

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES

PICARDES 1993

Par X. COMMECY

Pour 1993 encore, ces actualités ornithologiques ont pour but de mettre en évidence les modifications observées au cours de cette année là dans notre connaissance du statut des oiseaux fréquentant nos trois départements. Les bases de comparaisons utilisées sont le Guide des oiseaux de Baie de Somme, SUEUR F. et COMMECY X. (1990) EDF, DRAE Picardie, GEPOP, 192 p. et la publication : "Migrations et stationnements des limicoles à l'intérieur des terres-région Picardie", COMMECY X. (1989) *L'AVOCETTE* 13 (2-3-4) p.99-117, complétées par les différentes actualités ornithologiques publiées depuis dans *L'AVOCETTE*.

Les données publiées par SUEUR F. (1994) : Observations ornithologiques remarquables réalisées en 1993 en Picardie *Bulletin de la société Linéenne Nord-Picardie* p. 83-88 ont été consultées et éventuellement intégrées. Il serait plus simple pour tous qu'il n'y ait que la publication collective dans *L'Avocette* qui perdure mais on ne peut empêcher un observateur individuel de publier ses données où il le souhaite. Les observations ayant déjà fait l'objet de publications antérieures sont mentionnées (sauf omissions ou méconnaissances) avec leurs références.

Les données suivies de (*) ont été relevées dans "Le coin des branchés", *L'Oiseau* magazine -L.P.O. et n'ont pas été transmises à la C.O.P.; ce ne sont donc pas des données authentifiées et doivent être prises avec beaucoup de circonspection jusqu'à nouvel avis.

Plongeon imbrin *Gavia immer*

1 ad. le 9 janvier au Hourdel (80) (T. RIGAU), 1 juv. le 30 Décembre à Monampteuil (L. GAVORY, J. LITOUX et al.); cette espèce n'est pas notée chaque année et est encore plus occasionnelle en terres.

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

1 le 25 Février à Bouvaincourt/Bresles (80) (L. GAVORY); 1 juv. le 28 Novembre puis 1 ad. le 28 au PeA (02) (H. COENEGRACHTS, L. GAVORY et J. LITOUX); les observations en terres restent peu fréquentes en Picardie.

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

1 juv. le 30 Août à Estrées-Mons (80) (X. COMMECY), nouvelle preuve d'une dispersion postnuptiale à cette époque jusque dans notre région.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

1 couple nicheur à Chevrières (60) : 2 juv les 26 Juillet et 8 Août (S. MALIGNAT, A. ROUGE et al.) et un autre probable à Bresles (R. FRANCOIS).
7 ad. le 15 Mai au H.A. (80) (V. BAWEDIN), passage à cette époque ou installation de nicheurs ?

Grand cormoran *Phalacrocorax carbo*

Installation d'un dortoir fréquenté à partir d'Octobre à Villers en Prayères (02), entre 19 et 43 oiseaux repérés (L. GAVORY et J. LITOUX) et un à Chaalis (60) (J.

LHEULLIER) avec un max. de 26 le 4 Novembre; premiers suivis de dortoirs conséquents dans ces départements.

Héron bihoreau *Nycticorax nycticorax*

Un jeune peu volant à Noyelles/mer le 9 Juin (TRIPLET 1993), première certitude de reproduction réussie sur le littoral picard où elle est suspectée depuis longtemps. 1 en vol crépusculaire le 28 Mai en forêt d'Ermenonville (60) (D. DELVILLE); date de passage prénuptial sans surprise mais seulement deux données antérieures sûres pour ce département.

Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis*

Conséquence des reproductions de 1992 et de celle de 1993 des statinements hivernaux sont notés au P.O.M. (P. CARRUETTE) et (F. SUEUR 1994) ce qui est nouveau pour la région.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

1 le 14 Juillet à Parcy -02-(*) puis 1 les 18 et 23 Juillet à Viry-Nouveau (02) (R. FRANCOIS et L. GAVORY), 1 à Vauciennes (60) le 15 Août (J.P. BONNEL) et 1 à Chevières (60) le 21 Août (CORIF); jamais le passage postnuptial n'avait été repéré de cette façon en terres; faut-il y voir une conséquence du développement de la colonie littorale du Marquenterre : 32 nids sûrs- 47 comptés (risques de surestimations : ébauches, nids non occupés...) (P. CARRUETTE). A noter 150 le 28 Octobre au dortoir du P.O.M. et encore 67 le 19 Décembre (P. CARRUETTE).

Grande aigrette *Egretta alba*

1 du 13 Juin (1, la même? le 11 Juin au H.A. (SUEUR 1994), donnée la plus précoce connue) au 31 Décembre en B.S. Nord (Réserve, P.O.M., Le Crottoy) (P. CARRUETTE et de nombreux observateurs), record de présence continue pour cet oiseau.

Héron cendré *Ardea cinerea*

2 nids au PeA (02) (L. GAVORY, J. LITOUX et al.); première année, second site pour le département, les nids sont atypiques pour la région : petits Saules bas (environ 2 mètres) dans la phragmitaie.

Cigogne noire *Ciconia nigra*

1 ad. et 2 juv. observés fin Juin-début Juillet en forêt de Saint-Michel (02) (P. FERREIRA); signe d'une nidification proche mais le site de nid (non trouvé) peut aussi bien être en Belgique ou dans les Ardennes proches que dans l'Aisne. A surveiller dans les années à venir.

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

1 le 20 Février à Amigny-Rouy (02) (L. GAVORY et J.P. BONNEL), même aux passages, cette espèce est rarement observée en terres dans la région. Tentative de nidification dans la héronnière du P.O.M. du 30 Avril au 16 Juillet (transport de matériaux le 18 Mai, max. 23 ad. posés dans les Pins le 21 Mai) (P. CARRUETTE); toujours pas de reproduction menée à terme malgré les essais successifs de ces dernières années.

Cygne de Bewick *Cygnus bewickii*

11 le 24 Novembre au H.A. (80) (G. FLOHART), voilà bien longtemps qu'un tel groupe de cette espèce n'avait été signalé dans la région.

Oie rieuse *Anser albifrons*

L'aménagement de nouvelles prairies dans le P.O.M. a amélioré les conditions d'hivernage de cette espèce : 3 le 7 Novembre, 7 le 21, 106 le 1 Décembre, 125 le 31 (P. CARRUETTE).

Bernache nonette *Branta leucopsis*

11 le 29 Novembre (*) et 1 le 4 Décembre au H.A. (80) (L. GAVORY) et 22 le 26 décembre au P.O.M. (80) (T. RIGAUX), hors coup de froid majeur la région n'accueille que peu cette espèce nordique à moins que les populations férales de Grande-Bretagne ne viennent changer ce statut.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

13500 le 12 décembre et 14700 le 31 en RBdS (T. RIGAUX); nouveaux records d'abondance, mais jusqu'où s'arrêteront-ils (humour)?

Fuligule milouin *Aythya ferina*

5 couples nicheurs certains (4X3 et 1X5 pulli) et 8 couples possibles en vallée de Bresles, autour de Sénarpont (80) (X. COMMECY et J.M. SANNIER).

Fuligule morillon *Aythya fuligula*

4 couples nicheurs certains (2X4, 1x3 et 1x2 pulli), 1 couple probable et 6 possibles en vallée de la Bresles, autour de Sénarpont (80) (X. COMMECY et J.M. SANNIER).

Fuligule milouinan *Aythya marila*

1F./Im. à Monampeuil (02) et 2 F./Im. au PeA (02) le 28 Novembre (L. GAVORY); nouvelles données en terres pour cet anatidé essentiellement marin.

Harelde de Miquelon *Clangula hyemalis*

1 mâle Im. le 18 Novembre à Verneuil en Halate (60) (J. LHEUILLEZ); espèce peu fréquente en terres.

Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula*

Hivernage continu et régulier à Pontpoint (60) : 9 jusqu'au 4 Mars puis 4 dès le 27 Novembre (A. ROUGE); rare site de présence en terres.

Autour des Palombes *Accipiter gentilis*

8 couples nicheurs certains ayant produit chacun au moins deux jeunes (4 pour un couple), sur 6 cartes I.G.N. 1/25000 du Sud de l'Aisne (J. MORENIAUX).

Buse pattue *Buteo lagopus*

1 à 2 régulièrement observées à partir du 13 Novembre au H.A. (80) (L. GAVORY et al.); reprise d'un hivernage continu dans le secteur. 1 le 3 Octobre à Juvigny (02) J. LITOUX).

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*

1 le 30 Mars à Dammard (02) en vol Nord (J. MORENIAUX); précoce.

Gelinotte des bois *Bosana bosania*

Confirmation de la présence d'une petite populations (nicheuse ?) dans la forêt de Saint-Michel (02) avec l'observation d'un oiseau le 27 Septembre (L. LARZILLIERE).

Râle des genets *Crex crex*

26 chanteurs dans la ZICO de la vallée inondable de l'Oise (secteur Chauny-Beautor -02-) (R. FRANCOIS); population importante pour la France, effectifs à suivre.

Grue cendrée *Grus grus*

1 juv. du 3 au 10 Avril à Lanchères (80) (L. GAVORY); les données de printemps sont rares pour cette espèce, surtout si à l'Ouest de notre région.

Glaréole à ailes noires *Glareola nordmanni*

1 ad. les 23 et 24 Mai à Noyelles/mer (80) (G. FLOHART)

Huitrier pie *Haematopus ostralegus*

En terres, première donnée : 1 le 19 Septembre à Amiens (80) (V. BAWEDIN).
2 couples se reproduisent dans des cultures en bordure du littoral, à St Quentin en Tourmont (80) 3 jeunes pour l'un, échec pour l'autre (V. BAWEDIN).

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

Nicheuse certaine (1 couple) à Grand-Laviers (80) (V. BAWEDIN).

Avocette *Recurvirostra avocetta*

Nicheuse certaine (1 couple) à Grand-Laviers (80), dans un bassin de décantation à quelques kilomètres du rivage et 63 en ce lieu le 21 Juillet (V. BAWEDIN).
240 en 2 vols au large de Cayeux/mer (80), le 21 Novembre (X. COMMECY), jamais un tel effectif n'avait été repéré à cette époque de l'année.

Petit gravelot *Charadrius dubius*

Si l'observation du 14 Mars au H.A. (80) (A. ROUGE) est très précoce, elle n'est pas la plus précoce devant celle du 12 Mars 1978.

Grand gravelot *Charadrius hiaticula*

Plusieurs données en terres, nous ne citons que celles qui précisent son statut tel qu'actuellement connu: 1 le 18 Juin à Daours (80) (V. BAWEDIN), 3 le 24 et 1 le 26 Juin puis 1 le 14 Juillet à Luzoir (02) (L. LARZILLIERE); 1 le 18 Juillet à Viry-Nouveau (02) (L. GAVORY); celles de Juin étendent un peu les dates connues du passage de printemps, celles de Juillet sont assez précoces.
Effectif important en RBdS le 13 Août, 1200 (X. COMMECY).

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

1 ad. le 7 Juin à Roye (80) (L. GAVORY et ORY et C. LOUVET), 1 ad le 15 Août à le Viry-Nouveau (02) (H. COENEGRACHTS, L. GAVORY et J. LITOUX); 6ème et 7ème donnée en terres pour la région.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

1 le 5 Mai à Daours (80) (V. BAWEDIN), seconde donnée seulement pour le passage prénuptial en terres, 1 le 28 Août à Chevrières (60) (GEOR-60-)

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

840 le 29 Mai en RBdS (T. RIGAUX), effectif record

Bécasseau minute *Calidris minutus*

Passage postnuptial important, maximum de 124 le 16 septembre en RBdS-P.O.M. (P. CARRUETTE). 1 le 31 Juillet à Chevières (60) (GEOR-60-), nous ne connaissons le passage en terres qu'à partir de la première décade d'Août!

Bécasseau de Temminck *Calidris temmincki*

2 le 9 Mai à Estrées-Mons (80) (L. GAVORY), nouvelle donnée pour le passage prénuptial en terres habituellement peu repéré après celles de 1992; 1 le 27 Avril au H.A. (80) (L. GAVORY) et 2 le 9 Mai en RBdS (G. FLOHART et A. ROUGE), dates classiques du passage prénuptial qui n'est pas lui non plus noté chaque année sur le littoral.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

140 comptées (170 à 190 estimées) le 22 Mars au marais communal de Nempont (80) (G. FLOHART); effectif record signant bien l'intensité maximale du passage prénuptial à ce moment de l'année.

Bécassine sourde *Lymnocyptes minutus*

2 le 28 Mars en RBdS (Anse Bidard) (T. RIGAUX), confirme le discret passage de cette espèce sur nos côtes fin mars comme celles du 8 Mars à Chiry-Ourscamp (60) (R. FRANCOIS) et du 24 Mars à Ailly/Somme (80) (L. GAVORY) en terres. L'observation de 1 le 11 Novembre à Viry-Nouveau (02) (L. GAVORY) montre elle la fin du passage postnuptial lui aussi des plus discrets.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

1 le 19 février à Moru-Pontpoint (60) (J.M.Mallard); remontée précoce.

Barge rousse *Limosa lapponica*

1 le 5 Mai à Chevières (60) (A. ROUGE), 5 ème donnée en terres.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

Si la date du 9 Mai est classique pour observer le passage de cette espèce en migration prénuptiale sur le littoral, au H.A. (80), l'effectif compté en 2 heures : 300 est exceptionnel (G. FLOHART); ce même jour ont été aussi observés en migration active : 1500 Chevaliers gambette *Tringa totanus*, 500 Barges rousse *Limosa lapponica*, 250 Pluviers argentés *Pluvialis squatarola*...).

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus*

1 le 20 Juin à Péronne (80) (L. GAVORY), une des très rares données régionales en terres de cette espèce; sur le littoral fin Juin marque la fin du passage prénuptial. Plus classiquement, 1 juv. les 28 et 29 Août au P.O.M. (P. CARRUETTE).

Mouette mélanocéphale *Larus mélanocéphalus*

2 couples construisent un nid mais sans réussite de la reproduction au Crotoy (80) (L. GAVORY et al.) (SUEUR F. 1994); à quand la première nidification réussie dans la région?

Goéland cendré *Larus canus*

Suite à l'afflux du à la vague de froid de fin 92, effectif record en stationnement : 46 le 7 Janvier à Pontpoint (60) (A. ROUGE).

Goéland brun *Larus fuscus*

6 à St-Nicolas-aux-bois (02) et 1 à Viry-Nouzeil (02) le 23 Mai (L. GAVORY); espèce peu observée en terres; l'époque de ces 2 observations correspond sur le littoral à la fin du passage prénuptial et il est alors maximum.

Goéland leucophaea *Larus cachinnans*

1 adulte transporte des matériaux (pas de suites) le 15 Mai au P.O.M. (P. CARRUETTE); premiers indices d'une installation à venir de cette espèce dans la région?

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

1 ad. le 29 Décembre à Cléry/Somme (80) (T. RIGAUX), espèce rarement rencontrée en terres et un record de date tardive.

Sterne Pierre-Garin *Sterna hirundo*

6 ad. 3 juv. le 18 Juillet puis 2 ad. 2p. le 15 Août à Beautor (02) (L. GAVORY); nouveau site dans ce département après ceux occupés en 1992.

Guifette moustac *Chlidonias hybridus*

1 le 27 Avril au H.A. (80) (*); 2 les 24 Mai et 21 Juin à Noyelles/mer (80) (G. FLOHART); espèce toujours rare mais dates classiques sauf celle de Juin.

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*

2 le 9 Mai et 1 le 10 à Boismont (80) (G. FLOHART et A. ROUGE); ces données précisent les dates du passage prénuptial qui n'est pas repéré chaque année.

Mergule nain *Alle alle*

1 le 29 Novembre à Cayeux/mer (80) (*); date sans surprise mais n'est pas observé chaque année.

Coucou gris *Cuculus canorus*

1 tardif le 31 Octobre au P.O.M. (P. CARRUETTE)

Martinet noir *Apus apus*

2 à 3000 le 13 Juillet en centre ville de Compiègne (60) (R. FRANCOIS), pourquoi un tel rassemblement? S'agit-il des seuls nicheurs locaux?

Torcol fourmilier *Jynx jynx*

Espèce devenue rare dans la région (hors forêt de Compiègne -60-) aussi la découverte de 4 cantons dans le Camp militaire de Sissonne est elle une heureuse surprise.

Pic cendré *Picus canus*

Contacté en Juin en forêt de Compiègne (60) (P. SENGEZ); espèce peu connue dans la région.

Pic mar *Driocopus medius*

1 mâle à Lappion (02) (L. G. et V. BAWEDIN), soit bien en dehors des secteurs connus comme étant occupés dans notre région par cette espèce et dont les effectifs sont précisées cette années par R. FRANCOIS : 27 chanteurs en forêt de Laigue, 10 en forêt de Compiègne, 2 en forêt d'Ourscamp et 1 en Forêt de Hez.

Alouette calendrelle *Calandrella brachydactyla*

1 le 8 Mai au Banc de l'Ilette en Baie de Somme (80) (*); ce serait une première régionale.

Alouette lulu *Lulula arborea*

La prospection d'un nouveau site, le camp militaire de Sissonne (02) permet de détecter un minimum de 20 couples cantonnés (L. GAVORY et al.), c'est la plus importante population pour la région; les 2 chanteurs repérés le 15 Mai (puis 1 le 22) dans les dunes entre Quend-Plage et Fort-Mahon (80) (T. RIGAUX) sont la preuve que ce petit noyau de reproducteurs n'a pas disparu. Date du passage postnuptial confirmé par l'observation de 3 en migration le 5 Octobre à Morienval (60) (J.P. BONNEL).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

2 très tardives le 31 Octobre à Ault (80) (X. COMMECY), remarquons que ce même jour sont aussi notées des Hirondelles de cheminée *Hirundo rustica* elles aussi tardives (11 au Crotoy - S. THIERY- et 6 à Quend-Plage -R. DEVISSE) sur le littoral nord.

Pipit rousseline *Anthus campestris*

La surprise de l'année (?) : un minimum de 3 couples cantonnés, nicheurs probables est repéré dans le camp militaire de Sissonne (02); une note à paraître devrait faire le point sur cette découverte (et sa confirmation en 1994) d'une petite population, trait d'union entre celles du Nord-Est de la France et celle de Belgique.

Bergeronnette de Yarrel *Motacilla alba yarrelli*

12 le 25 Février à Gamaches (80) (L. GAVORY), début précoce du passage.

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*

1 chanteur le 3 Avril au P.O.M.(80) (F. SUEUR); donnée antérieure la plus précoce : 1 le 7 Avril 1986.

Rouge-queue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

15 cantons repérés en forêt de Compiègne (60) (R. FRANCOIS et al.), première estimation d'effectif pour cette espèce devenue bien localisée dans la région.

Tarier d'Europe *Saxicola rubetra*

Minimum de 61 couples repérés dans le camp militaire de Sissonne (02) (L. GAVORY et al.) et 100 à 160 couples dans la ZICO de la vallée inondable de l'Oise (secteur Chauny-Beautor -02-) (R. FRANCOIS); deux belles populations connues mais dont les effectifs sont ainsi précisés pour une espèce maintenant très localisée dans la région.

Traquet pâle *Saxicola torquata*

Minimum de 85 couples repérés dans le camp militaire de Sissonne (02), 150 estimés (L. GAVORY et al.) pour cette espèce en forte régression dans toute la région.

Merle à plastron *Turdus torquata*

6 le 18 Avril à Beautor (02) (L. GAVORY); date classique du passage mais groupe important.

Grive litorne *Turdus pilaris*

1 nid/au moins 2 jeunes de bonne taille le 17 Juillet à Quend (ETIENNE 1993), première certitude de nidification dans ce secteur, le plus à l'Ouest de la région après plusieurs indices sérieux les années précédentes.

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*

2 chanteurs repérés dans le camp militaire de Sissonne (02), soit une localisation bien au nord de la répartition régionale (et française) de cette espèce.

Mésange noire *Parus ater*

Une invasion de cette espèce a été remarquée dans toute la France cet automne; 1902 en migration active ont été comptées au P.O.M. (P. CARRUETTE) (32 en Août, 1707 en Septembre, 138 en Octobre, 25 en Novembre) bien que ce site ne soit pas le mieux placé pour avoir une vue d'ensemble du phénomène sur le littoral nord (par exemple plusieurs centaines en mouvement sont observées en RBdS pour la seule journée du 19 Septembre (X. COMMECY et al.).

Grimpereau des bois *Certhia familiaris*

Chanteurs entendus en Mars en forêt de Retz (02) et dans le bois voisin d'Hautwison (J. MORENIAUX); confirmation et extension de la présence de cette petite population picarde d'une espèce localisée en France.

Pie grièche écorcheur *Lanius collurio*

Minimum de 45 couples repérés dans le camp militaire de Sissonne (02), 100 estimés (L. GAVORY et al.) et 78 couples dans la ZICO de la vallée inondable de l'Oise (secteur Chauny-Beautor -02-) (R. FRANCOIS); deux remarquables populations en limite Nord-Ouest de répartition nationale. Ailleurs, 10 en forêt de Compiègne (60) (R. FRANCOIS et al.)

Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes*

3 le 30 septembre à Vervins (02) (*); rarement observé dans la région.

Bruant lapon *Calcarius lapponicus*

1 le 25 Octobre à Aulnois/Laon (L. GAVORY et X. COMMECY); une des rares données pour cette espèce dont une meilleure connaissance du chant par les observateurs et des opérations de captures au filets commencent à mettre en évidence un passage en petit nombre jusqu'alors quasiment inconnu mais régulier en terres dans toute la France.

Bruant rustique *Emberiza rustica*

1 le 16 Octobre au Crotoy (80) (*); donnée soumise au CHN (ce qui n'a pas été fait); nous attendons donc des précisions pour cette première régionale d'une espèce rare en France : 10 observations au XX siècle.

Bibliographie :

ETIENNE P. (1993) : Nidification de la grive litorne *Turdus pilaris* sur le littoral picard (Département de la somme). *Picardie écologie*, 8 : 37.

SUEUR F. (1994) : Premier cas de nidification de la Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* en Picardie. Bulletin de la société linéenne Nord-Picardie Tome XII p.87-88.

TRIPLET P. (1993) : Nidification du héron bihoreau *Nycticorax nycticorax* en plaine maritime picarde. *Picardie écologie*, 8 : 45.