

CENTRALE ORNITHOLOGIQUE G.E.P.O.P.

ADDITIONS A LA SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1974

Après la publication de la synthèse 1974, la Centrale a reçu encore quelques observations dont nous avons extrait les plus intéressantes.

F. Sueur

Fuligule milouinien (Aythya marila)

1 femelle du 1er au 3 avril à Pontpoint-60

Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus)

1 observation à l'intérieur des terres mérite d'être signalée :
2 le 29 mars à Long-le-Catelet-80

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)

1ères : le 13 avril à Long-le-Catelet.

Locustelle inachinoïde (Locustella inachinoïdes)

1ères : le 15 avril à Long-le-Catelet.

CENTRALE ORNITHOLOGIQUE G.E.P.O.P.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1975

Cette année 1975 a été fertile en événements ornithologiques : nidifications du Canard pilet, de l'Avocette, du Cisticole des joncs... observations du Faucon kobez, du Phalarope à bec étroit, de la Mouette de Sabine...

Si l'on compare cette synthèse avec celle de l'année précédente, on remarque qu'elle traite d'un plus grand nombre d'espèces et avec plus de détails en général pour chacune. Cela est dû au nombre accru des observateurs et surtout à l'activité importante de certains d'entre eux qui réalisent la majorité des observations. Toutefois on peut déplorer la perte d'un certain nombre d'informations, plusieurs observateurs omettant d'envoyer des comptes-rendus ornithologiques.

P. Royer et F. Sueur

Observateurs : L. Allouche, A. Baras, F. et G. Baudry, G. Boccourt, J.L. Bourdons, E. Chaaron, X. Commey B. Centy, N. Darras, M. Defermand, J.F. Dejonghe (G.O.P.), C. Delahoche, R. Delcourt, P. Dequiedt, B. de Wazières, F. Dordain, G. Dubois G. Duhamel, Y. Flament, E. Fourey, M.C. Guillaume, G. Guillot, A. Jouve, V. Lefebvre, C. Lemaire, D. Masson, J.L. Migeon, M. Nequet, G. Neveu, R. Paxton, N. Ranson, P. Royer, F. et M. Sueur, P. Thiery, J. et P. Trouvilliez.

Abréviations : BdA = Baie d'Authie 80
BdS = Baie de Somme 80
HA = Hâble d'Ault 80
MQ = Marquenterre 80
M. = mâle
F. = femelle
ad. = adulte
subad. = subadulte
im. = immature
juv. = juvénile
pull. = pullus, pulli (poussin)

Lorsque le département n'est pas mentionné après la localité d'observation, il s'agit de la Somme.

Plongeon arctique (*Gavia arctica*)
1 trouvé mort le 25 janvier en BdS.

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)
1 trouvé mort le 13 avril à Quend-Plage.

Grèbe luppé (*Podiceps cristatus*)
30 le 20 avril à Cléry-sur-Somme, 10 le 14 mai au HA.
Nidification : 2 ad./2 pull., 1 ad./1 pull., 2 ad. le 27 mai à Bray-sur-Somme
5 couples (1 ad./1 pull.) le 8 juin à Cléry-sur-Somme
2 ad./4 pull., 2 ad./2 pull. en juin au HA
2 ad./4 pull. au Hamel (nouvelle localité de nidification).

Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*)
1 trouvé mort le 23 février sur le littoral. 1 le 3 déc. à Boves.

Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)
2 tués le 20 novembre à Boves.

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)
1 du 1er au 3 avril au HA. 2 le 29 octobre dans le MQ.

Grèbe castagneux (*Podiceps ruficollis*)
Nicheur commun. Beurepaire-60 : 15 (1 ad./2 juv.) le 9
sept., 10 le 4 nov., 5 le 12 déc., plus un seul le 30.

Fulmar (*Fulmarus glacialis*)

5 trouvés morts le 13 avril à Quend-Plage. 2 le 27 à Ault
(Bois de Cise).

Fou de Bassan (*Sula bassana*)

Hormis l'hivernage sur le littoral jusqu'en avril et à
partir de septembre (nombreux individus trouvés morts
pendant cette période), 1 aubad. trouvé mourant le 13
juin en Bda.

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Bds-HQ : 1 ad. le 13 mars, 2 le 16, 3 les 28 et 29. 3
(1 ad. de la sous-espèce continentale) le 3
avril. 1 ad. le 8 juillet, 4 ad. le 9, 3 le 26.
2 le 3 août et le 5 septembre. 3 le 6 octobre,
1 du 8 au 12, 1 in. le 29.

HA : 1 ad. les 2 et 3 avril, 1 le 27. 1 in. le 7 mai, 2
les 18 et 21. 1 le 9 juin.

A l'intérieur : 17 (dont 6 in.) remontant la vallée de
l'Oise le 5 avril à Beurepaire-60
1 in. le 20 à Cléry-sur-Somme, 27 quelques
jours auparavant.

Héron cendré (*Ardea cinerea*)

1 colonie dans la Somme, 1 dans l'Oise.

Bds-HQ (max. mensuels) : 10 en janvier, 1 en avril, 5 en
mai, 14 en juin, 26 en juillet, 30 en août, 2 en
sept., 25 en oct., 10 en nov., 17 en déc.

A l'intérieur, 12 le 21 juillet à Fontaine-sur-Somme ;
1 les 12 et 31 août, 21 sept. et 2 nov. à Boves ; 1 le
4 oct. à Corbie, 1 le 9 à Condé-Folle, 1 le 7 déc. à Fieffes

Héron pourpre (*Ardea purpurea*)

1 dans le HQ à la mi-mai. 1 le 19 mai au HA, 2 le 21.

1 le 25 en Bds. 1 le 23 juillet à Long-le-Catelet.

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)

HQ : 1 de la mi-mai au 15 juin, 2 du 16 au 21, 3 le 22,
2 du 23 juin au 26 juillet, 1 du 14 août au 2 sept.

Héron bihoreau (*Nycticorax nycticorax*)

HQ : 1 les 19, 24 et 25 mai. 1 le 8 juin, 1 le 26 juillet.

Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)

1 H. le 19 mai à Cléry-sur-Somme, 1 le 12 août à Boves.

Grand Butor (*Botaurus stellaria*)

1 du 23 mars au 11 juin à Boves, 1 le 19 mai à Long-le-
Catelet, 1 le 28 sept. à Fouencamps.

Spatule blanche (Platalea leucorodia)

MQ : 3 à 4 pendant la 2e quinzaine de mai, 1 du 31 mai au 15 juin, 3 (1 ad., 1 subad., 1 im.) jusqu'au 12 juillet, 2 le 22, 3 le 23. 1 le 29 août.

Cygne tuberculé (Cygnus olor)

MQ-BdS (max. mensuels) : 1 en janvier, 7 en février, 1 en décembre.

HA (max. mensuels) : 22 en janvier, 19 en février, 17 en mars, 12 en avril, 11 en mai, 12 en juin, 10 en nov., 26 en déc.

1 le 9 avril à Caix, 3 le 27 à L'Etoile. 1 du 13 au 27 mai à Bray-sur-Somme, 2 le 5 juin. 10 le 8 à Cléry-sur-Somme, 9 le 3 juillet à Gamaches. 2 le 29 nov. à Sailly-Laurette, 1 les 22 et 27 déc. 1 im. du 15 au 31 déc. à Villers-Bocage et 1 im. pendant la même période à Amiens, 1 le 3 déc. à Dreuil-les-Amiens.

Nidification : 2 ad./8 pull. à Gamaches et 2 ad./10 pull. à Dompierre-sur-Authie.

Cygne de Bewick (Cygnus bewickii)

1 dans le Marquenterre à la mi-octobre.

Oie des moissons (Anser fabalis)

100 en février en BdS.

Oie cendrée (Anser anser)

110 le 16 mars en BdS.

Bernache cravant (Branta bernicla)

4 le 8 octobre en BdS.

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)

BdS-MQ (max. mensuels) : 800 en janvier, 200 en février, 300 en mars, 140 en avril, 60 en mai, 65 en juin, 130 en octobre, 1300 en déc.

présent toute l'année avec un minimum en août
1ers pull. notés le 14 juin, 2 à 14 par couvée.

Canard colvert (Anas platyrhynchos)

BdS-MQ : 50 en janvier, 40 en avril, 14 en juin, 200 en juillet, 300 en octobre, 100 en déc.

Nicheur commun, 1ers pull. le 4 avril, 2 à 12 par couvée.

Sarcelle d'hiver (Anas crecca)

BdS-MQ : 21 le 16 mars, 150 le 2 avril, 100 le 3 octobre, 40 le 9, 100 le 18 oct. et le 9 nov., 220 le 6 déc.

Canard chipeau (Anas strepera)

BdS-MQ : 1 M. 1 F. le 18 mai, 17 le 21 juin, 5 le 4 juillet, 2 le 3 octobre, 1 du 6 au 25.

HA : 2 le 1er avril, 3 le 2.

Canard siffleur (Anas penelope)

BdS-MQ : 19 du 2 au 26 janvier, 2 M. 2 F. le 16 mars, 15
le 3 avril, 1 M. le 31 mai, 3 M. le 1er juin, 1
M. le 14, 30 le 4 juillet, 6 le 7, 20 les 3 et 25
octobre, 7 le 6 déc., 20 le 19.
A l'intérieur, 2 le 13 avril à Boves.

Canard pilot (Anas acuta)

BdS-MQ : 160 le 26 janvier, 1 5 le 22 février, 7 le 16 mars,
3 le 1er avril, 2 M. le 1er juin, 1 M. le 4 juillet
19 le 6 octobre, 100 le 18, 200 le 9 nov., 300 le
30 déc.

Nidification : 1 F./3 pull. le 14 juin (3 ou 4 couples
auraient niché).

Sarcelle d'été (Anas querquedula)

1ère : le 29 mars à Boves.
1 le 27 avril à Long-le-Catelet, 8 le 9 juin au HA, 8 le 14
août dans la Marquenterre.
dernières : le 18 octobre en BdS.

Canard poucet (Anas clypeata)

BdS-MQ : 4 le 2 janvier, 5 le 23 février, 7 le 4 avril,
8 le 23 juillet, 10 le 18 octobre, 20 le 25.

Nidification : 1ère pull. notée le 25 juin, 5 à 8 par
cuvées.

HA : 1 F. le 23 février, 4 le 2 avril, 30 le 27, 3 le 21
mai, 1 le 6 déc.

3 M. le 31 mars à Long-le-Catelet, 4 le 4 avril à Boves.

Fuligule milouin (Aythya ferina)

MQ : 1 F. du 4 au 26 janvier, 1 M. 1 F. le 1er juin, 1 F.
le 14, 23 le 19, 30 le 20, 33 le 24, 1 les 6 et 30
déc.

HA : 250 le 3 janvier, 100 le 5, 150 le 25, 600 le 26,
15 le 22 février, 23 le 2 avril, 22 le 27, 30 le 9
juin, 130 le 6 déc., 18 le 29.

2 F./im. le 12 août à Fouencamps, 1 F./im. le 22 déc. à
Corbie, 1 F./im. les 22 et 27 à Sailly-Laurette.

Fuligule morillon (Aythya fuligula)

HA : 9 le 3 janvier, 6 le 5, 20 le 22 février, 7 le 2 avril,
4 le 27, 2 le 9 juin, 110 le 6 déc., 42 le 29.

MQ : 2 M. le 1er juin, 1 M. les 24 juin et 4 juillet, 3 le 7.
A l'intérieur, 1 M. le 19 janvier à Corbie.

Fuligule milouinan (Aythya marila)

1 M. le 4 avril à Beaupaires-60, 2 F. le 9 nov. au HA,
1 F. le 14 déc. dans la Marquenterre, 1 M. 1 F. le 30.

Eider à duvet (Somateria mollissima)

1 M. le 9 novembre en BdS.

Macreuse noire (Melanitta nigra)

Cayeux-sur-Mer : 30 le 23 février, 300 le 6 décembre, 46 le 29.

Quend-Plage : encore 300 le 1er avril, 100 le 4, 50 le 6.

10 le 7 octobre, 20 le 9, 60 les 10 et 19.

1 M. le 11 mai dans le Marquenterre.

Macreuse brune (Melanitta fusca)

Notée sur le littoral jusqu'au 7 mai et à partir du 22 nov.

Hareide de Miquelon (Clangula hyemalis)

1 du 16 au 23 février au HA.

Garret à œil d'or (Bucephalus clangula)

1 F. du 1er février au 21 mars à Pontpoint-60.

BdS-MQ : 1 M. le 16 mars, 3 M. le 6 déc., 1 F. le 30.

1 F. le 9 novembre au HA.

Harle piette (Mergus albellus)

1 F. le 3 janvier au HA.

Harle huppé (Mergus serrator)

BdS-MQ : 1 le 2 janvier, 21 le 24 mars, 15 les 28 et 29,

17 le 1er avril, 10 le 3, 8 le 4, 1 M. le 9 nov.

2 F. au HA le 1er avril, 1 M. le 2 à Cayeux-sur-Mer.

4 le 4 avril à Quend-Plage, 250 le 6.

Buse variable (Buteo buteo)

Localités d'observation dans la Somme : Abbeville, Ailly-sur-Noye, Berny-sur-Noye, BdS, Cayeux-sur-Mer, Corbie, Fouencamps, Forêt de Crécy, HA, Marquenterre.

Epervier d'Europe (Accipiter nisus)

Localités d'observation dans la Somme : BdS, Marquenterre, Mouflers.

Autour des palombes (Accipiter gentilis)

1 F. début janvier en forêt de Compiègne-60, 1 M. le 7 mai.

Milan royal (Milvus milvus)

1 le 7 juin à Pont-Noyelles, 1 le 3 juin dans le Marquenterre, 1 le 3 août

Milan noir (Milvus migrans)

1 bague en Suisse du 25 au 28 mai, recueilli ce dernier jour, à Amiens (Presse locale). 1 le 11 octobre à Sailly-Flibeaucourt.

Buseard des roseaux (Circus aeruginosus)

Marquenterre : 1 couple nicheur probable observé de mai à août, jusqu'à 3 individus le 10 juillet (1 M. ad., 1 M. im., 1 F.)

2 à 3 autres couples nicheurs probables dans le secteur du littoral.

1 F. le 26 avril à Boves, 1 M. le 13 mai.

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)

Toujours des F./im. en hivernage : 1 le 3 janvier au HA,
1 le 26 à Quend, 2 le 26 février à Argoeuves, 1 du 9
nov. au 7 déc. dans le Marquenterre, 1 le 14 déc. à
Mareuil-Caubert, 1 à Crécy-en-Ponthieu.

1 M. le 21 juin à Rue.

Dalbusard fluviatile (Pandion haliaetus)

1 le 19 avril à Fouencamps, 1 du 29 août au 5 sept. dans
le Marquenterre, 1 du 4 au 6 sept. à Heilly.

Faucon kobez (Falco vespertinus)

1 F. du 5 au 7 mai à Baillon-60, près de Chantilly.

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

Seul rapace répandu dans notre région : 34 localités d'ob-
servation dans la Somme.

Râle d'eau (Rallus aquaticus)

Commun toute l'année, peu de données significatives, 5 à
6 chanteurs le 17 juin à Sailly-le-Sec.

Marouette ponctuée (Porzana porzana)

1 chanteur le 19 mai à Long-le-Catelet.

Foule macroule (Fulica atra)

Nicheur commun.

HA : 400 le 3 janvier, 300 le 5, 200 le 25, 300 le 22
février, 400 le 9 nov., 880 le 6 déc., 30 le 29.
75 le 29 nov. à Sailly-Laurette, 86 les 22 et 27 déc.

Huitrier-pie (Haematopus ostralegus)

BdS-MQ : 2000 le 2 janvier, 3000 le 4, 2500 le 26, 500
le 16 mars, 20 le 3 avril, 210 du 8 au 22 juillet,
250 le 24, 400 le 3 octobre, 2000 le 25, 3000 le
6 déc., 4500 le 30.

nidification : min. 6 couples.

Vanneau huppé (Vanellus vanellus)

BdS-MQ : 120 le 26 janvier, 100 le 22 février, 150 le 23,
50 le 16 mars, 300 le 6 déc.

nidification : 20 à 25 couples.

300 le 26 février et 1650 le 1er mars à Pontpoint-60.

Cité dans de nombreuses localités jusqu'en mars et à partir
de septembre, plus rarement d'avril à août.

Pluvier doré (Pluvialis apricaria)

10 le 1er mars à Pontpoint-60.

MQ : 1 le 9 juillet, 2 le 10, 1 les 14 et 29 août.

Grand Gravelot (Charadrius hiaticula)

BdS-MQ : 50 le 22 février, 1000 le 16 mars, 250 le 3 avril,
200 le 15 mai, 26 le 14 juin, 25 le 3 juillet, 30

le 10, 40 le 24, 300 les 6 et 9 oct., derniers le 12

nidification probable : 1 accouplement le 2 juillet.
20 le 9 juin au HA, 6 le 1er oct. à Beaufort-60.

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)

BdS-MQ : 75 le 1er janvier, 110 le 4, 45 le 26, 25 le 25 mai,
180 le 31, 20 le 14 juin, 10 le 17 juillet, 110 le
2 oct., 650 le 6, 20 le 6 décembre.

Petit Gravelot (Charadrius dubius)

Quelques couples nicheurs dans le Marquenterre, observation
d'un couple :

1ère ponte,	11 mai	, 1 nid/3 oeufs
	31 "	, 1 " /4 oeufs
2e ponte,	21 juin	, 1 " /3 "
	3 juillet,	nid abandonné
3e ponte,	9 "	, 1 nid/2 oeufs
	24 "	, 60000.

Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)

Présent d'avril à septembre dans le Marquenterre, Min. 11
couples nicheurs,

Tournepierrre (Arenaria interpres)

BdS-MQ : 1 le 16 mars, 2 le 10 mai, 10 les 11 et 31, 1 le 22
juillet, 24 le 25, 32 le 25, 8 le 26, 1 le 29 août
4 le 3 sept., 1 le 6 oct.

Bécassine des marais (Gallinago gallinago)

Présente toute l'année avec des max. en hivernage pour la
Somme au HA.

10 le 3 oct. à Beaufort-60, 100 le 25, +100 le 30 déc.

Bécasse des bois (Scolopax rusticola)

2 le 17 déc. en forêt de Crécy.

Courlis cendré (Numenius arquata)

BdS-MQ : 450 du 4 au 26 janvier, 400 le 16 mars, 10 le 27
avril, 4 en mai (nicheurs probables), 3 le 14
août, 15 le 10 sept., 16 le 6 oct., 300 le 9 nov.,
800 le 6 déc., 1200 le 30.

Courlis corlieu (Numenius phaeopus)

BdS-M Q : 40 du 18 mai au 8 juin, 70 le 22, 250 le 9 juillet,
450 le 10, 600 le 24, 10 le 5 sept., 1 les 2 oct.
et 21 déc.

Barge à queue noire (Limosa limosa)

2 le 7 mai au HA, 10 le 17. 1 du 11 au 26 juillet dans le
Marquenterre.

Barge rousse (Limosa lapponica)

BdS-MQ : 16 le 16 mars, 120 le 27 avril, 2 le 11 mai, 1 le
3 juillet, 2 le 2 oct., 10 le 6.
2 le 3 janvier au HA, 1 le 18 mai.

Chevalier arlequin (Tringa erythropus)

BdS-MQ : 12 le 7 mai, 2 le 16, 8 le 14 juin, 1 le 24, 2 le 30 juin et les 3 et 8 juillet, 1 du 3 au 13 août.

Chevalier gambette (Tringa totanus)

BdS-MQ : 12 du 2 au 26 janvier, 10 le 22 février, 30 le 16 mars, 18 le 3 avril, 55 le 8 mai; plus de 300 du 25 au 31, 30 le 18 juin, 100 le 30, 40 le 3 juillet, 52 le 8, 132 le 10, 128 le 11, 30 les 24 et 25, 15 le 26, 100 le 15 août, 10 le 5 sept., 24 le 6 oct.

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)

BdS-MQ : 1 le 21 juin, 3 du 3 au 8 juillet, 4 le 9, 1 du 11 juillet au 4 août, 2 le 5 août, 1 le 13, 5 le 2 sept. 2 le 14 sept. à Pontpoint-60.

Chevalier culblanc (Tringa ochropus)

1 les 5 et 12 avril à Deaurepaire-60. 1 le 1er juillet dans le Marquenterre.

Chevalier sylvain (Tringa glareola)

1 le 8 mai à Long-le-Catelet. 3 le 4 août dans le Marquenterre et 1 le 5.

Chevalier guignette (Tringa hypoleucos)

1er : le 20 avril à Brie.

Noté un peu partout jusqu'en septembre avec des maxima dans le Marquenterre : 13 le 1er juin, 10 le 30 juillet.

Bécasseau maubèche (Calidris canutus)

BdS-MQ : 300 le 25 mai, 4 le 3 juin, 2 le 3 juillet, 8 le 11, 3 le 23, 4 le 15 août, 1 le 2 sept., 2 le 30 déc.

Bécasseau minute (Calidris minuta)

BdS-MQ : 1 le 24 mai, 4 le 1er juin, 2 le 7 juin et les 3 et 5 août, 4 le 14, 14 le 2 sept., derniers le 6 octobre.

Bécasseau variable (Calidris alpina)

BdS-MQ : 500 les 1er et 2 janvier, 1500 le 4, 2000 le 26, 3000 le 16 mars, 100 le 3 avril, 40 le 27, 50 le 31 mai, 100 le 25 juillet, 40 le 30, 45 le 15 août, 600 le 6 oct., 50 le 1er nov., 2700 le 6 déc., 6000 le 30.

2 le 14 sept. à Pontpoint-60, 4 le 15.

Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea)

MQ : 1 le 11 juillet, 1 du 23 au 26, 16 le 3 août, 12 les 4 et 5, 5 le 21, 2 le 3 oct.

Bécasseau sanderling (Calidris alba)

BdS-MQ : 3 le 4 janvier, 30 le 16 mars, 9 le 26 juillet, 2 le 30 sept., 11 le 6 oct., passage important jusqu'à la mi-oct., 1 le 21 déc.

Combattant (Philomachus pugnax)

NQ : 5 le 7 mai, 1M. le 25, 1F. les 31 mai et 1er juin,
2M. 2F. le 7, 3M. le 24, 1M. le 1er juillet, 3 le 30,
1 du 3 au 13 août, 2 le 14, 1 le 21.

Avocette (Recurvirostra avocetta)

BdS-NQ : 17 le 16 mars, 67 le 3 avril, 80 le 4, 25 à 28 de
mai à juillet, 3 le 2 sept. et le 6 oct.

Nidification : 12 couples (cf. Sueur F. 1976, Bull. GEPOP
n°7)

Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus)

1F. en plumage nuptial dans le Marquenterre le 30 juin et
le 1er juillet, 1 tué début août en BdS.

Grand Labbe (Stercorarius skua)

1 trouvé mort le 4 avril en BdS.

Mouette pygmée (Larus minutus)

28 ad. et 2 im. le 6 avril à Quend-Plage, 1 im. trouvé mort
le 13. 1 im. le 23 mai au HA.

Mouette de Sabine (Xema sabini)

1 im. le 2 avril à Cayeux-sur-Mer.

Guifette noire (Chlidonias niger)

8 le 7 mai dans le Marquenterre, 3 le 8, 2 le 15.
4 le 7 mai au HA, 24 le 20, 11 le 21. 1 le 10 à Fouencamps.
7 le 13 mai à Bray-sur-Somme, 16 le 23. 1 le 31 mai à Port-
le-Grand, 1 le 9 juin à Longpré-les-Corps-Saints.

Guifette leucoptère (Chlidonias leucopterus)

1 le 23 mai au HA.

Sterne pierregarin (Sterna hirundo)

1ère (à l'intérieur) : le 20 avril à Brie.

BdS : 30 le 9 juillet, 65 le 10, 60 le 24. Un millier de
Sternes pierregarins, arctiques, naines et caugeks
le 5 sept. Dernière LE 10 sept.

Sterne naine (Sterna albifrons)

BdS-NQ : 3 le 10 juillet, 2 le 13 août, 3 le 13.

Sterne caugek (Sterna sandvicensis)

Quend-Plage : 15 le 6 avril, 5 le 13, 20 le 8 mai.
20 le 7 mai au HA.

BdS -NQ : 10 le 9 juillet, 32 le 10, 25 le 24, 4 le 30.

Guillemot de Troil (Uria aalge)

Pendant l'hivernage, 1 en plumage nuptial trouvé mort le
26 janvier au HA.

Mergule nain (Plautus alle)

1 trouvé mort le 22 février à Cayeux-sur-Mer.

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)
1ère : le 20 avril à Erle.

Tourterelle turgue (Streptopelia turtur)
Troupe d'environ 400 au sud d'Amiens les 4 et 5 janvier,
plus que quelques individus le 7 février.

Coucou gris (Cuculus canorus)
1er (tardif) : le 19 avril à Boves.

Hibou moyen-eup (Asio otus)
1 le 7 mai en forêt de Compiègne-60, 1 le 1er juin en forêt
de Crécy, 2 ad./2 juv. les 17 et 18 à Sillery-le-Sec, 4 du
17 au 19 juin à Boves, 1 trouvé mort le 20, 1 les 1 et 4
juillet dans le Marquenterre.

Hibou des marais (Asio flammeus)
1 couple nicheur dans l'Amiénois : Boves, 4 pull., 3 juv.
à l'envol.
1 le 15 mai en Bds, 1 le 19 oct. au HA.

Chouette chevêche (Athene noctua)
Localités d'observation dans la Somme : Amiens, forêt de
Crécy, Le Crotoy, Marquenterre, Saint-Quentin-en-Tourment.

Chouette huiette (Strix aluco)
1 seule localité d'observation dans la Somme (manque d'in-
formations) : Boves.

Martinet noir (Apus apus)
1ers : le 1er mai en Bds
Derniers (tardifs) : le 16 sept. à Amiens.

Huppe fasciée (Upupa epops)
1 le 12 oct. dans le Marquenterre.

Pic noir (Dryocopus martius)
1 le 7 mai en forêt de Compiègne-60.

Pic épeichette (Dendrocopos minor)
Citée dans quelques localités de la Somme : Boves, Condé-Folie,
Corbie, Bamechon, forêt de Crécy, Fouencamps.

Alouette lulu (Lullula arborea)
30 le 29 déc. au HA.

Alouette des champs (Alauda arvensis)
Nicheuse très commune. Hivernage (tardif) : 40 le 26 déc. à
Corbie...

Alouette haussecol (Eremophila alpestris)
1 le 3 janvier en Bds, dernière le 4 avril.
1ères : le 30 oct. au HA.
8 le 14 déc. en Bds, 15 le 29 à Cayeux-sur-Mer.

Hirondelle de rivage (*Hirundo lunifrons*)
1ère : le 19 avril à Beves.
dernière : le 14 sept. à Fouencamps.

Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*)
1ères : 4 le 7 avril à Amiens.
dernières : 2 le 9 nov. à Corbie.

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*)
1ère : le 19 avril à Beves.
dernière : le 28 sept. à Beves.

Pipit maritime (*Anthus trivialis*)
Hivernage sur le littoral jusqu'en mars et à partir de là.

Bergeronnette de Varrel (*Motacilla alba varrelli*)
1 en mars en BdS, 1 le 2 avril en HA, 1 le 3 dans le MQ.
1 le 7 juin à Corbie.

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)
Cette espèce n'a été observée que dans le secteur de Beves
que ce soit en période de nidification ou hivernage.

Traquet pâle (*Saxicola terquata*)
2 hivernants les 22 et 23 février en BdS.

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)
1ers : le 16 mars à Cayeux-sur-Mer.
derniers : le 6 sept. au HA.

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)
1 (tardif) le 10 nov. à Corbie.

Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)
1er : 1M. le 1er avril à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Ressignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)
1ers : le 13 avril en forêt de Crécy.
derniers : le 2 sept. dans le Marquenterre.

Grive litorne (*Turdus pilaris*)
dernières : le 13 avril en forêt de Crécy et à Beves.
1ères : le 8 oct. dans le Marquenterre.

Merle à plastron (*Turdus torquatus*)
1F. le 28 avril à Amiens.

Grive mauve (*Turdus iliacus*)
dernières : le 3 avril à Fouencamps.
1ères : le 9 nov. à Amiens, Sailly-le-Sec et Vaux-sur-Somme.

Locustelle luscinioïde (*Locustella luscinioidea*)
1ère : le 19 avril à Beves.

Locustelle tachetée (Locustella naevia)

1ère : le 19 avril à Boves.

Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus)

1er (tardif) : le 19 avril à Boves.

Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris)

Signalée en 2 localités : Corbie et Daburs.

Rousserolle effarvate (Acrocephalus scirpaceus)

1ères : le 21 avril à Corbie.

dernière : le 28 sept. à Boves.

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus)

1ère : le 4 mai à Boves.

Fauvette des jardins (Sylvia borin)

1ère : le 19 avril à Fontaine-sur-Somme.

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)

1ères : le 29 mars à Fouencamps/Boves.

Fauvette babillarde (Sylvia curruca)

1ère : le 18 mai au HA.

dernière : le 2 sept. dans le Marquenterre.

Fauvette grisette (Sylvia communis)

1ère : le 22 avril à Amiens.

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis)

Nicheur en bordure de la BdS (Alauda 1975/4).

2 ad./3 ou 4 juv. en août dans le Marquenterre, 1 chanteur du 28 août au 2 sept.

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)

1ers : le 31 mars à Corbie et Hamelot.

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)

Hivernage en janvier et février à Amiens et Corbie, noté en nov. à Amiens.

Gobemouche gris (Muscicapa striata)


Signalé en 2 localités : Sailly-Laurette et Saint-Quentin-en-Tourmont.

Mésange à moustaches (Panurus biarmicus)

Un nouveau point de nidification sur le littoral : 1 couple nourrit le 22 juin, 1M./2 juv. le 3 juillet.

Bruant zizi (Emberiza cirius)

1M. hivernant le 21 janvier à Albert ; en période de nidification, signalé dans quelques localités : Boves, Corbie, Fouencamps, Marquenterre, Le Crotey, Vaux-sur-Somme.



Répartition du Bruant zizi dans la Somme (1970-1975)

Le Bruant zizi (Sylvia hortensis) est un oiseau commun dans la Somme. Il est présent dans les zones humides, les champs et les forêts. Sa répartition est variable d'une année à l'autre. En 1970, il était présent dans 12 communes. En 1975, il était présent dans 15 communes. La répartition du Bruant zizi dans la Somme (1970-1975) est la suivante :

L "Atlas des Oiseaux nicheurs de France" sous-estime la répartition de cette espèce dans la Somme; nous publions une carte de répartition plus complète pour la période 1970 à 1975.

Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis)

HA : 4 le 25 mars, 20 le 9 nov., 12 le 23 déc.
1er : le 3 oct. en Bda.

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla)

Derniers : le 13 avril en forêt de Crécy.

Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris)

BdS : 250 le 26 janvier, premières le 29 oct. et 150 le 30 décembre.

Sizerin flammé (Carduelis flammea)

3 le 5 avril à Cernisy-Gailly.

Serin cini (Carduelis serinus)

1er : le 20 mars à Cayeux-sur-Mer.

Gros-bec (Coccothraustes coccothraustes)

3M. le 7 mai en forêt de Compiègne, 60 ; 2 le 22 à Farnichon.
2 le 9 nov. à Amiens.

Moineau friquet (Passer montanus)

Nicheur assez commun. 350 le 3 janvier à La Houssoye, 50 le 10 nov. 150 le 29 déc. au HA.

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)

Dortoir d'environ 10.000 le 25 nov. près de Montdidier.

Loriol d'Europe (Oriolus oriolus)

1er (précoc) : le 13 avril à Boves.

Corneille mantelée (Corvus corone cornix)

BdS-MQ : 50 du 25 janvier au 16 mars, 2 le 13 avril (derniers)
premières le 12 oct., 20 le 6 déc., 70 le 30.