

RESULTATS DE L'ETUDE DES PELOTES DE REJECTION DE BUSARD SAINT-MARTIN (Etude réalisée par M. SUEUR F.)

Cette étude a été réalisée sur 19 pelotes, dont 13 ont été trouvées dans les abords immédiats du nid.

Dimensions de 3 pelotes : 35 mm x 23 mm

36 -- x 17 --

29 -- x 19 --

Récapitulatif des restes trouvés dans les pelotes :

- Matières minérales : cailloux (=graviers) = 21
- Matières végétales : végétaux verts
graine = 1
grain de blé = 1
- Arthropodes = 20 : Myriapodes = 3
Coléoptères indéterminés = 15
" Carabidés = 2
- Gastéropodes = 20 : Limnéidés = 1
Hélicidés = 1
- Oiseaux = 16 : Fournin grise (jeune individu) = 1
Passereaux indéterminés = 9
Alouette indéterminée = 1
Pipit indéterminé = 1
Grive indéterminée ou jeune Merle
noir = 1
Bruant indéterminé = 1
Fringille indéterminé = 1
Moineau indéterminé = 1
- Mammifères = 2 : Campagnols indéterminés = 2

Les matières minérales et végétales ainsi que les Arthropodes et les Gastéropodes proviennent probablement des gésiers des oiseaux ingérés.