

# RESULTATS DE L'ETUDE DES PELOTES DE REJECTION DE BUSARD SAINT-MARTIN (Etude réalisée par M. SUEUR F.)

Cette étude a été réalisée sur 19 pelotes, dont 13 ont été trouvées dans les abords immédiats du nid.

Dimensions de 3 pelotes : 35 mm x 23 mm  
36 -- x 17 --  
29 -- x 19 --

Récapitulatif des restes trouvés dans les pelotes :

- Matières minérales : cailloux (=gravier) = 21
- Matières végétales : végétaux verts  
graine = 1  
grain de blé = 1
- Arthropodes = 20 : Myriapodes = 3  
Coléoptères indéterminés = 15  
" Carabidés = 2
- Gastéropodes = 20 : Limnéidés = 1  
Hélicidés = 1
- Oiseaux = 16 : Fournin grise (jeune individu) = 1  
Passereaux indéterminés = 9  
Alouette indéterminée = 1  
Pipit indéterminé = 1  
Grive indéterminée ou jeune Merle  
noir = 1  
Bruant indéterminé = 1  
Fringille indéterminé = 1  
Moineau indéterminé = 1
- Mammifères = 2 : Campagnols indéterminés = 2

Les matières minérales et végétales ainsi que les Arthropodes et les Gastéropodes proviennent probablement des gésiers des oiseaux ingérés.