NOTES SUR LE MARTIN-PECHEUR Alcedo atthis

par G. Neveu et F. Sueur

L'un d'entre nous (F.S.) a réalisé une observation curieuse le 8 septembre 1976 à Hamelet-80 pour cette espèce considérée comme solitaire en dehors de la saison des nids : 2 individus volent ensemble vers 7h30. Vers 8h30, l'un d'entre eux (femelle : tache claire à la mandibule inférieure) a pénétré par un trou dans le grillage sans doute à l'intérieur d'une volière à "appellants" et n'arrive plus à en sortir. Le 2e individu (mâle : bec entièrement noir) attend perché à l'extérieur, il s'envole parfois mais revient toujours se poser sur la volière (observation pendant trois-quarts d'heure). Vers 18h30, les 2 individus ne sont plus observés. Les couples pourraient donc rester unis après la période de nidification.

Le 11 septembre 1977 au Hamel-80, un individu capture un petit poisson et est suivi ensuite en vol sur plus de 500m avec celui-ci dans le bec, il disparaît au niveau du canal (G.N.). Cette observation amène à penser que le Martin-pêcheur peut encore élever des jeunes au début de septembre ; la signification de la première observation est incertaine : maintien de la cohésion du couple en dehors de la saison de nidification ou couple en cours d'élevage des jeunes.

Le 23 octobre 1977, 2 individus sont observés ensemble à l'île Sainte-Aragonne à Amiens-80 (Section Ornitho) ; cette observation tardive montre que la prétendue solitude de cette espèce en dehors de la saison des nids n'est donc pas absolue.