

CENTRALE ORNITHOLOGIQUE G.E.P.O.P.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1979 DANS L' AISNE

La synthèse 1979 s'est étoffée, ceci étant dû à une meilleure couverture du département.

Du point de vue climatique, l'année a été marquée par le coup de froid du 1er janvier, qui a duré une bonne partie de ce mois, et par un printemps pluvieux (juin surtout).

En 1979, l'enquête F.I.R. concernant les populations nicheuses de rapaces a commencé, il en sera largement fait part dans cette synthèse.

Malheureusement, si le Nord du département semble maintenant assez bien couvert, le Sud est bien délaissé : vallée de l'Aisne, marais St Boétien. Espérons que cela ira en s'améliorant.

Quelques données retiennent l'attention :

- l'hivernage du cygne sauvage
- l'hivernage du Pygargue
- la tentative de nidification du Milan royal
- l'observation des deux Phalaropes à Aulnois-sous-Laon (intérieur des terres), de la Corneille mantelée.

H. Dupuich

OBSERVATEURS :

R. Blackburn (G.O.N.), S. Boutinot, D. Charlet, C. et H. Dupuich,
L. Eloy, L. Kérautret (G.O.N.), P. Luce, E. Matthias, E. Novak,
P. Pigeon, J. Piot, D. Prud'homme, A. Scuotto, B. Taillez, B. Venet,
J-L. Wiart.

CENTRALE ORNITHOLOGIQUE G.E.F.O.P.
 SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DE L'ALSNE ANNÉE 1979

ABREVIATIONS :

M. = mâle
 F. = femelle
 ad. = adulte
 im. = immature
 juv. = juvénile
 ind. = individu

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata

Un ind. en migration est observé le 5 janvier à Le Neuvion-en-Thiérache (H. Dupuich).

GREBE HUPPE Podiceps cristatus

Les observations montrent une extension de l'espèce.

Aulnois-sous-Laon : 9 ind. non cantonnés le 6 mai

Beaurieux : 1 couple le 6 mai sur une gravière

Boué : noté en avril, 1 juv. du 6 au 15 août, rejoint le 14 août par deux autres juv.

Nidification :

Guignancourt : 2 ad. le 4 mai, 4 ad./juv. le 6 mai

St-Quentin : 1 couple au marais d'Isle

Vermand : 4 couples nicheurs

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollis

Le coup de froid a chassé cette espèce de ces lieux habituels. Elle a été retrouvée parfois sur les rivières. Le retour est tardif.

Englancourt : 1 ind. le 6 janvier sur l'Oise en partie gelée

Autreppes : 2 ind. le 7 Septembre sur l'Oise

Nidification : elle est bien suivie à Boué, peu de données ailleurs.

Boué : 2 ad. le 24 mars (premiers), 3 ad. dont un en plumage nuptial, le 13 avril, 1 ad. le 17 avril, 1 ad. le 12 mai, 1 ad. le 9 juin, 2 ad. le 23 juin, 1 ad. le 22 juillet, 2 ad./3 juv. à la becquée et 3 ad. 6 juv. le 12 août, 2 ad./3 juv. et 5 juv. le 15 août, 12 le 2 août, 14+1 ad./2 juv. en nourrissage le 7 septembre, 20 ind. le 15 septembre,

30 ind. le 22 septembre, 27 le 21 octobre, 18 le 10 novembre,
3 le 17 novembre.

Il en ressort : 2 couples doivent nicher, et pic migratoire
en septembre et octobre.

Vermand : plusieurs couples nicheurs

Aulnois-sous-Laon : 3 ind. le 7 juillet, 13 le 26 août

HERON CENDRE Ardea cinerea

On note surtout des hivernants et erratiques

Le Nouvion en thiérache : 1 le 7 janvier, 1 les 17 et 18 janvier
au lieu-dit le Garmouzet, 20 en vol le 4 février

Boué : 1 le 12 mai, 1 le 15 mai

1 le 6 mai à Guignicourt, 1 le 10 mai à Aulnois-sous-Laon, 2 le
3 septembre à Maizy.

HERON POURPRE Ardea purpurea

Toujours rare en migration

1 les 13 et 14 avril à l'étang de Boué (R. Blackburn, H. Dupuich,
P. Luce)

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus

Noté nicheur à Vermand

GRAND BUTOR Botaurus stellaris

Noté nicheur à Vermand

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor

Boué : 3 im. du 13 mars au 12 avril, 2 ad. de fin avril au 20 mai,
Beaurieux : 1 couple le 6 mai à Beaurieux.

CYGNE SAUVAGE Cygnus cygnus

Le coup de froid de début janvier a chassé cette espèce sur les
inondations de l'Oise, rien dans l'Aisne.

6 en vol le 14 janvier à Autrepes (J-L Wiart, P. Luce, B. Venet)
puis 3 ind. minimum du 14 janvier au 10 février entre Autrepes et
Maizy et 7 ind. le 10 février (H. Dupuich).

OIE CENDRÉE Anser anser

Quelques stationnements dans la vallée de l'Oise, suite au coup
de froid.

Montceau-sur-Oise : 7 le 2 janvier, individus tués vers le 10
février, 50 en vol vers le sud-ouest le 18 février.

Boué : 1 ad. le 19 mars, 2 ad. les 24 et 25 mars

60 en vol vers le sud le 10 novembre.

Aulnois-sous-laon : 1 ind. posé puis volant vers le nord-est le
25 Avril.

A noter : 30 ind specia (*Anser specia*) vers le sud-ouest le 18 février.

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna*

Boué : 1 M. le 17 mars, noté fin mars et en avril : maximum 5 début avril, 1 F. le 4 mai.

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos*

Aulnois-sous-Laon : 250 du 11 au 15 février dans les champs du lieu-dit Reneuil, 120 le 15 février, 80 le 18 février, 3 couples le 29 avril à Reneuil, 1 F. le 1er mai, 1 M. le 2 mai, 20 le 7 juillet, 6 le 26 août.

Boué : plusieurs ind. toute l'année, 3 couples le 25 Mars, 1 F. et des pulli le 1er mai, 35 le 22 juillet, 3 couples nicheurs, 1 couple le 8 décembre.

Maizy, Montceau sur Oise (inondations de l'Oise) : présent en janvier et en février, maximum : 1000 le 2 janvier, plusieurs centaines le 3 février, 31 le 10 février.

Vermand : couples nicheurs

Noté aussi à : Englancourt (fév., mai.), Autreppes (mai, juin), Villers-en-Prayères, Barenton, Beaurieux (M. et F. en mai).

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca*

Observée en hivernage et en migration prénuptiale.

Aulnois-sous-laon : 18 le 15 février, 45 le 18 février, 2 le 25 avril, 1 F. le 10 mai, 4 le 7 septembre.

Boué : 3 le 18 mars, 7 le 17 mars, 2 M. et 3 F. le 19 mars, 7 le 24 mars, 7 le 17 avril.

Montceau-sur-Oise : ind. tués en janvier et février.

5 couples le 26 février à Guignicourt, 1 M. le 6 mai à Villers-en-Proyères, 9 le 25 avril, 45 le 18 novembre à Reneuil.

CANARD CHIPEAU *Anas strepera*

1 couple le 24 février à Boué

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope*

15 ind. le 15 février à Aulnois-sous-laon.

CANARD PILET *Anas acuta*

Aulnois-sous-laon : 6 le 15 février, 1 le 18 février.

Boué : quelques ind. en février.

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

25 ind. le 8 avril à Boué, 12 le 7 juillet à Aulnois-sous-laon.

CANARD SOUCHET Anas clypeata

Boué : 1 M. et 1 F. le 17 mars, 2 couples et 1 F. les 18 et 19 mars et un M. les 24 et 25 mars. 1 M. et 1 F. le 17 avril.

2 M. le 26 août à Aulnois-sous-laon.

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina

Aulnois-sous-laon : 23 ad. les 15 et 18 février.

Boué : 3 M. et 3 F. le 24 février, 1 M. le 17 mars, 3 M. les 18 et 19 mars, 2 M. et 1 F. le 12 mai.

Vermand : noté nicheur (S. Boutinot)

Vendeuil : noté nicheur en 1978.

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula

Aulnois-sous-laon : 2 M. et 4 F. le 15 février, 5 ad le 18 février

Boué : quelques ind. le 8 avril, 2 M. et 1 F. le 17 avril.

GARROT A L'OEIL D'OR Bucephala islandica

Boué : 1 M. les 24 et 25 mars, 1 F. du 17 novembre au 8 décembre (H. Dupuich)

HARLE BIEVRE Mergus merganser

Vermand : noté en nombre sur les étangs en janvier suite au coup de froid (S. Boutinot).

HARLE PIETTE Mergus albellus

Vermand : plusieurs dizaines en janvier, suite au coup de froid (S. Boutinot).

BUSE VARIABLE Buteo buteo

1979 est m'année de l'enquête F.I.R. sur les rapaces. Les données sur la nidification seront résumées en fonction des cartes I.G.N.

(il était demandé de couvrir 4 secteurs sur les 40 d'une carte

1/50000° et de faire une extrapolation sur la population totale de la carte.)

Hivernage : Hormis sur les lieux de nidification, cette espèce est notée dans le Vermandois, dans le Sud de l'Aisne. A retenir également : 18 en carrousel vers la mi-mars après une semaine de pluie près de Boué.

Nidification :

- carte I.G.N. Péronne (secteur Aisne): Bois d'Honon-sur-Vermand : 1 couple
 - carte I.G.N. Bohain secteur de Menneuret: 1 couple
C'est une partie de la forêt d'Aindigny : population estimée : 3 couples nicheurs.
 - carte I.G.N. Guise: bien couverte, elle regroupe la forêt de Nouvion en Thiérache, la forêt du Régnaval et les bois attenants de Leschelles et de l'Epaissenoux, entrecoupées de bocage.
20 couples nicheurs au minimum : environ 10 en forêt de Nouvion
environ 10 en forêt de Régnaval
et bois attenants
- La surface par couple sur les surfaces prospectées donne :
1 couple / 4 km²
- A retenir : Erloy, forêt de Régnaval : 1 parade le 10 février
Queue de Boué/Boué : 1 parade (1 ind. miaule sur une branche d'arbre, un 2ème ind. la survole) le 13 avril.
4 couples nicheurs dont 2 dans le secteur de l'étang (mais tirs de gardes)
- carte I.G.N. Hirson : non couverte, forêt d'Hirson et de St-Michel, bocage, champs. Les ind. sont observés lors de visites brèves. Secteur favorable, nidification plus que probable. Nombre de couples ?
 - carte I.G.N. Ham (secteur Aisne) : secteur d'Attichy: 1 couple
 - carte I.G.N. St Quentin : couverte, aucun couple
 - carte I.G.N. Vervins : non couverte, peut-être un ou deux couples nicheurs.
 - carte I.G.N. Rozoy : non couverte, même biotype que la carte d'Hirson. Nidification plus que probable. Nombre de couples ?
 - carte I.G.N. la Fère : forêt de Coucy-Basse : 2 à 3 couples nicheurs. Forêt de St Gobain : peu couverte : combien de couples nicheurs ?
 - Carte I.G.N. Laon : Forêt de Samaussy, marais boisés de St boetien, Liesse, camp militaire de Sissonne. Peu couvert. Les quelques données reçues donnent des nidifications probables. Nombre de couples ?

Le reste de l'Aisne, région de Soissons, de Château-Thierry n'a pas été recensé. C'est une région assez boisée où ce rapace devrait nicher. Il apparaît que dans la zone bocagère de Thiérache (carte de Guise, Hirson, Rozoy, la Buse est le rapace le plus abondant.

En 1980, un effort devrait être fait pour couvrir toute l'Aisne et pour donner une idée quantitative de ses populations rapaces.

BUSE PATTUE Buteo lagopus

Observée lors du coup de froid, il faut noter l'augmentation des hivernants dans le Nord de la France.

1 ind. trouvé mort le 18 février à Juvincourt et Danary (C. Riols)

1 ind. observé posé puis en vol le 10 novembre à Leschelles (H. Dupuich)

MILAN ROYAL Milvus milvus

1 hivernant le 19 janvier à Vermand (J. Piat, D. Charlet)

Le reste des observations concerne la Thiérache. Elles sont faites durant la nidification.

Queue de Boué/Forêt de Nouvion-en-Thiérache (carte I.G.N. Guise) :

2 ind. en avril, transport de matériaux (construction de l'aire)

1 ind. trouvé mort (bague en D.D.R.) tué par fusil, puis 1 ind.

observé seul, ensuite 4 ind. vers fin avril : nidification avortée (ref. P. Luce)

1 ind. le 1er mai à Nouvion en Thiérache

1 ind. Le 12 août au lieu-dit le Moulin lointain

Forêt de Regnaval/Leszy (carte I.G.N. Guise)

ind. observés en avril, en mai et juin, aucun observateur sur le secteur.

1 ind. le 16 juillet

2 ind. le 23 juillet près du grand Wey à 8 km du point du 16 juillet, dont l'individu du 16 juillet.

1 couple nicheur possible.

- carte I.G.N. Guise : 1 couple probable, 1 couple possible

- carte I.G.N. Rozoy-sur-Serre : non couverte, ind. observés en 1978

- carte I.G.N. Hirson : ind. observés en septembre, 1 ind. les 14 et 20 à Bellevue, aucun observateur avant. Nicheurs en 1975

Une prospection accrue en 1980 devrait faire le point sur l'existence d'une petite population en Thiérache, celle-ci étant une extension de la population Ardenno-marnoïse.

MILAN NOIR Milvus milvus

1 ind. dans la semaine du 11 au 17 mars sur la queue de Boué
(P. Luce)

Passage d'ind. dans la première quinzaine d'avril sur la Queue de Boué.

1 ad. le 13 mai à Chivres (L. Kérautret).

Aucune observation n'indique la nidification de ce rapace.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Haliaetus albicilla

L'hivernage est noté à l'étang de Caulaincourt par S. Boutinot.

1 imm. jusque fin février (présent du 28 décembre 1978 et non du 22 décembre 1978 : L'Avocette n°3 (3-4) 1-62 1979.

1 imm. à partir du 20 décembre.

EPERVIER D'EUROPE Accipiter nisus

1 couple hivernant jusqu'à fin mars. Il est tué alors qu'il commence à nicher. Toutes les observations sont faites sur la Queue de Boué, entre Le Nouvion et Boué.

1 F. le 5 janvier au Nouvion

1 M. les 6 et 13 janvier au Nouvion (il chasse au-dessus des maisons)

1 M. les 19 et 24 mars à Boué

Quelques plumées sont trouvées à Boué

- 1 merle le 19 mars

- 2 merles le 24 mars

- 3 merles, 1 ramier, 1 poule d'eau le 25 mars

Carte I.G.N. Guise : 1 couple nicheur probable

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus

Nous traiterons cette espèce par cartes I.G.N.

- Carte I.G.N. Laon : (non couverte) 1 couple le 1er mai à Barenton-sur-Serre, 1 couple le 10 mai à Aulnois-sous-Laon, 1 M. le 13 mai à Chivres. Il est possible qu'un ou deux couples se reproduisent (marais St-Boétien ?)

- Carte I.G.N. Bohain (S. Boutinot) : secteur de Morcourt : 1 couple.

- Carte I.G.N. Guise : (Wiart, Luce, Mathias, Venet, Scuotto) : secteur Queue de Boué observé dès fin mars : 1 couple nicheur.

- Carte I.G.N. Péronne : (partie Aisne) (S. Boutinot) : étang de Vermand : 1 couple

- Carte I.G.N. St-Quentin : (S. Boutinot)
secteur de Ribémont : 1 couple
secteur de Mennesis : 1 couple

- Carte I.G.N. Ham : (secteur de St Simon) 1 couple

Le reste de l'Aisne n'a pas été couvert. Quelques couples subsistent dans les zones de marais.

BUSARD SAINT-MARTIN Circus cyaneus

L'hivernage est noté : 1 M. le 2 janvier à Fauconné, 1 M. le 21 janvier en forêt de Coucy-Basse, 1 F. le 2 décembre à Aulnois-sous-Laon.

Boué : passage en avril, 1 F./1 imm. le 5 mai : pas de nidification
Forêt de Saint-Gobain : 1 M. le 24 mai. L'espèce y a déjà niché mais malheureusement ce secteur n'a pas été couvert.

- Carte I.G.N. Guise : (H. Dupuich) secteur d'Autreppes : 1 couple

BUSARD CENDRE Circus pygargus

1 seule donnée : 1 M. le 13 mai à Chivres (L. Kérautret)

Une prospection des plateaux cultivés du Laonnais et du Soissonnais serait à entreprendre.

BONDREE APIVORE Pernis apivorus

La prospection insuffisante de l'Aisne ne donne pas une idée des effectifs de ce rapace. Des cartes où le biotope est favorable n'ont pas été couvertes (Hirson, Rozoy, Laon, et tout le sud de l'Aisne)

Cette espèce devrait être suivie avec plus d'intérêt en 1980

- Carte I.G.N. Guise : Queue de Boué : 1 couple nicheur

Secteur d'Autreppes-Erloy : 1 couple nicheur

Forêt de Nouvion (1 secteur) : 1 couple

La carte de Guise : forêt du Nouvion et forêt de Régnaval ainsi que les bois limitrophes, doit abriter 6 couples nicheurs.

2 le 13 mai à Chivres (carte de Laon)

FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo

Aucune observation sur ce rapace pendant la saison de nidification. Faiblesse des effectifs et petit nombre d'observateurs doivent l'expliquer. Cette espèce sera à surveiller en 1980.

FAUCON CRECERELLE Falco tinnunculus

Cette espèce sera traitée comme la Buse

Hivernage : il est noté partout

Nidification :

- Carte I.G.N. Péronne (secteur Aisne) : secteur de Vermand : 1 couple

- Carte I.G.N. Bohain : secteur de Menneuret : 1 couple

Secteur de Marcourt : 1 couple

- Carte I.G.N. Guise :

Secteur Queue de Boué : 1 couple

Secteur le Nouvion en Thiérache : 1 couple

Secteur forêt du Nouvion (1 parcelle) : 1 couple

Secteur Englancourt : 1 couple

Secteur Lerzy : 1 couple

Nombre total de couples 17-18.

- Carte I.G.N. Hirson : noté. nombre de couples ?

- Carte I.G.N. Ham (secteur Aisne) : secteur Attily : 1 couple
secteur St Simon : 1 couple

- Carte I.G.N. St Quentin : secteur Mennecourt : 1 couple
secteur Marcourt : 1 couple

- Carte I.G.N. Vervins : noté. nombre de couples ?

- Carte I.G.N. Laon : noté. nombre de couples ?

Le reste de l'Aisne n'a pas été recensé, ce rapace y est certainement nicheur.

Le Vermandois (carte Péronne, Ham, Bohain, St Quentin) laisse apparaître une bonne densité. C'est un biotope de champs et bosquets. Nous pouvons extrapoler le nombre de couples à 20-25 par carte.

La Thiérache donne aussi une bonne densité de nicheurs mais il est moins abondant que la Buse comme le montre la carte de Guise.

Il préfère donc l'openfield au bocage, ce qui est donc la logique des choses.

C'est le rapace le plus abondant dans l'Aisne.

PERDRIX GRISE Perdrix perdrix

Aucune donnée sur la nidification, seulement sur l'hivernage.

15 à Englancourt le 21 janvier, 4 à Chigny le 10 février, 2 à Soissons le 20 novembre.

FAISAN DE CHASSE *Phasianus colchicus*

Forêt du Nouvion-en-Thiérache : nicheur certain

Noté en mars, couple formé le 24 mars, 1 F. et 6 juv. non volants
le 6 juillet, juv. peu volant le 2^e juillet

1 M. le 15 décembre à Soissons, 1 M. le 21 décembre à Pommiers.

GRUE CENDREE Grus grus

50 en vol N-E près de Sissonne le 17 mars. C'est la bordure ouest du canal migratoire

POULE D'EAU Gallinula chloropus

Boué : hibernage important : 400 en décembre 78, 2 le 24 février quelques couples nicheurs, 2 juv. le 23 juin, ad./juv. le 22 juillet, 50 le 15 août, 70 minimum le 22 septembre.

Noté à Leschelles (3 couples nicheurs), Englancourt, Sorbais, Autrepes, Aulnois-sous-Laon, Beaurieux, Maizy.

FOULQUE MACROULE Fulica atra

Boué : nicheur certain noté en février, mars (minimum 20 le 24), avril, mai minimum 10 couples nicheurs, 2 ad./5 pulli, 1 ad./4 pulli le 9 juin, 1 ad./3 pulli le 23 juin, 35 le 22 juillet, 80 les 6 et 12 août, 60 le 20 septembre, le 10 novembre, 78 le 2 décembre.

Aulnois-sous-Laon : 13 le 7 juillet, 18 le 26 août, 12 le 7 septembre

Noté à Englancourt (jan., fév.), Barenton, Beaurieux (15 le 6 mai) Guignicourt (10 le 14 mai), Moisy, Vermand durant la nidification.

HUITRIER PIE Haematopus ostralegus

Le limicole est peu courant à l'intérieur des terres.

Boué : passage de quelques ind. fin avril, 5 en vol N-W le 4 mai (H. Dupuich)

Aulnois-sous-Laon : 1 le 10 mai (P. Pigeon)

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus

Le retour après le coup de froid est noté le 10 février, 200 à Mielzy, bandes en février et mars.

Nidification : 1 couple nicheur dès avril, alarme le 12 mai à Faucommé.

2 couples probables le 6 mai à Beaurieux

3 couples à Marchais le 13 mai

Plusieurs couples à Chivres le 13 mai

Premières bandes : 100 à Hirson le 22 juin, 100 à Chigny le 23 juin,

Autrepes, Englancourt, Urigny : bandes de plus de 600 ind. le 23 juillet, Aulnois-sous-Laon (juillet, août).

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola

7 ind. le 2 mai à Aulnois-sous-Laon (P. Pigeon)

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula

Aulnois-sous-Laon : 2 le 25 avril, 2 le 10 mai, 1 le 26 août, 2 le 7 septembre, 1 ind. le 4 mai à Guignicourt.

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius

Aulnois-sous-Laon : 3 le 5 avril, 1 couple le 1er mai, 6 le 10 mai, 6 le 7 juillet, 4 le 26 août, 7 le 7 septembre
3 et 4 le 6 mai à Beaurieux, 2 le 6 mai à Maizy, (1 alarme)
1 cantonné le 6 mai à Villers-en-Prayères

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres

Cette espèce est peu commune à l'intérieur.

1 ind. en plumage nuptial les 1er et 2 mai à Aulnois-sous-Laon (P. Pigeon), 1 ind en avril, à Boué (P. Luce).

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago

Elle est notée de janvier à mars dans les pâturages du Nouvion, de Boué, 3 le 25 février à Nouvion, 3 le 19 mars à Nouvion.

Il y a un petit nombre d'hivernantes.

Aulnois-sous-Laon : 10 le 26 août, 6 le 7 septembre, 1 le 18 novembre.

BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola

Elle hiverne en forêt du Nouvion en Thiérache (jan., fév.) où elle a déjà niché.

1 couple les 16 et 18 mai en forêt de St-Gobain, 1 le 18 novembre à Reneuil.

COURLIS CENDRE Numenius arquata

3 ind. le 3 février dans une pâture au Nouvion (H. Dupuich)

1 le 7 juillet à Aulnois-sous-Laon (P. Pigeon)

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa

Toujours en migration : 2 ind. le 2 mai à Aulnois-sous-Laon (P. Pigeon)

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus

Peu commun en migration

Aulnois-sous-Laon : 2 le 1er mai, 2 le 2 mai, 2 le 13 mai, 1 ad. en plumage nuptial le 7 juillet, 1 le 22 août à Liesse.

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus

Bien noté en migration

Boué : 1 ind. du 17 au 19 mars

Aulnois-sous-Laon : 1 le 25 avril, 20 le 1er mai, 22 le 2 mai, 6 le 10 mai, 6 le 13 mai, 3 le 7 juillet

4 le 6 mai à Guignicourt, 11 le 6 mai à Beaurieux.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia

Aulnois-sous-Laon : 3 le 1er mai, 3 le 2 mai, 16 le 10 mai, 11

le 13 mai, 2 le 7 juillet, 4 le 26 août, 6 le 7 septembre.

Moisy : 3 le 6 mai, 7 le 3 septembre.

5 le 6 mai à Beaurieux.

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus

Bien noté durant la migration

Aulnois-sous-Laon : 6 le 29 avril, 2 le 1er mai, 1 le 2 mai, 11 le 26 août, 2 le 7 Septembre.

Boué : quelques ind. dans la première quinzaine d'avril, 2 le 4 mai, 1 le 5 mai, 2 le 25 août, 11 le 7 septembre, 15 le 10 novembre.

2 le 1er mai à Barenton, 1 le 6 mai à Moisy.

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

Moins commun

Aulnois-sous-Laon : 2 le 1er mai, 3 le 10 mai, 6 le 13 mai, 4 le 7 juillet, 4 le 26 août, 3 le 7 septembre

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos

Aulnois-sous-Laon : 5 le 25 avril, 2 le 29 avril, 4 le 1er mai, 7 le 2 mai, 14 le 10 mai, 15 le 13 mai, 5 le 7 juillet, 25 le 26 août, 5 le 7 septembre

Boué : en avril (max. 3) 1 le 5 mai, 4 le 6 mai, 2 les 6 et 12 août

Guignicourt : 3 le 4 mai; 3 le 6 mai
1 le 13 août près de Soissons

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta

1 le 2 mai à Aulnois-sous-Laon

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina

1 le 2 mai à Aulnois-sous-Laon, passage en avril à Boué

Aulnois-sous-Laon : 2 le 13 mai, 1 le 26 août

BECASSEAU SANDERLING Calidris alba

peu commun

1 ind. début avril, à Boué (P. Luce)

CHEVALIER COMBATTANT Philomachus pugnax

Aulnois-sous-Laon : 1 F. le 25 avril, 1 F. le 1er mai, 1 le 2 mai le 13 mai, les 6 et 7 juillet, 1 M. et 1 F. le 7 septembre

PHALAROPE A BEC LARGE Phalaropus fulicarius

Exceptionnellement à l'intérieur

1 ind. le 7 juillet à Aulnois-sous-Laon (P. Pigeon)

PHALAROPE A BEC ETROIT Phalaropus lobatus

Exceptionnellement à l'intérieur

1 ind. en plumage nuptial le 10 juin à Aulnois-sous-Laon
(P. Pigeon)

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus

Des ind. erratiques sont notés jusqu'au 10 mai et à partir du 7 juillet.

Aulnois-sous-Laon : 3 ad. 1 imm. le 25 avril, 1 imm. le 29 avril
1 ad et 1 imm. le 1er mai, 2 ad. le 2 mai, 1 ad. le 10 mai, 68
le 7 juillet

Boué-Le Nouvion : 10 le 24 février, 50 le 19 mars, 6 le 24 mars
vers le sud-ouest, 1 ad. le 15 juillet, 1 imm. le 22 juillet, 1
le 10 novembre, 16 le 11 novembre

Guignicourt : 200 ad. et Imm. le 4 mai, 300 le 6 mai
45 à Beaurieux le 6 mai, dortoir hivernal assez important à
Vermand

Nidification : deux colonies sont connues, une troisième a été
découverte

Bucy-le-long : 1 colonie non recensée en 1979 (environ 30 couples
en 1978)

Vermand : 1 colonie d'une quarantaine de couples (S. Boutinot)

Guignicourt : Des ad. nicheurs sont notés le 6 mai parmi les
ind. présents (L. Eloy)

MOUETTE PYGMEE Larus minutus

1 imm. le 4 mai à Guignicourt (L. Eloy)

1 imm. le 13 mai à Aulnois-sous-Laon (P. Pigeon)

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger

Guignicourt : min. 3 le 4 mai, 5 le 6 mai

Aulnois-sous-Laon : 2 le 10 mai

PIGEON COLOMBIN Columba oenas

1 ind. le 13 mai en forêt de St Gobain

Peu de données sur cette espèce

PIGEON RAMIER Columba palumbus

Nicheur commun dans les bois et forêts du département

1 ad. au nid le 24 mars en forêt du Nouvion où il est abondant

Il est peu observé en janvier

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur

Premières début mai en Thiérache, nicheuses assez communes.

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto

Cette espèce est toujours abondante, il est à noter que quelques couples construisent leurs nids en bordure de forêt.

COUCOU GRIS Cuculus canorus

Premiers, le 13 avril à Boué (H. Dupuich)

Noté le 19 avril à Aulnois-sous-Laon, actif en mai-juin en forêt de Coucy-Basse

Les chanteurs se manifestent encore début juillet.

HIBOU MOYEN DUC Asio otus

Dortoir de 5 ind. jusqu'au 12 février à Reneuil (P. Pigeon)

Cet oiseau serait à rechercher comme nicheur dans les résineux des forêts d'Hirson et de St Michel.

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus

1 ind. en chasse diurne le 9 juin à Boué (H. Dupuich)

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua

Fort peu de données sur cette espèce qui trouve en Thiérache un biotope favorable. Elle est à rechercher activement.

1 ind. le 13 août à Clairefontaine.

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco

Premiers chants : le 18 janvier en forêt du Nouvion (P. Luce)

Nicheuse en forêt de Nouvion, de St Gobain, de Coucy-Basse, de St Michel.

1 ind. à Margival le 19 décembre.

1 sur le même perchoir diurne pendant deux ans, en forêt de Coucy-basse, parcelle 236 (E. Novak).

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba

Aucune donnée significative sur la nidification de ce rapace.

Signalée en Thiérache, dans le Laonnais...

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus

Cet oiseau est rare dans l'Aisne.

1 en vol le 24 juin près d'Hirson, survolant des champs nés, que cherche-t-il ? (H. Dupuich)

Il a déjà été noté à Cessières dans les landes à bruyères, il est à rechercher.

HUPPE FASCIEE Upupa epops

Devenue bien rare

1 ind. le 6 mai à Guignicourt (L. Eloy)

D'après certaines sources, elle se trouverait dans la région d'Hirson (vers le sud).

MARTIN PECHEUR Alcedo atthis

Cette espèce a considérablement souffert du coup de froid. Les effectifs sont en chute libre. Fort peu observé.

1 ind le 13 décembre à Soissons (B. Tgilliez)

MARTINET NOIR Apus apus

Premiers : le 6 mai à Maizy et Boué

28 le 10 mai à Aulnois-sous-Laon

PIC VERT Picus viridis

1 couple nicheur fin avril à Boué en forêt

Nombreux cris en forêt du Nouvion -en-Thiérache (mai)

Observé dans le bocage : 1 au Grand Wey le 23 juin.

Nids en forêt du Nouvion, de Coucy-Basse

PIC EPEICHE Dendrocopos major

Forêt du Nouvion : 1 ind. le 18 mars au "Moulin lointain"/Boué

1 le 24 mars à la Queue de Boué

5 tambourineurs le 13 avril dont 1 couple sur son territoire et 1 M. seul à la Queue de Boué

Donc minimum 3 couples sur la Queue de Boué (partie de la forêt du Nouvion)

Signalé en forêt de St Gobain, de Coucy-Basse : 2 chanteurs le 19 août, une dizaine observés en août (E. Novak)

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor

Signalé à Rouvroy, en forêt de Nouvion...

PIC NOIR Dryocopus martius

Aucune donnée concernant cet oiseau. Il serait à rechercher en forêt de St Gobain (déjà signalé) et d'Hirson où il pourrait nicher.

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis

Assez commune sur les zones cultivées, parfois sur le bocage comme à Lezy : 1 ad. Le 6 mai

HIRONDELLE DE CHEMINEE Hirundo rustica

Premières : le 7 avril à Boué, 250 le 25 avril à Aulnois-sous-Laon
220 le 2 mai à Aulnois-ss-Laon

Dernières le 21 octobre à Boué.

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica

Premières : le 13 avril à Boué

Dernières pas de date

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia

Premières : le 25 avril à Aulnois-ss-Laon, environ 20

Maizy : 15 nids aux Gravières le 6 mai

20 nids à la sucrerie le 6 mai

noté à Boué (mai, juin, juillet)

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis

Premiers : le 13 avril en forêt de Nouvion-en-Thiérache

Bien observé en forêt du Nouvion, peu de données ailleurs

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis

Retour après le coup de froid, 1 le 11 février à Boué

Noté en mars, avril, mai...

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava

Surtout en migration

Aulnois-ss-Laon : 25 le 25 avril, 8 le 29 avril, 20 le 2 mai,
3 le 6 mai à Villers en Prayères, noté le 6 mai à Guignicourt.

Nidification : 1 couple à Boué (usine Nestlé)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea

Bien notée en avril à Boué en migration

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba

M. _alba _alba_ : Aulnois-ss-Laon : 12 le 29 avril, cantonné le
15 mai

Boué : le 17 mars (retour), 3 juv. peu volants
le 22 juillet

C'est une nicheuse assez commune, abondante vers le mois D'août
où on l'observe bien le long des routes.

M. _alba yarrelli_ : quelques individus observés dans la première
semaine d'avril à Boué (P. Luce)

PIE-GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio

Cette espèce semble en progression vers le nord-ouest, cela
est sensible depuis 1978. La nidification n'a pas été prouvée,
mais elle est probable pour certaines places.

1 M. le 13 mai à Chivres (L. Kérautret)

1 M. le 13 mai à Marchais (L. Kérautret)

1 M. le 6 juin en forêt de Coucy-Basse dans une zone assez dégagée avec arbustes et ruisseau (déjà observé en juillet 1978)
1 couple nicheur ? (E. Novak)

1 M. le 23 juillet à Sarbais pourrait être celui d'un couple nicheur (H. Dupuich)

Dans tous les cas, les biotopes sont favorables.

PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor

1 ind. le 26 février à Guignicourt (C. Eloy)

1 ad. en chasse le 23 juin à Boué, attrape une proie en vol puis la transporte vers les arbres longeant l'étang : est-ce un nicheur local ? (H. Duipuich)

Cette espèce est devenue peu commune.

CINCLE PLONGEUR Cinclus cinclus

Hivernant présent sur la Vallée de l'Oise (frontière Aisne-Nord) au-dessus d'Hirson.

Noté au printemps en forêt d'Hirson (D. Prud'homme)

Il serait à rechercher dans quelques ruisseaux traversant la forêt de St Michel.

TROGLODYTE Troglodytes troglodytes

Nicheur commun dès qu'il trouve un secteur convenable.

Alerte dès le 24 mars en forêt de Nouvion-en-Thiérache.

Des études de densité seraient plus intéressantes.

ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis

Nicheur commun dans les parcs et bois.

Signalé au Nouvion, à Boué, St Quentin,...

TRAQUET TARIER Saxicola rubetra

1 couple fin juillet à Faucommé, 1 M. le 6 mai à Moizy, 1 M. le 13 mai à Chivres, observé le 23 juillet à Lerzy.

Le couple de Faucommé a probablement niché.

TRAQUET PATRE Saxicola torquata

Peu de données significatives sur la nidification, c'est bien dommage.

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe

Premiers : 1 couple le 29 avril à Aulnois-ss-Laon (P. Pigeon)

ROUGEQUEUE NOIR Phoenicurus ochrurus

Pas observé en hivernage (trop froid)

Nicheur commun : Buironfosse, Boué (F. et M. en mai), Leschelles...

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus

Pas de données intéressantes alors que l'espèce semble être plus abondante.

ROUGEGORGE Erithacus rubecula

Nicheur commun

ROSSIGNOL PHIMOMELE Luscinia megarhynchos

Premiers : 3 le 29 avril à Reneuil

3 le 6 mai à Beaurieux, 6 le 6 mai à Maizy, plusieurs ind. le 6 mai à Guignicourt.

GRIVE LITORNE Turdus pilaris

Noté en hivernage, départ début avril, elle est abondante.

La nidification sera à surveiller dans les prochaines années.

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus

Bien noté en hivernage en bande de plusieurs centaines.

Dernières le 24 mars à Boué

MERLE NOIR Turdus merula

Des données sur les premières pontes et la densité seraient plus instructives.

MERLE A PLASTRON Turdus torquatus

1 M. le 6 mars à Bohain

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos

Même chose que pour le merle noir

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus

Plusieurs le 21 janvier d'Erloy à Chigny, noté le 10 février

1 chanteur le 24 mars en Forêt du Nouvion

Moins commune que la grive musicienne

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti

Le coup de froid a décimé cette espèce sur les lieux de nidification, les effectifs sont en baisse.

Boué : 1er chant le 7 avril, alarme régulière en mai : 1 couple nicheur (3 en 78)

Aulnois-ss-Laon : peu entendue, peu de données par ailleurs.

LOCUSTELLE LUSCINOIDE Locustella luscinioides

Premières le 1er mai à Barenton (P. Pigeon)

Noté à Maizy : 2 le 6 mai ...

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia

Premières le 4 mai à Boué

Boué : 1 chanteur les 12 et 20 mai, 20 juin : 1 couple nicheur
forêt du Nouvion : 2 ad. et 3 juv. peu volants le 15 juillet dans
une coupe avec taillis et broussailles.

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus*

Premiers : le 1er mai à Barenton

Boué : 1 le 4 mai, 6 et 12 mai (chanteur), le 20 mai : chante et
il est agité (nid ?), le 23 juin : chants : 1 couple nicheur

Noté à Maizy (4 le 6 mai), à Guignicourt, Vermand...

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris*

Peu de données sur cette espèce, l'écoute du chant permettrait
de clarifier son statut

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus*

Premières : le 12 mai à Boué

Boué : nourrissage le 23 juin, le 16 juillet, ad. et juv. le
22 juillet, environ 12-13 couples à Boué.

Noté à Vermand, St Boetien

Dernières le 7 septembre à Boué

ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus*

Noté à Vermand. Pas d'autres données

HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina*

Noté en forêt du Nouvion en Thiérache, dans le Vermandois
(St Quentin)

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta*

Noté dans le Vermandois

Plus rare en Thiérache où il est dans le nord de son aire de
distribution : 1 ad. le 20 mai à Boué (H. Dupuich)

Une mise au point permettrait de fixer, pour les deux espèces :

- la limite sud de l'Ictérine
- la limite nord de la Polyglotte
- La zone de contact des deux espèces.

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*

Premières : le 4 mai à Boué ?

Commune en Thiérache

FAUVETTE A TETE NOIRE *Sylvia atricapilla*

Retour après le coup de froid : le 13 avril à Boué

Notée un peu partout, des chiffres de densité seraient plus
intéressants.

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis

Premières le 29 avril à Reneuil

Boué : noté en mai, ad. et juv. le 22 juillet à Boué, 1 ad. le 15 août

Noté à Guignicourt (le 6 mai), Maizy, Beaurieux, Villers en Prayères, et ailleurs...

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca

Aucune donnée significative sur cette fauvette.

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus

Premiers le 13 avril à Boué

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita

Noté le 25 mars à Boué (le premier ?) toujours présent fin septembre. Nicheur commun.

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix

Premiers le 16 mai en forêt de St Gobain

Nombreux chanteurs en forêt du Nouvion en juillet

ROITELET HUPPE Regulus regulus

Encore beaucoup d'hivernants fin mars (Boué, Le Nouvion)

1 ad. le 23 juillet en forêt du Nouvion (nicheur local ?)
en décembre en forêt de Coucy-Basse

ROITELET TRIPLE-BANDEAU Regulus ignicapillus

Beaucoup d'hivernants fin mars en forêt du Nouvion-en-Thiérache

GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata

Peu de données significatives

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus

Noté en mars à Boué (en bande), quelques bandes à Soissons en novembre...

MESANGE NONNETTE Parus palustris

Signalé à Boué en Février, 1 chanteur le 18 mars...

MESANGE BOREALE Parus montanus

Boué : 1 chanteur le 20 à Boué où elle niche

Peu de données par ailleurs

MESANGE HUPPEE Parus cristatus

Hivernants en décembre en forêt de Coucy-Basse

MESANGE NOIRE Parus ater

Hivernante en décembre en forêt de Coucy-Basse

MESANGE BLEUE Parus caeruleus

Nicheuse assez commune

MESANGE CHARBONNIERE Parus major

Nicheuse commune. Pas de données de densité

BRUANT PROYER Emberiza calandra

Nicheur assez commun sur les zones cultivées.

1 ind. cantonné le 13 avril à Rignicourt, cantonné le 13 mai à Aulnois-ss-Laon

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella

Nombreux hivernants, près des maisons en janvier

Les couples se cantonnent début avril en Thiérache et dans le Laonnais.

BRUANT ZIZI Emberiza cirrus

1 M. noté le 25 août dans un champ près de la forêt de Coucy-Basse (E. Novak)

A noter : M. chanteur à la périphérie de St Quentin en 1978 (S. Bouthot)

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus

Laonnais : 7 le 15 février à Aulnois-ss-Laon, 25 le 1er mai à Barenton, 5 le 6 mai à Villers-en-Prayères, 4 le 6 mai à Aulnois, ces individus sont cantonnés le 13 mai.

Boué : 1 M. le 24 février puis 1 F. cantonnée le 20 mars, ad./juv. peu volants le 23 juillet

Noté à Vermand, St Boetien

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs

Espèce très commune, en bandes l'hiver.

Nicheur

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla

En bande durant l'hivernage, 1 le 24 mars à Boué

Dernier : 1 M. en plumage nuptial début mai à Boué (P. Luce)

VERDIER Carduelis chloris

En bande en février, mars

Boué : noté en juin, juillet...

CHARDONNERET Carduelis carduelis

Nicheur commun

noté à Boué, Buironfosse, Aulnois-ss-Laon, (cantonné le 13 mai)...

TARIN DES AULNES Carduelis spinus

20 les 1 et 2 décembre à Reneuil (P. Pigeon)

Noté ensuite en hivernage

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina

Cantonnée fin avril à Aulnois-ss-Laon où des bandes de migration sont notées : 80 le 29 avril.

Noté comme nicheur : Lerzy, Boué, ...

SERIN CINI Serinus serinus

Nicheur

1 M. chanteur en août à Soissons

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula

Bien noté en hivernage (Boué, Vallée de l'Oise...)

Nicheur assez commun.

GROS-BEC Coccothraustes coccothraustes

Nombreux hivernants en janvier et février, en forêt du Nouvion

1 F. le 13 avril à Boué

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus

Rien à signaler

MOINEAU FRIQUET Passer montanus

Nicheur assez commun (Boué...)

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris

Grosses bandes hivernales. Il commence à nicher dès mars (Boué)

1500 le 7 septembre à Aulnois-ss-Laon

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus

Premiers : le 20 mai à Aulnois-ss-Laon

1 M. et 1 couple les 24 et 25 mai en forêt de Coucy-Basse parcelle 328

Noté en forêt du Nouvion (nombreux chanteurs le 23 juillet)

1 M. le 15 août en forêt de Coucy-Basse parcelle 343

1 M. le 16 août à Boué

Nicheur noté

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius

Nicheur

Assez abondant en forêt du Nouvion

PIE BAVARDE Pica pica

Nicheuse commune, abondante en Thiérache

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula

Hivernant et nicheur (Le Nouvion)

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus

Hiverne sur les champs

colonies : 40 nids à Essigny

20 nids à Moizy

environ 20 nids à Rouvroy...

CORNEILLE NOIRE Corvus coroneType C. corone corone : Hivernante bien notée

Nicheuse abondante en Thiérache

2 F. couvent à Barenton le 7 mai

Mantelée C. c. cornix : 2 le 17 mars en forêt du Nouvion-en-Thiérache (H. Dupuich)
