CORVIDES ET VAGUES DE FROID

par F. Sueur

De Liedekerke et de Haronne (1980) rapportent l'observation d'une capture de Moineau domestique Passer domesticus par une Pie bavarde Pica pica, oiseau réputé ne capturant qu'occasionnellement des oisillons encore malhabiles ou malades. Ces auteurs pensent que ce comportement particulier de prédation est à mettre en relation avec les dures conditions climatiques (températures oscillant entre -5° et -15°, couche de neige de 30 à 40 cm) existant au moment de cette observation.

Lors de la vague de froid de février 1978, des observations similaires ont pu être effectuées à Corbie (Somme). Des Pies bavardes ont été notées attaquant en vol des Passereaux pouvant atteindre la taille du Merle noir Turdus merula, des Corbeaux freux Corvus frugilegus et des Corneilles noires C. c. corone faisaient de même. Des comportements identiques furent également observés lors de la vague de froid de janvier-février 1979.

Il semble donc que lorsque les conditions climatiques deviennent très rigoureuses les Corvidés n'arrivant plus à trouver leur nourriture de manière normale adoptent un comportement prédateur proche de celui de Falconidés prédateurs d'oiseaux (poursuite en vol) comme les Faucons pélerin et émerillon Falco peregrinus et F. columbarius. Toutefois les Corvidés capturent les oiseaux avec le bec et non avec les serres comme le font les Falconidés.

REFERENCE

De Liedekerke R. et de Haronne C. (1980) Une Pie bavarde capture un Moineau domestique en plein vol - Nos Oiseaux 35(6, 379)288.