

UN TRAQUET PATRE ORIENTAL

Saxicola torquata maura / stejnegeri

DANS LE MARQUENTERRE

par F. Sueur

Le 13 avril 1980 au Parc Ornithologique du Marquenterre, nous notons un Traquet pâtre mâle perché à environ 10 m de nous. Lorsqu'il s'envole pour se poser sur un autre buisson, notre attention est attirée par le croupion entièrement blanc pur. Ce caractère étant caractéristique des populations sibériennes maura et stejnegeri de Traquet pâtre, celles d'Europe rubicola et hibernans ne possédant pas ou très peu de blanc au croupion, nous avons cherché à détailler davantage cet oiseau. Les taches blanches de chaque côté du cou étaient bien développées mais ne se rejoignaient pas sur la nuque, ce caractère permettant de penser plus à maura qu'à stejnegeri. La poitrine était rosée très pâle et non pas roux orangé comme chez les Traquets pâtres européens, le dos et les ailes fortement rayés de brun chamoisé (coloration des liserés des plumes). Tous ces caractères nous permettent de conclure que nous étions alors en présence d'un Traquet pâtre oriental.

Yesou (1979) indique que 38 données de Traquets pâtres orientaux maura et stejnegeri ont été obtenues essentiellement depuis 1974 au Danemark, aux Pays-Bas, en Norvège, Allemagne, Irlande, aux Féroés et surtout en Grande-Bretagne. Cet accroissement des observations traduit réellement une évolution de la pattern migratoire de ces populations orientales hivernant normalement de l'Inde à Formose et au sud de la péninsule malaise. La plupart des observations ont été effectuées en automne (9 septembre - 15 novembre), 5 autres au printemps notamment en mai. En France jusqu'alors une seule mention était connue : 18 février 1978 dans les Côtes-du-Nord (Yesou 1979).

REFERENCE

Yesou P. (1979) Observation d'un Traquet pâtre oriental Saxicola torquata maura / stejnegeri en Bretagne - Alauda 47(2) 117-118.