

La REMIZ PENDULINE (*Remiz pendulinus*) dans l'OISE.

par Pierre et Marc SENGEZ

Le 31 octobre 1999, nous découvrons une Rémiz penduline *Remiz pendulinus* femelle en bordure d'un plan d'eau (M16) dans le secteur de Moru-Pontpoint. Cette observation, fut effectuée sur les quelques maigres pieds de Typhas *Typha latifolia* qui bordent cette gravière, ce qui piqua notre curiosité et nous encouragea vers une recherche plus approfondie de l'espèce.

Ainsi, nous allons découvrir plusieurs oiseaux les jours suivants, toujours en bordure du même plan d'eau :

le 1^{er} novembre : 4 oiseaux dont 1 mâle et 1 juv (P. et M. Sengez)

le 02 novembre : 4 oiseaux dont 1 mâle et 1 juv (P. et M. Sengez, C. Louvet et W. Mathot)

le 18 décembre : 3 oiseaux (P. et M. Sengez)

le 27 décembre : 3 oiseaux (P. et M. Sengez)

Les précédentes observations connues dans l'Oise se situent :

le 04 avril 1992 à Verneuil-en-Halatte avec 1 individu (P.J. Dubois) et le 17 septembre 1994 à Chevrières avec 2 juv (P. Malignat & al)

Il s'agissait donc apparemment de la 3^{ème} observation de l'espèce pour le département. Espèce qui doit sans doute passer assez facilement inaperçue du fait de son extrême discrétion, (mais qui aurait eu l'idée d'aller les chercher sur ce site ?)

DESCRIPTION DES OISEAUX OBSERVES :

Les oiseaux que nous avons observés étaient principalement occupés à se nourrir sur des massettes *Typha sp.* dont ils décortiquent la bourre pour y rechercher les insectes ou les graines selon la saison (Un bon truc pour les repérer de loin : si la bourre des massettes vole en tout sens, un jour sans vent, c'est qu'il y a probablement des Rémiz dans le secteur ; mais attention, la Mésange bleue sait aussi profiter de cette manne).

Les déplacements observés consistaient en de petits vols parfois à une dizaine de mètres de hauteur pour explorer un autre petit massif de typhas, vols accompagnés des petits cris. Nous les avons quelquefois perdues dans des saules, toujours en bordure de plan d'eau.

Cet oiseau est d'ailleurs inféodé à ce type de milieux : rideaux d'arbres des ripisylves, zones de marais en voie d'arborisation, phragmitaies avec saules, typhaies, anciennes ballastières. Il est bien connu que l'espèce recherche les feuillus à branches ténues et pendantes pour y construire son nid caractéristique en forme de bourse constitué d'un feutrage de duvets végétaux.

STATUT GENERAL DE L'ESPECE :

Pour comprendre ces observations inhabituelles, présentons le statut de l'espèce. L'aire de nidification de la Rémiz penduline est principalement située en Europe Centrale et Orientale ainsi que dans la région méditerranéenne. Ses principaux bastions sont la Russie, l'Ukraine, la Pologne, l'Italie et l'Espagne. Mais on constate une expansion de l'espèce depuis les années 1930 vers l'Ouest et plus modérément vers le Nord : Sud de la Scandinavie, Pays Bas, Nord Est de la France pendant que les populations du pourtour méditerranéen subissaient un déclin. (GEROUDET 1998)

Aux Pays Bas, l'espèce se reproduit régulièrement depuis 1981 et en Belgique depuis 1989.

Pour la France, MAYAUD, en 1936, situait les aires de nidification dans l'Hérault, le Gard et le delta du Rhône. En 1976, YEATMAN reprenait la même distribution, avec en plus quelques cas isolés de nidification dans la Drôme.

Dans l'Est de la France, la première observation en période de nidification a eu lieu dans le Bas Rhin et la première nichée en 1979 en Alsace. En Lorraine, la nidification est régulière depuis 1986 dans les vallées du Rhin et de la Moselle où 5 à 20 couples se reproduisent depuis 1990. La reproduction en Haute Garonne a été constatée en 1982 puis confirmée depuis. Au total en France la population nicheuse a été estimée entre 100 et 200 couples en 1990 (YEATMAN-BERTHELOT et JARRY 1991 et 1994).

La migration post-nuptiale se déroule de juillet (dispersion des jeunes) à début novembre pour les populations du Nord et de l'Est de l'Europe avec un pic en septembre-octobre, c'est dans ce cadre que se situent nos observations. Les

individus du littoral méditerranéen seraient plutôt sédentaires.

L'hivernage a lieu principalement en Espagne. En France, le nombre d'hivernants est estimé entre 1000 et 10 000 individus, il concerne les étangs de la côte orientale de la Corse, les étangs littoraux du Midi méditerranéen du Roussillon à la presqu'île de Giens et enfin l'estuaire de la Gironde où les effectifs sont en augmentation (YEATMAN-BERTHELOT et JARRY 1991 et 1994).

LE STATUT EN PICARDIE :

La première mention de l'espèce date de la fin des années 1950 dans l'Aisne (BOUTINOT. 1980), puis il faudra attendre le 13 avril 1986 à Gamaches (Somme) (SANNIER.1994), ensuite le 4 avril 1992 avec une observation à Verneuil en Halatte (Oise) (DUBOIS. in ROUGE 1992) puis le 27 septembre 1992 pour une autre observation de 4 oiseaux au Parc du Marquenterre (BERNUZEAU & ROUGE in SUEUR 1993) (Somme), 1 mâle le 9 mai 1993 à Noyelles-sur-mer (80) (LOUVET in SUEUR 1994). Enfin 2 juvéniles sont observés le 17 septembre 1994 à Chevrières (Oise) (P. MALIGNAT & al. com. pers.). Les observations réalisées à Moru-Pontpoint sont donc les plus tardives pour la région et concernent un nombre inhabituellement élevé d'oiseaux pour le département.

Signalons qu'un nid a été trouvé à la fin des années 90 à Villers-en-Prayères (02) (S. DELEPINE en préparation).

Nos deux observations des 18 et 27 décembre 1999 dans l'Oise ne sont pas sans rappeler les quelques observations remarquables suivantes correspondant elles aussi à des sites où l'hivernage de cette espèce est occasionnel (Le Coin des Branchés- Oiseau Magazine et com. Pers. sur l'internet). :

2 oiseaux le 14/01/95 au lac de Madine (Meuse)

1 donnée en janvier 1998 à Thumeries (Nord)

1 donnée le 12/12/98 à Plobsheim (Bas Rhin)

1 oiseau du 09/01 au 16/02/95 à Villeneuve la Garenne (Hauts de Seine).


Ces quelques observations indiquent quand il est possible d'observer cette espèce au passage (hors des sites habituels).

Nombre d'observations par mois

Le graphique 1 présente le nombre de données et d'individus observés sur les départements : 51,55, 57, 59, 60, 62, 67, 77, 80, 91, 92, 93. (soit le nord est de la France, c'est à dire hors des zones importantes d'hivernage) (Source : Le Coin des Branchés-Oiseau Magazine).

(Données partielles cumulées de 1992 à 1999).

Graphique 1



On peut voir ainsi que le mois de novembre où ont commencé les observations décrites ici correspond au maximum du passage post nuptial et que des données en hiver (décembre) existent aussi dans les départements voisins. Nos données s'inscrivent donc dans cet ensemble.

COMPLEMENT


2 oiseaux ont été observés sur les bassins de Vauciennes les 30 septembre 2000 (PMS) et 1^{er} octobre 2000 (P et M SENGEZ, F. BOUCHINET), 1 le 8 octobre 2000 (P. et M.SENGEZ) ; ces observations confirment ce qui précède.

BIBLIOGRAPHIE :

- BOUTINOT S. (1980) Etude écologique de l'avifaune du Vermandois. Structure, dynamique et évolution des populations depuis 1950. Thèse doctorat univ. Reims 444p.
- GEROUDET P. (1998). Les Passereaux d'Europe Tome III. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé : 242p.
- LUCCHESI J.L. & al in YEATMAN-BERTHELOT D., JARRY G. (1991). Atlas des Oiseaux de France en hiver, Paris, S.O.F. : 432-433

- MAYAUD N. (1936) Inventaire des oiseaux de France. Société d'étude ornithologique. Blot éd., Paris, 211p.
- OLIOSO G. in YEATMAN-BERTHELOT D., JARRY G. (1994). Nouvel atlas des Oiseaux nicheurs de France 1985-1989. Paris S.O.F. : 628-629.
- ROUGE A. (1992) Actualités ornithologiques : 15 février - 15 mai 1992. GEOR 60. Bull. liais., (11) 5 p.
- SANNIER J.M. Note sur l'observation de la Rémiz penduline à Gamaches, l'Avocette 92 - 16 - (1-2) : 20-22
- SUEUR F. (1993) Observations ornithologiques remarquables réalisées en 1992 en Picardie. Bull. S.L.N.P. t.11 : 116-118.
- SUEUR F. (1994) Observations ornithologiques remarquables réalisées en 1993 en Picardie. Bull. S.L.N.P. t.12 : 116-118.
- YEATMAN L. (1976) : Atlas des oiseaux nicheurs de France. Paris (S.O.F.) 282p.
- L'Oiseau magazine, Coin des Branchés. LPO.

Remerciements spéciaux aux Internautes qui ont répondu à notre demande : D. Cohez, E. Buchel



Dessin Marc Sengez

Pierre et Marc Sengez
8, rue du chauffour
60129 ORROUY