Avifaune de deux vallées picardes : l'Avre et la Noye

par Pierre ROYER *

Les vallées confluentes de l'Avre et de la Noye, au sud-est d'Amiens, ont entaillé le plateau picard pour donner naissance à un ensemble de milieux diversifiés : étangs, roselières, fourrés humides, pâturages, vergers, côteaux calcaires, bois de plaine, plateau cultivé. Cette mosaïque de milieux accueille de nombreuses espèces d'oiseaux qui ont fait l'objet d'un suivi ornithologique depuis une quinzaine d'années. On peut estimer que les observations enregistrées régulièrement sur ce secteur sont représentatives de l'avifaune des vallées picardes et en font une zone témoin de l'évolution locale des populations d'oiseaux.

178 espèces ont été recensées en quinze ans d'observation. Ce nombre se rapproche de celui estimé en vallée des Evoissons dans le Sud amiènois.

Parmi les 91 espèces nicheuses, 43 se répartissent dans les zones humides, soit 48 %, attachées aux milieux de fond de vallée : étangs, roselières, bois humides. 18 espèces sont strictement inféodées à ce genre de biotope ; parmi elles, il faut souligner la présence du Butor étoilé, du Blongios nain, de la Locustelle luscinioïde, de la Rousserolle turdoïde et du Busard des roseaux. Ces oiseaux figurent sur la liste rouge des espèces menacées en France. Le Héron cendré est un nicheur très récent dans ce milieu.

Les cours d'eau avec ripisylve occupent le deuxième rang avec 41 espèces nicheuses. Deux espèces sont attachées à ce milieu : le Martin-pêcheur et la Bergeronnette des ruisseaux. Le Faucon hobereau présente le statut de nicheur probable dans ce biotope ces deux dernières années.

Les massifs boisés des flancs de vallée et de plaine regroupent 40 espèces nicheuses ; 11, soit 25,6 %, recherchent exclusivement ce milieu pour se reproduire. L'Epervier d'Europe est réapparu en tant que nicheur en 1990 et 1991.

Les cultures et les agglomérations sont les milieux les plus pauvres qui n'attirent que des espèces plutôt banales ou anthropophiles.

La position géographique des deux vallées, orientées nord-sud, constitue un axe de passage pour les migrateurs. Certains empruntent ces couloirs naturels sans s'arrêter pour transiter entre leurs zones d'hivernage et de reproduction : c'est le cas de l'Oie cendrée ou du Grand Cormoran. D'autres peuvent stationner quelques heures ou

 © Picardie Nature/C.O.P.

quelques jours sur le site. Les milieux humides constituent les zones les plus attractives pour le repos des migrateurs, particulièrement pour les limicoles (en avril-mai et août-septembre) ainsi que pour les canards de surface (en mars-avril et septembre-octobre). D'autres catégories de migrateurs empruntent également ces voies de passage : passereaux (Hirondelles, Pinsons, Pipits), rapaces (Epervier d'Europe, Buse variable).

Enfin, les hivernants trouvent un refuge dans ces vallées et les secteurs avoisinants. On peut distinguer des hivernants réguliers (Grives litorne et draine, Vanneau) et des hivernants occasionnels qui n'arrivent dans nos contrées que pendant les coups de froid (Harles).

L'étude réalisée depuis une quinzaine d'années dans les vallées de l'Avre et de la Noye a permis de constater une continuité dans le temps de l'avifaune. Peu de bouleversements ont affecté ces milieux ces dernières années. Nous avons constaté quelques variations quantitatives : augmentation du Grèbe huppé, diminution des Fauvettes aquatiques certaines saisons. D'un point de vue qualitatif, certaines espèces se sont éteintes : Chouette chevêche et Pie-grièche grise. Le secteur s'est enrichi d'espèvces nicheuses nouvelles ou réapparues : Héron cendré, Epervier d'Europe, Faucon hobereau et Gorgebleue.

La richesse spécifique est liée à la diversité des milieux ; parmi eux, les zones humides demeurent les plus fragiles et accueillent les espèces les plus rares. La conservation des biotopes de fond de vallée demeurera le seul moyen de protéger les espèces les plus menacées au niveau régional et même national.

* 32 rue Montcalm, F-80090 Amiens

Ce texte dont seul le résumé est donné ici a paru dans l'AVOCETTE 1988 - 12(3) p.97 à 165 sous le titre :
G. NEVEU et P. ROYER : L'avifaune de la confluence des vallées de l'Avre et de la Noye (suite), 2ème période : 1977-1988.

 © Picardie Nature/C.O.P.