

suburbain) mais essayant de prélever des espèces assez grosses (Tourterelles turques ou Pigeon ramier, secondairement Merle noir) pour rentabiliser son effort de chasse. Ces résultats sont cohérents avec ce que la littérature donne sur le régime alimentaire de ce prédateur et régionalement avec les résultats obtenus par COMMECY (1992).

Remerciements :

Je tiens à remercier Xavier COMMECY pour l'aide apportée à correction et à la rédaction de cette synthèse.

BIBLIOGRAPHIE :

COMMECY X. (1992) : L'Épervier d'Europe *Accipiter nisus* rapace urbain et suburbain en Picardie. L'Avocette 16 (1-2) p. 15-17.

GEROUDET P. (1978) : Les rapaces diurnes et nocturnes d'Europe. Neuchâtel. (Delachaux et Niestlé) 426p.

COMPORTEMENT ANTAGONISTE ENTRE UN ROUGE GORGE *ERITHACUS RUBECULA* ET UN ROUGE-QUEUE-NOIR *PHOENICURUS OCHRUROS* .

par Y. LECOMTE.

A Villers Saint Sépulcre (60), le 21 février 1994, à l'entrée d'une usine, un Rouge gorge agressait furieusement un Rouge queue noir mâle. Le motif de la bagarre : une branche de charme *Carpinus betulus* " poste de chant territorial " .

Un problème se pose cette année pour les deux oiseaux suite à l'élagage des branches des arbres des espaces verts et parking. L'importante diminution de celles-ci utilisées comme perchoirs dans le passé, les ont rendues peu nombreuses d'où ces problèmes de "cohabitation", chacun chantant l'un après l'autre. Quoique le Rouge queue noir, sans oublier de temps à autre le Charme ... du perchoir, alterne les chants sur les pilasses de la clôture.

Résultat d'une simple séance d'élagage, cette modification du milieu a modifié le comportement de ces deux oiseaux, paisibles voisins habituellement. Le Rouge gorge est resté le maître du lieu.