

Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme) : année 1994

Patrick TRIPLET (directeur de la réserve),
Jean-Claude ROBERT & François SUEUR

Liste des observateurs: J. BELLARD, P. J. DUBOIS, P. ETIENNE, E. FOURCY, D. FOURNIER, A. e J.C. GUILLO, C. MAISON, F. MAURY, F. MONTEL, J.B. MOURONVAL, P. POIRE, B. et E. QUEVAL J.C. ROBERT, P. ROYER, V. SCHRICKE, H. SERE, F. SUEUR, G. et P. TRIPLET.

Liste des observations

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

3 le 2 janvier, 1 le 29, 1 les 2 et 9 février.

Plongeon arctique *Gavia arctica*

1 le 14 janvier, 1 les 8 (*Oiseau Magazine* 56) et 10 mai.

Grèbe castagneux *Podiceps ruficollis*

1 le 29 janvier. 1 le 2 février. 2 le 11 mars, 1 couple le 26, 2 le 30. 6 (dont 2 chanteurs) le 6 avril, 2 couple: le 13, 6 ad. le 19, 3 couples (avec 2 chanteurs) le 21. 1 ad. le 18 mai, 2 chanteurs le 25. 4 le 8 juin, 2 ad. le 20, 7 ad./2 pulli le 24. 2 les 5 et 13 juillet, 5 le 17, 18 les 21 et 24, 4 (+ 2 pulli) le 29. 8 le 5 août, 3 ad (dont 1 chanteur) 2 juv. 1 pullus le 7, 6 ad. 4 juv. 2 pulli le 14, 3 ad. 2 juv. le 28. 9 le 5 septembre, 6 le 27 4 le 5 octobre et 1 le 19. 2 les 6 et 28 novembre. 3 le 19 décembre.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

45 le 2 janvier, 25 les 19 et 29. 15 les 9 et 12 février, 19 le 26. 21 le 9 mars, 16 le 13, 6 le 21. 19 le 6 avril 28 le 19, 12 le 29. 21 ad./2 pulli (quelques jours) le 10 mai, 14 ad. le 18, 17 ad. le 22, 8 (+ 1 juv.) le 30. 3 nichées le 15 juin, 14 individus (dont 3 couples) 2 pulli le 20, 9 ad./1 pullus le 24. 8 le 5 juillet, 12/2 pulli le 11, 21 ad. 3 juv. 1 pullus âgé le 17, 15 ad. 2 juv. le 24. 8/1 pullus âgé le 7 août, 19/1 pullus (nouvelle couvée) le 14, 17/1 pullus le 28. 19 le 5 septembre, 5 le 12 et 8 le 27. 9 le 5 octobre, 4 le 19 et 1 le 25. 6 les 6 et 17 novembre. 3 le 12 décembre et 8 le 26.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*


1 le 2 janvier. 1 ad. le 11 mars. 1 le 5 avril, 3 ad. le 19 et 1 ad. PN le 21. 1 ad. PN le 8 juin, 4 ad. PN le 15. 7 ad. PN le 18 et 4 ad. le 28. 2 le 13 juillet, 3 le 21, 1 ad. PN 3 juv. (reproduction locale ?) le 24. 1 le 5 août et 1 juv. le 28. 1 les 5 et 9 novembre. 1 le 29 décembre.

Malgré la présence de tous ces oiseaux, aucun observateur n'a pu prouver la reproduction certaine.

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis*

1 en vol le 18 juin.

Grands Cormorans *Phalacrocorax carbo* (Photo de Marc MAILLER)



Hérons garde-boeufs *Bubulcus ibis* (Photo de Marc MAILLER)



Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

11 les 2 et 14 janvier, 12 le 29 (dortoir situé au sud de la zone et non pas dans la vallée de la Maye utilisé par les oiseaux fréquentant la baie de Somme et ses abords pendant la journée). 14 le 3 février, 4 le 16 et le 21. 12 le 9 mars, 8 les 15 et 26, 31 le 30. 26 le 8 avril, 27 le 19 et 25 le 26. 23 le 10 mai, 53 le 19 et 4 le 22. 79 le 10 juin, 55 le 20 et 11 le 25. 1 le 5 juillet, 27 le 20 et 5 le 25. 4 le 7 août, 7 le 11 et 4 le 29. 31 le 5 septembre, 4 le 10 et 7 le 22. 13 le 5 octobre, 3 le 19 et 8 le 25. 9 le 5 novembre, 11 le 17 et 8 le 28. 71 le 19 décembre et 18 le 31.

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*

1 le 19 octobre.

Butor étoilé *Batanrus stellaris*

1 les 9, 10 et 11 mars. 1 le 17 novembre. 1 le 19 décembre.

Blongios nain *Ixobrychus exilis*

1 femelle est notée les 28 et 29 juin (P.J. DUBOIS), tandis qu'un mâle est signalé sur le répondeur LPO le 31 juillet. Plusieurs observations non datées ont également été rapportées ce printemps, de même que la découverte d'un nid dans une phragmitaie de la réserve.

Héron garde-boeufs *Bulbulcus ibis*

1 le 21 mai (*Oiseau Magazine* 36).

Algrette garzette *Egretta garzetta*

1 le 18 mai. 1 le 15 juin et 6 le 30. 2 les 13 et 20 juillet. 3 le 7 août, 1 le 11, 2 les 28 et 29 août. 3 les 5 et 10 septembre.

Héron cendré *Ardea cinerea*

1 le 5 janvier. 3 le 9 février, 2 les 12 et 26. 1 les 9 et 11 mars. 5 le 6 avril, 1 les 13 et 19, 7 le 23. 3 le 11 mai et 5 le 18. 9 le 15 juin et 3 le 24. 2 le 5 juillet et 5 le 11. 1 ad. 3 juv. le 7 août, 8 le 14 et 4 le 28. 1 ad le 2 septembre, 6 le 22. 1 le 19 octobre. 1 les 5, 17 et 28 novembre. 1 le 31 décembre.

Héron pourpré *Ardea purpurea*

1 le 2 mai.

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

1 le 19 février. 8 en vol vers le nord-est le 10 mai, 3 ad. le 18 et 1 ad. le 26.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*

1 ad. le 23 avril.

Cygne muet *Cygnus alar*

19 le 2 janvier, 15 le 14 et 28 (dont 3 couples) le 29. 9 le 2 février, 13 le 12 et 32 (dont 6 couples) le 26. 15 (dont 5 couples/1 nid) le 9 mars, 16 (dont 4 couples) le 13 et 28 le 26, 2 nids près de la ferme de la Basse Envierte le 30. 30 (dont 5 couples) le 6 avril, 14 le 19, 22 (dont 3 ou 4 couples/parades et 1 nid en construction) le 21. 73 (dont 3 couples/1 nid) le 10 mai, 43 (+ 4 pulli) le 16, 100 (dont 1 couple/1 nid) le 18, 64/5 pulli le 22, 2 nichées de 6 et 7 pulli le 24. 47 le 6 juin, 203 (dont 4 couples/6 pulli gris + 6 pulli « immutabilis » + 6 pulli + 4 pulli gris et 1 pullus « immutabilis ») le 20, 237/7 pulli gris + 6 pulli « immutabilis » le 24. 92 le 5 juillet, 293/7 juv. non volants et min. 2 pulli le 17, 260/6 juv. non volants le 24. 112 le 5 août ainsi qu'une femelle et 5 juvéniles, 307/8 + 2 juv. non volants (tous gris) le 7, 312/4 + 1

+ 4 juv. non volants le 14, 303/2 juv. + 2 juv. non volants le 28. 285 le 5 septembre, 105 le 12 et 171 le 27
42 le 5 octobre. 34 le 19. 10 le 5 novembre, 31 le 17 et 20 le 25. 10 le 19 décembre et 26 le 31.

Cygne noir d'Australie *Cygnus atratus*

1 ad. du 24 juillet ou 14 août.

Oie cendrée *Anser anser*

15 vers le NW le 16 février et 8 (dont 7 vers le N) le 26. 23 le 9 mars, 60 le 13, 46 le 26 et 116 le 30. 33 le
5 avril, 18 le 13 et 15 le 21. 2 le 22 mai.

Bernache cravant *Branta bernicla*

1 le 15 mars et 16 le 26. 1 les 2 et 5 mai, 2 le 7.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

5 le 3 février, 6 M. 4 F. le 9, 11 M. 10 F. le 16, 31 M. 29 F. le 21. 11 M. 10 F. le 2 mars, 68 le 9, 26 M. 2
F. le 11, 23 M. 21 F. le 17, 16 M. 14 F. le 21. 37 (dont min. 14 couples) le 6 avril, 11 couples et 1 femelle
le 19, 22 couples et 3 mâles le 21. 16 M. 14 F. le 2 mai, 22 M. 15 F. le 5, 12 M. 6 F. le 16, 11 couples et
mâles le 18, 46 (dont 19 couples et 3 mâles) le 22. 4 M. 7 F. le 8 juin, 10 (+ 2 pulli) le 15, 4 mâles et 11
couples/ 8 pulli (7 jours) + 6 + 13 + 9 pulli le 20. 1 couple, 1 mâle/3 pulli + 6 pulli (8 jours) + 5 pulli (1
jours) + 11 pulli (2 jours) le 24 juin. 1 pullus (10 jours) et 12 pulli (15 jours) le 5 juillet. 2 couples/4
pulli, 1 femelle/7 pulli et 1 mâle le 17 juillet. 2 ad. (+ 13 pulli) le 20 juillet, 1 couple/15 pulli et 1 femelle/
pulli le 24, 12 pulli le 29. 1 femelle 6 juv. 2 pulli et 1 femelle/2 pulli le 7 août, 1 couple/ 10 juv. le 11,
femelle/7 juv. le 14, 6 juv. le 28. 1 M. le 19 décembre.

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*

1 femelle les 13 et 17 juin (J. BELLARD & J. QUEVAL).

Canard siffleur *Anas penelope*

1 M. les 4, 5 et 14 janvier, 20 le 17 et 1 femelle le 29. 30 le 14 février et 7 M. 6 F. le 26. 4 M. 2 F. le 1
mars, 9 M. 7 F. le 11, 3 M. 5 F. le 17, 3 M. 2 F. le 21, 28 le 25. 4 M. 3 F. le 5 avril, 5 M. 8 F. le 19 et
le 21. 3 M. 3 F. le 2 mai, 3 M. 3 F. le 16 et 1 couple 1 femelle le 18. 1 M. le 25 septembre et 2 F. le 27.
M. le 17 octobre, 1 F. le 19, 4 le 25. 3 le 6 novembre, 2 M. 4 F. le 17 et 2 le 28. 8 le 12 décembre et 2 le
19.

Canard chipeau *Anas strepera*

1 M. 1 F. le 4 janvier et 1 F. le 19. 1 M. le 16 février, 1 M. 1 F. le 17, 3 M. 2 F. le 21. 17 le 13 mars, 3 M.
2 F. les 15 et 21, 22 le 30. 5 couples et 5 mâles le 6 avril, 7 couples les 13 et 19, 4 couples les 21 et 29. 1
M. le 10 mai, 4 M. 3 F. le 16, 9 M. le 18, 15 le 22, 6 M. 3 F. le 30. 1 M. le 8 juin, 1 couple le 20 et 1 M. le
30. 4 le 5 juillet et 2 le 17. 1 M. le 28 août. 2 M. le 5 septembre et 1 le 12. 2 M. le 5 novembre, 5 M. 3 F. le
17.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

3 le 15 février et 2 le 21. 4 le 2 mars, 37 M. 27 F. le 11, 41 M. 32 F. le 21. 3 couples 2 mâles et 4 femelle
le 6 avril, 40 le 18, 32 le 21 et 2 M. le 29. 2 M. 1 F. le 2 mai. 1 couple le 24 juin. 5 le 5 août et 2 le 28. 1 F.
le 2 septembre, 3 F. le 22 et 7 le 27. 1 le 7 octobre, 2 le 19 et 5 le 25. 1 les 5 et 17 novembre. 5 le 1
décembre.

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

3 M. 3 F. le 4 janvier, 3 couples et 3 mâles le 19, 2 M. 2 F. le 26. 5 couples le 9 février, 8 le 19, 5 le 21, 1 M. 2 F. le 26. 3 M. le 9 mars, 20 le 13 mars. 4 le 6 avril, 6 (1 copulation) le 19 et 3 le 21. 3 M. le 10 mai, 1 M. 2 F. le 16 mai, 13 M. le 19, 10 pulli le 24, 35 le 30. + 8 pulli de 7 jours le 8 juin, 8 le 20, 22 (+ 9 pulli le 24, 50 le 11 juillet, 5 le 20 et 15/8 juv. non volants le 24. 10 le 7 août, 15 le 11 et 26 le 28. 3 M. 2 F. le 1 septembre et 14 le 25. 3 le 6 novembre, 8 M. 2 F. le 17, 8 M. 6 F. le 28. 2 le 12 décembre, 1 les 26 et 29, 1 M. 7 F. le 31.

Canard pilet *Anas acuta*

11 le 19 février et 20 le 23. 6 le 2 mars, 2 M. 1 F. le 11, 7 le 15, 3 M. 2 F. le 17, 8 M. 5 F. le 21, 48 le 26. M. le 8 avril, 2 les 15 et 18, 1 couple les 21 et 29. 1 M. 2 F. le 2 mai, 1 M. le 7, 1 F. le 10 et 1 M. le 30. 1 les 11 et 28 août. 1 le 22 septembre.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

4 M. 1 F. le 9 mars, 7 M. 6 F. le 11, 6 M. 3 F. le 21, 14 M. 3 F. le 26. 3 couples 2 M. 1 F. le 6 avril, 1 couple et 2 mâles le 19, 1 couple le 21 et 1 M. le 29. 2 M. 1 F. le 2 mai puis 1 M. les 10, 18 et 22. 1 M. le 15 juin, 1 couple le 20, 6 le 24. 2 le 13 juillet et 5 le 20. 2 le 7 août.

Canard souchet *Anas clypeata*

1 M. le 5 janvier, 2 M. 1 F. le 26. 3 le 11 février, 14 le 19, 8 M. 4 F. le 21 et 5 M. 6 F. le 26. 13 M. 6 F. le 9 mars, 47 M. 30 F. le 11, 49 M. 30 F. le 17, 146 M. 116 F. le 21, 236 le 30. 80 M. 47 F. le 5 avril, 5 couples et 65 mâles le 6, 205 le 19, 110 le 21, 17 M. 6 F. le 29. 11 M. 5 F. le 2 mai, 3 couples les 7 et 16, 1 M. le 30. 1 M. 1 F. le 8 juin, 1 M. le 15, 6 le 24. 15 le 20 juillet. 5 le 5 août et 20 le 28. 10 le 5 septembre. 7 le 5, 5 imm. le 10, 4 M. 4 F. le 25. 1 M. 1 F. les 5 et 19 octobre, 2 M. le 25. 1 F. le 9 novembre, 3 F. le 17, 1 le 28. 3 le 12 décembre et 1 M. 4 F. le 29.

Nette rousse *Netta rustica*

1 femelle le 2 janvier.

Fulligule milouin *Aythya ferina*

66 le 2 janvier, 23 M. 7 F. le 4, 50 le 6, 60 le 17, 55 M. 11 F. le 26, 49 M. 29 F. le 29. 16 M. 3 F. le 1 février, 35 le 3, 19 M. 14 F. le 9, 8 M. 5 F. le 12, 15 M. 5 F. le 16, 16 M. 6 F. le 21 et 9 M. 10 F. le 26. 21 M. 17 F. le 2 mars, 5 F. le 9, 9 M. 8 F. le 11, 8 le 26. 10 le 6 avril, 6 M. 1 F. le 19 et 2 couples le 29. 2 M. 1 F. le 2 mai, 4 M. le 7, 1 couple et 2 mâles le 10, 6 M. 2 F. le 16, 1 couple et 10 mâles le 18, 1 couple 1 mâles et 1 femelle le 22, 1 couple le 25, 9 M. le 30. 6 M. le 8 juin, 13 M. le 10, 6 M. 1 F. le 15, 1 femelle/8 et 8 pulli le 18, 21 M. 4 F. le 20, 14 M. 3 F. le 24, 15 le 28, 5 M. 2 F. (+ 4 pulli de 3 jours) le 30, 5 ad. (+ 8 pulli + 2 pulli) le 5 juillet, 11 le 11, 2 M. 2 F. le 24 et 3 le 29. 5/1 pullus le 7 août, 6/1 pullu le 14, 1 M. 3 F. le 28. 1 M. les 2 et 5 septembre, 3 le 12, 1 M. 4 F. le 25 et 4 M. 2 F. le 27. 5 M. 3 F. le 1 octobre, 32 M. 9 F. le 19, 58 M. 13 F. le 25. 22 M. 12 F. le 6 novembre, 89 M. 11 F. le 17 et 45 M. 6 F. le 28.

37 le 12 décembre, 148 M. 17 F. le 19, 47 le 26, 28 M. 52 F. le 29 (on notera avec intérêt cette observation de P. ROYER où les femelles sont plus nombreuses que les mâles, ce qui est rare pour cette espèce sur ce site) et 140 le 31.

Fulligule morillon *Aythya fuligula*

43 M. 34 F. le 4 janvier, 75 le 19 et 45 M. 33 F. le 26. 31 M. 22 F. le 2 février, 36 M. 22 F. le 9, 24 M. 2 F. le 12, 18 M. 12 F. le 16, 17 M. 16 F. le 21 et 27 M. 29 F. le 26. 8 M. 8 F. le 2 mars, 9 M. 11 F. le 9, 1 M. 3 F. le 11, 4 le 17, 17 M. 9 F. le 21. 8 M. 3 F. le 5 avril, 6 couples 4 mâles et 2 femelles le 6, 18 les 1 et 19, 27 le 21. 4 M. 3 F. le 2 mai, 5 M. 1 F. le 10, 4 couples le 19, 8 M. 3 F. le 25. 4 M. 1 F. (couve) le 1 juin, 10 M. le 10, 12 M. 3 F. le 15, 10 M. 1 F. le 20, 10 M. 3 F. le 24 et 10 M. 2 F. le 30. 11 le 5 juillet,

F./8 pulli le 9, 27 le 11, 28 le 17, 5 juv. le 20, 26/8 pulli (2 à 3 semaines) le 24, 5 juv. le 25, 20 le 29. 1 juv. le 5 août, 8 le 7, 16 le 11, 12/ 5 + 2 pulli âgés et 5 juv. non volants le 14, 5 M. 7 F. le 28. 3 F. et 6 imm. le 2 septembre, 16 le 5, 10 le 12, 22 M. 6 F. et 4 imm. le 25, 22 M. 13 F. le 27. 8 M. 7 F. le 5 octobre, 11 M. 8 F. le 19, 24 M. 21 F. le 25. 23 M. 21 F. le 6 novembre, 26 M. 21 F. le 17, 29 M. 16 F. le 28. 22 le 12 décembre, 31 M. 28 F. le 19 et 31 M. 56 F. le 29.

Fuligule milouinan *Aythya marila*

2 F./imm. le 2 janvier, 1 M. 2 F. les 5, 14 et 18, 2 M. imm. 1 F./imm. le 19, 3 F. le 20 et 2 M. imm. 1 F./imm. le 29. 3 F./imm. les 2 et 9 février, 1 le 16 et 2 le 21. 1 couple 1 mâle le 6 avril, 1 M. le 19 et 1 couple adulte le 21. 1 M. le 10 mai. 4 F./imm le 17 novembre. 1 F./imm le 19 décembre.

Macreuse noire *Melanitta nigra*

1 F./imm les 26 et 30 mars, ainsi que le 8 avril.

Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula*

1 mâle adulte le 26 février.

Harle pieuvre *Mergus albellus*

1 M. de 1er hiver et 1 femelle le 5 et 14 janvier, 1 femelle les 18, 20 et 29. 1 F./imm les 3 et 9 février, 2 le 16, 1 les 21 et 26. 2 le 11 mars, 1 le 15, 1 F. les 22 et 26.

Harle huppé *Mergus serrator*

1 M. 1 F. du 11 au 17 mars.

Milan noir *Milvus migrans*

1 en vol vers le nord le 21 avril et 1 ad. le 23.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

1 F. les 30 mars et 23 avril. 1 F. le 2 mai, 1 M. le 7, 1 F. le 10, 2 F. les 18 et 26. 1 imm. les 7 et 14 août, 2 le 22. 1 F. ad. le 5 septembre, 1 F./imm. les 22 et 25, 1 F. ad. et 1 imm. le 27. 1 F. le 28 novembre.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

1 F./imm. le 29 janvier. 1 F./imm le 3 février et 1 M. le 9. 1 F. les 9 et 21 mars, 1 couple le 26. 1 F. le 2 mai.

Busard cendré *Circus pygargus*

1 F. le 19 avril. 1 F. les 16 et 24 mai, 1 couple nicheur possible dans les Bas-champs. 1 F. le 20 juin. 1 M. imm. le 9 juillet. 1 juvénile volant le 18 septembre.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

1 F. le 13 mars. 2 M. le 22 septembre et 3 en migration le 7 octobre.

Buse variable *Buteo buteo*

1 le 12 février. 1 le 24 mai. 2 le 22 septembre.

Buse pattue *Buteo lagopus*

1 ad. hivernant à partir d'octobre, présent jusqu'au 2 janvier 1995 (T. FOURNET in DUBOIS & C.H.N. 1995: *Ornithos* 2 : 6).

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

1 les 19 et 29 janvier. 1 le 2 février, 2 le 9 et 1 le 26. 3 le 9 mars, 1 le 13 et 2 le 21. 1 couple nicheu probable à la ferme de la Basse Enviète en avril. 2 M. le 19 avril, 3 le 21. 2 (dont 1 F.) le 10 mai, 1 les 11 et 22. 4 le 20 juin et 1 le 24. 5 le 24 juillet. 13 le 7 août, 15 le 14 et 11 le 28. 1 M. 1 F. le 2 septembre, 1 les 5 et 22. 1 le 19 octobre. 1 les 26 et 31 décembre.

Faucon émerillon *Falco columbarius*

1 M. le 15 mars. 1 F./imm le 13 avril et 1 M. le 26.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

1 M. le 2 mai, 1 ad. du 24 mai au 1er juin. 1 M. le 27 septembre.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

1 immature le 7 décembre.

Perdrix grise *Perdix perdix*

3 couples le 26 mars. 3 (dont 1 couple) le 10 mai, 2 le 11 et 1 couple le 22. 7 le 25 septembre. 6 le 1 octobre.

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

1 le 23 septembre.

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus*

3 le 4 janvier. 1 le 9 février. 4 le 11 mars et 1 le 17. 4 les 6 et 19 avril. 3 le 10 mai. 2 nichées le 15 juin. 4 le 17 juillet, 4 et 1 ad. 4 juv. 1 pullus le 24. min. 9 (dont 2 ad. 6 juv.) le 7 août, 5 (dont 3 juv.) le 11, 2 ad./3 pulli âgés et 1 juv. le 14, 8 (dont 1 ad. 4 juv.) le 28. 12 (dont 1 ad. 8 juv.) 1 pullus (15 à 25 jours) le 5 septembre, 2 juv. le 27. 2 le 5 octobre et 9 le 25. 3 le 6 novembre, 4 le 17 et 3 le 28. 4 le 19 décembre et 8 le 26.

Fulque macroule *Fulica atra*

4 975 le 2 janvier, 690 le 4, 675 le 19, 770 le 29. 460 le 9 février, 395 le 12 et 495 le 21. 245 le 9 mars, 195 le 13 et 160 le 21. 76 le 6 avril, 40 le 19, 1 couple et 3 pulli le 21, 35 le 29. 62 le 10 mai, 44 le 19 et 50 le 24. 140 le 10 juin, 185 le 15, 224 (1 + 1 + 6 + 2 + 1 pulli) le 20, 335 (4 + 6 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 3 pulli) le 24. 620 le 5 juillet, 580 le 11, 650 le 13, 1390 (7 pulli et 5 + 2 juv.) le 17, 1372/11 juv. le 24. 1555 (1 pullus de 10 à 15 jours, 4 + 3 + 3 juv.) le 7 août, 1586 le 11, 1785 le 14, 670 les 22 et 28, 530 le 29. 432 le 2 septembre, 720 le 5, 401 le 12 et 650 le 27. 410 le 5 octobre, 430 le 19 et 540 le 25. 295 le 6 novembre. 205 le 17 et 96 le 28. 150 le 12 décembre, 160 le 19, 410 le 26 et 500 le 31.

Huitrier ple *Haematopus ostralegus*

1 ad. le 11 mars, 2 les 21 et 22. 1 couple le 21 avril, 14 le 29. 2 ad. le 2 mai, 4 ad. le 16, 2 ad. alarmant le 24, revus le 30. 1 le 24 juin. 1 ad. (+ 2 pulli de 7 jours) le 20 juillet, 13 le 29. 1 le 19 octobre.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

1 couple (accouplement) le 2 mai.

Avocette *Recurvirostra avasetta*

19 le 8 mars. 1 le 21 avril et 1 alarme le 29. 2 le 7 mai, 2 le 25 et 9 le 26. 6 le 24 juin.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

1 le 7 et 13 juillet dans une pâture près de la Ferme à galets.

Glaréote à collier *Glareola pratincola*

1 ad. en vol le 28 juin (P.J. DUBOIS), l'oiseau serait présent depuis le 26 juin.

Pluvier petit-gravelot *Charadrius dubius*

Installation des nicheurs dès la mi-mars. 7 à 9 couples nicheurs dont 3 certains sur la réserve. Encore oiseaux le 28 août.

Pluvier grand-gravelot *Charadrius hiaticula*

9 le 26 février. Arrivée des nicheurs locaux le 9 mars, 2 le 11. 1 le 6 avril, 2 le 19 et 2 couples le 29. 36 le 16 mai, 2 couples le 18 et 64 oiseaux le 26. 20 le 1er juin, 4 couples nicheurs dont 3 certains dans la zone allant de la réserve (2 couples certains) aux gravières de Woignarue. 8 le 11 août et 4 le 22. 2 le 1 septembre et 1 juv. volant le 19.

Pluvier à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*

Accouplements et parades dès le 30 mars. 6 couples recensés sur la réserve.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

1 en mue le 19 avril. 2 le 19 mai.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

4 le 11 mars. 2 le 29 avril. 1 le 2 mai, 2 le 11, 3 le 16, 8 le 19, 1 le 22 et 25. 1 le 24 juin.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

60 le 9 mars. 12 couples oiseaux nicheurs aux abords de la réserve en mars. 34 (dont 30 en vol vers le sud) le 17 juillet. 23 en vol vers le sud-ouest le 7 août. 120 le 27 septembre.

Bécasseau minute *Calidris minuta*

6 le 29 juillet. 5 le 5 août et 2 le 28.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

1 en PN les 2 et 24 mai, ainsi que le 28 juin. 1 le 20 juillet. 1 le 5 octobre.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

1 le 9 mars et 16 le 21. 4 le 13 avril et 40 le 23. 1 le 16 mai. 5 le 1er juin, 2 les 20 et 21. 3 le 5 août et 2 le 22. 2 le 10 septembre. 1 le 19 octobre.

Combatant *Philomachus pugnax*

2 le 15 mars et 17 le 26. 2 F. le 23 avril. 24 le 2 mai et 60 le 7. 1 M. et 1 F. le 24 juin. 3 le 29 août. 16 le 10 septembre.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

8 le 6 janvier et 5 le 18. 5 le 2 février et 10 le 19. 3 le 11 mars et 1 le 26. 1 le 13 avril. 2 le 21 juillet. 1 le 5 août. 76 le 5 novembre.

Barge à queue noire *Limasa limasa*

5 le 26 mars. 1 leucistique le 7 mai (*Oiseau Magazine* 36), 1 les 10 et 16, 7 le 28 juin et 3 le 30, 3 les 1^{er} juillet et 5 août.

Barge rousse *Limasa lappanica*

3 11 (dont 9 en vol vers le nord) le 21 avril. 1 le 2 mai et 2 le 30, 5 le 13 juillet, 3 le 28 août, 7 le 1^{er} septembre.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

le 2 le 19 avril, 6 le 21 et 5 le 23, 2 le 2 mai, 4 le 10, 1 les 18 et 19, 1 le 28 juin, 7 le 13 juillet, 10 le 17 et 1 le 21, 2 le 5 août.

10

Courlis cendré *Numenius arquata*

12 le 19 février, 3 le 21 avril, 2 le 17 juillet.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

1 les 20, 21 et 23 avril.

Chevalier gambette *Tringa tatanus*

1 le 17 mars, 18 le 21 et 11 le 26, 4 le 19 avril, 5 le 21 et 4 le 29, 4 le 2 mai, 11 le 10, 7 (dont 2 en vol vers le nord) le 18, 16 le 19 et 4 le 24, 3 le 1^{er} juin, 3 ad. (dont 1 parade en vol) le 10, 1 les 15 et 20, 9 le 24, 1 le 5 juillet, 2 le 5 août et 1 le 14. Passage de plusieurs dizaines le 1^{er} septembre et 2 le 5.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

1) 3 le 19 avril et 2 le 23, 1 les 2 et 10 mai.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

3 le 11 juillet.

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

1 le 11 juillet.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

1 le 26 avril, 1 les 2 et 10 mai, 5 le 12, 3 les 17 et 24 juillet, 2 le 29, 2 les 5 et 7 août, 3 le 11 et 4 le 28, 1 les 5, 22 et 25 septembre.

Tournepleur à collier *Arenaria interpres*

4 le 21 avril et 1 le 29, 6 le 2 mai et 1 le 24.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

1 ad. le 30 mars (2 autres le même jour sur les gravières de Woignarue), 1 ad en plumage nuptial le 28 juin.

Mouette pygmée *Larus minutus*

1 le 21 mars, 3 od. le 22, 4 le 26 et 18 ad. le 30, 60 le 5 avril, 77 le 8, 94 ad. et 3 imm. le 13, 140 (dont 22 ad. 8 imm.) le 19, 181 (dont 16 ad. 8 imm.) le 21, 137 le 23 et 3 le 29, 8 le 2 mai, 1 od. 2 imm. le 10.

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

30 le 2 janvier, 115 le 19 et 45 le 29. 40 le 9 février, 12 les 12 et 16, 68 le 26. 180 le 9 mars, 55 le 13 et le 17. 85 le 6 avril, 5 le 19 et 50 le 26. 15 le 2 mai et 1 ad. 3 imm. le 22. 10 le 20 juin et 20 le 24. 10 le juillet, 15 le 20 et 170 le 24. 70 le 7 août, 20 les 11 et 28. 13 le 5 septembre et 205 le 27. 17 le 5 octobre 28 le 19. 25 le 5 novembre. 160 le 31 décembre.

Goéland cendré *Larus canus*

15 le 4 janvier, 40 le 19 et 10 le 29. 60 le 9 février, 7 le 16 et 15 le 21. 26 le 9 mars, 55 le 13, 53 ad. et imm. le 15. 9 le 8 avril et 140 le 26. 3 le 2 mai. 2 ad. les 13 et 17 juillet, 30 le 24. 25 le 7 août, 3 ad. imm. les 11 et 28. 17 le 27 septembre. 25 le 7 octobre et 20 le 19. 73 le 5 novembre. 300 le 31 décembre.

Goéland brun *Larus fuscus*

4 ad. le 15 mars et 12 ad. le 26. 3 ad. le 13 avril. 2 le 10 mai, 2 ad. le 24, 6 le 22. 1 ad. *intermedius* le 1 août, 6 le 28. 1 ad. *intermedius* le 5 septembre. 2 ad. 4 imm. le 5 octobre.

Goéland argenté *Larus argentatus*

50 le 2 janvier, 2 les 4 et 19, 100 le 29. 1 subad. le 9 février. 2 le 9 mars, 105 le 13, 1 ad. le 15. 1 couple adulte du 26 mars au 21 avril. 6 le 10 mai, 5 (dont 1 couple) le 18 et 2 le 22. 7 le 20 juin et 9 le 24. 2 le 1 juillet, 3 ad. 1 juv. le 24, 1 ad. le 29. 2 le 7 août, 5 le 11 et 10 le 28. 10 le 27 septembre. 4 le 7 octobre.

Goéland leucophée *Larus cachimans*

1 ad. le 26 mars.

Goéland marin *Larus marinus*

2 ad. les 2, 14 et 26 janvier. 1 ad. les 2 et 3 février, 2 ad. (apparemment cantonnés) 1 imm. le 12, 2 ad. le 21 et 26. 1 le 11 mars, 2 ad. le 13, 2 ad. simulent la construction d'un nid le 17 et parquent sans suite du 1. au 30. 2 ad. les 5 et 6 avril (1 nid probable le 6). 2 ad. les 2 et 5 mai, 3 ad. (toujours 1 couple) et 2 imm. le 18, 3 ad. le 22. 1 ad. les 7 et 11 août, 3 le 28. 1 ad. le 10 septembre et 2 imm. le 27. 1 ad. les 5 et 11 octobre, 1 le 25. 1 le 28 novembre. 1 ad. le 5 décembre, 1 le 26 et 1 ad. le 31.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

1 ad. mazoutée le 13 mars. 1 imm. le 28 août.

Sterne caspienne *Sterna caspia*

1 le 10 juillet (P. ETIENNE & C. MAISON) et 2 le 14 (B. QUEVAL). 2 imm. le 3 septembre (J.-C. ROBERT).

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

3 le 8 avril, 5 le 19, 30 le 21 et 6 le 23. 4 le 24 mai. 2 les 13 et 20 juin, 17 le 28. 2 les 11 et 17 juillet, 10 le 20. 2 le 5 août. 2 les 5, 25 et 27 septembre.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

1 le 5 mai. 20 le 24 juillet. 5 le 7 août, 9 le 11 et 3 le 28. 2 le 3 septembre, 1 ad. les 22 et 25.

Sterne arctique *Sterna paradisaea*

1 ad. le 24 juillet. 1 le 1^{er} septembre.

10

11 Sterne naine *Sterna albifrons*

et 2 le 5 mai. 1 couple parade le 24 juin. 1 le 11 août. 1 le 10 septembre.

Gulfette moustac *Chlidonias hybrida*

1 le 8 mai et 2 le 21 (*Oiseau Magazine* 36), 1 ad. le 24. 1 le 24 août (répondeur LPO). 1 le 1^{er} septembre.

1

1 Guifette noire *Chlidonias niger*

14 le 23 avril. 90 le 2 mai, 7 en vol vers le nord le 18, 1 ad. le 22. 3 juv. le 5 août, 3 le 7, 8 les 14 et 22, 4 le 28. 22 le 5 septembre, 15 le 10, 18 le 12, 9 le 22 et 3 le 27. 1 les 5 et 7 octobre.

4 Guifette leucoptère *Chlidonias leucapterus*

1 le 25 août (*Oiseau Magazine* 37).

Pigeon colombin *Colomba aenas*

le Présent et nicheur probable au niveau de la Ferme de la Basse Enviette en avril. Sur la réserve, 5 le 10 mai.

7 4 le 24, 3 le 24 juin et 1 le 7 août.

Pigeon ramier *Columba palumbus*

17 à la Ferme de la Basse Enviette le 30 mars. Autrement noté en très petit nombre : 1 le 6 avril, 1 le 17 juillet, 2 le 24, 2 le 11 août et 1 le 28.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocta*

s 12 le 19 janvier. 1 le 26 février. 4 le 9 mars et 3 le 13. 1 le 18 mai et 2 le 22. 1 les 17 juillet et 11 août.

5

e Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

9 31 en migration vers le nord le 26 mai. 1 le 28 août.

Coucou gris *Cuculus canorus*

1 chanteur le 19 avril. Noté également en mai.

Chouette effraie *Tyto alba*

Présence de l'espèce à la Ferme de la Basse Enviette.

Martinet noir *Apus apus*

1 le 23 avril. Migration notée le 18 mai et env. 1900 le 30. 2 le 2 septembre et 3 le 22.

Martin-pêcheur *Alceda atthis*

1 les 27 septembre, 17 et 28 novembre.

Cochevis huppé *Galerida cristata*

1 couple nicheur probable dans la zone de galets de la réserve (transports de nourriture et alarmes le 24 juin).

Alouette des champs *Alauda arvensis*

Espèce nicheuse (6 chanteurs le 21 avril, transports de nourriture le 26...).

Alouette baussécol *Eremophila alpestris*
25 le 31 décembre.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*
Premières le 6 avril et 2 le 13. 200 le 7 août. 20 le 2 septembre, 110 le 3 et encore une centaine le 10.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*
1 M. le 26 mars. 10 le 7 octobre.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*
2 le 21 avril, 6 le 23 et 30 le 26. 15 à 20 le 21 mai. Encore notée le 20 juin.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*
Nicheur local en mai (4 chanteurs le 22...). 170 en migration le 7 octobre (en 30 minutes).

Bergeronnette printanière *Matacilla flava*
1 le 9 mars et 3 M. le 30. Notée également en avril-mai et août-septembre.

Bergeronnette flavéole *Matacilla flavissima*
3 M. le 30 mars. 3 le 2 septembre.

Bergeronnette des ruisseaux *Matacilla cinerea*
Notée le 14 août. 1 le 3 septembre.

Bergeronnette grise *Matacilla alba*
2 le 9 mars et 1 le 17. 1 nid dans la hutte de la Pointe d'Offoy. 2 juv. peu volants le 18 mai. Dernières : 2 le 5 novembre.

Bergeronnette de Yarrell *Matacilla yarrelli*
1 le 15 mars et 1 M. ad. le 22. 2 le 28 novembre.

Rougegorge *Erithacus rubecula*
1 dans la phragmitaie le 7 octobre.

Gorgebleue *Luscinia svecica*
1 chanteur le 11 mars, 2 le 15, ainsi que 2 autres vers la Basse Enviette le 30. Dernier chant le 24 juin.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochrurus*
1 couple le 30 mars. 1 mâle le 22 mai.

Tartre des prés *Saxicola rubetra*
10 le 11 août. 1 M. le 18 septembre et 35 le 22 sur le cordon littoral. 1 le 5 octobre.

Tartre pâle *Saxicola torquata*
1 F. les 14 janvier, 3 et 21 février. 2 M. 2 F. le 9 mars, 1 M. 1 F. le 11, 2 couples et 1 M. le 30. 1 couple le 6 avril, 1 M. le 19 et 2 couples le 26. 1 M. les 10, 22, 24 et 30 mai. 1 M. le 15 juin et 1 le 20. 1 M. les 24 juillet et 28 août. 2 couples le 22 septembre. 1 M. le 5 novembre.

Traquet moineux *Oenanthe oenanthe*

1 M. le 22 mars.

Le suivi de la population du site, entrant dans le cadre du programme personnel de baguage (conventio CRBPO/ J.-C. ROBERT) a permis les résultats suivants : 1 seul nichoir utilisé sur 9 installés, avec 5 pul le 19 mai; 5 couples ont cependant niché dans la réserve. Sur les 4 pontes contrôlées: 23 oeufs pondus, 2 jeunes éclos (95,65 %), 15 jeunes à l'envol (65,21 % de réussite par rapport au nombre d'oeufs). Ce tau est le plus faible enregistré depuis 1992 (ROBERT, en préparation). La population nicheuse entre Cayeu et Onival est estimée à 18 couples le 1^{er} juin, dont 10 nids trouvés (J.-C. ROBERT).
Derniers : 2 oiseaux le 1er novembre.

Merle noir *Turdus merula*

Nicheur avec 1 à 2 couples en avril. 2 mâles nourrissent des pulli le 22 mai...

Merle à plastron *Turdus tigrinus*

2 M. le 30 mars à la Basse Enviette.

Grive musicienne *Turdus philamelas*

1 le 19 avril. 1 le 21 juillet dans la phragmitaie. 1 le 7 octobre.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

1 chanteur le 26 avril.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

3 le 30 mars. Noté ensuite jusqu'au 7 août.

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*

1 chanteur le 1^{er} juin à la Dune, dans les argousiers.

Rousserolle effarvée *Acrocephalus scirpaceus*

1 le 29 avril. 3 chanteurs les 10 mai et 24 juillet. 1 juv. le 22 septembre.

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

1 chanteur les 10, 18, 19, 22 et 30 mai. 1 chanteur les 15, 20 et 28 juin.

Fauvette grisette *Sylvia communis*

1 chanteur les 16 et le 25 mai. 1 juvénile le 3 septembre dans la phragmitaie.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

1 mâle le 6 avril.

Pouillot de Schwarz *Phyllascapus schwarzi*

1 le 9 novembre à Onivol (J.-C. ROBERT et J. BELLARD), donnée en cours d'homologation par le CHN, qui constitue une première picarde.

Pouillot véloce *Phyllascapus collybita*

1 le 11 mars. 1 chanteur dans une phragmitaie le 21 avril.

Roitelet huppé *Regulus regulus*
1 le 11 mars.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*
1 juvénile le 22 septembre.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*
1 mâle le 26 février. 3 le 9 mars. Nicheuse. Comportement de migrateurs les 22 septembre et 7 octobre.

Pic bavarde *Pica pica*
3 les 19 janvier et 9 février. 2 le 13 mars. 1 le 11 mai à Hautebut. 1 le 19 décembre. Premières mention pour le site.

Corneille noire *Corvus corone*
8 le 19 janvier. 3 le 9 février, 1 le 12 et 6 le 26. 3 le 9 mars, 2 le 13 et 5 le 26, 2 le 13 avril, vu jusqu'en juillet ; ce couple perturbe les gravelots nicheurs autour des gravières de Woignarue. 1 le 7 août, 5 le 11 et 2 le 28. 5 le 27 septembre. 2 le 26 décembre.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*
80 le 30 mars. 500 le 24 juin, autant le 5 août.

Moineau domestique *Passer domesticus*
Nicheur dans les divers bâtiments (transports de matériaux le 18 mai...).

Molneau friquet *Passer montanus*
2 le 7 octobre.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*
30 le 3 décembre...

Chardonneret *Carduelis carduelis*
1 couple le 30 mars. 1 le 20 juin. 2 les 24 juillet et 28 août. 1 juv. le 5 septembre et 17 le 22.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*
2 le 9 mars et plusieurs couples dès le 26 dans les argousiers. 10 le 14 août et 40 le 28. 23 le 25 septembre

Bruant lapon *Calcarius lapponicus*
4 le 29 janvier. 23 le 3 février avec 12 bruants des roseaux. 1 le 30 mars (*Oiseau Magazine* 36).

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*
6 le 9 novembre.

Bruant jaune *Emberiza citrinella*
1 mâle le 6 avril. 1 chanteur les 17 et 24 juillet. 1 chanteur le 7 août et 1 mâle le 28.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*
12 le 3 février. 1 couple le 10 mai.

Bruant proyer *Miliaria calandra*
3 le 9 mars, 7 le 26 et 3 le 30. 1 le 16 mai.

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* et son nid (Dessin de Sylvie MEYER)

