

Mue tardive chez le Bécasseau variable *Calidris alpina* : un phénomène régulier

François SUEUR

Le 8 décembre 1999 dans la Réserve Naturelle de la Baie de Somme, un Bécasseau variable *Calidris alpina* (sur environ 5000 individus) présente un plumage en tout début de mue avec une tache ventrale noire seulement parsemée de quelques plumes blanches. Un autre adulte se trouve sensiblement à mi-mue et trois autres arborent encore quelques plumes noires sur le ventre.

CRAMP & SIMMONS (1983) indiquent pour le Bécasseau variable que la mue corporelle s'achève avant la fin de celle des rémiges primaires qui a lieu fin novembre.

En décembre 1997 (SUEUR, 1997), décembre 1998 (SUEUR, 1999) et en décembre 1999 (présente note), des Bécasseaux variables en mue corporelle sont notés en Baie de Somme. Il semble donc que les cas de mue tardive soient réguliers même s'ils ne concernent qu'une très faible proportion d'oiseaux.

Bibliographie

- CRAMP S. & SIMMONS K.E.L. (1983) *The Birds of the Western Palearctic*, vol. III. Oxford, London, New York (Oxford University Press), 913 p.
- SUEUR F. (1997) Mue tardive chez trois Limicoles : Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*, Bécasseau variable *Calidris alpina* et Barge rousse *Limosa lapponica*. *Avifaune picarde*, 4 : 90.
- SUEUR F. (1999) Mue tardive chez le Bécasseau variable *Calidris alpina*. *Avifaune picarde*, 7 : 32.

François SUEUR
9 rue du Champ neuf
Le Bout des Crocs
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont