

Nidification villageoise du Moineau friquet *Passer montanus*

François SUEUR

En Picardie, le Moineau friquet *Passer montanus* se reproduit essentiellement dans les milieux bocagers. Aussi, avons-nous été assez surpris de noter le 5 mars 1999 deux couples (dont un construisant un nid sous le toit d'une habitation) au sein même du village de Bernay-en-Ponthieu (Somme), commune sur le territoire de laquelle cet oiseau peut être observé toute l'année. Ce fait est d'autant plus curieux que cette espèce est assez peu abondante dans l'ouest de la Somme et plutôt en régression dans toute la Picardie.

Toutefois, si ce type de site de nidification est inhabituel pour le Moineau friquet dans la région, ce comportement est beaucoup plus régulier dans le nord de l'Europe et en Asie (GEROUDET, 1998).

La compétition interspécifique avec le Moineau domestique *Passer domesticus* est parfois invoquée pour expliquer cette utilisation des différents biotopes : habitations et leurs abords pour le Moineau domestique et milieux plus naturels pour le Moineau friquet. Les deux espèces se côtoient assez rarement en période de nidification en Picardie : marais de la Barette à Corbie (Somme) au début des années 1970 (obs. pers.) et un nid de chaque espèce dans un même buisson d'Aubépine à un style *Crataegus monogyna* au Hamel (Somme) en 1977 (DUPUICH & al., 1978). Dans le cas de notre observation, la réduction de la compétition interspécifique ne semble pas en cause puisque ce village abrite une population relativement importante de Moineaux domestiques.

Bibliographie

- DUPUICH H., ROYER P. & SUEUR F. (1978) Centrale Ornithologique GEPOP. Synthèse des observations 1977 dans la Somme. *L'Avocette*, 2 : 33-59.
- GEROUDET P. (1998) *Les Passereaux d'Europe. Tome 2. De la Bouscarle aux Bruants*. Lausanne, Paris (Delachaux & Niestlé), 512 p.

François SUEUR
9 rue du Champ neuf
Le Bout des Crocs
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont