Goélands pontiques *Larus cachinnans ponticus* et Goélands leucophées *Larus cachinnans michahellis* sur le littoral picard

François SUEUR

Introduction

Depuis de nombreuses années, l'apparition de mouvements réguliers de Goélands leucophé Larus cachinnans michahellis de la zone méditerranéenne vers des régions plus septentrionales puis cel de cas de nidification, ainsi que l'expansion de l'espèce en Méditerranée, ont fait l'objet de maint publications (DEVILLERS, 1983; GRANT, 1983; MARION & al., 1985; YESOU, 1985; BAUDOIN LE MARECHAL, 1988; GEROUDET, 1989, 1992a, b & c; DEBOUT, 1990; de MESEL, 1990 ANTONIAZZA, 1995; SADOUL, 1998). Plus récemment, cette sous-espèce atteint l'Amérique du Nord (manière encore occasionnelle (CORNELL & al., 1995; MacTAVISH, 1995; LEWIS, 1996) tandis qu'un autre sous-espèce, cachinnans ou plus exactement ponticus (forme occidentale de cachinnans élevée à rang de sous-espèce à part entière ou même d'espèce selon les auteurs; STEGMANN, 1934; SANGSTE & al., 1998), rare il y a encore quelques années en Europe occidentale et septentrionale avec une seu mention en France (NICOLAU-GUILLAUMET, 1977), devient plus régulière (GRUBER, 1995 JONSSON, 1996; KLEIN & GRUBER, 1997; KNOLLE & al., 1997; GARNER, 1997 & 1998; DUBOI 1998; HOOGENDOORN & al., 1998).

La présente note a pour but de relater la première observation sur le littoral picard d'un oisez vivant appartenant à cette sous-espèce ponticus et de préciser le statut de michahellis.

Observations

Le 28 novembre 1998, un Goéland à pattes jaunes Larus cachinnans est repéré à moins de 70 d'un des postes d'observation du Parc Ornithologique du Marquenterre (commune de Saint-Quentin-en Tourmont). Quelques traits le distinguant à première vue des Goélands leucophées Larus cachinnan michahellis présents en nombre important sur le littoral picard essentiellement dans le secteur de la Réserv Authie-Somme (littoral des communes de Fort-Mahon et Quend) nous incitent à le détailler davantag C'est tout d'abord son allure de Goéland leucophée svelte faisant penser à un Goéland cendré Larus cant de très grande taille mais au dos moins sombre et plus gris que bleuté, différant en cela du Goélar leucophée, qui a attiré notre attention. A partir d'un autre poste à environ 60 m duquel se trouve désorma l'oiseau, nous l'examinons avec davantage de précision. Sa tête est relativement arrondie et blanche avec c rares stries sombres (gris brunâtre ?). Ses pattes sont d'une couleur jaune pâle alors que celles des Goélanc leucophées sont généralement d'une teinte plus vive notamment à cette époque de l'année. Ses yeu paraissent sombres. Ensuite, l'oiseau se rapproche à environ 40 m près d'un minuscule îlot où il commenc à consommer un cadavre d'Anguille Anguilla anguilla adulte. Il est alors possible de remarquer que sc long bec droit présente des bords supérieur et inférieur des mandibules presque parallèles sans ang goniaque marqué. Sa couleur est jaune clair avec une tache rouge de chaque côté en grande partie masqué

par une coloration noire. Celle-ci est plus marquée du côté droit où elle forme une barre subterminale s les 2 mandibules que du côté gauche où elle est restreinte à la mandibule inférieure. A cette distance, l yeux de l'oiseau présentent une coloration jaune ambre plutôt sombre tandis que ses cercles orbitai apparaissent orangés. Ses longues ailes possèdent des rémiges primaires externes présentant une gran pointe blanche et une marque subterminale noire la séparant d'une langue blanche sur le vexille inten (grise chez le Goéland leucophée). L'ensemble de ces caractéristiques permettent de déterminer cet oises comme un Goéland pontique Larus cachinnans ponticus.

Cette sous-espèce de *Larus cachinnans* a déjà fait l'objet d'une mention dans la région avec découverte en mai 1960 en baie de Somme du cadavre d'un oiseau bagué le 3 mai 1952 sur l'île de Kéta « Mer noire (Ukraine), mention citée par NICOLAU-GUILLAUMET (1977).

Ensuite, ce sont essentiellement des Goélands leucophées qui sont notés sur le littoral picard a août 1974 (un oiseau) puis chaque année à partir de 1977 en particulier sur le littoral au nord de la baie a Somme et en nombre croissant (MASSON, 1978; SUEUR & al., 1982; SUEUR & COMMECY, 1990; SUEUR, 1993; COMMECY & al., 1997) avec un maximum de 450 oiseaux le 27 août 1998. Toutefoi quelques oiseaux du type ponticus, toujours isolés, ont déjà été notés notamment en fin de période a présence des Goélands leucophées lorsque ceux-ci sont moins nombreux: plus grande facilité de les repér ou période de présence diffèrente de cette sous-espèce (ou espèce?)? Il faut rappeler ici la phénologie tr particulière des observations pour cette espèce méridionale qu'est le Goéland leucophée: absence en ma et avril, rares observations en mai et juin (1 à 2 individus), arrivées en nombre à partir de fin juille effectifs maximaux de début août aux premiers jours de septembre, mentions hivernales peu nombreuses quelques individus (SUEUR, 1993) à l'exception de 30 oiseaux le 1er février 1981 en baie d'Authie (1 DUPUICH). Il est désormais possible de s'interroger aujourd'hui sur l'appartenance de ces 30 oiseaux leur totalité à la sous-espèce michahellis.

Conclusion

Cette première observation circonstanciée d'un Goéland pontique sur le littoral picard constit peut-être les prémisses d'une présence régulière de ce Laridé dans la région dans la mesure où il est de pl en plus fréquent en Europe du Nord et de l'Ouest en particulier en Allemagne et aux Pays-Bas pendant période hivernale (van den BERG, 1988; M. GARNER & R. de BY cités par DUBOIS, 1998).

Bibliographie

- ANTONIAZZA M. (1995) Reprises de jeunes Goélands leucophées (*Larus cachinnans*) bagués au Fandlac de Neuchâtel. *Nos Oiseaux*, 43: 155-161.
- BAUDOIN G. & LE MARECHAL P. (1988) Le Goéland leucophée *Larus cachinnans* en Ile-de-Franc *Alauda*, 56: 51-65.
- COMMECY X., HOOGENDOORN W. (T.) & RAEVEL P. (1997) Le Goéland leucophée Lar cachinnans michahellis dans le nord de la France. L'Avocette, 21: 10-15.
- CORNELL C., TUTT K. & McLAREN I. (1995) Yellow-legged Gull in Nova Scotia. *Birders J.*, 4: 30 304.
- DEBOUT G. (1990) Les Goélands argentés à pieds jaunes (Larus michahellis) en Normandie. Cormoran, 8:25-28.
- DEVILLERS P. (1983) Yellow-legged Herring Gulls on southern North Sea shores. *British Birds*, 76: 19 192.
- DUBOIS P.J. (1998) Le Goéland pontique *Larus c. cachinnans*. Statut provisoire en France et perspectiv taxonomiques. *Ornithos*, 5: 135-139.

- GARNER M. (1997) Identification of Yellow-legged Gulls in Britain. British Birds, 90: 25-62.
- GARNER M., QUINN D. & GLOVER B. (1998) Identification of Yellow-legged Gulls in Britain. Part British Birds, 90: 369-383.
- GEROUDET P. (1989) Nouvelles données sur l'origine des Goélands leucophées séjournant en périor postnuptiale autour du lac Léman. Nos Oiseaux, 40: 153-167. GEROUDET P. (1992a) L'alimentation et le repos chez chez les Goélands leucophées, Larus cachinnan
- du Léman. Nos Oiseaux, 41: 293-304. GEROUDET P. (1992b) Les reposoirs sur les rives et sur des édifices chez chez les Goélands leucophée
- Larus cachinnans, du Léman. Nos Oiseaux, 41: 305-313. GEROUDET P. (1992c) Les classes d'âge (1989-1990) et les comportements juvéniles chez les Goéland leucophées (Larus cachinnans) du Léman. Nos Oiseaux, 41: 397-403.
- GRANT P.J. (1983) Yellow-legged Herring Gulls in Britain. British Birds, 76: 192-194.
- GRUBER D. (1995) Die Kennzeichen und das Vorkommen der Weisskopfmöwe Larus cachinnans Europa. Limicola, 9: 121-165.
- HOOGENDOORN W. (T.), McGEEHAN A. & MACTAVISH B. (1998) Observation d'un Goélar pontique Larus c. cachinnans dans le Pas-de-Calais. Ornithos, 5: 145-148.
- JONSSON L. (1996) « Gulfotade » trutar. Räkna med bade medelhavstrut och kaspik trut ! Var Fagelvärl 55 (8): 12-26. KLEIN R. & GRUBER D. (1997) Die Bestimmung und taxonomische Stellung der in Mitteleuro
- auftretenden Weisskopfmöven Larus cachinnans. Limicola, 11:49-75. KNOLLE P., JANSEN J. & PALMEN P. (1997) Pontische Geelpootmeeuwen bij Enschede en in Noor
- Limburg. Dutch Birding, 19: 277-280.
- LEWIS R.H. (1996) First North Carolina record of Yellow-legged Gull. Chat, 60: 153-156.
- MacTAVISH B. (1995) Yellow-legged Gull in St. John's Newfoundland. Birders J., 4: 294-299.
- MARION L., YESOU P., DUBOIS P. & NICOLAU-GUILLAUMET P. (1985) Coexistence progressive la reproduction de Larus argentatus et de Larus cachinnans sur les côtes atlantiques française Alauda, 53 : 81-89.
- MASSON D. (1978) Note à propos de l'observation d'un Goéland argenté à pieds jaunes à Saint-Valer sur-Somme. L'Avocette, 2:30-31.
- De MESEL D. (1990) Geelpootmeeuwen, Larus cachinnans michahellis, in Belgie een analyse vi ringgegevens. Le Gerfaut, 80: 25-56. NICOLAU-GUILLAUMET P. (1977) Mise au point et réflexions sur la répartition des Goélands argent
- Larus argentatus en France. Alauda, 45:53-73. SADOUL N. (1998) Expansion des laridés en Camargue: populations en bonne santé o
- dysfonctionnement? Nos Oiseaux, 45 suppl. 2:83-86. SANGSTER G., HAZEVOET C.J., Van den BERG A.B. & ROSELAAR C.S. (1998) Dutch avifauna lis species concept, taxonomic instability and taxonomic changes in 1998. Dutch Birding, 20: 22-32
- STEGMANN B. (1934) Uber die formen der grossen Möven («Larus») und ihre gegensseitige Beziehungen. J. Orn., 82: 340-380.
- SUEUR F. (1993) Stratégies d'utilisation de l'espace et des ressources trophiques par les laridés sur littoral picard. Thèse Doctorat Sciences Biologiques (Eco-Ethologie) Univ. Rennes 1, 119 p.
- SUEUR F. & COMMECY X. (1990) Guide des oiseaux de la baie de Somme. EDF, DRAE Picardi GEPOP, 192 p.
- SUEUR F., HERNANDEZ O. & RIGAUX T. (1982) Le Goéland argenté à pattes jaunes Larus argentat phylum cachinnans sur le littoral picard. Alauda, 50: 230-231.
- Van den BERG A. (1988) WP Reports. January-February 1998. Dutch Birding, 20: 43-49. YESOU P. (1985) Le cycle de présence du Goéland leucophée Larus cachinnans michahellis sur le littoi
 - atlantique français: l'exemple des marais d'Olonne. L'Oiseau et R.F.O., 55: 93-105.