

Goélands pontiques *Larus cachinnans ponticus* et Goélands leucophées *Larus cachinnans michahellis* sur le littoral picard

François SUEUR

Introduction

Depuis de nombreuses années, l'apparition de mouvements réguliers de Goélands leucophé *Larus cachinnans michahellis* de la zone méditerranéenne vers des régions plus septentrionales puis cel de cas de nidification, ainsi que l'expansion de l'espèce en Méditerranée, ont fait l'objet de maint publications (DEVILLERS, 1983 ; GRANT, 1983 ; MARION & al., 1985 ; YESOU, 1985 ; BAUDOUIN LE MARECHAL, 1988 ; GEROUDET, 1989, 1992a, b & c ; DEBOUT, 1990 ; de MESEL, 1990 ; ANTONIAZZA, 1995 ; SADOUL, 1998). Plus récemment, cette sous-espèce atteint l'Amérique du Nord d manière encore occasionnelle (CORNELL & al., 1995 ; MacTAVISH, 1995 ; LEWIS, 1996) tandis qu'un autre sous-espèce, *cachinnans* ou plus exactement *ponticus* (forme occidentale de *cachinnans* élevée à rang de sous-espèce à part entière ou même d'espèce selon les auteurs ; STEGMANN, 1934 ; SANGSTER & al., 1998), rare il y a encore quelques années en Europe occidentale et septentrionale avec une seule mention en France (NICOLAU-GUILLAUMET, 1977), devient plus régulière (GRUBER, 1992 ; JONSSON, 1996 ; KLEIN & GRUBER, 1997 ; KNOLLE & al., 1997 ; GARNER, 1997 & 1998 ; DUBOIS, 1998 ; HOOGENDOORN & al., 1998).

La présente note a pour but de relater la première observation sur le littoral picard d'un oiseau vivant appartenant à cette sous-espèce *ponticus* et de préciser le statut de *michahellis*.

Observations

Le 28 novembre 1998, un Goéland à pattes jaunes *Larus cachinnans* est repéré à moins de 70 m d'un des postes d'observation du Parc Ornithologique du Marquenterre (commune de Saint-Quentin-en-Tourmont). Quelques traits le distinguant à première vue des Goélands leucophées *Larus cachinnans michahellis* présents en nombre important sur le littoral picard essentiellement dans le secteur de la Réserve d'Authie-Somme (littoral des communes de Fort-Mahon et Quend) nous incitent à le détailler davantage. C'est tout d'abord son allure de Goéland leucophée svelte faisant penser à un Goéland cendré *Larus canus* de très grande taille mais au dos moins sombre et plus gris que bleuté, différant en cela du Goéland leucophée, qui a attiré notre attention. A partir d'un autre poste à environ 60 m duquel se trouve désormais l'oiseau, nous l'examinons avec davantage de précision. Sa tête est relativement arrondie et blanche avec quelques rares stries sombres (gris brunâtre ?). Ses pattes sont d'une couleur jaune pâle alors que celles des Goélands leucophées sont généralement d'une teinte plus vive notamment à cette époque de l'année. Ses yeux paraissent sombres. Ensuite, l'oiseau se rapproche à environ 40 m près d'un minuscule îlot où il commence à consommer un cadavre d'Anguille *Anguilla anguilla* adulte. Il est alors possible de remarquer que son long bec droit présente des bords supérieur et inférieur des mandibules presque parallèles sans angulation marquée. Sa couleur est jaune clair avec une tache rouge de chaque côté en grande partie masquée

par une coloration noire. Celle-ci est plus marquée du côté droit où elle forme une barre subterminale sur les 2 mandibules que du côté gauche où elle est restreinte à la mandibule inférieure. A cette distance, les yeux de l'oiseau présentent une coloration jaune ambre plutôt sombre tandis que ses cercles orbitaires apparaissent orangés. Ses longues ailes possèdent des rémiges primaires externes présentant une grande pointe blanche et une marque subterminale noire la séparant d'une langue blanche sur le vexille interne (grise chez le Goéland leucophée). L'ensemble de ces caractéristiques permettent de déterminer cet oiseau comme un Goéland pontique *Larus cachinnans ponticus*.

Cette sous-espèce de *Larus cachinnans* a déjà fait l'objet d'une mention dans la région avec la découverte en mai 1960 en baie de Somme du cadavre d'un oiseau bagué le 3 mai 1952 sur l'île de Kéty, Mer noire (Ukraine), mention citée par NICOLAU-GUILAUMET (1977).

Ensuite, ce sont essentiellement des Goélants leucophées qui sont notés sur le littoral picard : le 1^{er} août 1974 (un oiseau) puis chaque année à partir de 1977 en particulier sur le littoral au nord de la baie de Somme et en nombre croissant (MASSON, 1978 ; SUEUR & al., 1982 ; SUEUR & COMMECY, 1990 ; SUEUR, 1993 ; COMMECY & al., 1997) avec un maximum de 450 oiseaux le 27 août 1998. Toutefois, quelques oiseaux du type *ponticus*, toujours isolés, ont déjà été notés notamment en fin de période de présence des Goélants leucophées lorsque ceux-ci sont moins nombreux : plus grande facilité de les repérer ou période de présence différente de cette sous-espèce (ou espèce ?) ? Il faut rappeler ici la phénologie très particulière des observations pour cette espèce méridionale qu'est le Goéland leucophée : absence en mai et avril, rares observations en mai et juin (1 à 2 individus), arrivées en nombre à partir de fin juillet, effectifs maximaux de début août aux premiers jours de septembre, mentions hivernales peu nombreuses, quelques individus (SUEUR, 1993) à l'exception de 30 oiseaux le 1^{er} février 1981 en baie d'Authie (J. DUPUICH). Il est désormais possible de s'interroger aujourd'hui sur l'appartenance de ces 30 oiseaux à leur totalité à la sous-espèce *michahellis*.

Conclusion

Cette première observation circonstanciée d'un Goéland pontique sur le littoral picard constitue peut-être les prémises d'une présence régulière de ce Laridé dans la région dans la mesure où il est de plus en plus fréquent en Europe du Nord et de l'Ouest en particulier en Allemagne et aux Pays-Bas pendant la période hivernale (van den BERG, 1988 ; M. GARNER & R. de BY cités par DUBOIS, 1998).

Bibliographie

- ANTONIAZZA M. (1995) Reprises de jeunes Goélants leucophées (*Larus cachinnans*) bagués au Fanlac de Neuchâtel. *Nos Oiseaux*, 43 : 155-161.
- BAUDOIN G. & LE MARECHAL P. (1988) Le Goéland leucophée *Larus cachinnans* en Ile-de-France. *Alauda*, 56 : 51-65.
- COMMECY X., HOOGENDOORN W. (T.) & RAEVEL P. (1997) Le Goéland leucophée *Larus cachinnans michahellis* dans le nord de la France. *L'Avocette*, 21 : 10-15.
- CORNELL C., TUTT K. & McLAREN I. (1995) Yellow-legged Gull in Nova Scotia. *Birders J.*, 4 : 30-304.
- DEBOUT G. (1990) Les Goélants argentés à pieds jaunes (*Larus michahellis*) en Normandie. *Cormoran*, 8 : 25-28.
- DEVILLERS P. (1983) Yellow-legged Herring Gulls on southern North Sea shores. *British Birds*, 76 : 19-192.
- DUBOIS P.J. (1998) Le Goéland pontique *Larus c. cachinnans*. Statut provisoire en France et perspectives taxonomiques. *Ornithos*, 5 : 135-139.

- GARNER M. (1997) Identification of Yellow-legged Gulls in Britain. *British Birds*, 90 : 25-62.
- GARNER M., QUINN D. & GLOVER B. (1998) Identification of Yellow-legged Gulls in Britain. Part *British Birds*, 90 : 369-383.
- GEROUDET P. (1989) Nouvelles données sur l'origine des Goélands leucophées séjournant en période postnuptiale autour du lac Léman. *Nos Oiseaux*, 40 : 153-167.
- GEROUDET P. (1992a) L'alimentation et le repos chez les Goélands leucophées, *Larus cachinnans* du Léman. *Nos Oiseaux*, 41 : 293-304.
- GEROUDET P. (1992b) Les reposoirs sur les rives et sur des édifices chez les Goélands leucophées *Larus cachinnans*, du Léman. *Nos Oiseaux*, 41 : 305-313.
- GEROUDET P. (1992c) Les classes d'âge (1989-1990) et les comportements juvéniles chez les Goélands leucophées (*Larus cachinnans*) du Léman. *Nos Oiseaux*, 41 : 397-403.
- GRANT P.J. (1983) Yellow-legged Herring Gulls in Britain. *British Birds*, 76 : 192-194.
- GRUBER D. (1995) Die Kennzeichen und das Vorkommen der Weisskopfmöwe *Larus cachinnans* Europa. *Limicola*, 9 : 121-165.
- HOOGENDOORN W. (T.), MCGEEHAN A. & MACTAVISH B. (1998) Observation d'un Goéland pontique *Larus c. cachinnans* dans le Pas-de-Calais. *Ornithos*, 5 : 145-148.
- JONSSON L. (1996) « Gulftotade » trutar. Räkna med både medelhavstrut och kaspik trut ! *Var Fagelvärld* 55 (8) : 12-26.
- KLEIN R. & GRUBER D. (1997) Die Bestimmung und taxonomische Stellung der in Mitteleuropa auftretenden Weisskopfmöven *Larus cachinnans*. *Limicola*, 11 : 49-75.
- KNOLLE P., JANSEN J. & PALMEN P. (1997) Pontische Geelpootmeeuwen bij Enschede en in Noor Limburg. *Dutch Birding*, 19 : 277-280.
- LEWIS R.H. (1996) First North Carolina record of Yellow-legged Gull. *Chat*, 60 : 153-156.
- MACTAVISH B. (1995) Yellow-legged Gull in St. John's Newfoundland. *Birders J.*, 4 : 294-299.
- MARION L., YESOU P., DUBOIS P. & NICOLAU-GUILLAUMET P. (1985) Coexistence progressive et la reproduction de *Larus argentatus* et de *Larus cachinnans* sur les côtes atlantiques françaises. *Alauda*, 53 : 81-89.
- MASSON D. (1978) Note à propos de l'observation d'un Goéland argenté à pieds jaunes à Saint-Valer sur-Somme. *L'Avocette*, 2 : 30-31.
- DE MESEL D. (1990) Geelpootmeeuwen, *Larus cachinnans michahellis*, in Belgique een analyse van ringgegevens. *Le Gerfaut*, 80 : 25-56.
- NICOLAU-GUILLAUMET P. (1977) Mise au point et réflexions sur la répartition des Goélands argentés *Larus argentatus* en France. *Alauda*, 45 : 53-73.
- SADOUL N. (1998) Expansion des laridés en Camargue : populations en bonne santé ou dysfonctionnement ? *Nos Oiseaux*, 45 suppl. 2 : 83-86.
- SANGSTER G., HAZEVOET C.J., VAN DEN BERG A.B. & ROSELAAR C.S. (1998) Dutch avifauna list species concept, taxonomic instability and taxonomic changes in 1998. *Dutch Birding*, 20 : 22-32.
- STEGMANN B. (1934) Über die formen der grossen Möven (« *Larus* ») und ihre gegenseitigen Beziehungen. *J. Orn.*, 82 : 340-380.
- SUEUR F. (1993) *Stratégies d'utilisation de l'espace et des ressources trophiques par les laridés sur littoral picard*. Thèse Doctorat Sciences Biologiques (Eco-Ethologie) Univ. Rennes 1, 119 p.
- SUEUR F. & COMMECY X. (1990) *Guide des oiseaux de la baie de Somme*. EDF, DRAE Picardie GEPOP, 192 p.
- SUEUR F., HERNANDEZ O. & RIGAUX T. (1982) Le Goéland argenté à pattes jaunes *Larus argentatus* phylum *cachinnans* sur le littoral picard. *Alauda*, 50 : 230-231.
- VAN DEN BERG A. (1988) WP Reports. January-February 1998. *Dutch Birding*, 20 : 43-49.
- YESOU P. (1985) Le cycle de présence du Goéland leucophée *Larus cachinnans michahellis* sur le littoral atlantique français : l'exemple des marais d'Olonne. *L'Oiseau et R.F.O.*, 55 : 93-105.