

# **Nidification de l'Ouette d'Egypte**

## ***Alopochen aegyptiacus* dans l'Aisne et en Picardie en 2001.**

**Par Alain ROUGE, Bertrand SEIGNEZ & Laurent GAVORY.**

Le 16 mai 2001, l'un d'entre nous (LG) observe deux Ouettes d'Egypte aux lieux-dits « Le Pré à taureau » et « La Balance » sur la commune de Deuillet (ZICO de la moyenne vallée de l'Oise, Aisne). Elles le seront à grande distance : environ 1,25 km. Les oiseaux ont été repérés posés puis se sont envolés. Trois jours plus tard, l'un d'entre nous (BS) retourne sur les lieux et découvre un couple avec 4 jeunes dont il estime l'âge à deux à trois semaines. Le 2 juillet, il notera trois jeunes. A signaler, qu'à 5 kilomètres de là, 2 individus de cette espèce avaient été observés le 15 mai (LG). La zone où le couple s'est installé est une gravière peu étendue non exploitée complètement.

Parallèlement, un couple et 3 poussins en duvet seront vus le 4 juin à Manicamp (toujours en moyenne vallée de l'Oise, en aval de Chauny, Aisne) au lieu-dit "Les Carrières"(AR) dans des prairies humides ponctuées de mares.

A notre connaissance, il s'agit des premiers cas de nidification constatés de cette espèce en Picardie. L'Ouette d'Egypte est un anatidé qui niche sur une bonne partie du continent africain au Sud du Sahara (Del HOYO J. & *al.*, 1992). Toutefois, une population férale prospère en Europe occidentale en Grande-Bretagne, Pays-Bas et Belgique où la

population nicheuse est estimée à un nombre oscillant entre 1730 et 1800 couples au début des années 90. En Grande-Bretagne, les premières introductions dateraient du 17<sup>ème</sup> siècle avec un fort développement au 19<sup>ème</sup> siècle. Aux Pays-Bas et en Belgique, elles sont plus récentes, datant d'après la seconde guerre mondiale (HAEGEMAÏER & BLAIR, 1997).

En France, DUBOIS & *al.* (2000) précisent qu'elle « niche en liberté en très petit nombre », citant comme site régulier Caen et signalent une petite population dans le Sud-Est de la France ainsi que 2 cas de reproduction ponctuels. Enfin, ils indiquent que des individus non volants se reproduisent dans différents parcs et jardins. Cet anatidé introduit reste donc un nicheur peu répandu dans notre pays.

### **BIBLIOGRAPHIE**

- Del HOYO J., ELLIOT A. & SARGATAL J. eds. (1992). Handbook of the birds of the world. Vol. 1. Lynx Edicions, Barcelona. 696 p.
- DUBOIS P.J., Le MARÉCHAL P., OLIOSSO G & YESOU P. (2000). Inventaire des Oiseaux de France. Nathan/HER, Paris. 397p.
- HAEGEMAÏER EJM. & BLAIR MJ. eds. (1997). The EBCC Atlas of European Breeding Bird : Their Distribution and Abundance. T & AD Poyser, Londres. 903 p.

Alain ROUGE  
100 rue de Paris - Appt 1131  
60 200 Compiègne

Bertrand SEIGNEZ  
54, rue de Tergnier  
02800 Beaufort

Laurent GAVORY.  
Square Darlington, ESCF  
80000 Amiens  
laurent.gavory@club-internet.fr