

Les Rapaces Nicheurs de Picardie.

Suivi annuel. Années 2005 et 2006.

Par Xavier COMMECY

Faisant suite à l'enquête nationale coordonnée par la LPO - commission rapaces (FIR) en 2000-2001 et à la mise en place d'un observatoire permanent des populations nicheuses françaises de rapaces, voici quelques résultats obtenus en Picardie ces deux dernières années selon les modalités présentées précédemment (COMMECY, 2004).

En 2005, G. TOMBAL a choisi de suivre les carrés centraux des cartes 2610 O (Tergnier-La Fère) et 2610 E (Anizy-le-Château) et a proposé une estimation pour ces deux feuilles qui n'avaient pas été prospectées lors de l'enquête nationale (COMMECY, 2002). A la lecture de ses résultats on peut remarquer que pour les Buses variables *Buteo buteo*, ces deux cartes de l'Aisne incluant la forêt de Saint-Gobain montrent des densités parmi les plus fortes de la région, de l'ordre de celles obtenues en Thiérache. Il en est de même pour la Bondrée apivore *Pernis apivorus*. La découverte de couples d'Autour des palombes *Accipiter gentilis* est une nouveauté pour ce secteur et nous montre un point intermédiaire

entre les populations connues au sud et au nord-est de ce département.

En 2006, respectant le tirage aléatoire donné par la L.P.O., les carrés centraux des feuilles de Guise dans l'Aisne et de Moreuil dans la Somme ont été prospectés respectivement par C. ROUSSEAU et X. COMMECY. Les carrés centraux des feuilles de Moreuil et de Saint-Just-en-Chaussée ont fait l'objet de prospections intermédiaires (X.C. et F. BOUCHINET) dont les résultats sont rappelés ici. Ces mêmes observateurs avaient déjà prospecté ces carrés lors de l'enquête nationale. Voici les résultats obtenus lors de ces recherches qui doivent permettre de suivre à l'échelle nationale (et régionale ?) les populations nicheuses de rapaces.

BIBLIOGRAPHIE

- COMMECY X. (2002). Enquête rapaces nicheurs 2000 – 2001. Bilan pour la région Picardie. *L'Avocette* 26 (2 – 3) p. 43 -52..
- COMMECY X. (2004). Les rapaces nicheurs de Picardie. Année 2004. *L'Avocette* 28 (1 – 2) p. 14.

Tableau 1 : Nombre de couples repérés en 2005 dans les carrés centraux (certains et probables) et estimations sur la feuille complète.

	Tergnier – La Fère ; carré central, 2005	Anizy-le-Château ; carré central, 2005	Tergnier – La Fère ; feuille entière, 2005	Anizy-le-Château; feuille entière, 2005
Bondrée apivore	4	3	15	9
Busard cendré				1
Autour des palombes	1		2	1
Epervier d'Europe	3	2	10	8
Buse variable	14	11	45	30
Faucon crécerelle	4	6	16	15
Faucon hobereau			4*	3

* Sur la base de prospections réalisées entre 1993 et 2002 en vallée de l'Oise et ses abords, R. FRANÇOIS propose de réévaluer cette valeur à 8 à 10 couples pour la feuille entière. (Valeur à confirmer si possible ultérieurement par une prospection complète de la feuille une année donnée).

Tableau 2 : Nombre de couples repérés dans les carrés centraux (certains ou probables - possibles)

	Guise 2006 *	Guise 2004 *	Saint-Just- en- Chaussée 2004	Saint-Just- en- Chaussée 2001 - 2002	Moreuil 2006	Moreuil 2004	Moreuil 2001-2002
Bondrée apivore	0 - 1	0 - 1	-	-	-	1	-
Busard des roseaux	0 - 1	-	-	-	1	1	1
Busard Saint- Martin	1 - 2	0 - 1	0 - 1	0	1	1	2
Busard cendré	1 - 2	1 - 2	-	-			-
Epervier d'Europe	0 - 3	1 - 2	-	-	1 - 0	1	1
Buse variable	2 - 5	2 - 5	2	3	4 - 5	2 - 3	3 - 4
Faucon crécerelle	1 - 3	3 - 5	1	1 - 2	3	4	6 - 7
Faucon hobereau	0 - 1	-	-	-	1	-	-

* Lors de l'enquête nationale (2001 - 2002), il n'avait pas été fourni d'informations pour le carré central de Guise mais uniquement une estimation pour la totalité de la feuille.

Xavier COMMECY
4 Place Godailler Decaix 80800 Gentelles
xavier.commecy@wanadoo.fr