

Histoires de bécasses

Par Xavier COMMECY

Mais d'où viennent-t-elles ces Bécasses des bois *Scolopax rusticola* que l'on voit parfois, surtout en hiver dans nos régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie (appelées ici grande région) ? Oiseaux locaux ou migrants ? Voyageurs au long cours ou pas ? Essayons de répondre à ces questions.

Les populations nicheuses locales sont localisées pour le Nord-Pas-de-Calais à l'est de la région, depuis les bois de la plaine de la Scarpe jusqu'aux Ardennes pour 150 à 200 couples annuellement, valeurs stables après une forte diminution jusqu'au milieu des années 80 (TOMBAL, 1996) et pour la Picardie aux grandes forêts de l'Aisne et de l'Oise, avec quelques dizaines de couples (COMMECY et SUEUR, 1995). Avec si peu de couples nicheurs et la relative fréquence de l'observation des bécasses en période internuptiale, il est évident que ces oiseaux – considérés comme sédentaires par ces auteurs – voient leurs effectifs renforcés par l'arrivée d'autres venus de régions plus ou moins lointaines. C'est ce que nous allons tenter de montrer en utilisant la base de données de baguage des deux régions concernées ; les données de 2000 à début 2006 ont été consultées. Ces informations sont centralisées par le Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d'Oiseaux C.R.B.P.O. – M.N.H.N. (Muséum d'Histoire Naturelle de Paris) que nous remercions ici de nous avoir permis de les utiliser.

Cette base est riche de 2138 données dont 1784 oiseaux bagués en « grande région » (presque exclusivement grâce au travail de quelques gardes des Fédérations des chasseurs spécialisés dans cette activité, les captures occasionnelles de cette espèce par les bagueurs généralistes du C.R.B.P.O. étant très rares). Les autres données étant des contrôles ou reprises de ces oiseaux ou des reprises d'oiseaux bagués hors grande région.

Les oiseaux marqués ou repris à l'étranger.

Les reprises d'oiseaux marqués à l'étranger.

Parmi ces oiseaux qui ont été repris (presque toujours tués à la chasse, la Bécasse, bien que considérée comme vulnérable en hiver en Europe et classée comme nicheur à surveiller en France selon

FADAT (1999), est un oiseau classé gibier), on peut relever 4 origines lointaines pour 8 oiseaux. Malheureusement, pour 7 d'entre eux (pour le huitième bagué en Pologne, les informations ne sont pas encore revenues) le baguage a été fait en hiver. Il n'est ainsi pas possible d'être sûr que ces oiseaux aient été marqués sur leur lieu de naissance. On relève ainsi :

- * 2 oiseaux marqués aux **Pays-Bas** en novembre et repris quelques jours après en grande région ;

- * 1 en **Estonie**, bagué en octobre et tiré en novembre (soit 1740 Km en 1 mois 5 jours) ;

- * 4 en **Russie**, 2 en reprise directe (c'est-à-dire repris la même année que le baguage) : 1341 Km en 1 mois et 1 jour pour l'un, 2511 Km en 3 mois et 11 jours pour l'autre. Les deux autres oiseaux avaient eux parcouru au moins 1340 et 2774 Km entre leur site de baguage et celui de leur reprise, mais ils sont repris après plus d'un an de port de bague ; combien de Km effectivement parcourus ?

Ces premiers cas montrent que les Bécasses des bois sont de grands voyageurs.

Les reprises à l'étranger d'oiseaux marqués en France.

Nous possédons aussi quelques informations pour des oiseaux ayant fait un voyage inverse : bagués en grande région en hiver, ils ont été repris en :

- * **Biélorussie** : 2 bagués en hiver dans le Pas-de-Calais et repris en mai ; ils sont alors probablement sur leurs sites de nidification.

- * **Russie**, 2 reprises concernant des oiseaux probablement nicheurs, ils ont été repris en été, 2 ans ½ plus tard, à respectivement 2700 et 2422 Km de leur lieu de baguage hivernal (un bagué dans l'Aisne et un bagué dans le Pas-de-Calais) ;

- * **Finlande**, 2 reprises concernant des oiseaux probablement nicheurs. 1 bagué en janvier dans le Pas-de-Calais et repris en août soit à 1961 Km après 6 mois 29 jours et 1 en février marqué dans l'Aisne et trouvé mort après une collision avec un véhicule en juillet après 1 an 4 mois et 29 jours.

- * **Suède**, 1 autre probablement encore nicheur, bagué en novembre dans le Pas-de-Calais et repris en août 9 mois 11 jours plus tard à 1187 Km de là.

- * **Grande-Bretagne**, pour un oiseau bagué en février dans l'Aisne, il est repris en juillet soit à 1992 Km après 1 an 4 mois 29 jours.

Pour ces 8 Bécasses, il est probable que cela nous montre l'origine géographique de leur naissance.

Pour les 5 oiseaux suivants, il s'agit probablement d'oiseaux en transit et marqués chez nous :

* 2 oiseaux en reprise directe en **Espagne**, bagués en novembre et décembre repris respectivement en décembre et janvier, soit 903 Km après 1 mois et 2 jours (pour un bagué dans l'Aisne) et 960 Km en 1 mois et 6 jours (pour un autre bagué dans le Pas-de-Calais). Pour un autre bagué en novembre dans le Pas-de-Calais il sera repris en décembre après plus d'1 an, à 1073 Km de son lieu de marquage.

* **Grande Bretagne** : 1 oiseau rapidement repris : bagué en octobre dans le Pas-de-Calais et repris en janvier, soit à 320 Km en 2 mois et 11 jours.

2 autres repris après 1 an presque jour pour jour, bagués en octobre et novembre, tirés respectivement 436 et 140 Km plus loin (bagués dans le Pas-de-Calais et dans le Nord).

Le statut des Bécasses des bois hivernantes en régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie se précise ainsi à la lecture de ces résultats : des oiseaux d'origines lointaines de l'est et du nord-est et probablement de Grande-Bretagne hivernent chez nous (rappelons que les populations reproductrices dans ces pays sont importantes : Biélorussie, 170000 couples nicheurs, Finlande, 140000 couples, Suède, 70000 couples, Grande-Bretagne, 20000 couples ; HOODLESS et SAARI, 1997). Il semble aussi que certaines Bécasses transitent dans nos marais et bois en route vers le sud de l'Europe (Espagne) ou les îles britanniques.

Nous pouvons préciser et confirmer cette première impression en analysant les données franco-françaises.

Première série de données : les oiseaux bagués en grande région et repris ou contrôlés localement (moins de 100 Km) en grande région.

La plupart (sauf 3) sont contrôlés à moins de 50 Km de leur lieu de marquage, souvent même sur place. Ceci concerne 72 cas (dont 15 contrôles) pour une capture/recapture le même hiver, 34 (dont 10 contrôles) pour une information l'hiver suivant, 7 cas après 2 ans de port de bague, 4 cas (dont 1 contrôle) après 3 ans, 3 cas après 4 ans et enfin 1 cas repris après 5 ans. Tout ceci signe une fidélité aux

sites d'hivernages à quelques Km près. On peut ajouter à cela, le cas de 6 oiseaux bagués dans le département voisin de la Seine-Maritime et repris en grande région après 1 an (4 cas) et 2 ans (2 cas).

Seconde série de données : les oiseaux bagués en hiver en grande région et repris ou contrôlés en dehors de la grande région et hors Seine-Maritime :

1 seul contrôle : un oiseau bagué le 18 octobre 2001, contrôlé le 21 novembre 2001 dans les Deux-Sèvres (79), soit 560 Km en 1 mois et 7 jours.

Toutes les autres informations concernant des reprises par chasse faites en France.

Distance en Km	Départ. de reprise	Durée du port de bague
1032	2b	7 jours
791	40	2 ans 27 jours
768	40	1 an
258	27	11 jours
679	33	1 mois 7 jours
601	19	1 mois 5 jours
560	79	1 mois 3 jours
165	27	3 ans 5 jours

Tableau 1 : Bécasses baguées en grande région et reprises en France (hors grande région).

Un net mouvement vers le sud-est (vers l'Espagne ?) se dessine mais cette direction n'est pas exclusive.

Troisième série de données : les oiseaux bagués en France, hors grande région et repris en grande région

Distance en Km	Départ. baguage	Mois de baguage	Durée du port de bague
486	35	Mars	3 ans 7 mois 26 jours
468	85	janvier	10 mois 27 jours
449	35	janvier	4 ans 10 mois 6 jours
427	36	janvier	10 mois 17 jours
353	10	octobre	11 mois 18 jours
348	50	novembre	1 an 23 jours
263	50	décembre	10 mois 29 jours

Tableau 2 : Bécasses baguées en France (hors grande région) et reprises en grande région.

Le mouvement vers le sud-est montré précédemment semble bien s'effectuer dans les deux sens.

Ainsi, notre grande région accueille en hiver des Bécasses des bois, voyageuses au long cours : plusieurs oiseaux ont fait un voyage de plus de 1000 Km, certains de plus de 2000 Km pour venir hiverner chez nous ou

transiter vers d'autres régions. La fidélité au site d'hivernage a été démontrée. Les chasseurs locaux ont donc entre les mains une partie de l'avenir européen de cette espèce, un excès de tirs pouvant réduire ces populations d'oiseaux nés dans des pays où la nature est encore protégée et permet leur reproduction. Et quant à nous, observateurs d'oiseaux, saurons-nous apprécier d'un autre œil cette

ombre souvent fugitive aperçue au détour d'un fourré : cet oiseau a probablement fait des milliers de kilomètres pour venir chez nous.

BIBLIOGRAPHIE

COMMECY X. et SUEUR F. 1995 : Bécasse des bois *Scolopax rusticola* in COMMECY *et al.* Atlas des oiseaux nicheurs de Picardie (1983 – 1987). Picardie Nature et C.O.P. p. 85-86.

FADAT C. (1999) Bécasse des bois *Scolopax rusticola* p. 350- 351 in ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D. – *Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et recherche de priorités. Populations. Tendances.*

Menace. Conservation. S.E.O.F., L.P.O. Paris, 560p.

HOODLESS A. & SAARI L (1997)- Woodcock p. 294-295 in E.J.M. HAGEMEIJER & M.J. BLAIR (Editors). *The EBCC Atlas of European Birds : Their Distribution and Abundance.* T & A.D. POYSER, London.

TOMBAL J.-C. 1996 - Bécasse des bois *Scolopax rusticola* in [Tombal J.-C. Coord] – Les oiseaux de la région Nord-Pas-de-Calais- Effectifs et distribution des espèces nicheuses : période 1985-1995. *Le Héron* 29 : p.125.

Xavier COMMECY
4 place Godailler Decaix
80800 Gentelles
xavier.commecy@wanadoo.fr