

NOUVELLES OBSERVATIONS D'OEDICNEME CRIARD (*Burhinus oedicnemus*) DANS LE NORD - OUEST DE L'OISE.

Par Rémi FRANCOIS

Introduction

L'Oedicnème criard est un nicheur exceptionnel dans le département de l'Oise. Seule une localité était jusqu'alors connue pour être fréquentée régulièrement par un ou deux couples, près de Lataule, entre Montdidier et Compiègne (Actualités ornithologiques de l'Oise, diverses années). Cependant sur ce site en 1995, un seul contact en début de nidification avait été établi, sans suite malgré plusieurs prospections. En 1996, aucun individu n'a pu être contacté sur ce site traditionnel (F. SPINELLI, comm. pers.).

Il importait donc de mener des investigations dans d'autres secteurs de l'Oise afin de savoir si l'Oedicnème faisait encore partie du paysage avifaunistique départemental. Ceci est d'autant plus important que cette espèce est considérée en Europe comme vulnérable, avec plus du tiers de ses populations en déclin (HEATH, 1994). La France abrite d'ailleurs une part significative de la population européenne, de l'ordre de 7 à 13% avec 5 000 à 9 000 couples. Mais les populations y subiraient une régression comprise entre 20% et 50% des effectifs depuis 1970 (ROCAMORA, 1994). L'Oedicnème mérite donc largement que les ornithologues picards s'y intéressent de plus près.

En 1996, quelques prospections rapides nous ont permis de repérer un nouveau petit noyau de population au nord-ouest du département, en limite avec la Somme, en plein plateau picard.

Données antérieures à proximité

Dans le Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France, BERNARD et MALVAUD (1994) mentionnent, pour la période 1985-1989, une nidification probable sur la carte au 1/ 50 000ème de Montdidier, ainsi qu'une nidification possible sur la carte de Crèvecœur. Il en va de même dans l'Atlas des oiseaux nicheurs de Picardie pour la période 1983-1987 (FLOHART, 1995). Entre 1991 et 1993, lors de l'enquête nationale sur l'Oedicnème, la population nicheuse de Picardie a été estimée à 50- 100 couples (MALVAUD, 1995), essentiellement concentrés dans la Somme et dans l'Aisne. Le petit noyau du sud de la Somme y est mentionné, suite aux observations de B. COUVREUR notamment.

Avant de mener nos prospections, des échanges d'informations avec B. COUVREUR nous avait permis de mieux cerner le statut de cette espèce dans le sud-amiénois, juste au nord de la limite Somme/Oise. B. COUVREUR (comm. pers.) connaît ainsi depuis quelques années une dizaine de couples, répartis sur une dizaine de communes, entre les villages de Conty, Ailly-sur-Noye et la limite de l'Oise. Sur la commune de Lawarde-Mauger-L'Hortoy, frontalière avec l'Oise, se trouverai(en)t ainsi un à deux couples assez réguliers).

De même, ROBERT (1990) mentionnait l'Oedicnème dans les années 1980 sur quelques coteaux crayeux de la vallée des Evoissons, qui frôle le nord-ouest de l'Oise. Dans les deux cas, les milieux fréquentés sont surtout des "blancs", ces espaces cultivés où la craie affleure, débarrassée par l'érosion de son manteau de limons et d'argile à silex.

Enfin, P. MATHOT, de l'Office National de la Chasse de l'Oise, nous avait signalé (comm.pers.) une donnée récente de *Burhinus oedicnemus* près de Breteuil.

Nous avons donc recherché l'Oedicnème sur quelques secteurs marqués par de tels "blancs" dans le paysage très ouvert des grandes cultures du plateau picard, aux environs de Breteuil et de Crèvecœur-le-Grand..

Observations

Nous avons cherché l'Oedicnème aux jumelles dans les champs vers Croissy-sur-Celle et Fontaine-Bonneleau, sur les étendues d'affleurements de craie les plus vastes. Cette méthode n'est apparemment pas très efficace, compte tenu des surfaces à parcourir, et de la faible mobilité des oiseaux dans la journée.

Nous avons quand même pu repérer un individu posé dans un champ caillouteux le 14.5.1996 près de Fontaine-Bonneleau (nord-est de Crèvecœur).

Puis nous avons ensuite essayé d'attirer le "Courlis de terre" au moyen de la diffusion de son chant au magnétophone, et au moyen d'imitations (hasardeuses!) en sifflant.

Les environs de Vendeuil-Caply, Breteuil, Villers-Vicomte, Bonneuil-les-eaux et Gouy-les-Groseillers ont été parcourus au crépuscule et en début de nuit claire et chaude.

Deux chanteurs nocturnes certains ont ainsi été repérés le 30.5.1996 au Sud de Breteuil et à Gouy-les-Groseillers.

Deux autres individus ont peut-être été entendus vers Vendeuil-Caply et Villers-Vicomte, mais avec une incertitude.

B. COUVREUR a également repéré au printemps 1996 un site occupé près de Paillart, au nord de Breteuil.

Notons par ailleurs qu'il faut se méfier des imitations : d'autres espèces, spécialement les Turdides (Merle noir, Grive musicienne et bien sûr l'Etourneau sansonnet) intègrent dans leur répertoire vocal des strophes de vocalises d'Oedicnèmes. On peut ainsi, notamment à la tombée de la nuit, entendre des "Oedicnèmes" dans des haies ou dans des bois... Ce qui amène à la fois à se méfier des imitations, mais aussi à supputer une présence possible de l'Oedicnème dans ces secteurs où des imitateurs sévissent.

Enfin, une donnée nous a été transmise par P. MAIRE, à qui un agriculteur connaissant assez bien les oiseaux a affirmé que l'Oedicnème était présent au nord-est de Blicourt, à quelques kilomètres au sud de Crèvecœur-le-Grand.

Dans chaque cas, les contacts ont été effectués dans des vallons secs, comprenant d'importantes surfaces de craie à nu, occupées par une végétation basse et clairsemée (alignements de betteraves, de maïs, de pommes de terre, bordures de champs où la végétation se développe mal...).

Conclusion

L'Oedicnème criard est bien présent dans l'Oise en période de reproduction sur le plateau picard, avec au moins cinq sites repérés en 1996. Les milieux occupés sont identiques à ceux du secteur de Lataule où il était connu encore très récemment. Cette espèce est probablement assez bien représentée dans le Nord de l'Oise, sur les secteurs d'affleurements crayeux dans les cultures, à l'instar des milieux situés en limite sud de la Somme, quelques kilomètres plus au nord.

L'Oedicnème est donc à rechercher activement à l'avenir vers Breteuil et Crèvecœur-le-Grand.

Nous estimons qu'il n'est pas impossible de découvrir plus d'une dizaine de cantons occupés, au regard des potentialités des vastes étendues de "blancs" dans cette région.

Des investigations complémentaires dans les prochaines années devraient ainsi permettre de préciser les effectifs en présence.

BIBLIOGRAPHIE

- **BERNARD A.; MALVAUD F.** -1994- Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*) in YEATMANN-BERTHELOT D., JARRY G., 1994, Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France. 1985-1989. pp.274-275. Société Ornithologique de France. Muséum National d'Histoire Naturelle. Paris, 776 p.
- **FLOHART G.** -1995- Oedicnème criard (*Burhinus oedicnemus*) in COMMECY X. (coord.), 1995, Atlas des oiseaux nicheurs de Picardie, 1983-1987. p.78. N° spécial de *L'Avocette*, C.O.P.-Picardie Nature. Amiens. 234 p.
- **GAVORY L. (coord.)** - 1995 - Les oiseaux nicheurs menacés de Picardie. Centrale Ornithologique Picarde, Picardie Nature. Direction Régionale de l'Environnement de Picardie, Conseil Régional de Picardie. 60 p.
- **HEATH M.** -1994- Stone Curlew (*Burhinus oedicnemus*). in TUCKER G.M., HEATH M.F., 1994, Birds in Europe : their conservation status". pp. 244-245. Birdlife international. Birdlife Conservation Series n° 3, 600 p.
- **MALVAUD F.** -1995- L'Oedicnème criard en France. *Ornithos*, 2, pp.77-81. L.P.O.
- **ROBERT J.C.** -1990- Les oiseaux de la vallée des Evoissons. in COUTANCEAU *et coll.*, 1990, Faune et flore de la vallée des Evoissons. *L'Entomologiste picard*, non paginé. Amiens.
- **ROCAMORA G.** -1993- Les Zones d'Importance pour la Conservation des Oiseaux en France . Ligue pour la Protection des Oiseaux. Birdlife International. Ministère de l'Environnement. Rochefort, 339 p.