

# ANOMALIE PIGMENTAIRE CHEZ LE ROUGEQUEUE NOIR *PHOENICURUS OCHRUROS* DANS L'OISE

par François SUEUR

Le 18 avril 1996 à Belloy (Oise), un rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* mâle chante perché sur l'église de cette commune.

Si le chant est typique de cette espèce, cet oiseau présente un plumage montrant une tendance à l'éclaircissement de certaines parties: la calotte, le dos, les couvertures alaires et le ventre sont gris pâle, le front est mêlé de blanc et de gris pâle. Par contre, d'autres zones du corps présentent une coloration normale: la face, la gorge et la poitrine sont noires, les rémiges sont sombres avec un miroir blanchâtre.

Bien que l'hybridation entre le Rougequeue noir et le Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* soit connue (ROBERT & TOULON, 1984) il semble que l'hypothèse d'un éventuel hybride puisse être écartée (chant et biotope typiques de l'espèce), d'autant plus que des mâles présentant une telle tendance à l'éclaircissement du plumage, moins marquée cependant, sont notés de temps à autre comme celui observé le 27 avril à Quend (Somme).

## Bibliographie

ROBERT J.C. & TOULON D. (1984) Notes sur le comportement d'un couple mixte de Rougequeue (*Phoenicurus ochruros* et *Phoenicurus phoenicurus*). *Aves*, 21 : 105-108.