


# le GUEPIER D'EUROPE - *Merops apiaster*

## - Observations dans l'Oise -

Par : Franck SPINELLI



Une récente observation printanière de Guépier d'Europe à Cuvilly, m'incita à rechercher les observations que nous avions réalisées dans le département de l'Oise.


Ma surprise fut grande de constater que les observations de cet oiseau étaient fort peu nombreuses : trois pour être précis et encore dont une en limite de notre département.

Ces données, de 1978 à nos jours, sont les suivantes :

- De 1978 à 1989 : Pas d'observations dans l'Oise.
- En 1990 : 1 individu blessé près de BREGY (Sud est de l'Oise) le 14/06/1990 (*Alain ROUGE*).
- En 1991 : Pas d'observations.
- En 1992 : Observation en limite de l'Oise mais en Seine-et-Marne (77). Deux individus sont observés le 12/06/1992 à MARCILLY en train de creuser une cavité (*Jean LHEUILIER*). Cependant des travaux ont détruit la colonie d'Hirondelles de rivage toute proche et ont fait fuir les Guépiers d'Europe. Ces derniers auront, au total, été observés à plusieurs reprises du 12/06/1992 au 15/07/1992.
- De 1993 à 1996 : Pas d'observations.
- En 1997 : 6 individus sont observés en vol le 02/05/1997 à CUVILLY (*Franck SPINELLI*)
- En 1998 : Pas d'observations.

On constate qu'aucun cas de reproduction n'est connu à ce jour dans notre département et que les données sont rares.

Pourtant, un certain nombre de départements limitrophes à l'Oise, accueillent des populations plus ou moins importantes de Guépriers d'Europe (cf carte ci-dessous).



Sans vouloir être exhaustif, et ne disposant pas de l'ensemble des données de ces dernières années, nous pouvons résumer la nidification du Guéprier d'Europe dans le nord de la France de la manière suivante (données postérieures à 1960) :

#### HAUTE NORMANDIE.

En l'état actuel des informations en notre possession, le Guéprier d'Europe ne semble pas avoir niché en Haute Normandie. Par contre, un cas de nidification à PORTBAIL (département de la Manche) nous est relaté en 1980.

#### ILE-DE-FRANCE.

Le Guéprier d'Europe semble s'être installé en Ile-de-France vers le milieu des années 1970, plus particulièrement au sud de la Seine-et-Marne puis de là vers le sud-est de l'Essonne.

La première nidification semble avoir eu lieu en 1974 sur un site proche du marais de LARCHANT (77), mais il faudra attendre 1977 pour que la nidification soit considérée comme certaine. La colonisation de l'Essonne se fera en 1978 (1 couple). Puis en 1987, ce sera au tour de la forêt de Fontainebleau d'accueillir 2 couples.

Les effectifs nicheurs augmentent ainsi régulièrement en Ile-de-France. Ils étaient en 1989 de 10 couples pour la Seine et Marne et 25 couples en Essonne (P. LE MARECHAL) pour atteindre un optimum en 1996 et 1997 où la population était estimée à plus de 135 couples (100 à 110 en Essonne et une vingtaine de couples au sud de la Seine-et-Marne) (P. LE MARECHAL, G. LESAFFRE).

## NORD / PAS-DE-CALAIS.

La colonisation de la région Nord / Pas-de-Calais par l'espèce fut plus tardive et la première nidification certaine eut lieu en 1982 près de TARDINGHEN, puis il faudra attendre 1989 où l'espèce a niché à ECOURT SAINT QUENTIN.

Ensuite, les cas de nidification vont se succéder beaucoup plus régulièrement et le Guêpier d'Europe sera noté nicheur à BRAY-DUNES en 1994, près d'AMBLETEUSE et à BRAY-DUNES en 1995, puis deux couples dans le Boulonnais en 1996 ainsi qu'en Belgique, etc...

## PICARDIE.

Les premiers cas de nidification en Picardie, postérieurs à 1960, proviennent de BUCY-LE-LONG (Aisne) où l'espèce a niché dès 1967 et 1968 et jusqu'en 1973 semble-t-il.

Ensuite, vers le milieu des années 1970 (1977 plus précisément), plusieurs couples s'installent dans le LAONNOIS. En 1985 on notait dans ce secteur, 25 couples nicheurs répartis en 5 colonies.

On constate donc une extension très récente de l'aire de répartition de cet oiseau vers le nord dont le gros des populations reste essentiellement localisé sur le pourtour méditerranéen (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'azur) ainsi qu'en vallée du Rhône.

Selon LESSELLS, cette expansion de l'espèce depuis les années 1970 semble être en relation avec une évolution favorable des conditions climatiques.

Le principal facteur limitant à l'installation du Guêpier d'Europe est lié au manque de milieux attractifs et plus particulièrement de sites favorables au creusement des terriers à proximités de l'eau dans des secteurs riches en insectes (odonates, lépidoptères, hyménoptères, diptères, coléoptères, etc..)

Les sites de reproduction sont principalement à rechercher parmi les "falaises" des carrières de sables, les berges abruptes des rivières, les micro-falaises dunaires ou, plus rarement, les bords des routes.

Bien souvent cette espèce grégaire peut former des colonies en association avec celles des Hirondelles de rivage.

## ANALYSE DES DEUX DONNEES POUR L'OISE.

L'observation d'Alain ROUGE en 1990 à BREGY semble pouvoir être mise en relation avec un cantonnement possible de l'espèce que la tentative de nidification décelée en 1992 à MARCILLY en Seine-et-Marne semblerait vouloir prouver. En effet, ces deux communes ne sont distantes que de 5 kilomètres à vol d'oiseau.

D'autre part, il est peut probable compte tenu de la date de l'observation (mi-juin), de pouvoir la mettre encore au crédit de la migration pré-nuptiale.

Celle-ci semble s'échelonner de mi-avril à mi-mai pour la majorité de la France et plus tardivement dans le Nord / Pas-de-Calais où les passages sont plus importants courant du mois de mai. Dans cette région les cantonnements ont lieu en général vers la mi-juin.

La deuxième observation, de 6 individus le 02 mai 1997 à CUVILLY est quant à elle beaucoup plus en corrélation avec les dates du passage pré-nuptial. On ne peut cependant pas tirer de conclusion sur la base de cette seule donnée, ni en faire une généralité. Si l'on regarde la carte en début de cette note, on constate que la position de Cuvilly est néanmoins située sur un axe de migration potentiel pour les espèces de la région Nord / Pas-de-Calais.

Il pourrait donc être intéressant de rechercher plus particulièrement cette espèce dans le courant du mois de mai afin de mieux cerner les dates de son passage pré-nuptial dans l'Oise.

En ce qui concerne le passage post-nuptial, celui-ci semble s'échelonner dès la fin du mois d'août et plus spécialement courant septembre. On peut quelquefois observer de gros rassemblements à cette période comme les 300 individus observés en septembre 1984 dans le Laonnois.

Selon GEROUDET ses principaux quartiers d'hivers sont situés en Afrique tropicale et méridionale, notamment à l'ouest du Sahara.

### **Bibliographie.**

- CENTRALE ORNITHOLOGIQUE PICARDE, 1995 : "Atlas des oiseaux nicheurs de Picardie (1983-1987) - COP, Picardie Nature, 241 pp.
- GEROUDET (P), 1980 : "Les passereaux - Tome I : du coucou aux corvidés" - Delachaux et Niestlé, 235 pp.
- GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND, 1993 : "Atlas des oiseaux nicheurs normands" - Graphitype, 247 pp.
- HEINTZ (D), 1995 : "Nidification du Guêpier d'Europe - *Merops apiaster* sur le littoral Flandres & Boulonnais en 1995" - Rapport ornithologique - Littoral Flandres-Boulonnais.
- JONSSON (L), 1994 : "Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du nord et du Moyen-orient" - Nathan, 559 pp.
- LE MARECHAL (P), LESAFFRE (G), à paraître : "Avifaune de région parisienne et de Paris".
- SUEUR (F), 1995 : "Liste commentée des oiseaux de Picardie" - François Sueur Editeur, 61 pp.
- TOMBAL (JC), 1996 : "Les oiseaux de la région Nord / Pas-de-Calais" - Groupe Ornithologique Nord.
- YEATMAN-BERTHELOT (D), JARRY (G), 1994 : "Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France (1985-1989)" - Société Ornithologique de France, Muséum National d'Histoire Naturelle, 775 pp.