NOTE SUR LA NIDIFICATION DU CHEVALIER GUIGNETTE *Tringa hypoleucos* DANS L'AISNE

par Hugues Dupuich

INTRODUCTION

Il semble, d'après les données de la littérature, que la nidification du Chevalier guignette n'ait jamais été signalée dans l'Aisne.
YEATMAN (1976), dans l'Atlas des Oiseaux nicheurs de France, n'indique aucun cas. BOUTINOT (1980) ne l'a jamais trouvé nicheur dans le Vermandois.
Dans la Somme, sa nidification n'a été donnée comme certaine que sur le littoral picard (YEATMAN 1976).
Le cas de nidification constatée en 1981 à l'étang de Boué est donc le premier cas enregistré pour l'Aisne.

DEROULEMENT DE LA NIDIFICATION


1) Description du biotope

La nidification a eu lieu à l'étang de Boué, situé en Thièrache, dans le nord de l'Aisne. C'est un étang eutrophisé aux bords vaseux, où se développe sur la rive même une végétation palustre typique, formée d'arbustes aux branches enchevêtrées retombant vers l'eau et ménageant un grand nombre de caches. Une roselière constituée de Massettes *Typha sp.* jouxte l'étang. Deux ruisseaux l'alimentent : l'Ancienne Sambre et l'Essery (ruisseaux aux eaux très claires). C'est tout près de ce dernier que la nidification a été constatée.

2) Résumé des observations

Migrateur régulier de mars à novembre, le Guignette n'avait jamais montré à Boué de comportement nicheur avant 1981.
Jusque fin mai, la migration est constatée. Durant le mois de juin, l'étang ne sera visité qu'une seule fois le 8 où 2 individus seront observés.
En juillet, le cantonnement est noté : les 6 et 11, un individu alarme, deux fois, en décollant du même endroit, à environ 10 m de l'embouchure de l'Essery dans une zone de végétation dense.
Le 15 juillet, un individu alarme dans le même secteur puis j'observe un Guignette, non volant, d'une taille inférieure à l'adulte proche, qui fuit sous la végétation. Son âge est estimé à 8 ou 10 jours.
Le 17 juillet, 2 adultes et ce juvénile non volant seront observés dans le même secteur. Ils n'ont pas décollé car j'ai évité tout dérangement.
Le 24 juillet, toujours au même endroit, sur un bord vaseux, j'observe les 2 adultes et le juvénile volant assez mal (âge

Résumé de la nidification



estimé 17 à 19 jours) car ils ont décollé, m'ayant repéré.
Après le 24 juillet, l'étang ne sera plus visité.
Donc, un couple de Chevaliers guignettes s'est reproduit en 1981 à Boué, donnant un jeune à l'envol.
Je n'ai jamais recherché le nid par mesure de prudence.

DISCUSSION SUR LA NIDIFICATION

D'après les données de la littérature et les observations réalisées, nous avons pu retracer la chronologie de la reproduction.
HARRISON (1977) donne comme début de période de reproduction mai à mi-juin ; généralement, la ponte est de 4 oeufs. L'incubation dure de 20 à 23 jours. Les 2 parents couvent et la nichée abandonne le nid dès que le duvet est sec. Les pulli ne commencent à voler que vers le 13ème jour et parfaitement le 21ème jour.
Si le 24 juillet est considéré comme le 18-19ème jour, l'éclosion remonte alors au 5-6 juillet et le début de la ponte vers la mi-juin. On peut donc considérer les 2 individus du 8 juin comme le couple nicheur. C'est une nidification assez tardive. On note un seul jeune à l'envol, c'est faible mais cela peut être expliqué par la date déjà avancée de la nidification.

CONCLUSION

Il s'agit donc de la première nidification constatée de Chevalier guignette dans l'Aisne. Une meilleure prospection des bords de rivières (Aisne, Serre...) aux époques favorables devrait mieux nous éclairer et montrer que le cas de Boué n'est peut-être pas le seul.

BIBLIOGRAPHIE

Boutinot S. (1980) Etude écologique de l'avifaune du Vermandois. Structure, dynamique et évolution des populations depuis 1950 - Thèse Docteur Université Reims, 444 p.
Harrison C. (1977) Nids, oeufs et poussins d'Europe - Bruxelles (Elsevier).
Yeatman L. (1976) Atlas des Oiseaux nicheurs de France - Paris (S.O.F.), 282 p.