

# SYNTHESE DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES EN PICARDIE EN 1986

par C.O.P.

Pour cette année 86 parait notre première synthèse régionale (contre 3 synthèses départementales habituellement). Elle parait en retard certes, et sous une forme très condensée, mais des problèmes tant matériels que financiers nous imposent cette condensation...et cela fera toujours économiser quelques arbres! De nouveaux équipements informatiques de plusieurs rédacteurs devraient bientôt permettre une réalisation plus claire.

Dans cette synthèse régionale, on pourra remarquer la grande place prise par les données issues du département de l'Oise, département autrefois peu couvert, et qui montre aujourd'hui la grande activité des observateurs de ce département qui se sont regroupés sous le nom de GEOR 60.

Le suivi traditionnel des sites de la Somme a été poursuivi tant sur le littoral que pour l'intérieur.

Le département de l'Aisne reste le moins bien prospecté et les suivis de sites sont rares.

Cette année encore nous avons regroupé de nombreuses données sous forme de tableau ou par un nombre cumulé d'observations par site, département, période... selon les espèces. Bien que cela puisse paraître frustrant de ne pas voir ses observations figurer isolément, c'est un mal nécessaire si l'on ne veut pas assister à une inflation du nombre de pages de bilan annuel, sans que cela rende plus de services pour les ornithologues régionaux ou nationaux. Cette contraction doit inciter chacun de nous à développer les études sur une espèce ou sur un site particulier...qui trouveront leur place dans les pages de l'Avocette! A vos plumes donc.

Vous noterez que comme l'année dernière, nous avons isolé le compte rendu des suivis de migration postnuptiale des oiseaux terrestres en baie de Somme en fin de synthèse.

Rappelons enfin que comme depuis plusieurs années, nous avons commenté les observations les plus remarquables de l'année 1986 dans les actualités ornithologiques qui ont paru dans l'Avocette 11(1) 47-51.

La synthèse 1987 est actuellement en cours de réalisation et nous espérons pouvoir l'éditer rapidement

Les rédacteurs : Non Passereaux, X. COMMECY (avec F. SUEUR pour les Anatidés, les Limicoles et les Laridés)

Passereaux, G. FLOHART et L. GAVORY.

A. ROUGE a synthétisé l'ensemble des observations de l'OISE.

Quelques données climatologiques pour cette année 1986

Il faut bien entendu remarquer la sévère vague de froid de Février (-6°C par rapport à la normale, 25 jours de gel dans le mois, -14°C le 10 par exemple) qui se termine dans la première quinzaine de Mars. Mars et Avril sont pluvieux alors que le début de l'été est sec. Le début de l'hiver est doux Octobre et Décembre étant assez pluvieux.

Quelques journées de vents forts : 14 au 19 Janv., 24 Mars, 26 Août, 3 Sept., 20 Octobre (104 Km/h, max. pour une période venteuse du 19 au 26); 18 Dec. (104 Km/h, max. d'une période venteuse du 15 au 21).

Observateurs : C. ANCELET, S. BACROT, J.C. BARAILLER, G. BAUDOIN, C. BECKER, G. BETEILLE, D. BLED, J.P. BONNEL, B. BOUGEARD, J.C. BOUVIER, E. CHALLET, F. CHANTEPIE, S. CAROLUS, V. CARON, P. CARRUETTE, A. CHANTRILUX, M. CHATELAIN, J.P. CHAVANE, A.M. et X. COMMECY, B. COURONNE, A. et Y. COMBEAU, B. COUVREUR, R. DAMERY, C., M. et P. DANCOISNE, L. DELACOUR, D. DELVILLE, F. DELANNOY, K. DESCHERE, H. DUMOULIN, H. DUPUICH, A. DUPUIS, S. FARGEAS, G. FLOHART, R. et L. FRANCOIS, C. GARNIER, L. et P. GAVORY, J.M. GIBIARD, A. et B. GINTZBURGER, C. GRICOURT, C. GUYOT, G. JARDIN, J.C. KOVACS, L. LARRIEU, L. LARZILLIERES, N. LAWNIKZAK, J. LAW, Y. LECOMTE, P. LEMARECHAL, J. LHEUILLIER, R. MADRAGORE, P. et T. MALIGNAT, J.M. MALLARD, M. et V. MANNECART, E. MERCIER, F. MEYER, V. MONVOISIN, J.B. MOURONVAL, D. MURE, G. PHILIPPE, J. PILNIAK, A. PIQUEMAL, D. ROBERT, D. ROCHERIEUX, A. ROUGE, P. ROYER, J.M. SANNIER, A. SAUVAGE, A. et M. SENGEZ, F. SPINELLI, F. SUEUR, F. et M. THAURONT, P. THIERY, L. TOUTAIN, C. VIEZ ...et les oubliés éventuels, qu'ils nous en excusent.



PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica*

10 observations, toutes sur le littoral Sud sauf 2 le 9 Fev. en RBdS. Pas d'observations en terres.

Janvier : 4 données, max. 4 le 5 face à Cayeux/mer

Fevrier : 3 données, max. 3 le 6 au H.A.

Mars : dernier le 13 au H.A.

Retour, 2 le 14 Octobre à Cayeux/mer puis 3 le 22 Decembre.

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata*

Régulier en petit nombre sur le littoral en Janv. et Fev. et un petit passage déce lé mi-Mars. 1 le 2 Mars sur la Somme à Port le grand (L. GAVORY)

Quelques attardés : 1 le 2 Avril à St Félix(60) et 1 le 24 Mai au POM.

1 trouvé mort sur le littoral en Juin (6 autres le seront au cours de l'année)

1 le 15 Fev. en basse vallée de Bresle entre Gamaches et Mers les bains

Retour :

1 le 10 Octobre au H.A., 11 le 14 en mer, quelques-uns en mer en Nov.; passages observés les 7, 13 et 30 Dec. littoral Sud (environ 10/heure)

H.A.: Max. mensuels, 13 en Janv., 14 en Fev., 4 en Mars, 1 en Oct. et Nov.

GREBE HUPPE *Podiceps cristatus*Nidification :

Dans l'Aisne, repérée dans 8 localités

PdA, 5 c.; Beautor, 1 c.; Bucy le Long, 3 c.; S.N.B., 1 c. (2 couvée successive)

Vailly/Aisne, 1 c.; Vendeuil, 1 c. 4 oeufs 1 p. le 12 Mai, 3 p. à l'envol, 1 oeu clair, 1 disparaît; Villers en Prayères, 2 c.

Total, 15 couples (très incomplet).

Pour 12 couples dont le nombre de pulli a pu être compté, moyenne de 2,33 p/c.

Oise, 12 localités de reproduction prospectées

Vallée de l'Oise, 12 à 14 c. (L.S.M.: 4-6 c.; M.P.: 2 c.; V.H.: 6 c.)

Vallée de l'Aisne, +6 c. (St Pierre: 6c.; Couloisy: ?)

Vallée du Thérain, 6 c. (Bailleul/Th.: 4 c.; Troissereux: 2 c.)

Forêts de Chantilly/Ermenonville, Chantilly: 6 c.; Commelles: 7 c.; Ermenonville: 1 c.; Mortefontaine: 4 c.)

D'autres secteurs connus comme accueillant des couples n'ont pas été visités cette année.

Pour 24 couples, 54 pulli comptés soit 2,16 p/c..

Somme.

Vallée de la Somme, 77 c. repérés dans 21 localités (15 c. à Péronne, 9 c. à Bray/Somme...)

Vallée de la Noye, 17 C. (Boves: 10 c.; Fouencamps: 4 c.; Hailles: 1 c.; Thézy-Glimont: 3 c.)

Vallée de la Selle : Fossemanant 1 c.

Vallée des Evoissons, 2 c.

Littoral, H.A.: 2 c.; Rue: 1 c.

Total, 101 couples repérés; premières parades le 12 Mars (Argoeuves, Péronne),

Premier nid le 20 Mars, premiers pulli le 4 Mai, encore des éclosions fin Août

H.V.S. Pour 48 couples, 135 p. repérés soit 2,81 p/c.

Pour la région, répartition des familles,

13 de 1 p., 29 de 2, 28 de 3, 13 de 4, 2 de 5, Moyenne 2,55 p/c.

Stationnements et hivernage :

Aisne : Peu de rassemblements notables, mis à part :

PdA, 55 le 13 Avril, 36 le 16 Août et 10 le 12 Oct.

V.enP., 29 le 13 Avril; Tergnier, 12 le 11 Oct.

Oise :

Vallée de l'Oise : poussins exclus

Max. mens.:	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
L.S.M.	2	?	8	11	12	6	?	11	?	10	3	7
M.P.	2	1	8	11	7	13	10	10	7	7	11	2
Beaurepaire	5	:	:	:	:	:	:	:	:	4	7	5
V.H.	:	:	12	:	8	:	:	10	:	26	4	6

## Vallée de l'Aisne ;

Pas de sites de rassemblements remarquables, une prospection quasi-complète a donné les résultats suivants, 19 Janvier, 2 sur 2 sites, 23 Octobre, 13 sur 5 sites et le 6 Décembre, 7 sur 3 sites.  
En Février, désertion du département, 1 seule observation : 1 le 6 à P.M.

Somme :

Littoral : Sud B.S. du Hourdel à Ault, en mer :

1460 le 12 Janv., 1500 à 2000 le 26, 500 le 2 Fev. (face à Cayeux/mer), 1000 le 24, 13 le 3 Mai, Retour, 9 le 27 Sept. (7 en mig. S./2h,30 le 25 Oct.), 50 le 22 Nov., 125 le 7 Dec. (322 mig. S/1h,30), 110 le 13, H.A. : moins de 10 chaque mois sauf, 9 en Mars et 11 en Oct.

Le Crotoy : 1 seule valeur remarquable, 24 le 29 Mars

Sur le canal de la Somme, de St Valéry/S/ à Abbeville, 5 le 26 Fev., 1 le 2 Mars.

Vallées : Bresles, 21 le 15 Fev, de Gamaches à Mers, 75 en Fev, de Sénarpont à Bouvaincourt.

Moyenne vallée de la Somme, rare en Janv. et Fev. (1 à 2 d'Amiens à Péronne), bien suivi au printemps à St Sauveur : 2 le 11 Mars, 8 le 16, 16 le 21, 21 le 23, 22 le 27, 20 le 29, 25 le 1 Avril, 10 le 18 (couples nicheurs).

Vallée des Evissons : 2 le 20 Janv., 1 le 16 Mars, 2 c., 3 le 18 Oct., 1 en De

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
P.O.M.	0	0	2	0	0	2	1	3	3	2	2	1
H.V.S.	3	16	44	40		couples	nicheurs		60	72	7	12
St Sauveur												

GREBE JOUGRIS Podiceps griseigena

1 au H.A. les 1 et 2 Fev. puis 1 le 3 Mars, 2 trouvés morts sur le littoral fin Février.

Migration d'Août, 2 données : 1 le 16 à Aulnoy/Laon (02) (X. COMMECY et L. GAVORY)

1 juv. au POM les 29 et 31 (C. VIEZ et F. SUEUR)

H.A. : 1 les 25 et 26 Oct., 1 les 15 et 16 Nov., 1 le 11 Nov. en RBdS sur la Maye, 1 le 13 Dec. à Cayeux/mer et 1 au H.A. le 22.

GREBE ESCLAVON Podiceps auritus

2 à Cayeux/mer le 24 Fev. et 1 au H.A. les 9 et 21 Mars (L. GAVORY)

1 les 23 et 25 Oct? au POM (F. SUEUR), 1 le 25 en B.S. (G. FLOHART) et 1 au cours de ce mois à Bouvaincourt/Bresles (J.M. SANNIER),

GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis

2 données dans l'Oise concernant la mig. post-nuptiale

1 le 3 Août à Chevrières et 2 le 1 Oct. à L.S.M.

10 données dans la Somme :

1 le 2 Fev. au H.A., 1 les 4 et 5 Avril au Crotoy, 1 le 6 Mai à Argoeuves (ces 2 derniers en P.N.).

Retour, 1 juv. le 16 Août à Roye, Sept., 1 au H.A. les 6, 9 et 27, 1 au POM du 14 Sept. au 25 Oct.; 1 au H.A. le 10 Oct. et le 22 Dec.

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollisNidification :

Repérée dans 11 localités de l'Oise (22 couples comptés)

V.H. : 2 c./2 juv. le 15 Août; Chevrières : 1 c./4 juv. le 3 Août;

Commelles : 1 c./2 p.; Boulincourt : construction du nid le 29 Mai.,

10 localités dans la Somme (14 couples repérés)

1 p. le 25 Mai à La Chaussée-Tirancourt; 2 et 1 p. le 8 Août à Fouencamps;

1 nid le 4 Mai en vallée des Evissons; 1 juv. le 7 Août à Ham.

4 localités dans l'Aisne (7 couples repérés)

1 nid/4 oeufs le 20 Juillet à Beautor; 2 juv. le 16 Août à Villers en Prayères

3,3 et 2 juv. le 16 août à S.N.B.; 2 c. à PeA.

Les sites de nidification sont variés : gravières, étangs, marais, bassins de déc

Hivernage (Janv., Fev., Dec.) :

Faibles effectifs dans la région mais nombreux sites d'observations (forte dispersion des oiseaux). Quelques rassemblements toutefois, 30 le 25 Janv. et 26 le 2 Fev. en vallée des Evissons ainsi que 47 le 4 Dec. et 42 le 18; 35 le 15 Fev. dans la basse vallée de la Bresle; 11 le 28 Dec. à St Christ-Briost, 14 le 16 Fev au Crotoy et 16 le 9 Dec. (Somme) et 26 le 7 Dec. à V.H. (Oise).

Tous les autres obs (+ 60) concernent moins de 10 individus

## Migration :

Celle de printemps est discrète; nombreuses données de Mars époque où les c. se cantonnent; petit passage noté le 10 Fev. avec 30 oiseaux en H.V.S. en 5 localités puis le 17 Avril à Rue...

La migration d'automne est nette à partir d'Août et surtout en Octobre, particulièrement dans l'Oise;

Août: L.S.M., max. 13; Bresles, 34 le 3

Septembre: L.S.M., max. 3, Vauciennes 17 le 14

Octobre: L.S.M. max. 13, V.H. 51 le 6; Couloisy 13 le 23

Dans la Somme,

Max./quinz	A	S	O
E. MONS	5/29	16/28	27/13
Amiens	00/0	0/2	7/1

5 le 12 Octobre à S.N.B.(02)

En Novembre, fin du passage en début de mois, peu de grands groupes hormis : 28 le 9 à V.H.(60); 9 le 16 à Comelles(60), 16 le 22 au Crotoy(80)...

Max./mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
H.A.	0	1	1	2	Couples nicheurs				37	54	23	1
P.O.M.	4	3	2	4	2	7	12	13	16	28	27	39
Val.Evois.	30	26	25		15	N.	26	35	34	48	41	47

PUFFIN DES ANGLAIS Puffinus puffinus

1 le 25 Oct. à Cayeux/mer (X. COMMECY et E. MERCIER).

FOU DE BASSAN Sula bassana

3 obs. de Juv. à Mars sur le littoral, max. 4 ind.; 1 ad. 1 Im. le 21 Juin à Quend. Net passage en Oct.: une dizaine stationnent face à Cayeux/mer, Quelques-uns en Nov. et début Dec., passages le 13.

FULMAR Fulmarus glacialis

Arrivée sur les falaises entre le 4 et le 12 Janv., 49 c. repérés, 8 juv. à l'envol, désertion du site à la mi-Sept. (E. MERCIER et al.). Mig. de Juin, 1 le 15 à Cayeux/mer et 2 le 21 à Quend

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo

P.O.M.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	1	12	10	13	8	14	11	19	118	200	21	7
	2	1	13	8	9	7	5	42	56	87	12	15
Max./dec.	31	0	5	9	11	7	9	57	96	25	10	21

Baie de Somme Sud, 1 le 4 Janv.; 10 le 2 Mars; 4 le 4 Avril; 2 le 4 Juin; 10 le 16 Sept; 20 le 1 Nov.; 9 le 23 Dec,

H.A.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Max./mois	0	2	5	5	3	5	2	7	6	1	2	6

Les passages de Mars-Avril et Août-Septembre permettent l'observation de Grands Cormorans stationnant en terres : 6 au printemps dans la Somme et 2 dans l'Aisne 3 à l'automne dans la Somme. Les autres mois, 2 obs. dans la Somme (Nov.), 3 dans l'Aisne (Oct., Nov., Dec.) et 4 dans l'Oise (Fev., Oct., Dec.). A remarquer, 1 donnée de Mai : 1 le 17 à L.S.M.(60) (B. COURONNE et P. LE MARECHAL).

## Migrateurs actifs :

Le 16 Mars, 42 (N.E.) à Amiens(80) 3 (N.E.) à Beautor (02), 10 (N.) le 1 Mai à Ault(80); 40 (S.W.) le 25 Oct. à Cayeux/mer et 76(S.)/45 min, le 27 à Quend(80). Les sites de Chamouilles et Vendeuil (02) accueillent quelques hivernants (isolés ou en très petit nombre) ainsi que L.S.M. et M.P. (60).

HERON CENDRE Ardea cinereaNidification :

Somme. Péronne St Radegonde: 8 nids occupés le 3 Fev., 25 le 2 Mars, 9 le 12 (coup de froid et neige entre ces 2 dates), 37 nids le 2 Avril, 41 en fin de saison.

Boismont, nids occupés le 16 Fev.

P.O.M.: 34 nids.

Oise. Villers St Sépulcre, un couple se reproduit cette année; ceci constitue la première preuve de nidif. de l'espèce dans ce département (Y. LECOMTE, voir l'AVOCETTE 1988-12(2) p.94-96)

Comme d'habitude, nombreuses obs., le plus souvent en petit nombre, dans toute la région de Janv. à Mars-Avril puis retour en Juillet, mais toujours quelques données en période de nidif. dans les vallées (Somme et Oise).

A noter : 24 le 2 Janv. à Fossemanant, 10 le 25, 15 le 17 à Amiens, 20 le 26 Fev. à Vendeuil(02), 10 le 19 Juin en Bda, 14 le 30 Août à Hangest/Somme, 17 le 12 Oct. à Chamouille(02), 13 le 13 Nov. à La Chaussée-Tirancourt(80)  
Beautot(02), max. mens.; en Mars, 2 Avril, 1 Mai (dernier le 19), 8 Août (retour le 13), 17 Oct., 5 Nov.

Oise : Nombre de données par mois/nombre de sites

Janv. 11/8; Fev. 6/3; Mars 2/2; Avril 1/1; Mai 1/1; Juin 1/1; Juillet 1/1  
Août 5/5; Sept. 6/3; Oct. 22/15; Nov. 11/6; Dec. 8/4.

Migrateurs actifs: 6 le 13 Oct. à Cayeux/mer; 2(S)/6 h. le 9 Nov. en RBdS.

HERON POURPRE Ardea purpurea

Une seule donnée lors de la migration postnuptiale : 1 le 20 Août au POM.

GRANDE AIGRETTE Egretta alba

1 le 9 Nov., stationne au POM puis traverse la B.S. en direction S.W. (L. GAV-ORY).

AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta

Quelques données au POM (nouveau recul de l'espèce par rapport à 85) :

1 le 7 Mai et du 31 Mai au 6 Juin, 2 les 7 et 9 Juin.

1 le 15 Mai à M.P.(60) (J. LHEUILLIER).

HERON BIHOREAU Nycticorax nycticorax

Toutes les obs. au POM : 1 les 30 Mai et 1 Juin, 1 Im. le 28 Août, 1 Ad. les 31 Août et 3 Sept., 1 le 25 Oct.

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus

Premier: 1 chanteur à Rue le 18 Mai; repéré aussi à Bouvaincourt/Bresle; Camon (nicheur certain), Boves (2 sites avec 2-3 c. et 1 c.), Dominois, Rouy le grand (3 c., au moins 1 nid sera abandonné suite à des dérangements dus à des pêcheurs, C. DANCOISNE). Toutes des localités de la Somme.

GRAND BUTOR Botaurus stellaris

Entendu dans 6 localités de la Somme (Blangy-tronville, Hailles, Rue (3 chanteurs), Sailly le Gray, Pont Rémy et Rouy le Grand),  
1 seule localité dans l'Oise, Sacy le grand/Cinqueux; 4 chanteurs entendus le 11 Juin (s'il est confirmé, ce dénombrement traduirait une baisse inquiétante de cette population nicheuse (conséquence des hivers rigoureux?), Rappelons en effet que H. DUPUICH et G. TOMBAL notaient en 1983 11 chanteurs dans cette même zone.

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia

1 à Beautot(02) le 28 Sept., 1 à Noyelles/mer/Boismont du 24 Fev. au 2 Mars,  
POM: 1 le 14 Mai, 6 le 28 Août, 2 ad. 7 juv. le 17 Sept., 4 le 21, 1 du 1 Oct. au 31 Dec.

CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra

4 (3 ad. 1 im.) à Viry Noreuil(02) le 13 Août.

RBdS-POM: 3 le 14, 5 le 20, 6 du 23 au 26, 2 le 27 Août.

1 le 11 Mia en forêt de Retz (D. DELVILLE)(60) (1 seconde possible).

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia

Hivernage : 1 juv. du 1 au 11 Janv. (présent dès le 27 Oct. 85).

Retour : 4 au POM le 29 Mars. 1 le 4 Avril à Noyelles/mer.

Max./des.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	1	0	0	5	0	1	2	11	10	2	2	2
P.O.M.	1	0	0	2	1	0	3	15	25	1	2	2
	0	0	5	1	4	0	3	12	5	2	2	2

H.A.: 8 le 12 Sept., 1 le 30 Oct., 1 le 30 Nov. à St Val/S., 8 mig. le 31 Août à Abbeville (V. CARON).

Nouvel hivernage avec 1 ad, 1 juv. du 23 Oct. au 31 Dec. au POM (jusqu'à présent seuls des oiseaux de l'année avaient été remarqués en hiver)

Pas d'obs. en dehors de la Somme.

FLAMANT ROSE Phoenicopiterus ruber

2 le 23 Mai au H.A. (P.r.chilensis) et 1 le 11 Juin.

1 du 12 au 21 Mai à P.M.(60) (P.r.roseus, sous espèce nicheuse de Camargue), non bagué (J.P. BONNEL et J. Lheullier).



CYGNE TUBERCULE *Cygnus olor*

## Nidification :

Sur le littoral; P.O.M.: 1 c.; Le Crotoy: 1 c.; Noyelles/mer: 2 c.; Boismont: 2 c.  
H.A.: 4 c.; Le Hourdel: 1 c.; Saigneville: 3 c.

Vallée de Somme: Long le Catelet: 1 c.; Picquigny: 1 c.; St Sauveur: 1 c.;  
Amiens (marais Bout du Monde): 1 c.; Corbie: 1 c./2p. (premier cas de nidif.  
connu dans cette localité suivie régulièrement depuis 1970)

Vallée des Evoissons: 2 c./7 et 5 pulli.

Construction du nid notée le 16 Mars, 2 Avril; Couvaisons les 20 Avril (3 cas) et  
17 Mai et 18 Avril

Stationnements (hors période de nidif. pour les sites où elle a lieu).

POM, les 2 ad. et 7 pulli restent jusqu'au 21 Sept.; Rue, 2 le 30 Avril, 12 le 17  
Mai; Le Crotoy : 5 le 9, 1 le 16 Fev., 2 le 30 Dec.

Canal de la Somme de St Valéry/S. à Abbeville : 23 le 26 Fev. et 13 le 2 Mars

L'étoile-Long le Catelet : 14 le 14 Janv.

Fontaine/S. : 2 le 16 Fev.; Yzeux : 2 le 1 Mars, 1 le 11; Belloy/S. : 1 le 7 Mars;

La Chaussée-Tirancourt : 2 les 5 et 6 Mars, 4 le 12, 1 les 11 et 28 Juillet, 1 le

30 Oct.; St Sauveur : 7 les 1 et 6 Mars, 5 le 11, 6 le 21, 11 le 24 Oct. 4 le 16

Nov., 2 le 22; Amiens (MBdM) : 4 le 10 Janv., 2 ensuite; (étang St Pierre) : 1 le

14 Nov.; (Hortillonages) : 2 en Fev. et Mars, 6 de fin Juil. à fin Oct., 4 en Dec.

Camon : 1 en Oct.; Daours : 1 le 7 Sept.; Sailly-Laurette : 1 le 24 Oct.;

Hem-Monacu : 2 le 22 Nov.; Feuillières : 2 le 9 Fev., 2 les 24 Oct, 22 Nov. et 28

Dec.; Cléry/S. : 26 le 9 Fev.; Péronne : 6 le 9 Fev., 28 le 24 Oct., 20 le 22 Nov.

18 le 28 Dec.; Brie : 3 le 8 Mai, 5 le 22 Nov.; St Christ-Briost : 16 le 24 Oct.,

9 le 22 Nov.; Estrées-Mons : 9 le 24 Oct., 10 le 22 Nov., 6 le 20 Dec. et 10 le 28

Fouencamps : 1 le 13 Avril et 2 le 9 Nov.

Vallée des Evoissons : 2 le 1 Janv.; 1 le 20; 4 le 9 Fev., 2 le 22 Mars, 16 le

18 Oct., 7 le 21 Nov., 5 le 27 et 17 en Dec.

Notons pour la Somme les forts stationnements sur le littoral (tableau)

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

Boismont; N/M 33 : 30 : 50 : 50 : 52 : 51 : 6 : 6 : 8 : 26 : 79 : 48 :

H.A. : 37 : 58 : 40 : 20 : 37 : 133 : ? : 110 : 121 : 105 : 106 : 24 :

et en Haute Vallée de la Somme : 34 le 9 Fev., 55 le 24 Oct., 48 le 22 Nov., 30 le

28 Dec. alors qu'ailleurs dans le département les stationnements sont faibles et

irréguliers. Aussi, 41 le 15 Fev. en vallée de Bresles entre Gamaches et Mers.

Aisne : Beautor, 1 ad. 4 im. le 11 Janv., 1 ad. 2 im. du 11 Fev. au 4 Mars, 1

du 10 au 25 Mars, 2 le 12 Mai, 1 le 21 Juin

PeA : 1 le 21 Juin, 2 le 12 Octobre.

Oise : Nicheurs à Comelles (1 c./8p.), Chantilly (1 c./6j.), Mortefontaine (1 c./

1 p; importants stationnements esyivaux, 10-15 c. nicheurs possibles, population

introduite), L.S.M. : 1 c.; P.M. (1 c./3j.), V.H. (1 c./5p.). 2 le 20 Juin et le

15 Août à Morlincourt, des stationnements estivaux en 4 localités de la vallée du

Thérain, sans reproduction.

Les stationnements hivernaux sont importants comparés à la faiblesse des effectifs

en période estivale ce qui montre l'apport d'une pop. hivernante étrangère.

Comelles, 10 en Janv., 8 en Oct., L.S.M.: 10 en Nov., 16 en Dec., P.M.: 31 le 15

Mai, 18 en Oct.-Nov., 34 en Dec., V.H.: 11 en Janv., 12 en Oct., 17 en Nov.

CYGNE SAUVAGE *Cygnus cygnus*

2 le 5 Janv. à Chamouille (02) (Y. CORBEAU).

1 le 16 Fev. à Belloy/S., présent jusqu'au 11 Mars (probablement blessé, il présente une déviation du cou visible au vol).

CYGNE DE BEWICK *Cygnus columbarius bewickii*

2 ad. 2 im. du 7 Dec. 85 au 11 Janv. 86 et 3 ad. 3 im. du 17 Fev. au 23 Mars à  
Beautor (02) (Y. CORBEAU).

3 du 26 Janv. au 5 Fev. à Boismont, probablement les mêmes les 24 et 26 Fev. sur  
le canal de la Somme entre St Valéry/Somme et Abbeville (L. GAVORY). Encore 3

le 5 Mars à Boismont. (f0)

2 les 8 et 9 Fev. en B.S. (X. COMMECY et C. VIEZ), puis 3 du 22 Fev. au 11 Mars  
(F. SUEUR).

OIE DES MOISSONS Anser fabalis

RBdS-POM:

200 le 7 Janv., 300 le 6 Fev., 460 le 21.

environ 50 posées près de Belloy/Somme le 25 Dec.(80) (C. VIEZ).

70 le 8 Oct. et 26 le 17 Nov. à Beautor(02)

OIE RIEUSE Anser albifrons

RBdS-POM:

2 à 3 toute l'année mis à part 6 le 21 Fev.

OIE CENDREE Anser anser

RBdS-POM: passages importants dès le 20 Fev., 780 N.E. le 25, gros passages le 26, 901 N.E. en 6h30 le 27.

12 le 9 Mars, 7 le 17 Mai; une petite dizaine estive.

280 le 18 Oct., +2400 en 2h. le 19

45 le 3 Nov., 123 le 16, 40 le 23; 5 le 7 Dec.

Noyelles/mer: 4 les 12 et 13 Avril, St Valéry/S/: 280 S.W. le 19 Oct.,

H.A.: 1 le 15 Fev., 50 N. le 26, 120 le 2 Mars, 50 le 8, 30 le 22.62 S. le 15 Nov.

Cayeux/mer: 252 N. le 26 Fev., 870 S.W. le 19 Oct., 110 le 7 Dec.

Ault: 15 N. le 24 Fev. Port le grand: 40 le 2 Mars

Long le catelet: 3 le 13 Mars, 15 le 5 Oct., St Sauveur: 1 le 27 Mars,

Famechon: 1 le 22 Mars, 165 le 27 Nov.; Amiens: 40 le 3 Dec.

OISE: 1 donnée de passage pré-nuptial, 30 N. le 6 Mars à Beauvais

2 en automne, 33 S. le 7 Dec. à M.P. et 80 S. le 21 à Vaudrampont

5 données d'Oies sp., 40 le 12 et 97 le 19 Oct., 50 le 3, 100 le 27 Nov, et 93 le

6 Dec. L'essentiel des observations (toutes?) doivent se rapporter à cette espèce

OIE D'EGYPTE Alopochen aegyptiacus

1 le 12 Mai à Vecquemont(80) (X. COMMECY et L. GAVORY),

2 le 22 Juin à Boismont(80) (A. CHANTRIEUX et F. MEYER).

BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis

POM: 1 du 12 Avril au 28 Juin.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla

POM, 1 à 2 toute l'année

BdS, 66 le 8 Avril, 1 le 30 Oct., 7 le 2 Nov., 3 le 30 Dec.

H.A.: 1 le 20 Avril, 2 le 25 Sept.

Cayeux/mer, 7 le 27 Sept., 3/1h,30 S. le 25 Oct., 1 le 22 Nov., 10 dont 8 S.W. le

7 Dec., 1 le 22. Ault: 1 N. le 1 Mai.

1 posée à L.S.M.(60) le 7 Dec. (A. ROUGE); espèce toujours rare en terres.

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna

; J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D

BdS/POM 3560 : 365 : 1132 : 987 : 742 : 750 : 977 : 47 : 1015 : 2223 : 2005 : 20

3700 : 3075 : 1905 : 1300 : 871 : 857 : 247 : 10 : 1900 : 3200 : (540) : 13

ax./dec. 3047 : 1655 : 1033 : 581 : 736 : 1405 : 164 : 35 : 2250 : 3000 : 2533 : 42

BdA: 60 le 23 Juin; Rue: 2 c. le 17 Mai;

Le Crotoy: 90 le 26 Fev., 25 le 9 Mars, 20 le 20 Avril, 5 c. le 17 Mai, 2 c./8

9 pulli le 3 Juin.

Noyelles/mer-Boismont: 13 le 24 Janv., 2 le 26 Fev., 12 le 9 Mars, 1 c. le 21,

2 C. le 20 Avril, 1 le 3 Mai, 4 le 25, 4 le 19 Juin.

H.A.: 1 le 5 Janv., 2 le 25, 11 &amp; 2 c.) le 9 Mars, 10 c. le 21, 19 le 7 Avril, 3

19 Mai, 26 +1F./10 p. le 19 Juin, 2 N. le 11 Oct., 1 du 15 au 22 Nov., 9 N. le

Décembre. Cayeux/mer: 55 S. le 9 Dec., 6 N. le 23.

A l'intérieur des terres :

Aisne: Aulnois/Laon, 6 (2c.) le 13 Avril, 16 pulli, 1c./10 juv., 1c. le 29 Juin

10 et 16 juv. le 5 Août, 2 et 13 juv. le 16.

Beautor, 6 le 11 Janv.

Oise: 2 sites ont accueilli 1 c. en période de reproduction sans qu'une nidif.

ait pu être prouvée : P.M., noté régulièrement du 16 au 27 Avril et les 9, 15 et

22 Mai. Berneuil/Aisne, 2 le 17 Mai, Egalement 1 le 11 Juin à Wallu.

Somme: 8 le 6 Janv. à Amiens; Hortillonages, 2 le 16 Fev., 1 le 26 et les 2 et 10 Mars, 1 M. du 9 au 14 Avril (La Hotoie).  
2 le 25 Mars à St Sauveur, 1 le 5 Mai à Long, 1 le 19 Mai à D-B., 2 le 19 Dec. à Famechon. Péronne, 16 le 9 Fev, 15 le 23, 2 le 10 Mars, 1 le 28 Dec.  
Estrées-Mons, 3 c. cantonnés de fin Mars à fin Juin, 1 le 20 Dec., 2 le 28.

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
RBds/POM	461	650	311			94	161	141	200	300	320	336
	385	303	220	Nicheurs	130	127	260	280	340	320	307	
Max./dec.	392	275	83			151	122	140	280	294	234	300

Ailleurs, Aisne, souvent en petit nombre mis à part, 500 le 26 Fev. à Vendeuil, 100 le 16 Août à Bucy le Long, S.N.B., 5 le 16 Août, 80 le 12 Oct., 15 le 9 Nov., 35 le 21 Dec.; PeA, 40 le 13 Avril, 160 le 16 Août, 50 le 12 Oct., 300 le 15 Nov. min. 1060 le 21 Dec.

Oise, a noter parmi de nombreuses données de petits groupes, 50 le 11 Oct? à Chevières, 75 le 12 Oct. à Commelles, L'Epine/Mortefontaine, 600 le 11 Janv., 550 les 3 et 11 Oct., 1200 le 13 Nov. (ce site peu chassé accueille les stationnements les plus importants du département); Etang St Pierre (F. de Comp.), 126 le 11 Janv., 93 le 17 Fev., 116 le 26 Oct., 80 le 23 Nov.; Pierrefonds, 136 le 20 Janv.... Les stationnements sur les gravières de la vallée de l'Oise sont irréguliers et concernent généralement peu d'individus.

Somme: Amiens (MBdM) 20 le 25 Janv., 25 le 15 Fev., 14 le 16 Mars, 6 le 2 Avril, 16 le 11 Nov.. Vallée des Evoissons, 200 le 18 Oct., Frise, 40 le 13 Janv., Cléry/S., 31 le 13 Janv. D le 28 Sept., Péronne, 140 le 13 Janv., 180 le 9 Fev., 200 le 3 Sept., 150 le 24 Oct., 50 le 22 Nov., 250 le 28 Dec.; Estrées-Mons, 16 le 13 Janv., 50 le 12 Oct....

Nidification: dans la Somme, pour 22 familles dont le nombre de pulli a été relevé, 198 sont comptés soit 9p./c. (à noter, 1 famille de 16, 2 de 14...) dans l'Oise, pour 24 familles, 133 p. soit 5,5 p./c. La différence entre nos 2 départements est étonnante et demande à être vérifiée. Le max. des éclosions s'est fait entre le 10 et le 20 Mai.

SARCELLE D'HIVER Anas crecca

Somme:

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Bds/POM	126	153	45	35	2	6	7	200	425	422	282	198
H.A.	7	30	57	2	0	0	0	0	17	8	18	7

Notée dans 14 localités essentiellement en Mars, 9 obs. (4 première moitié du mois 5 deuxième moitié) et en Avril, 8 obs. (5 et 3), toujours en petit nombre mis à part 45 le 21 Mars et 34 le 20 Avril à Noyelles/mer-Boismont. 2 le 25 Mai dans cette dernière localité.

Migration de descente, quelques données dans la deuxième moitié d'Août (+ 6 le 7 Août à Ham) et en Sept.; plus rare en Oct. et fin du passage début Nov. (30 le 7 à Camon). Quelques données hivernales: -10 en Janv.-Fev. à Amiens, +10 en Janv., Fev. Nov. et Dec. en H.V.S.

Situation assez semblable dans l'Aisne où le début du passage de printemps est noté dès le 22 Fev.: 65 à Beautor où des stationnements sont aussi notés en Oct. 35 le 19 et Nov. 38 le 6. Peu d'hivernage, mis à part 40 le 2 Fev. à Beautor et 30 le 21 Dec. au PeA. Observée dans 6 localités.

Oise: Nidification, certaine à Wallu, possible à Pierrefonds (1 c. le 11 Juin). Stationnements, Chevières, 100 le 11 Oct., 20 le 8 Nov., 25 le 16 Mars à Coyolle. Ailleurs les groupes sont de petite taille, 3 données de Janvier, 5 de Mars, Retour début Août (1 le 3 à Sacy), peu de données en automne. et hiver.

CANARD CHIPEAU Anas strepera

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
RBds/POM	18	13	24	12	4	11	0	2	30	16	36	35
H.A.	4	5	2	2	21	14	4	5	1	0	7	16
	15	N.,	11	le	Dec.	(Max. mens.)	Rue (80),	2	le	17	Mai.	

Somme: petit hivernage en H.V.S. d'une dizaine d'oiseaux jusqu'en Fev., et à parti; de fin Nov.? Passages de Mars(3 données) qui se termine début Avril, 2 le 4 à Régnières-Ecluses. 3 le 3 Mai à Noyelles/mer.

Oise: 6 données pour 34 oiseaux; noté jusque fin Mars puis à partir de fin Nov. Max.: 11M. 9F. le 22 Dec. à P.M.

Aisne: 2 le 28 Mars à Beautor, 10 le 13 Avril au PeA et 1 le 21 Dec.

CANARD SIFFLEUR Anas penelope

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
RBdS/POM	193	140	91	5	0	0	1	3	40	135	80	50

H.A., -de 10 toute l'année mis à part le passage d'automne qui est noté : 30 le 29 Sept., 28 le 10 Oct., 33 les 11 et 14, 6 le 26, 5 le 3 Mars en BdA.

En terres, la mig. de printemps est nette avec: 9 données de Mars et 8 d'Avril, max: 16 le 13 Mars à Troissereux(60), 12 le 21 à Beautor(02), 6 le 23 à Picquigny(80). automne, 3 le 8 Nov., 2 le 16 à Pontpoint(60).

Hivernage réduit, 10 le 24 Fev. sur le canal de la Somme à Boismont, 4 le 20 Dec. à Estrées-Mpns(80), 1 le 21 au PeA(02), 2 le 23 à L.S.M.(60).

Migrateurs actifs à Cayeux/mer: 24(S.) le 3 Fev., 1(S.) le 25 Oct., 9 6 le 22 Nov., 5 le 23.

CANARD PILET Anas acuta

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
RBdS/POM	820	640	350	17	4	1	0	6	85	255	450	460

H.A.: 1 les 13 et 20 Avril, 25 et 27 Sept., 11 Oct. et 23 Dec. Rue: 1 le 17 Mai. Canal de la Somme, 2 le 26 Fev. (St Val/S. à Abbeville) 1 les 23 Fev. et 12 Mars à Péronne, 2 le 18 à Bray/Somme. 1 le 16 Août à Estrées-M

Aisne: 1 le 4 Mars à Beautor, 2 le 13 Avril à Aulnois/Laon.

Oise: 1 M. le 28 Sept. à Monneville/La villette

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

+I/2 des données viennent de la P.M.P. pour la Somme. L'essentiel de ces données (7) est situé entre le 21 Mars et la mi-Mai; max. compté, 41.1 le 20 Juin à Roye. Aisne: 2 le 13 Avril à Aulnois/Laon, 2 le 19 Mai à Beautor, 3 le 16 Août au PeA Oise: 3 données de passage et aucune trace de nid; 15 Mars à V.H., 21 à M.P. (1 M. les 2 fois), 4 le 3 Août à Vauciennes.

CANARD SOUCHET Anas clypeata

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
RBdS/POM	4	2	19	47	11	13	10	38	146	80	43	15

1c. nicheur à Vauciennes, 1F./8 p. le 3 Août. prem. certitude depuis 10 ans. Situation semblable pour les 3 départements en terres.

Mig. de printemps: Mars, 2 dec. 4 groupes Moyenne 2,7 oiseaux

	3 dec.	7
Avril	1 dec.	9
	2 dec.	14
	3 dec.	5
Mai	1 dec.	5
	2 dec.	2
	3 dec.	2

1 M. le 20 Juin à Roye(80)

Mig. d'automne : Juil, 1 donnée de fin de mois, Août, 1 donnée de début de mois 5 de milieu (max.30), 3 de fin(max.38); 2 données ensuite, 1 de début et 1 de fin Sept.

Hivernage, faible; 1 donnée de Janvier, 3 de Fev.(dont 3 le 26 canal de la Somme) 1 d'Oct., 1 de Nov., 5 de Dec.(max., 14 le 20 Dec. à Estrées-Mons(80).

Migrateurs actifs à Cayeux/mer, 10 le 22 Nov., 5 le 7 Dec.

NETTE ROUSSE Netta rufina

1 F. les 12 et 29 Sept., et le 14 Oct. au H.A., 1 M. du 5 au 30 Nov. 1 M. le 15 Nov. au PeA(02); 1 M. le 22 Dec. à Pontoise/Noyon(60); 1 M. le 28 Dec. à Péronne(80).

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
RBdS/POM :	5	78	4	2	1	0	1	0	8	37	28	32
H.A.	177	56	94	59	5	4	2	0	16	60	130	143

Aisne: Hivernage à SNB(36 le 27 Janv. et 105 le 9 Nov.) et au PeA(640 le 21 Dec.)  
4 le 22 Fev. et 16 le 6 Mars à Beautor; 3 autres obs. en Mars-Avril sur des bassin  
de décantation (Max. 4 oiseaux). 1 le 21 Juin à Bucy le Long.  
Retour: 4 le 16 Août à Bucy le Long et 16 au PeA; 170 le 12 Oct. à SNB, 600 le 15  
Nov. au PeA.

Oise: Nidification: Pas de preuve certaine en 86 (contrairement à 85 où elle avait  
été prouvée à Sacy) mais quelques estivages sont observés sur plusieurs sites;  
Bresles, 6 M. le 19 Mai, 4 c. le 5 Juin, 18 le oiseaux le 3 Août  
V.H.: 2 M. le 23 Mai P.M.: 1 M. les 18 Mai et 5 Juin, 1 c. le 16 Juillet  
L'Epine/Mortefontaine: 1 c. en Avril.

#### Stationnements:

Vallée de l'Oise: L.S.M.: 10 en J., 5 en F., Mars, 100, 200, 30, Nov. 20, Dec. 20  
P.M.: 35 en J., 11 en F., 13 en M., estivage, 1 en A. et S., 14 en O., 59 le 8 Nov.  
6 en Dec.

B.P.: 15 en J., 5 en O., 158 en N., 64 en Dec.

V.H.: 12 en Mars, 242 en O., 550 en N. et 390 en Dec.

Un recensement de ces 4 sites le 7 Dec. donne un total de 466 (A. ROUGE).

Autres sites, Wallu, -5 toute l'année mis à part 25 en Mars

Mig. de printemps, 4 obs. de Mars, Avril,

13 le 31 Août à Vauciennes et 4 le 7 Sept.

Mig. d'automne: Oct., 2 obs. dont 89 le 3 à Mortefontaine et 250 le 30 Nov.

Somme: Hivernage: 25 le 24 Fev. canal de la Somme (St Val/S. à Abbeville)

Assez important en HVS, 60 en Fev., 150 en Dec.; occasionnel

(1 obs. de Janv. et 1 de Dec.) en vallée des Evoissons.

Migration de printemps, 8 obs. de Mars-Avril hors sites d'hivernage, essentielle-  
ment sur les gravières (Max., 13 le 21 Mars à St Sauveur). L'hivernage se termine  
mi Avril en HVS (32 le 13 à Estrées-Mons).

1 le 16 Août à Estrées-Mons.

Automne, Régnières-Ecluse : 7 le 25 Sept., 28 le 19 Oct., 53 le 9 Nov., 87 le 22  
et 11 le 13 Dec.

#### FULIGULE MORILLON Aythya fuligula

Aisne: Mig. de printemps, 6 obs. de Mars-Avril, toujours -5 oiseaux mis à part  
150 le 23 Avril au PeA.

1 le 21 Juin à Bucy le Long, 1 M. le 21 Juin et 2 le 16 Août au PeA

Retour, en Nov., 2 le 9 à SNB, 100 le 15 au PeA

Hivernage, 10 le 4 Dec. au PeA et 44 le 21.

Oise: Hivernage régulier en petit nombre sur les gravières, LSM, BP, toujours - de  
10 oiseaux, PM, 38 les 16 et 17 Janv., 39 le 31, 5 le 7 Dec. Ailleurs, occasionnel  
3 obs. de Janv. et Dec; (max. 8 le 11 Janv. à Chantilly).

Mig. de printemps, 10 en Mars à LSM.,

2 le 23 Mai à Couloisy, 1 F. le 3 Août à Bresles, 1 en Sept. à PM

Mig. d'automne, 10 en Nov. à LSM, 7 à PM... (3 autres obs. de ce mois).

Somme: Hivernage, relictuel en HVS (env. 20 à Péronne), sur le canal de la Somme  
(90 le 24 Fev.) ou en mer (1 les 15 et 26 Fev. à Cayeux/mer, 10 le 2 au Hourdel),  
occasionnel ailleurs (2 obs.)

Mig. de printemps: 8 obs. de Mars et 2 d'Avril hors sites d'hivernage, toujours en  
petit nombre

Retour, 4 le 3 Sept. à Péronne, .. 2 le 19 Oct. à Régnières Ecluse...

Mig. d'automne peu marquée, 2 obs. hors sites d'hivernage.

#### Hybride FULIGULE MILOUIN X FULIGULE MORILLON Aythya ferina X Aythya fuligula

1 M. les 12 et 13 Avril au H.A. (C. BECKER).

#### FULIGULE MILOUINAN Aythya marila

1 seule donnée de l'Oise, en dehors de toute période de froid, 1 F. le 26 Nov.  
à PM (D. DELVILLE).

1 F. le 15 Fev. en vallée de Bresles (80)

80 (dont 20 M.) en mer le 16 Fev. à Cayeux/mer (X. COMMECY et L. GAVORY).

H.A.: 4 le 8 Mars, 5 M. 6 F. le 4 Avril, 4 M, 15 F. le 7

2 F. le 15 Nov., 1 F. les 16 Nov. et 9 Dec., 2 F. le 23 Dec.

MORILLON: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :  
 RBdS/POM 5 : 12 : 3 : 3 : 1 : 3 : 1 : 1 : 2 : 2 : 1 : 2 :  
 H.A. 41, 61, 69, 30, 0, 5, 0, 0, 10, 36, 92, 80.

EIDER À DUVET Somateria mollissima

Uniquement observé en mer; max.: 40 le 9 Fev., autres obs. en Sept., Nov., Dec.  
 (toujours - de 10). 22 en mig. N. le 9 Mars en BdA

MACREUSE NOIRE Melanitta nigra

Uniquement sur le littoral. En mer, max. mens.: 200 en Mars, 500 en Avril, 150 en Juin, 20 en Oct., 10 en Nov., 250 en Dec. Meilleurs sites d'obs. : Cayeux/mer et Quend-plage.

POM: 1 F. le 12 Avril H.A.: 1c. le 13 Avril et 1 F. le 5 Nov.

HARELDE DE MIQUELON Clangula hyemalis

1 F. juv. le 3 Janv. au H.A. (G. FLOHART), 1 le 18 au POM (C. VIEZ).  
 1 F. les 15 et 26 à Cayeux/mer, 1 trouvé mort ce dernier jour (X, COMMECY et al.  
 5 données bien groupées dans le temps!

GARROT À OËIL D'OR Bucephala clangula

Aisne: PeA, 1M. 2F. le 13 Avril, 4 le 15 Nov., 1 M. le 21 Dec.  
Oise: Quelques rares hivernants, en Janv., 1 M. le 16 à Trosly-Breuil, 1 F. le 31 à PM

Les données de début Mars suivent de près une vague de froid, 3 le 8 et 2 le 9 à LSM, 1 F. le 27 à PM

suite de la remontée en Avril: 1 le 5 à LSM

Retour, 1 F. les 16 et 26 Nov. à PM

Somme: POM

Le Crotoy: 5 le 26 Janv., 4 le 9 Fev., 2 le 16, 7 le 26, 13 le 2 Mars, 1 le 9, 2 le 4 Avril, 3 les 6 et 27 Dec.

H.A.: 1 le 9 Fev., 2 le 26; 3 le 2 Mars, 1 le 15 Nov., 1 le 23 Dec.

Vallée de Somme: 19 Fev. sur le canal (St Val à Abbeville), 22 le 2 Mars

2 les 6 et 7 Mars à St Sauveur, 3 le 11 à Picquigny, 1 le 19 Fev. à Amiens.

Vallée de Bresle, 2 le 15 Fev.

Les statuts sont donc bien semblables dans les 3 départements.

HARLE PIETTE Mergus albellus

Aisne: 3M. 2F. le 26 Fev. à Vendeuil, 12 le 10 Mars; 2M. 5F. le 6 Mars à Beautor  
 1 F. le 21 Dec. au PeA

Oise: Noté uniquement suite à la vague de froid.

Fev.: 1 le 12 à LSM; Mars: 13 le 8 et 12 le 9 à LSM, 2 le 11

Somme: Le Crotoy, 4F. le 9 Fev., 1 le 16, 2M. 2F. le 26, 1F. le 2 Mars

H.A.: 2 le 26 Fev., 19 le 2 Mars, 1 le 4 Avril, 1F. le 23 Dec.

Cayeux/mer; 10 le 24 Fev.

POM: 3 le 9 Fev.

Canal de la Somme: 1 M. le 24 Fev., 2M. le 2 Mars; Long: 1F. le 16 Fev.

2M. 2F. le 12 Mars à Cléry/S/ et 1M. les 11 et 12 Mars à La Chaussée-Wirancourt.

4 le 26 Janv. à Régnières-Ecluse.

HARLE HUPPE Mergus serrator

Toujours rare en terres : 3 le 10 Mars à Vendeuil (02, Y. CORBEAU)

1M. 1F. le 1 Avril à St Sauveur (80, L. GAVORY), 1 F. le 9 Nov. à 80ves (80, P. ROY)  
 Sur le littoral, migrations toujours nettes

H.A.: 1 les 26 Fev. et 21 Mars et 4 Avril. 1F. du 22 Nov. au 23 Dec.

1M. 1F. le 26 Fev. et 2M. 1F. le 9 Mars au Crotoy, 3 le 9 Mars à St Valéry/Somme

Cayeux/mer: 5 le 16 Fev., 17 (dont 15 S.) le 24, 43 le 26, 17 N./1h, le 4 Avril

5 le 22 Nov., 1 le 13 Dec.

BdA: 1M. le 9 Mars

BdS-POM: 3 le 15 Mars, 12 le 8 Avril, 1F. le 3 Mai, 2F. le 10 Nov., 4 le 15, 2 le 9 Dec., 32 le 30

HARLE BIEVRE Mergus merganser

Aisne: 3M. 6F. le 3 Mars à Beautor; 1M. 1F. le 10 à Vendeuil

Oise: installation d'un petit groupe d'hivernants à MP en Janv., 2 le 3, 3 le 9, 5 le 16, 6 les 17 et 31. Curieusement, pas observé suite à la vague de froid fin Février.  
 1F. le 8 Nov. à MP

Somme: POM: 2 le 18 Janv., 1F. les 8 et 22 Fev., 1F. les 10 et 15 Nov., 1M. 4F. le 20 Dec.  
 H.A.: 7 le 2 Mars St Val/S/7 le 2 Mars

8 obs. en vallée de Somme fin Fev. début Mars (4 oiseaux en 7 localités, 16 M.)

BUSE VARIABLE Buteo buteo

## Nidification :

Aisne: l'espèce y semble florissante et les observations sont nombreuses et régulières; 2 aires début Avril dont 1 dans une haie (St Algis), 2 c. à Maucourt, 3 c. à Sissonne...

Oise: Nidif. certaine ou probable dans 11 localités dont 8 se situent dans ou à proximité des grandes forêts domaniales, Ailleurs, Sacy le grand, Breuil le vert, Thiescourt.

Somme: Quelques signes d'installation dans de nouveaux secteurs

-essentiellement en P.M.P., Grand Lavier, Pont Rémy, Saigneville, Villers/Authie.

confirmation de couples reproducteurs dans la vallée de Somme, Bouchon (4 j. le 25 Mai, Long; les autres secteurs traditionnels étant toujours occupés. 3 c. en forêt de Luchaux, 1 c. à Barly, 1 c. à Neuville (secteurs habituellement peu visités.

## Migration :

Quelques observations hors sites de nidif. et d'hivernage (Camon le 2, Villers Bretonneux le 8) en Mars et 1 le 18 Sept. à Moreuil, retour sur le littoral Nord à la fin du mois pour la Somme,

Dans l'Aisne, partage plus difficile à faire : 2 phases claires le 2 Dec. à Deuillet...

## Hivernage :

Dans la Somme, quelques unes hivernant dans les bosquets et vallées sèches du plateau, ce qui est nouveau : Beaucourt en Santerre (Janv.), Villers/Ailly (Janv.)... Assez nombreuses dans la P.M.P.: 10 localités d'obs. en Janv. Fev. G. FLOHART repère 4 oiseaux et estime à 10/30 KM<sup>2</sup> la population dans le Marquenterre fin Dec. Essentiellement près des sites de nidif. dans l'Oise.

BUSE PATTUE Buteo lagopus

Suite de l'hivernage au H.A., au moins jusqu'au 2 Fev. (X. COMMECY, L. GAVORY, L. LARRIEU et E. MERCIER).

1 le 25 Janv. à Flixecourt (rappel 1 le 15 Dec. 85 à L'ETOILE soit à moins de 10 Km) (E. MERCIER).

1 mig. en RBdS les 4 Oct., 25, 26 (juv.), et 8 Nov. (G. FLOHART et L. GAVORY).

EPERVIER D'EUROPE Accipiter nisus

## Nidification :

Oise, 1 c. certain à Thiescourt (A. PIQUEMAL), 1 c. le 30 Juil. en forêt de Comp. Somme, 21 sites en vallée de Bresles (4 nids en Picardie, les autres en Normandie) 2 nids en forêt de Crécy (visite rapide) (J.M. SANNIER), 1 juv. peu volant le 11 Août (G. FLOHART); 1 c. en forêt de Luchaux, 1 en vallée des Evoissons,

## Migration et hivernage :

Oise,	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
	2	4	1	0	0	0	1	0	0	7	7	4

Nb local/mois      Hors site nidif.      :      :      :      :      :

Le pic d'Oct.-Nov. (passage post-nuptial est net, l'hivernage plus faible,

Somme: 19 localités d'obs. en Janv., Fev. et Dec. : littoral, 6, vallées, 8, bois des plateaux, 5.

Présent toute l'année en vallée des Evoissons.

7 obs. de Mars (combien de nicheurs parmi eux?). 1 le 27 Juillet à Vignacourt (migrateur?). 6 localités d'obs. en Sept. hors lieux de nidif. connus, 6 en Oct. et 14 en Nov.

Recensement sur 30 KM du Marquenterre Nord fin Dec., 4 oiseaux observés, 10 estimés.

Aisne : peu de données.

AUTOUR DES PALOMBES Accipiter gentilis

Oise, 2 données dont 1 estivale.

-1 F. le 30 Juillet en F. de Comp. (E. CHALLET)

-1 M. le 30 Sept. en F. D'ERmenonville (C. GARNIER)

Le 30 Nov., en F. de Comp., un forestier observe un rapace dévorant un Pigeon sur une pelouse, probablement un Autour.

Somme, 2 migrateurs observés; 1 F. le 5 Sept. en P.O.M. (C. VIEZ)

1 F./Im. le Oct. à La Chaussée-Tirancourt (B. COUVREUR et L. GAVORY).

MILAN ROYAL *Milvus milvus*

3 données d'oiseaux en hiver : 1 le 6 Janv. à Amiens(P. ROYER), 1 le 11 aus étangs de Commelles(60)(N. LAWNISACK) et 1 le 12 Dec. à Thiescourt(60)(A. PICQUEMAL). La migration de printemps n'a pas été repérée.  
Mig. d'automne: dans la Somme, 2 le 25 Sept. au H.A.,  
RBdS, 1 mig. le 10 Août, 1 du 23 au 29, 1 du 13 au 29 Sept.(avec 3 les 20 et 21), 1 du 9 au 11 Nov.; 1 ce dernier jour à Neuville.

MILAN NOIR *Milvus migrans*Migration de printemps :

6 observations entre le 12 Avril et le 19 Mai- 3 dans l'Oise, 2/Somme, 1/Aisne.  
1 couple nicheur probable à Marchais-Liesse(02): observé en Juin et Juillet dont 2 ad. et 1 Im. de 1 an le 6 Juillet) (X. COMMECY, B. COUVREUR et L. GAVORY).  
1 le 23 Juin à Sissonne(02)

Migration d'automne :

1 le 16 Août à Mézières en Santerre(80), 2 le 20 Sept. au P.O.M., 1 le 4 Oct. à Vauciennes (60).

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla*

1 le 8 Mars à Vauciennes(J.P. BONNEL), observé en vol houspillé par 3 usages variables; s'éloigne en direction ENE.

BONDREE APIVORE *Pernis apivorus*

Premières, 2 le 23 Avril en forêt de Crécy(80), 1 le 4 Mai en F. de Comp.(60).

Nidification :

Quelques c. repérés dans l'Aisne (Chamouille, Sissonne...) et dans l'Oise (10 localités, surtout près des grands massifs(plusieurs c. en F. de Compiègne) et dans les secteurs bien boisés.  
Dans la Somme, 1 le 4 Juillet à Long, 2 le 19 à Loeuilly, 1 à La Chaussée-Tirancourt le 22, 4 obs. entre le 13 Juillet et le 27 (Dont 6 le 26) vallée des Evoissons. tous ces sites ont déjà fourni des contacts en été les années précédentes.  
3-4 c. en F. de Luchaux, transport de couvain le 18 Août à Villers/Authie.

Passage d'Août :

première 1/2 du mois, 2 données dont 4 en mouvement le 4 à Crécy en Somme, deuxième 1/2 du mois, 2 données de 2 oiseaux dans la Somme, notée aussi dans l'Oise.

Dernière :

1 le 1 Octobre à Froise/Rue (G. FLOHART).

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus*Hivernages exceptionnels :

poursuite de celui du H.A. repéré en Dec. 85, au moins jusqu'au 2 Fev.  
2 autres sur le littoral, au Nord: 1 F/Im. à Villers/Authie, 1 Im. le 8 Fev./POM.  
3 en vallée de Somme, 1 Im. les 13 Janv. et 3 Fev. à Cléry/Somme  
1 M. le 18 Janv. à Daours; 1 F.juv. le 10 Dec. La ChausséeT

Retours :

fin Mars, le 28 à Beautor(02) et surtout en Avril sur les lieux de nidif.  
2 mig. actifs repérés, 1 M. le 4 Avril à Noyelles/mer et 1 F. la 1 Mai à Quend(80)

Nicheurs, certains ou probables :

Aisne, Marchais-Liesse, Pierrepont (possible à Aulnoy/Laon)

Oise, possible à Pierrefonds et Sacy

Somme, Belloy/Somme, Blangy trionville, Boves, La Chaussée-Tirancourt, Frise, le Hamel, Nampont St Martin, Romaine(Ponthoile), Sailly le Bray, Villers/Authie  
Fin Juillet et en Août, dispersion des jeunes et ad., repérés sur les plateaux,  
4 données dans ces biotopes dans l'Oise et autant dans la Somme

Retour sur le littoral Nord fin Août ou 2-3 stationnent en Oct.

1 mig. actif le 14 Sept. à Luchaux (M.juv.)

Octobre : 1 juv. le 13 à Ville le Marcllet(80), 1 F. le 6 à Verneuil en Halatte(60)

1 M. ad le 2 Oct. à Neuville, en migration (80)

Novembre : 3 obs. sur le littoral dont 1 juv. le 30 à St Valery/Somme.

1 hivernant à Noyelles/mer, F./Im. le 27 Dec.

BUSARD SAINT MARTIN *Circus cyaneus*

Dortoirs: 80, 1c. le 10 Dec., 2M. 1F. le 31 à La Chaussée-Tirancourt, 1M. 2 Im. le 27Dec. en vallée des Evoissons, 2M. 1F. le 9 Nov., 3 F./Im. le 10 à Neuville



1F. le 9 Dec. à Hérissart; Vignacourt, 1F. le 9 Oct., 3F./Im. le 14, 2F. 1M. le 17, 3F. le 23, 1F. le 4 Nov., 2F. le 17, 3F./Im. le 19 Dec.

Somme: Contacts hors lieux de nidif. connus, migrateurs actifs exclus.

Nb localités:	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
P.M.P.	3	5	2	1	3						8	6
Vallée	8	5	4	3	3	NICHEURS				1	3	6
Plateaux	4	6	2	4	5	NICHEURS			3	7	6	7
Total	15	16	8	8	11				3	8	17	19
Nb oiseaux	19	21	8	8	16				3	8	20	23
Nb DE M.	5	10	5	2	4				0	2	4	6

Aisne : situation semble-t-il semblable à celle de la Somme mais moins bien appréciée par manque d'observateurs, 13 localités d'observations, 10 données de Janv., Fev., Dec.

Oise:

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Nb localités	3	3	2	2	4				1	1	5	4
Nb oiseaux	3	3	2	2	4				1	1	11	6
Nb M.	0	0	0	1	1				0	0	1	1

Nidification :

Aisne: possible à Aulnoy/Laon et Pont à Bucy

Somme: 5 c. certains, Berteaucourt les dames, 1c./3juv. (D. BLED), 1c./2juv. en vallée des Evoissons (B. COUVREUR), 1c./3juv. à Luchaux (G. FLOHART), 2c./1 et 3j. à Vignacourt (B. COUVREUR et L. GAVORY).

9 autres couples nicheurs probables ou possibles, Bettanwourt rivière, Boves, La Chaussée-Tirancourt, Fréchencourt, Lamotte-Warfusée, Lamotte-Brebière, Saint Aubin rivière, Ville le Marcllet, Thieulloy l'abbaye.

Non nicheur dans l'Oise?

BUSARD CENDRE Circus pygargus

4 c. nicheurs dans le nord de l'amiénois: La Chaussée-Tirancourt (mini 1 juv.), Flixecourt, St Vast en Chaussée, Vignacourt

1 c. possible à Sissonne (02), 1 c. cantonné en Mai, bois du Tillet, F. de Retz (60 en Août, 1 M. le 7 à St en Amiénois et 1 M. à Roye (80), 1 c. à Rully (60)

1 F. le 13 Sept. à Béthisy St Pierre,

BALBUZARD PECHEUR Pandion haliaetus

1 mig. N.E. le 9 Mai à Fort-Mahon, 1 Im, les 25 et 27 Juin au POM,

1 les 10 et 14 Juillet à La Chaussée-Tirancourt

Août, 1 mig. W. le 8 à Boves, 1 le 5 au POM, 1 le 25 en vallée des Evoissons (80)

1 le 29 au Pda (02)

Septembre, 1 mig. S. le 7 à Hailly le haut clocher, 1 le 8 en RBds, 1 le 15 à Cambron (80); 1 le 14 à l'Epine/Mortefontaine (60).

FAUCON PELERIN Falco peregrinus

1 M. le 4 Janv. à Ault/Bois de Cise (80) sur la même plate-forme qu'en Dec. 85 où l'on peut observer de nombreux restes de Pigeons (E. MERCIER).

Le passage de printemps n'est pas noté mais plusieurs obs. estivales :

1 Im. les 19 Mai et 30 Juin au POM, 1 F. le 3 Juillet à Tupigny Vadancourt (02)

(J.C. TOMBAL) et 1 F. le 31 à St Vast en Chaussée (80) (B. COUVREUR).

Passage d'automne, 1 M. en RBds-POM les 10 et 20 Sept,

Octobre, 1 M. les 1 et 12, 1 F.Im. de la sous-espèce calidus à partir du 25, 1 M. Im. le 28 sur le littoral nord, 1 F./Im. le 26 au Hourdel.

Novembre, 1 le 2, 1 M.Im. le 5, 1 F./Im. le 8, 1 F./Im. et 1 M. le 9, 1 F.Im. et 1 M.Im. le 16, en RBds.

1 les 1 et 10 Dec. puis 1 F./Im. les 23 et 30 en RBds-POM.

Oise, 1 recueilli blessé le 18 Nov. à Bailleul le sec, né en captivité le 17

Juin 86 au Danemark, réimplanté dans une aire naturelle et élevé par ses parents adoptifs "sauvages". Avait été tiré au fusil! le 16. Que dire?

FAUCON HOBREAU Falco subbuteo

Poursuite de l'hiernage exceptionnel (voir AVOCETTE 1986, 10(2-3-4)p.79-84)

Retour, 1 le 18 Mai à Boves, 1 le 19 à Villers/Authie (80)

1 le 25 Mai à St Quentin en Tourmont, 1 le 19 Juin au H.A.  
 Quelques données de Juillet-Août, nicheurs possibles ou probables :  
 en vallée des Evoissons, 24 et 27 Juil. (couple ce dernier jour); Vignacourt, 1  
 le 26 Juil., 1 les 4, 10 et 24 Août au POM (déjà les 24 et 26 Juin) puis le 1 Sept.  
 migrants?, 2 le 25 en BS, 1 le 10 à St Vast en Chaussée  
 2 migrants actifs le 17 en RBdS  
 Derniers en Oct., 1 ad. et 2 juv. le 2 à Neuville (nicheurs locaux?), 1 le 25  
 Octobre au POM. Seule la Somme a fourni des observations.

#### FAUCON EMERILLON Falco columbarius

1 hivernant en Janv. sur le littoral Nord; 1 les 26 et 27 Fev. à Vendeuil(02)  
 1 le 21 Mars à Cayeux/mer, 1 M. le 30 à Moreuil(80)  
 Dernier, 1 M. début Avril à Crécy en Ponthieu.  
Retour, 2 le 27 Sept. en RBdS et 1 mig.S. à Cayeux/mer.  
 Oct.: 3 les 4 et 12 en RBdS, 2 le 3 au H.A.  
 2 obs. en terres, 1 F./Im. les 18 et 29 à La Chaussée-Tirancourt  
 1 à Le Verguler(02)  
 Nov.: 2 pendant le mois en RBdS(3 le 5), 1 F./Im. le 2 à Villers/Authie, 1 à  
 Mézières en Santerre(80) le 5  
 Dec.: 1 hivernant sur le littoral Nord.

#### FAUCON CRECERELLE Falco tinnunculus

Aisne : 23 localités d'observations et ceci malgré une très faible pression d'  
 observation; ceci laisse supposer que le Faucon crécerelle est bien représenté  
 dans ce département.

Oise : Des indices de reproduction sont obtenus dans 15 localités, en bordures  
 des grandes forêts, en vallées...  
 Données assez régulièrement réparties sur l'ensemble de l'année avec toutefois un  
 max. en Mars-Avril :

Nb local/mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Somme	: 27	: 19	: 16	: 15	: 16	: 7	: 11	: 11	: 21	: 25	: 33	: 3
Oise	: 5	: 3	: 9	: 9	: 7	: 0	: 2	: 2	: 2	: 4	: 5	: 3

Sur 30 Km<sup>2</sup> dans le Marquenterre Nord, G. FLOHART repère 15 individus et estime la  
 population à 20. en fin Décembre.

Nicheurs certains aux falaises de Ault(Bois de Cise), Camon, St Vast en Chaussée.  
 Dispersion des jeunes observable à la mi-Août (Boves, Thézy-Glimont...).

#### PERDRIX ROUGE Alectoris rufa

2 le 19 Août au POM, suite à un lâcher de 11 oiseaux dans les dunes voisines  
 quelques jours auparavant.

#### PERDRIX GRISE Perdix perdix

#### CAILLE DES BLES Coturnix coturnix

Quelques données éparses.

Oise, cette espèce était donnée sur la quasi totalité des feuilles 1/50000 du  
 département dans l'Atlas national de YEATMAN(1970-1975); elle semble bien rare  
 désormais, une seule donnée : 1 chanteur en Mai à Noailles.

Aisne, 1 le 29 Juin à Liesse

Somme, 1 le 2 Mai à Villers/Authie, 1 le 23 à Courcelles au bois

reprise des chants fin Juillet (Berteaucourt, les Dames, Flixecourt, Vigna-  
 court). 1 le 3 Août à Vaux en Amiénois.

#### FAISAN DE COLCHIDE Phasianus colchicus

#### GRUE CENDREE Grus grus

La haute vallée de l'Oise (02) confirme être le limite Ouest du couloir habitué  
 de migration de l'espèce. A Beautor ont été repérés :

2 vols de 50 et 100 le 2 Nov., 10 posées le 9, 37 tentent de le faire le 23, tirée  
 elles s'enfuient...! 3 vols totalisant 700 le 27 (Y. CORBEAU et al.)

Ailleurs, les résultats sont plus sporadiques. Nous disposons cette année des  
 résultats de l'enquête très médiatisée qu'avait lancé le journal (le plus lu dans  
 les terriers) La Hulotte à l'automne. Ces données sont peut-être à prendre avec

es précautions, certaines ayant été faites par des observateurs occasionnels et es confusions avec des Oies ou des Laridés ne sont pas à exclure.

le 17 Oct. puis une troupe à Thiescourt(60)  
30 le 26 à Longpré les corps saints(80); 20 puis 100 le 31 à Fort-Mahon(80)  
00 le 2 Nov. à Boursonne(60), 30 le 4 0 Beauvais(02), 12 le 6 à Beauvais,  
passages nocturnes le 6 à Senlis (val d'Aunette)(60), 1 posée dans une clairière  
e la F. de Compiègne le 7, puis 40, 300 en 3 vols à Ham le 27 Nov.(80). toutes  
auf indication contraire sont en vol. (Nous remercions P. DEOM et C. RIOLS de  
ous avoir communiqué les résultats picards de cette enquête.) Rappelons que nous  
vons publié les résultats nationaux de cette migration des Grues à l'automne 86  
ans l'AVOCETTE D 87-11(2) p.I; le gros du passage a eu lieu dans la nuit du 2 au  
Novembre.

#### ALÉ D'EAU Rallus aquaticus

Bien représenté en hiver dans la vallée de la Somme et ses affluents.  
es râles d'eau se réfugient sur les bords des rivières en cas de gel des marais,  
pour 2 Km. à Fontaine/Somme le 16 Fev.  
lus discret en été; repéré à Dominois, La Chaussée-Tirancourt, St Christ-Briost.  
ise, 4 c. à Sacy le grand(1c./juv. le 11 Juin); 3 c. aux étangs de Commelles  
1 ad./1juv. le 17 Août. Pas de contacts en hiver en dehors de ces 2 sites.

#### AROUETTE POUSSIN Porzana parva

1 F. le 26 Mai à Dominois(80)(G. FLOHART)(Donné en cours d'homologation/CHN)

#### ALÉ DES GENETS Crex crex

Uniquement repéré à Beautor(02), premier le 9 Mai, 8 chanteurs le 26 Juin (Y.  
orbeau).

#### OULE D'EAU Gallinula chloropus

Quelques rassemblements en Février (gel) dans la Somme: 30 le 9 à Feuillières,  
3 dans la basse vallée de Bresles le 15, 40 le 16 le long de la Somme à Fontaine  
ur Somme, de même, 40 le 23 à Beautor(02).  
juv. le 17 Mai au POM... Nicheuse commune mais discrète et peu de rapports d'  
bservations ont été remis. Ont été comptés, 5 familles/1 pullus, 5/2, 4/3, 2/4  
oyenne pour 13 couples, 1,18 jeunes/couple.. Ces jeunes sont surtout observés en  
uin-Juillet.(estimation à 11 c. à Commelles(60)  
e nets passages ont été remarqués dans l'Oise,  
en Mars, 12 le 15 à V.H.

en Octobre-Novembre, 12 le 6 Oct. à V.H., 24 le 12 Oct. et 14 le 16 Nov. à Com-  
elles. A Vauciennes, 1 à 2 individus toute l'année sauf: 5 le 19 Avril, 8 le 31  
oût, 6 le 14 Sept. (site non favorable ensuite, début de la campagne sucrière).

#### OULQUE MACROULE Fulica atra

Stationnements importants en hiver, plusieurs centaines sur les grandes surface  
'eau libre, quelques dizaines sur de nombreux étangs et marais.

our les lieux régulièrement suivis :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
H.A.	330	199	94	110	150			880	380	375	557	350
AMIENS	15	9	15	3	2	2	5	11	6	7	5	
H.V.S.		180	170	30						650		250
GNIERES- ECLUSES	60	60	10							30	50	40

illeurs, PdA(02): 2000(Janv.), 345(Avr.), 235(Juin), 165(Août), 280(Oct.), 300  
(Nov.), 480(Dec.).

Vallée de Bresles, 387 le 15 Fev. entre Gamaches et Mers; 600 15 Oct. entr  
Sénarpont et Bouvaincourt.

ucy le Long(02)180(Août); S.N.B.(02):60(Août); Vendeuil(02):130(Fev.); Pernant(C  
00(Dec.); H.V.S.(80):430(Janv.), 290(Fev.), 230(Sept.), 270(Oct.), 350(Dec.).

O: V.H.:310(Oct.), 400(Nov.), 250(Dec.); L'Epine: 120(Oct.), 110(Nov.);

Commelles:115(Nov.).

e passage de Sept, est net dans l'Oise: Wallu, 10-30 toute l'année sauf 113 mi-  
ept, Vauciennes, -20 toute l'année, 112 le 31 Août, 100 les 7 et 14 Sept,

En hivernage, la vallée de l'Oise accueille des effectifs non négligeables, environ 1300 le 7 Dec. en 4 Sites. La vallée de l'Aisne semble elle moins accueillante 400 en Janv., 250 en Dec. (secteur Compiègne-Attichy).

Pendant le coup de froid de Février, une 100 sont répertoriés sur le canal de la Somme, entre St Valery et Abbeville(80).

Tous ces stationnements se dissolvent vers la mi-Mars pour les petits groupes (localisé aux petits étangs) et vers la mi-Avril pour les grandes troupes, mis à part le PdA où les stationnements estivaux restent importants, de même pour le H.A.(150 le 30 Mai par exemple).

#### Nidification :

Bien représentée en vallée de Somme et sur ses affluents et dans la vallée de l'Oise. Quelques relèves de réussites de couvées donnent :

1 famille d'1 pullus, 12 de 2, 10 de 3, 8 de 4, 2 de 5, 1 DE 6, Moyenne pour 34 couples, 3,02 p./c. Les éclosions se font essentiellement à partir de mi-Mai, le maximum étant de Juin à Août.

A noter, 15 à 20 c. à V.H., 15 c. à Comelles, 10 c. à Sacy le Grand...

HUITRIER PIE Haematopus ostralegus

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBds/POM : 3000 : 4100 : 2300 : 1173 : 725 : 791 : 1220 : 2300 : 2703 : 3000 : 3000 : 3000 :

Bda: 150 le 9 Mars

H.A.: 1 c. cantonné en Avril-Mai-Juin. 1 les 9 et 20 Sept. et 2 le 2 Nov.

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus

Pendant les phases de medoux hivernal, nous assistons au retour de l'espèce dans la Somme: 80 le 1 Janv. en vallée des Evoissons, 100 le 3 à Lamotte-Buloix puis, 120 le 31 Janv. et 220 le 2 Fév. en vallée des Evoissons.

Dans l'Oise, importants stationnements en Janv., 450 le 11 à V.H., 135 le 17 à Auchy le montagne, 350 le 20 à Javignies. Pas de stationnements en Fév.

Migration prénuptiale :

Très nette en Mars mais peu de données concernant des effectifs importants(+100) dans l'Oise et le Somme: 105 le 9 à Boismont.

Dans l'Aisne à Beautor, importants passages du 6 au 8, quelques milliers le 16, 400 à 500 le 19.

Nidification :

Oise, certaine à Mortefontaine, 15 c. nicheurs possibles(4 c. certains); en dehors de cette localité, 8 le 23 Mai à VH, 1 le 25 et 2 le 7 Juin à Vauciennes.

Somme: Pas de recensement exhaustif cette année, 5 c. à N/M, 2 c. en Bds(anse Bi-dard), 8 c. au marais de Rue, 8 à Salliy le Bray..

Aisne : nicheur à Beautor

Migration postnuptiale :

15 le 19 Juin à PM(60), espèce absente de ce site depuis fin Avril et dès fin Juin de grandes bandes sont notées : 130 le 24 à Beautor, 121 le 2 à Aulnois/Laon(02)

Juillet, premiers stationnements en plaine, 25 le 21 à Fergneux(60); 100 le 26 à Vauciennes, 30 les 14 et 28 Juillet en V. des Evoissons.

Août, 150 le 6 à Moreuil(80)...

Passages et stationnements automnaux:

Septembre, 200 le 14 à Crépy en Valois(60), 350 les 16 et 30 à Fergneux, 100 le 23 à Domart en Ponthieu(80), 1130 le 26 à Fergneux

Octobre, nombreuses observations de groupes de +100 oiseaux, 1400 le 30 en V.Evois. de même en Novembre, 1200 à Daours le 20... tant en Oise qu'en Somme.

Encore de gros stationnements en Décembre, 1400 le 13 dans le triangle Crécy en Ponthieu/ Auxi le Château(62)/ St Riquier(80), 1850 le 18 en V. des Evoissons, 1000 le 23 à PM(60)...

PLUVIER DORE Pluvialis apricaria

Rares données hivernales : 20 le 11 Janv. à Bayonvillers(80) et 21 le 25 à Conty

Migration prénuptiale : très nette en Mars; 58 le 8 à Frémontiers et 23 à Boves, 1 le 14 à Picquigny, 60 le 15 à Villers/Authie, 17 le 16 à St Sauveur, 100 le 21 à Boismont(80), 300 le 16 et 400 à 500 le 19 à Beautor(02) et 1 le 22 Mai à MP(60).

Migration postnuptiale: 8 le 14 Sept. et 16 le 26 à Crépy en Valois(60)  
1 le 12 Oct. à Frégneux(60), 4 obs. de Nov. (80 et 60)

Passages particulièrement nets en Décembre: 40 le 3 à Bellancourt(80), 182 secteurs de Crécy en Ponthieu le 13(80), 110 le 20 à Villers-Bretonneux(80) et 73 à Bayleux(60), 60 le 30 à Vauchelles les Quesnoy(80)...(10 obs. pour ce mois).

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBds/POM : 385 : 350 : 200 : 190 : 66 : 31 : 110 : 226 : 220 : 160 : 120 : 250 :

Quelques autres obs. sur le littoral, et 3 remarquables données en terres, de Oise; 1 le 7 Mai à MP(D. DELVILLE), 2 le 10 à Vauciennes(JP BONNEL) et 1 le 5 Juin à MP

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBds/POM : Premiers le : 8 : 50 : 300 : 200 : 30 : 696 : 1475 : 20 : Derniers :  
: 8 Mars : 100 : 10 : 985 : 120 : 30 : 1750 : 125 : 4 : 2 les 2 et  
: : 26 : 200 : 2000 : 25 : 60 : 1500 : 85 : 11 : 30 Novembre

BdA, 20 le 23 Juin; Le Crotoy, 10 le 1 Mai et 102 le 17; Boismont: 10 le 23 Juin  
H.A. : 2 le 9 Mars, 1 le 4 Avril, 50 le 30 Mai, 3 le 19 Juin, nidif. d'au moins 1

c. (suivi photographique de J.M. SANNIER), 4 le 20 Sept., 3 les 27 et 29.  
Cayeux/mer: 15 le 9 Octobre.

Bien noté aux 2 passages en terre:

2 le 27 Mars à MP, 1 le 7 Mai, 3 le 15, 6 le 14 Sept.; 5 le 17 Mai à Vauciennes,  
1 le 3 Août à LSM(60), 1 le 12 Mai à Vecquemont(80)

#### PETIT GRAVELOT Charadrius dubius

##### Migration de printemps :

Aisne: 3 le 13 Avril à Vailly/Aisne

Oise: 3 le 22 Mars à PM et 3 à VH, 1 le 27 à Bresles, 3 le 29 à Vauciennes.

4 sites d'obs. d'Avril, max.: 6 le 27 à PM, fin du passage en Mai: 12 le  
4 et 13 le 5 à PM

Somme: 1 le 13 Avril à Estrées-Mons, 3 autres obs. au cours de ce mois en terres

##### Nidification :

Aisne: 2 c. à Beautor(encore des juv. le 13 Août), 1 c. à Aulnois/Laon

Oise: Bresles, 3-4c; Chevrières, 1c.; Gouvieux, 1c.; LSM, 2-3c.; Vauciennes, 1-2c.

Somme: PMP, 4-5c.; Vallée: Dompierre-Becquincourt, 1c.; Moreuil, 1c.; Vecquemont  
Recensements incomplets dans l'ensemble, 18-22 c. repérés cette année en Picardie.

##### Migration d'automne: surtout nette en Août

Aisne: 5 le 16 Août à Aulnois/Laon, 3 à Villers en Prayères

Oise: 20 le 3 Août à Chevrières, Vauciennes, 28 le 3, 3 le 24, 6 le 31 puis, 8 le  
7 Sept., 15 le 14

Somme: 1 le 12 Juillet à Picquigny, Estrées-Mons: 4 le 7, 10 le 16 Août, 1 le 3  
Sept.; 2 le 12 Oct. (derniers pour la région).

Ham: 5 le 7 Août, Roye: 6 le 7, 5 le 16, 27 le 29 Août.

#### GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBdS/POM Premiers le 10 : 88 : 74 : 300 : 180 : 230 : 400 : derniers le 21 Oct  
BdA: 5 le 23 Juin, H.A.: 2 c. en Mai-Juin; 2 Mig.N./1h. le 4 Avril à Cayeux/mer.

#### TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres

: M : J : J : A : S : O : N : D :

RBdS/POM : 8 : 5 : 49 : 58 : 11 : Derniers mi Sept.  
Le Crotoy, 1 les 20 Avril et 17 Mai; H.A.: 1 le 30 Mai

Toujours rare en terres, 1 le 12 Mai à Vecquemont(80) (X. COMMECY et L. GAVORY)  
Vauciennes(60), 1 les 10 et 25 Mai(J.P. BONNEL) et 1 le 14 Sept.(G. et S. CAMBÉ  
NNAUX).

#### BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago

Quelques données hivernales: 6 le 2 Janv. à Beautor(02), à Amiens(80), 1 le 6,  
4 le 26, 1 le 6 Fev., 2 le 28; 2 le 9 Fev. au Crotoy(80) et 1 à Long(80); 8 le 28  
Dec. à Estrées-Mons(80).

##### Migration prénuptiale: nette de fin Mars à fin Avril,

50 le 19 Mars à Beautor, 10 le 14 à PM(60), 12 le 15 à VH(60), 1 le 28 à Troisser-  
reux, 1 les 10 et 27 Avril à PM

Nicheuse probable à Beautor(chevrottements le 8 Mai)(Y. CORBEAU)

##### Migration postnuptiale: de début Août

24 le 7 à Ham et 23 à Dompierre-Becquincourt(80), 18 le 13 à Beautor, 14 le 16 à  
Aulnois/Laon et 20 au PeA et 25 à Villers en Prayères et 40 à Bucy le Long(02)...  
à fin Sept., Vauciennes, 10 le 24 Août et 35 le 31, 30 les 7 et 14 Sept.

32 le 3 Sept. à Domp.-Becq., 20 Mig.S./2h.30 au HA(80) le 25 Oct., 30 le 11 à  
Chevrières, 50 le 14 à Vauciennes, 58 le 18 à Beautor...

5 le 2 Nov. à Chantilly, 4 le 8 à LSM(60), 10 mig.S./3h. en BdS, 40 le 22 à Abbe-  
ville(80)...

#### BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola

1 pendant la vague de froid le 16 Fev. à Long le Catelet(80),

Quelques rares obs. de printemps et d'automne, 1 le 13 Mars à Bray/Somme, 3 le 8 Nov. à Rue, 7 le 16 à St Pierre à Gouy(80) et en forêt de Compiègne(60)

#### Nidification :

Croûle le 5 Mai entre 17 h. et 21 h. T.U. en F. de St Gobain(02)(Y. CORBEAU)  
Nicheuse certaine en F. de Compiègne(1 chant le 13 Mai, 8 le 16, 5 le 2 Juillet dans un autre secteur...(D. MURE) et au Bois de Thiescourt: 1 couveuse découverte par A. PICQUEMAL.

#### COURLIS CENDRE Numenius arquata

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBds/POM: 950 : 1250 : 1000 : 600 : 23 : 230 : 535 : 800 : 620 : 745 : 890 : 900 :  
130 le 9 Mars en BdA, quelques autres obs. sur le littoral(Le Crotoy, HA max. 20 les 12 et 13 Avril...)

Jamais très noté à l'intérieur des terres dans la Somme où aucun couple ne niche: 35 le 9 Sept. à Hangest/Somme(B. Couvreur), 1 le 5 Oct. à Long le Catelet,

Aisne: Nicheur à Beautor, 2 le 8 Fev., 10 le 16 Mars, parades le 9 Mai(Y. CORBEAU)  
1 le 16 Août à Aulnois/Laon.

#### COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBds/POM: Peu du 12 Avril à mi-Juin : 520 : 80 : 1 : : : :  
Max. début Mai et mi-Juin

#### BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBds/POM: : : 1 : 20 : 10 : 16 : 56 : 47 : 5 : 1 : 1 : 1 :  
Boismont, 24 le 9 Mars, 130 le 16, 54 le 20 Avril; H.A.: 1 le 9 Mars, 4 le 21 et 1 le 25 Sept.

#### Al'intérieur des terres :

2 le 11 Mars à St Sauveur, 1 le 12 à Camon, 6 le 13 à St Sauveur, 6 le 14 à Picquigny, 4 le 16 à Amiens, 3 les 12 Mars et 2 Avril à Estrées-Mons(80); 1 le 16 Avril à PM(60). Remarquons le passage bien groupé de mi-Mars en Somme,

10 le 26 Juillet à Vauciennes(60), 3 du 18 au 27 à Beautor(02)

Août: 2 le 3 à Chevrières(60), 2 le 7 à Roye 6 à Dompierre-Becquincourt 5 à Estrée-Mons(80), Vauciennes: 13 le 3, 7 le 10, 6 le 24 et 1 le 31, 7 le 20 à Estrées-Mons  
1 à Aulnois/Laon/et 15 à Bucy le Long(02)

#### BARGE ROUSSE Limosa lapponica

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBds/POM: 2 : 5 : 17 : 105 : 49 : 14 : 14 : 72 : 5 : 1 : 1 : 1 :

Quelques unes sur les autres communes littorales fin Avril-début Mai(Max. 35 le 20)

#### CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus

Le 30

RBds/POM: : : 1 : 11 : 5 : 1 : 12 : 15 : 15 : 0 : 1 :

Littoral, 1 le 9 Mai à Fort-Mahon, 10 le 1 Mai au Crotoy, 1 le 19 Juin au H.A.

En terres: 80, 1 le 12 Mai à Vecquemont, 3 le 16 Août à Estrées-Mons

60, 3 le 22 Mars à PM; Mai, 1 le 7 à PM, 3 les 10 et 25 à Vauciennes

Août: 1 les 10 et 3 le 24 à Vauciennes, 1 le 14 Sept. et le 4 Oct.

#### CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBds/POM: 31 : 17 : 13 : 200 : 363 : 250 : 2500 : 700 : 136 : 20 : 5 : 11 :

Bien noté en d'autres localités du littoral, 17 obs. de 5 sites, Max. 9 le 21 Mars  
136 le 20 Avril, 87 le 1 Mai et 143 le 17, 15 le 11 Juin, 1 le 19 Août, 1 le 15 Nov

#### En terres: Migration de printemps

8 obs. de l'Aisne, 25 de l'Oise et 4 de la Somme; Max.: 9 le 21 Mars, 13 le 12 Avril, 6 le 15 Mai, 13 le 7 Juin à Vauciennes et 16 à Beautor(02)(le passage de mi-Juin est net dans les 3 départements,

Migration d'automne: bien moins marquée, 2 obs. dans l'Aisne, 4 en Oise et 4 Som  
Retour 16 le 7 Août, toutes les autres obs. concernant 1 à 3 oiseaux; dernier :  
2 le 14 Sept. à Vauciennes(60).

#### CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
RBdS/POM					28	8	34	45	6	2		

Migration de printemps:

Oise: 16 obs. du 14 Mars au 14 Juin, max. 10 le 10 Mai à Vauciennes(-10 autres)

Somme: 6 obs. de fin Avril-début Mai(2 en terres), max. 8 le 20

1 le 12 Juillet à Pimprez(60)

Migration d'automne: retour en terres fin Juillet

Aisne: 14 en 3 localités le 16 Août

Oise: 6 obs., 1 à 3 oiseaux de fin Juillet au 4 Oct

Somme: 5 obs. du 7 Août au 3 Sept.

CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus*

Plus abondant en terres que sur le littoral. Observé en terres de mi-Mars(pre-miers 2 le 10 à Beautor 02) à mi-Sept. (Mars, 4 obs., Avril, 5; Mai, 1; Juin, 6; Juillet, 4; Août, 16; Sept., 3) plus occasionnellement ensuite(3 obs. d'Oct., 1 de Nov., 5 de Dec.).

Décembre, traces d'hivernage en cas d'hiver clément?: 02, 1 le 20 à Aulnois/Laon 60:1 le 22 à LSM et 1 le 28 à Vauciennes; 80: 3 le 20 et 2 le 22 à Estrées-Mons Le passage de printemps est diffus sauf en Juin: 13 le 14 à Vauciennes(60), 14 le 29 à Aulnois/Laon. Retour massif en Août: 35 le 16 à Aulnois/Laon et 18 à Villers en Prayères(02), 15 le 7 à Domp. Becq., 8 le 16 à Estrées-Mons(80).

CHEVALIER SYLVAIN *Tringa glareola*

Episodique en terres : Aisne: le 16 Août, 1 à Aulnois/Laon et 1 au PeA

Oise: 1 le 22 Juin à Gouvieux, Août, 6 le 3, 17 le 10, 2 le 16, 1 le 31 à Vauciennes le 3, 2 à Chevrières et 1 à Bresles. 2 le 14 Sept. à Vauciennes.

Somme: 1 les 22 Juin et 16 Août à Estrées-Mons et 1 le 14 Sept. à Daours.

CHEVALIER GUIGNETTE *Actinias hypoleucos*

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
RBdS/POM				1	14	2	19	44	10	1		

En terres, des avants-coueurs en Avril, 1 précoce le 5 à LSM(60) et 2 autres obs. en fin de mois dans la Somme.

Mai, très nombreuses obs. (02:2, 60:12, 80:15) le plus souvent en petit nombre (mis à part 10 le 7 à PM-60- et 14 le 8 à Abbeville-80-) et dans de nombreux milieux(plans d'eau naturels ou artificiels et bords de rivières).

Juin, 1 le 20 à Roye(80), 1 le 29 à Aulnois/Laon(02)

Juillet, pas d'obs. avant le 12, 8 ensuite. Important passage dès la fin du mois: 100 le 26 à Vauciennes(60)

Août, poursuite du passage(29 obs. moyenne 16 oiseaux/obs.) belles concentrations sur de nombreux bassins artificiels:

02: Aulnois/Laon, 51 le 16; Bucy le Long, 19 le 16

60: Vauciennes, 26 le 10, 50 le 24; Chevrières, 30 le 30; Bresles, 40 le 3

80: Estrées-Mons, 54 le 7, 53 le 16; Dompierre-Becquincourt, 20 le 7; Ham, 35 le 7; Roye, 34 le 7

Fin du passage en Sept., 6 obs. moyenne 7 oiseaux/obs.

2 le 8 Nov. à Chevrières et 3 données de Décembre: LSM, 1 les 7 et 22; Vauciennes 1 le 20.



BECASSEAU MAUBECHÉ Calidris canutus

; J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBds/POM : 20 : 15 : 25 : 320 : 140 : 150 : 364 : 135 : 35 : 35 : 25 :  
 Jautres obs. sur le littoral, 44 le 9 Mai à Fort-Mahon et 26 le 20 Avril au Crotoy  
 1 le 2 Sept. au H.A.

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta

4 le 30 Mai au H.A.

2 obs. en terres, en Août: 2 le 16 à Aulnois/Laon(02) et 2 le 29 à Roye(80)

BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii

1 le 3 Août à Vauciennes(60) (G. BAUDOIN, B. BOUGEARD et D. ROCHERIEUX).

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina

; J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBds/POM : 5200 : 5000 : 3000 : 650 : 765 : 10 : 1000 : 750 : 500 : 1000 : 4000 : 4500 :  
 3 da: 250 le 3 Mars, quelques autres données sur le littoral.  
 H.A.: 47 le 12 Janv., 15 le 30 Avril, 1 les 19 Jul, 1 Août, 27 Sept., 5 et 15 Nov.  
 En terres, 14 données. Premier 3 le 22 Mars à PM(60)  
 Avril: 7 le 10 et 3 le 13 à Vauciennes(60)  
 Mai: 1 le 7 à PM, 1 le 10 à Vauciennes, 1 le 12 à Vacquemont(80)  
 Juillet: 2 le 26 à Vauciennes  
 Août: 5 données. A noter 26 le 7 à Ham(80), 1 à 2 oiseaux pour les autres  
 Sept.: 1 le 7 et 7 le 14 à Vauciennes

BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginaBECASSEAU SANDERLING Calidris alba

; J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBds/POM : 34 : 2 : 1 : 6 : 140 : 110 : 2 : 360 : 210 : 80 : 50 :  
 Bda, 30 le 9 Mars, 3 autres obs. groupées mi Mai, 134 le 9 à Fort-Mahon, 21 le  
 10 à Cayeux/mer et 2 le 17 au Crotoy

BECASSEAU FALCINELLE Limicola falcinellus

1 le 25 Août en Bds(G.FLOHART) (donnée acceptée par le C.H.N.)

COMBATTANT Philomachus pugnax

Quelques autres obs. sur le littoral de Mars à Juin; max. 18 le 20 Avril à Boismon  
 En terres, 11 obs. dans l'Oise du 29 Mars au 29 Juin, max. 5 le 14 Juin, moyenne:  
 1,9 oiseaux/obs.  
 Retour début Août, 10 obs. au cours de ce mois, moyenne: 4,2 oiseaux/obs.  
 3 données de Sept., derniers: 8 le 14 à Vauciennes(60).

AVOCETTE Recurvirostra avocetta

; J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBds/POM : 11 : 2 : 62 : 252 : 268 : 149 : 255 : 130 : 100 : 64 : 47 : 4 :  
 Nidification:

2 données de l'Oise, 1 le 2 Avril à Bresles et 1 le 15 Mai à MP

ECHASSE BLANCHE Himantopus himantopus

2 le 3 Mai à Vauciennes(60) (J.P. BONNEL).

PHALAROPE A BEC ETROIT Phalaropus lobatus

1 F. le 11 Juin au H.A.

OEDICNEME CRIARD Burhinus oedicnemusAisne : pas de recherches; Oise: 1 seule donnée, 1 le 26 Nov. à Etrepilly (limite Seine et Maren) niche-t-il encore dans ce département?Somme: 6 localités d'audition ou d'observation dont 1 c./1 juv. en duvet le 24 Juillet à Berteaucourt les dames (B. COUVREUR et L. GAVORY). Premier, 1 le 1 Mai à Rogy et derniers, 3 chanteurs le 10 Août à Vaux en amiénois.GRAND LABBE Stercorarius skua

2 trouvés morts (1 cadavre récent, l'autre plus ancien) le 26 Janv. sur le littoral. 1 le 20 Dec. au H.A.

LABBE POMARIN Stercorarius pomarinus

1 Im. (phase foncée) trouvé mort le 4 Janv. à Cayeux/mer (C. VIEZ)

1 le 12 Janv. à Ault (X. COMMECY et E. MERCIER); 1 juv. posé à Quend le 31 Août (E. MERCIER).

LABBE PARASITE Stercorarius parasiticus

2 le 10 Oct. et 1 le 5 à Cayeux/mer.

GOELAND MARIN Larus marinus : A : M : J : J : A : S : O : N : D :RBdS/POM : 200 : 84 : 126 : 47 : 170 : 271 : 340 : 1070 : 1250 : 725 : 580 : 955 :  
H.A.: Présent (-5) de Janv. au 19 Mai. 12 le 22 Nov., quelques uns en Dec.

Passage fin Oct. (100 mig.S./2h. le 26) et 4 ad. le 2 Nov. à Cayeux/mer.

GOELAND BRUN Larus fuscus M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :RBdS/POM : 100 : : 7 : 62 : 85 : 170 : 319 : 235 : 610 : 160 : 25 : 6 :  
Traces de passage, 20 le 7 Avril au H.A., 26 le 12 Sept. à Cayeux/mer et 1 le 11 Oct. à Quend-plage.GOELAND LEUCOPHEE Larus cachinnansLittoral, les leucophées représentent 10% des G. argentés présents au nord de la réserve les 31 Août et 5 Oct., absents le 22 Dec. (race microchelis). 1 le 26 Oct. au Hourdel.Race omissus, 4 le 31 Août et 5 le 22 Dec. au nord de la réserve.

5 juv. le 3 Août à Bresles (G. BAUDOIN, B. BOUGEARD et D. ROCHERIEUX).

GOELAND ARGENTE Larus argentatus

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

RBdS/OM : 1914 : 742 : 724 : 972 : 762 : 2370 : 2063 : 3321 : 2550 : 720 : 1350 : 240 :  
La décharge de St en amiénois est toujours utilisée, surtout en hiver.  
Oise: 2 le 27 Fev. à LSM et 1 le 23 Mai à VH.GOELAND BOURGMESTRE Larus hyperboreus

1 ad. à Cayeux/mer les 5 Janv., 30 Nov., 22 et 23 Dec.

GOELAND CENDRE Larus canus : A : M : J : J : A : S : O : N : D :RBdS/POM : 1770 : 490 : 870 : 600 : 70 : 18 : 394 : 1091 : 2330 : 1790 : 560 : 265 :  
H.A., quelques uns de Janv. à Mars, 1 le 12 Sept., quelques uns en Dec.En terres, Oise: en petit nombre en hiver (2 Im. le 17 et 1 le 30 Janv. à PM),  
net afflux en Fev. (20 le 20 à PM) suite à la vague de froid, encore 2 le 10 Mars.Somme: assez réguliers en dehors de l'été sur le plateau du Ponthieu  
en vallée de Somme, 1 ad. le 21 Fev. à Bourdon, 2 les 16 et 18 Fev. et 5 le 23 à Amiens.MOUETTE MELANOCEPHALE Larus melanocephalus

1 ad. le 9 Oct. au H.A., 1 les 30 Oct. et 1 Nov. en BdS.

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundusNidification : Oise, 5 colonies, Bresles (30 nids le 11 Juin), Chevrières (20 nids le 17 Mai), Berneuil/Aisne (200 nids le 17 Mai), Sacy (seul site naturel, 10 c. 4 nids le 11 Juin), Vauciennes (retour des nicheurs en Mars, 132 nids le 17 Mai, site déserté dès Oct.

Somme:Daours-Vesquemont : 3 nids le 17 Mai, Dompierrre-Becquincourt (premiers c. installés le 4 Avril, 70 couples le 19 Mai, encore 1 juv. non volant le 7 Août) POM, 110 nids le 3 Juin.

Cléry/Somme, la colonie a disparu suite à l'arasement des flots de même que le dortoir hivernal suite à de nombreuses destructions au fusil. Ce site a perdu une grande partie de son intérêt pour l'ensemble de l'avifaune aquatique depuis sa gestion selon des idéaux cynégétiques.

Période internuptiale:

Oise, Les Mouettes rieuses fréquentent essentiellement les grandes vallées (Aisne et Oise, secondairement Thérain). Les décomptes effectués à PM permettent une approche du calendrier migratoire de l'espèce mais les tailles des rassemblements qui ne sont que des pré-dortoirs varient avec l'heure de la journée :

1100 en Janv., 1200 Fev., 1500 Mars, 400 Avril, 55 Mai, 62 Juin, 200 Juillet, 200 Août, 350 Sept., 53 Oct., 370 Nov., 300 Dec.

Les oiseaux fréquentant dans la journée la vallée de l'Oise se regroupent en un dortoir dans la zone industrielle de Creil, dormant sur les toits des usines (2000 le 7 Dec. par exemple). Leur dispersion diurne les amène au moins jusqu'à Compiègne. Les Mouettes fréquentant dans la journée la vallée de l'Aisne regagnent un dortoir à Pommier-Soissons (3200 le 7 Dec. par ex.) (A. ROUGE).

Somme:

RBdS/POM : 135 : 7000 : 694 : 412 : 920 : 1707 : 1550 : 992 : 450 : 480 : 300 : 115 :  
 400 au dortoir de St Valéry/Somme par ex., un dortoir existe dans la région de Péronne.

MOUETTE PYGMEE Larus minutus

H.A.: 2 le 2 Fev., 7 le 4 Avril, 105 le 20 .

1 le 17 Mai à Rue. 4 le 9 Oct. à Cayeux/mer.

Mig., Nord, 7 le 13 Avril à Quend.

1 im. le 11 Juin à LSM(60)

MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla

Bois de Cise/Ault, 4 le 12 Janv., 1 ad. posé dans la falaise le 13 Avril.

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger

H.A.: 4 le 9 Avril, 1 le 20, 20 le 28 Août, 10 le 6 Sept., 11 le 20, 2 le 27.

Aux 2 passages en terres: Mai, 1 le 4, 2 le 7, 1 le 15 à PM(60), 4 le 17 à Vaucien  
 Août, 2 le 16 à Aulnois/Laon(02), 2 le 31 à Boves(80)

1 le 7 Sept. à Vauciennes(60)

GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucoptera

1 ad. en plumage d'hiver le 23 Sept. à PM(D. DELVILLE).

GUIFETTE MOUSTAC Chlidonias hybrida

1 le 17 Mai à Vauciennes (60) (B. COURONNE et P. LE MARECHAL).

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo ; A : M : J : J : A : S : O : N :

RBdS/POM : 72 : 17 : 1 : 450 : 445 : 350 : 2(1é 1) :

H.A.: 2 le 19 Juin, 5 le 9 Août, 25 le 19, 8 le 6 Sept.

Cayeux/mer: 82 le 12 Sept., 1 le 25 Oct.

En terres: 1 le 18 Mai à La Chaussée-Tirancourt(80), 1 le 22 et 2 le 29 à PM(60).

STERNE NAIN Sterna albifrons

En terres: 1 le 17 Mai à Daours(80) et 1 le 11 Juin à PM(60).

STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis

H.A.: 22 les 12 et 13 Avril, 9 le 9 Juin, 8 le 24 Juillet, 5 le 9 Août, 15 le 12  
 Sept., 4 le 14 Oct. (Max. mens.).

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O :

RBdS/POM : : : : 100 : 37 : 281 : 271 : 175 : 120 : 4 :

PIGEON COLOMBIN Columba oenas

Populations assez bien suivies dans l'Oise, en période de nidification, il est régulièrement noté en F. de Comp. (plusieurs c.), ainsi qu'à Chevrières, P.M., V.H., L'épine/Mortefontaine (10 c. possibles), Rocquement, Vauciennes, Trumilly. En dehors de cette période, quelques données sont obtenues chaque mois à l'exception de Janvier et Décembre (Droizelle et Nanteuil le Haudoin en Fev., Versigny en Mars, 7 le 10 Avril à P.M...., 9 le 4 Sept. à Vauciennes...). Un remarquable rassemblement de 150 le 13 Novembre à Mortefontaine. La situation doit être assez semblable en Somme, Aisne?

PIGEON RAMIER Columba palumbus

Abondants aux passages de Fev, début Mars et en automne (Oct., Nov.); quelques stationnements de plusieurs centaines sont signalés en Dec? dans la Somme. Pour l'Oise, ces stationnements hivernaux sont plus fréquents : 1000 le 26 Janv. à Vauciennes, 2000 le 17 Dec. à Verberie, +1000 le 23 à M.P.... on peut y voir l'influence des grandes forêts. Les passages de Fev. et Nov. sont aussi nets dans ce département avec de plus, 500 mig. N.E. le 11 Mai au dessus de la F. de Retz. Dans l'Aisne, à noter, 600 mig. S. en 30 min. le 12 Oct. à Chamaille, ce mouvement durant toute la journée... Dans nos trois départements, c'est un nicheur abondant.

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur

Première, 1 le 25 Avril en F. de Comp. (60), début Mai dans la Somme: le 1 sur le littoral, le 2 à Domart en Ponthieu. Partout entre le 5 et le 10, Nicheuse abondante (encore 1 nid en construction le 4 Juillet au POM), derniers chants le 9 Août sur le littoral. Rassemblement postnuptiaux: 10 le 26 Juillet et 50 le 10 Août à Vauciennes (60). Dernières, 3 le 27 Sept. et 1 le 4 Oct. au POM.

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto

Nicheuse bien répandue dans les villes et les villages; peu notée. 1 copulation le 9 Mars à Noyelles/mer, 4 c. à Frémontiers... 1 juv. peu volant le 21 Nov. à Amiens... (80) 15 le 13 Nov. à Mortefontaine (60), 60 le 14 Dec. en dortoir dans un Houx à Corbi

COUCOU GRIS Cuculus canorus

Premiers: 1 le 10 Avril à Taalis (02), le 16 en F. de Comp. (60), le 22 à Amiens Dans la Somme, arrivées massives fin Avril et dans les premiers jours de Mai; il sont alors abondants et s'installent. 1 juv. peu volant le 14 Juin à Mortefontaine (60)... nicheur abondant en forêts, marais et ailleurs. Derniers: chants, le 14 Juillet à Camon (80) oiseaux, 1 juv. le 29 Août à Roye (80), 1 les 31 et 7 Sept. à Vaucienne

HIBOU MOYEN-DUC Asio otus

6 localités d'observations seulement (5 dans la Somme et 1 dans l'Oise)! A suivre plus attentivement.

HIBOU BRACHYOTE Asio flammeus

1 dortoir à Beautor (02): 6 le 17 Fev., 2 le 31 Mars, Dans la Somme, nombre de contacts mensuels, Janv.: 1, Fev.: 1, Mars: 2, Sept.: 1, Oct.: 1, Nov.: 3, Dec.: 2 (toutes les observations en vallée de Somme et sur le littoral). A noter, 3 le 12 Janv. au H.A. et 2 le 1 Fev. Dans l'Oise, 1 le 24 Fev. à Beauvais et 1 le 17 Mai à Vauciennes.

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua

Somme, 1 morte le 2 Mars à Vauchelles les Quéannoys Mieux représentée dans l'Oise, 5 sites connus: Lieu-restauré, Pondron, Thiescourt verneui en Halatte et Mortefontaine 1 couple nicheur probable à Villers les Potées (02) où elle est sédentaire.

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco

Sédentaire, elle est notée dans 13 localités de la Somme et 10 de l'Oise. Plus discrète en été, l'essentiel des chants a été entendu en Mars et Novembre. 1 c. suivi à Vendeuil (02), ponte vers le 4 Avril, départ du nid entre fin Avril et début Mai, départs échelonnés selon le développement des jeunes. Beaucoup de nourrissages avec des vers de terre (Y. CORBEAU).

CHOUETTE EFFRAIE *Tyto alba*

Données de 7 localités dans la Somme, 7 localités aussi dans l'Oise, quelques couples suivis dans l'Aisne.  
En dehors des lieux connus de nidif., les rencontres de hasard se font surtout en automne. 5 données proviennent de la découverte d'oiseaux morts en bord de routes.

ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus*

2 chanteurs le 16 Juin à Ormoy-Villers (N. LAWNIZACK), seule localité connue pour l'Oise. La population du Marquenterre semble stable; premier chanteur le 26 Avril.

MARTINET NOIR *Apus apus*

Premiers: 1 le 27 Avril à M.P.(60) et 1 le 5 Mai à Long(80).

Nicheur abondant mais localisé.

Migration postnuptiale enregistrée dès le 28 Juillet au POM(7 oiseaux en mouvement).  
Derniers, rares observations après le 15 Août, 4 obs. de Septembre. Même dernière date en 60 et 80, le 17 Sept. avec 1 à Saveuse et 2 à Vauciennes.

MARTIN PECHEUR *Alcedo atthis*

Rappels pour le département de la Somme;  
en 1984, 34 localités d'observations dont 17 en période de nidification.  
Hiver froid en 84-85, en 85 15 localités d'obs. dont 4 en période de nidif.  
Hiver froid en 85-86 mais peu de gel des eaux; 86, 26 localités d'obs; dont 11 en période de nidification. En 86, 13 nouvelles localités d'obs, après Juillet (date de dispersion des jeunes de première couvée).  
Dans l'Aisne, observé toute l'année à Vendeuil, retour à Etresse le 4 Mai (d'où il avait disparu pendant l'hiver 84-85), nicheur à Marchais, 1 le 3 Nov. à S.N.B.  
Dans l'Oise, Nicheur certain ou probable dans 5 localités, observé dans 14 autres localités (9 citées après Juillet).  
En poursuivant sérieusement nos observations sur cet oiseau, nous aurons une bonne appréhension de sa réaction aux conditions hivernales exceptionnelles.

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*

2 c. nicheurs certains repérés début Juillet au camp de Sissonne, des oiseaux avaient été observés fin Juin et plusieurs sont encore présents fin Juillet (X. COMMECY B. COUVREUR G. FLOHART L. GAVORY).  
7 trous occupés fin Juin dans une autre colonie au Nord de Laon; 25 présents et 19 trous en cours de creusement ailleurs le 17 Juin (localisations précises non communiquées : protection d'abord) (X. COMMECY et Y. CORBEAU).

HUPPE FASCIEE *Upupa epops*

1 le 6 Juillet à Sissonne (L. GAVORY et G. FLOHART).

PIC VERT *Picus viridis*

Sédentaire, assez discret en hiver c'est pendant la période de nidification (Avril-Mai) qu'il est le plus détectable. Bien représenté dans les vallées.  
Aisne: 4 localités d'observation Oise: 19 localités Somme: 6 localités.

PIC NOIR *Dryocopus martius*

Oise: Nicheur bien représenté dans les forêts et leurs abords; contacté en Forêts de Compiègne, Retz, Bois du Tillet et à Ormoy-Villers, Mortefontaine et Plailly. 1 le 15 Dec. à Thiescourt (migrateur?; aucun n'avait été contacté en période de nidification).

Somme: 1 M. en Fev. à Camps en amiénois (A. DELATTRE)  
1 entendu le 23 Avril en F. de Crécy (C. VIEZ).

PIC EPEICHE *Dendrocopos major*

Le plus abondant des Pics dans les 3 départements : 6 c. à Sacy(60), nombreuses données en forêt de Crécy... Observé toute l'année.

PIC MAR *Dendrocopos medius*

Nicheur probablement abondant en F. de Comp.(60). Observé aussi en période de nidif. en F. de Retz(bois de Tillet) et en F. d'Halatte.  
Visite le jardin et même la mangeoire de J. LAW à Cuise-Lamotte(60) de Nov. à Avri

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor

Observé en période de nidification (Mars à Juillet) dans :  
7 localités/Somme; 5 localités/Oise; 2 localités/Aisne.  
Hors période de nidif.: 4 localités/Somme; 3 localités/Oise, 1 localité/Aisne.  
Le Pic epeichette reste donc peu abondant...ou peu recherché?

TORCOL FOURMILIER Jynx torquilla

3 secteurs de la Forêt de Compiègne semblent occupés :  
1° chants du 14 Mai au 17 Juin, 1 ad. bagué par J.M.. MALLARD  
2° chants du 7 Mai au 15 Juillet  
3° 1 chanteur le 28 Mai.

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata*

signalé nicheur sur le littoral (Cayeux-sur-mer(80), Quend-Plage(80)...), à Amiens(80) (5 couples), à Vauciennes(60) (1 le 17 mai)  
à rechercher activement à l'intérieur!  
à noter, un migrateur le 6 nov en BdS.

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis*ALOUETTE LULU *Lullula arborea*

une observation au passage pré-nuptial: 1 le 11 mars au POM  
une seule donnée dans les terres: 1 le 9 oct à Neuville(80)  
212 migrateurs notés en BdS entre le 27 sept et 16 nov  
une donnée hivernale: 1 le 1 dec au POM

ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris*

fin d'hivernage classique :

	J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1
HA	15			30	22		5
Cayeux-sur-mer		16					
Effectifs faibles pour l'hivernage 1986-87							
	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
HA	5			2			25
Cayeux-sur-mer(80)						7	
BdS	4	8			3		
Quend-Plage(80)		1					

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*

Les trois premières le 21 mars au HA  
peu renseignée en période de nidification: 350 trous à Vailly-sur-Aisne(02); 50 trous à Parfondru(60); 12 trous à Quend(80); nidification certaine à Longueil-Sainte-Marie(60), Moru-Ponpoint(60), Pierrefonds(60); notée en période de nidification à Chantilly(60), Bresles(60).

HIRONDELLE DE CHEMINEE *Hirundo rustica*

3 le 22 mars au HA  
dernières le 1 nov au HA; 2 le 23 nov à Précly-sur-Oise(60) (A. SCHMITT)

HIRONDELLE DE FENETRE *Delichon urbica*

5 le 30 mars à Lamotte-Warfusée(80)  
dernières: nourrissage jusqu'au 13 nov à Creil(60), présente jusqu'au 28 nov (A. SCHMITT et J. DATTIN)

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris*

2 le 20 sept en BdS (G. FLOHART): seule observation par manque de visite en sept.  
une donnée à l'intérieur des terres: 1 le 11 sept à Moru-Ponpoint(60) (J. LEULHIER)

PIPIT DE RICHARD *Anthus novaeseelandiae*

1 le 21 sept et 1 le 31 oct en BdS (G. FLOHART, F. SUEUR)

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*

PIPIT A GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*

2 le 21 sept en BdS (X. COMMECY, G. FLOHART, F. SUEUR et all)  
à noter la présence des trois pipits "rares" les 20 et 21 sept en BdS!  
*A. cervinus* est à rechercher en mai parmi les bandes de Bergeronnettes printanières et Pipit farlouse qui stationnent dans la région.

PIPIT SPIONCELLE MONTAGNARD *Anthus spinoletta spinoletta*

Signalé uniquement de l'Oise sur les bassins de décantation et les gravières.  
à rechercher ailleurs!  
2 le 15 mars à Verneuil-en-Halatte(60); 10 les 13 et 16 avr à Moru-ponpoint(60).  
2 le 20 nov, présent le 7 dec à Moru-Ponpoint(60); 10 le 6 dec à Bitry(60)

PIPIT SPIONCELLE MARITIME *Anthus spinoletta littoralis*

14 migrateurs actifs en Bds à partir du 5 oct.  
20 individus stationnent le 4 nov dans les mollières de La Maye (RBdS)

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*

Premières le 5 avr au POM et à Vauciennes (60)  
regroupements post-nuptiaux à Vauciennes (60):  
A2 A3 S1 S2  
58 16 100 35  
toute *M. flava*, *flavissima* observée hors de la plaine maritime picarde est à signaler.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea*

hivernage à Amiens et sur les bassins et gravières de l'Oise  
Passage pré-nuptial en mars (Ault(80), Pondron(60))  
Nidification à Domart(80), Boué(02), Long(80):2 couples, FdC(Etang Ste Pen-ine)(60), Chantilly(60), L'Epine/Mortefontaine(60)..  
Bien rare après les hivers froids.  
Plus fréquente lors du passage post-nuptial.

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba*

Rare en hivernage: Blangy-Tronville(80), Amiens(80), Long(80), Coulas(60), Bitry(60), Moru-Ponpoint(60)..  
période post-nuptiale bien suivie à Vauciennes(60) et PM(60) (maxima par mois):  
AOUT SEPT OCT NOV DEC  
Vauciennes 100 50 50 4 0  
PM ++ ++ ++ 2 0  
une seule donnée en dec: 1 le 6 à Pondron(60)  
sous espèce anglaise *Motacilla alba yarelli*  
1 0 le 1 mars à Amiens (P. ROYER) et un couple nicheur à Quend-Plage(80)  
Egalement notée le 24 avr au POM (F. SUEUR).

CINCLE PLONGEUR *Cinclus cinclus*

Cette espèce est uniquement signalée des Forêt du Nord-Est de l'Aisne où il recherche les petits ruisseaux à fort courant. Actuellement, nous ne disposons pas de données suffisantes pour chiffrer cette population.

TROGLODYTE MIGNON *Troglodytes troglodytes*

Il a été remarqué comme hivernant strict à Vauciennes(60) sur les bassins de décantation où il y est noté jusqu'au 16 mars et à partir du 30 nov.

ROUGEGERGE *Erithacus rubecula*



ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos*

premier: 1 le 7 avr au POM

Il est signalé un peu partout

dernier: 1 le 19 août à Saint-Quentin-en-Tourmont (80).

GORGEBLEUE *Luscinia svecica*

La Gorgebleue est une espèce considérée comme rare dans notre région. En effet les observations la concernant restent peu nombreuses et sont dû, vu les dates à des oiseaux en migration. Or cette année, fait remarquable, cette espèce a niché en Plaine maritime picarde (Alauda, 1987).

un 0 fut signalé en mai à Brie (80) (A. SAUVAGE) et une 0 ou un juv au POM le 27 sept.

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*

premier: 1 le 15 mars à Feigneux (60)

Nicheur commun; le passage est bien noté en oct

dernier: 1 le 16 nov au POM

Remarquons l'absence de données hivernales, il est vrai que nous avons eu un hiver rigoureux.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*

premier: 1 le 1 mai en FdC (60)

Les données de nidification sont peu nombreuses et concernent uniquement le département de l'Oise: Choisy-au-Bac (60) (1 couple), L'Epine/Mortefontaine (60) (7 couples), FdC (min 3 couples).

Quant au passage post-nuptial, il est bien remarqué, 2 observations en juil, 3 en août et 5 en sept.

dernier: 1 le 14 oct à Arrancy (60).

TRAQUET TARIER *Saxicola rubetra*

premiers: 3 le 3 mai à Bonneuil-en-Valois (60)

Ce Traquet est un nicheur devenu très localisé. Il est nicheur possible à Mortefontaine (60), Beaufort (02) et certain à Noyelles-sur-mer (80) avec 7 couples ainsi qu'au Camp militaire de Sissonne (02) avec un minimum de 4 couples.

Il reste bien noté lors de ses migrations:

passage pré-nuptial: M1: 7 obs, M2: 1 obs, M3: 1 obs (hors nidification), comme à l'accoutumée le passage est intense la première décade de mai

passage post-nuptial, il commence en août pour s'achever début oct (9 mentions avec un maximum de données première décade de sept)

dernier: 1 le 6 oct à PM.

TRAQUET PATRE *Saxicola torquata*

premier: 1 le 9 mars à Ermenonville (60)

les cas de nidification pour cette espèce restent encore nombreux, bien qu'il soit indéniable qu'elle régresse. Elle n'a cependant pas atteint le stade critique de son cousin le Traquet tarius. A surveiller!

Nidification certaine: 3 localités, probable: 13 et possible: 3

L'Aisne accueille une bonne partie des nicheurs, bien que ce département soit peu prospecté.

Quelques données hivernales, essentiellement sur le littoral (HA, janv et fev) mais aussi à l'intérieur des terres: en janv à Camon (80).

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*

premier: 3 le 23 mars au HA et à Boismont (80)

Uniquement noté nicheur sur le littoral, dans les dunes à Quend-Plage (80) et dans

les levées de galets (au HA, notamment).

Des migrateurs sont notés un peu partout: (nombre de localités par décade)

A1: 4 A2: 6 A3: 2 M1: 9 M2: 1 M3:

A1: 2 A2: 2 A3: 3 S1: 4 S2: 3 S3: 5

migration rampante observée le 11 avr sous quelques flocons de neige

dernier: 1 le 23 oct à Bitry(60).

MERLE NOIR *Turdus merula*

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*

Cette espèce était connue comme nicheuse dans l'Aisne et plus particulièrement de la Thiérache, or cette année G. et S. CARBONNAUX nous rapportent l'observation en avr et en mai de deux individus, avec notamment une becquée le 30 mai et ceci à Mortefontaine(60). Ceci constitue le premier cas de nidification pour l'Oise de cette Grive qui progresse d'années en années vers l'Ouest. Sa nidification reste à trouver dans la Somme!

Elle fut également notée lors de ses migrations: passage intense première décade de mars (Beautor(02) et Amiens(80)) ainsi qu'en hiver où des grandes troupes de Litorne sont de moins en moins fréquemment noté (max: 150 le 22 nov à Pondron(60), 700 en fév au POM ...)

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos*

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*

rien de très significatif

dernière: 1 le 10 avr en FdC(60)

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus*

Nicheuse moins commune que la Musicienne, elle fut notée nicheuse dans 13 localités. Envol de juv le 17 juin.

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*

Suite aux trois hivers rigoureux que nous avons connus, les effectifs nicheurs de ce sylvidé sédentaire se sont effondrés. Mais, depuis un an et malgré les périodes froides de cet hiver, on réentend les Bouscarles et semble-t-il avec des effectifs croissants. A quand le retour des effectifs d'avant vagues de froid? A suivre!

zones humides de l'Oise: 15 chts dont 11 au Marais de Sacy-le-Grand(60)

Plaine maritime picarde: 6 chts (3 localités)

Vallée de la Somme: 5 chts (5 localités)

Vallée de l'Avre et de la Noye (80): 2 chts (1 localité).

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*

première: 1 le 22 avr au POM

Elle est plus commune que l'espèce suivante, il est vrai qu'elle est bien moins exigeante quant au choix de son milieu de vie.

Elle fut notée dans les marais: à Sacy-le-Grand(60): 9 chts; en Vallée de la Somme: 4 chts; Vallée de la Souche(02): 3 chts. dans les friches: à Sissone (Camp

militaire)(02): 1 cht. dans les dunes: à Fort-Mahon(80), BdA

dans les coupe forestières: Massifs de l'Oise(Compiègne, Retz...)

LOCUSTELLE LUSCINOIDE *Locustella luscinioides*

première: 1 le 12 mai

Espèce localisée essentiellement aux marais à phragmitaie humide. Elle fut notée

en Vallée d'Authie(80) : estimation de 20 chts pour la basse vallée(G. FLOHART);  
 en Plaine maritime picarde: 9 chts pour 3 localités; en Vallée de la Somme: 3  
 chts pour 2 localités ainsi qu'au Marais de Sacy-le-Grand(60) avec 23 chts qui  
 est effectif record. Ce marais est le seul site de l'Oise favorable à cette espèce.

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus*

premier: 3 chts le 22 avr au POM

Espèce commune. Dans l'Oise, il est uniquement noté à Sacy-le-Grand avec 32  
 couples. Notons 17 chts sur 4,5 km au Marais de Rue(80).

dernier: 1 le 7 sept au POM.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus pamustris*

première: le 2 mai à Abbeville(80)

Elle est notée nicheuse essentiellement dans les zones humides (8 localités)

dernière: 1 le 17 sept au POM.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus*

première: le 24 avr à Boismont (80)

commune

dernière: 7 captures durant septembre et dernière le 9 septembre à Boves (80).

ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus*

peu de données cette année!!

première: 1 le 5 mai à Long(80)

uniquement observée dans 3 localités : 5 chts à Sacy-le Grand(60), 1 cht à Long(80)  
 et 2 chts à La Chaussée-Tirancourt(80)

HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina*

trois mentions seulement :

1 cht le 21 juin à Boisberge (80) (G; FLOHART)

1 cht le 12 juil à Pimprez(60) (B. COUVREUR, G. FLOHART et L. GAVORY)

1 le 10 juil à Saint-Quentin-en-Tourmont(80) (F. SUEUR)

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta*

première: 2 chts le 9 mai en Forêt de Crécy(80)

Notée en période de nidification à Chevrières(60), Sacy-le-Grand(60), Forêt de  
 Crécy(80), Marchais(02), Apremont(60).

dernière: 1 le 16 août à Vauciennes(60)

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

Cette Fauvette est assez peu notée dans l'ensemble.

Signalée en période de nidification à Sacy-le-Grand(60), FdC, Domart-en-  
 Ponthieu(80), Boves(80), La Chaussée-Tirancourt(80), Neuville-sur-Ailette(02),  
 Marchais(02), POM.

Il faut remarquer que cette espèce affectionne aussi les zones de marais.

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*

première: 1 cht le 24 avr en Forêt de Creuse(80)

observée un peu partout.

dernière: 3 le 31 août à Vauciennes(60)

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*

première: 1 le 27 avr à Hailles(80)

commune

FAUVETTE A TETE NOIRE *Sylvia atricapilla*  
une trouvée morte le 7 dec en BdS

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*

Espèce à tendance méditerranéenne, qui voit sa limite de répartition passer dans le Sud de notre région. Elle fut observée uniquement dans l'Oise : nicheur probable à L'Epine/Mortefontaine(3 chts), en Forêt de Retz et nicheur possible en FdC(GEOR 60).

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*

premier: '1 le 30 avr en FdC.

Uniquement mentionné dans les massifs forestiers ayant une superficie relativement importante: FdC(60), Forêt de Hez(60), de Crécy(80)...

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*

commun

Quelques données hivernales, notamment 5 pendant le coup de gel le 30 nov à Amiens(80) et 1 individu se réfugie pour la nuit dans le grenier d'une maison forestière en Forêt de Hez(60) le 30 nov(D.DELVILLE)

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus*

premier: 1 le 26 mars à Saint-Quentin-en -Tourmont(80)

bien noté

dernier: 2 le 14 sept à Vauciennes(60)

ROITELET HUPPE *Regulus regulus*

Bien qu'à priori commune, cette espèce est dans l'ensemble assez peu noté.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU *Regulus ignicapillus*

Peu de données pour la période de nidification: signalé en FdC

Il est relativement abondant en hiver, ceci dès nov, mois qui recueille le plus grnd nombre d'observations: passage?

GOBEMOUCHE GRIS *Musciapa striata*

Il est noté un peu partout

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca*

premier: 1 le 22 avr en FdC

Il est nicheur uniquement dans l'Oise et plus particulièrement en FdC(60) avec un minimum de 9 couples. On le trouve également en Forêt de Retz (Bois du Tillet)(60) avec 1 couple.

Le passage post-nuptial est bien marqué avec 7 observations.

MESANGE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus*

Uniquement notée sur le littoral dans 2 localités sur la commune de Noyelles-sur-mer(80) pour un minimum de 5 couples.

MESANGE A LONGUE QUEUE *Aegithalos caudatus*

MESANGE NONNETTE *Parus palustris*

signalée en période de nidification dans les massifs forestiers de feuillus de la region: FdC, Bois de Frémontiers(80).... et un peu partout en hiver.

MESANGE BOREALE *Parus montanus*

Notée principalement dans les zones marécageuses (Sacy-le-Grand(60)...etc)

MESANGE HUPPEE *Parus cristatus*

Niche dans les zones forestières (Thiescourt(60), Forêt de Coye(60), Gentelles(80)...etc.

MESANGE NOIRE *Parus ater*

Espèce qui reste peu signalée dans l'ensemble, notée en Forêt d'Ermmenonville(60), au POM, Quend(80), Mortefontaine(60) lors de la nidification et en hiver à Saint-Quentin-en-Tourmont(80), Saint-Valery-sur-Somme(80), Forêt de Retz(60). Elle reste très localisée.

MESANGE BLEUE *Parus caeruleus*MESANGE CHARBONNIERE *Parus major*SITELE TORCHEPOT *Sitta europaea*GRIMPEREAU DES JARDINS *Certhia brachydactyla*LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*

Noté un peu partout dans les vallées et quelques sites forestiers.

PIE GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*

Des nicheurs sont repérés dans l'Aisne: Neuville-sur-Ailette(1 cple), Sissone(min de 8 cples), Erloy(min de 2 cples)  
1 ♂ le 1 mai à Vendeuil(02), peut être un migrateur

PIE GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*

hivernage signalé en Vallée de Somme(Blangy-Tronville), d'Authie(Villers(80), Nampont(80)), en Plaine maritime Picarde(Villers(80), Quend(80)) et dans l'Oise (Forêt de Retz).

nidification en Vallée de Somme et ses affluents (L'Etoile, Boves, La Chaussée-Tirancourt, Falise), d'Authie(Nampont(80)), en Plaine maritime Picarde(Rue, Villers), dans l'Aisne(Plan d'eau de l'Ailette, Oeuilly, Camp militaire de Sissone, Vallée de la Souche).

Les observations d'août et sept hors des site de nidification : FdC,Villers-Bretonneux(80), Domart-en-Ponthieu(80), Méricourt-sur-Somme(80) Moreuil(80) concernent la dispersion des juvéniles. Ensuite des hivernants s'installent à Cléry-sur-Somme(80), Hem-Monacu(80), Noyelles-sur-mer(80), Froise-les-Rue(80), Moru(60) en déc.

GEAI DES CHENES *Garrulus glandarius*PIE BAVARDE *Pica pica*CHOUCAS DES TOURS *Corvus monedula*CORBEAU FREUX *Corvus frugilegus*

Quelques corbeautières recensées: Aulnoy-sous-Laon(02) (28 nids), Vailly-sur-Aisne(02) (50 nids), Oissy( ) (15 nids), Bussus-Bussuel(80) (35 nids), Epagnettes(80) (15 nids), Le Crottoy(80) (66 nids), Villers-Saint-Sepulcre( ) (12 nids), VH(60) (20 nids), Boneuil-en-Valois(60) (7 nids), Saint-Valery-sur-Somme(80) (175 nids).

CORNEILLE NOIRE *Corvus corone corone*

CORNEILLE MANTELEE *Corvus corone cornix*

Un seul individu hors du massif dunaire BdS/Saint-Quentin-en-Tourmont(80) le 13 nov à Cayeux-sur-mer(Le Hourdel). Bien peu de données concernant cet oiseau particulier à la région!

J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1	M2
BdS/POM			1	10			1

	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
BdS/POM		2	2	2			
Saint-Quentin-en-Tourmont					8		

L'hivernage devient presque relictuel

ETOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris*MOINEAU DOMESTIQUE *Passer domesticus*MOINEAU FRIQUET *Passer montanus*PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs*

Présence bien suivie à Vauciennes(60):

J	F	M1	M2	M3	A1	A2	A3	...	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
100	220	255	235	31	1	50	0		0	10		254		500	100

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla*

Deux donnée de l'Oise en janv totalisant 30 oiseaux  
Plus commun à partir de mi-fev et surtout en mars (14 données max: 300 le 2 mars à Vauciennes(60). Remarquons 1 cht le 15 mars à Quend-Plage(80).  
dernier en avr: 3 le 5 à Vauciennes(60), noté le 10 en FdC(60).  
retour le 25 sept en BdS(8500 migrants pour la saison)  
à l'intérieur, il est uniquement noté dans l'Oise où les stationnements sont importants: max 300 le 22 nov en Forêt de Retz(60), 500 le 5 dec en FdC(60).

SERIN CINI *Carduelis serinus*

nicheur commun en Plaine maritime Picarde, à Amiens(80). Ailleurs, il n'est signalé que dans l'Oise en période de nidification (Mortefontaine, Bresles, Sacy-le-Grand, Crépy-en-Valois, Cuise-Lamotte) A rechercher ailleurs!!  
passage post-nuptial signalé en BdS et dans l'Oise: 12 le 16 oct à Bonneuilsur-Aisne(02), 30 le 23 oct à Trosly-Breuil(60), et régulièrement à Vauciennes:

S	O	N1	N2	N3	D1	D2	D3
5		5		1			1

La donnée du 20 dec est la seule donnée hivernale. A rechercher!!

VERDIER *Carduelis chloris*

hivernage régulier sur le littoral et dans l'Oise.  
passage pré-nuptial signalé en avr: 400 le 4 avr à Noyelles-sur-mer(80), 100 le 12 avr à Vauciennes(60), plusieurs centaines en Forêt de Retz(60)

CHARDONNET *Carduelis carduelis*TARIN DES AULNES *Carduelis spinus*

peu d'hivernants cette année (max 50 à Amiens(80), 250 le 11 janv à Fontaine-Chaalis(60).  
Nidification à L'Epine/Mortefontaine(60): 1 couples et 4 juv volants difficilement le 23 juil, nourrissage des juv par la ♀ (S. FARGEAS).

D'autres indices de nidification sont notés:

observation de chanteurs dans les dunes 3 le 4 avr à Saint-Quentin-en-Tourmont,  
1 à Quend(80) et 1 autre à Fort-Mahon(80) le 15 mars (G. FLOHART)

1 cht le 6 mai à Barly(80) (G. FLOHART)

Retour le 20 sept en BdS puis régulièrement à partir d'oct dans les terres.

LINOTTE MELODIEUSE *Carduelis cannabina*

toute observation entre dec et fev dans les terres doit être notée.

LINOTTE A BEC JAUNE *Carduelis flavirostris*

Uniquement notée sur le littoral avec des effectifs faibles

	J	F	M	...O	N	D
BdS	150			1	15	
BdA						200
Le Hourdel	70				60	80
HA		10	80			

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea*

Quelques chanteurs dans les dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont(80)  
A l'intérieur, 1 du 19 au 21 fev à Amiens(80), 1 0 le 26 mars à Commelles(60)  
et 25 le 26 nov à Cuise-Lamotte(60).

BEC CROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*

Nidification possible au Camp militaire de Sissone(02): 2 Q/juv (X. COMMECY  
et L. GAVORY); en FdC(60) signalé le 18 juin et 20 le 7 juil (D. MURE); à L'Epine/  
Mortefontaine(60): 1 ou 2 en avr et juil (S. FARGEAS).

Les autres observations concernent probablement la dispersion des nicheurs plus  
nordiques: 3 le 11 août en Forêt de Crécy(80), 35 le 25 août à Saint-Quentin-  
en-Tourmont(80), 9 en vol Sud le 27 août et 1 en vol Sud le 30 oct en BdS (G.  
FLOHART).

BOUVREUIL *Pyrrhula pyrrhula*

20 migrants actifs fin oct-début nov en BdS  
à Vauciennes(60) noté jusqu'au 8 mars (max de 10) puis à partir du 4 oct  
A noter une centaine de contacts avec des groupes de 2-3 individus les 14 et 15  
fev en Forêt de Retz(60) et en Vallée de l'Automne(60) (D.DELVILLE)

GROS BEC *Coccothraustes coccothraustes*

Nicheur certainement plus répandu que ne le montrent les observations par-  
venues à la centrale.

BRUANT LAPON *Emberiza lapponicus*

L'observation d'un individu le 2 fev au HA (L. GAVORY) concerne un hivern-  
ant probablement.

Le passage post-nuptial est noté en BdS à partir du 4 oct.

Les nombres cumulés par décades

	O1	O2	O3	N1	N2	N3
BdS	2		18	24	1	
Saint-Quentin-en-Tourmont					1	

Une observation hivernale: 1 le 1 dec en BdS (F. SUEUR)

A rechercher dans les labours parmi les Alouettes en oct-nov.

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis*

Bon hivernage en 85/86

	J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1	M2	M3
BdS				3	12		15	1	
HA	60		1	80	6		12		3
Cayeux-sur-mer				20			40		

Migration post-nuptiale à partir du 25 oct. Effectifs faibles comme pour le autres passereaux nordiques:

	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
BdS		13	6		1	10	17
HA	1		14	13			21

BRUANT JAUNE *Emberiza citrinella*

BRUANT ZIZI *Emberiza cirrus*

1 couple 8 mars en FdC (D.DELVILLE) Seule observation!!

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*

7 le 21 sept au HA (J.M. SANNIER)

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus*

Bien suivi à Vauciennes (60)

J	F	M1	M2	M3	...A	S	O	N	D
100	2	70	147	1		10	10	50	10

le creux de fev pourrait être la conséquence du froid

BRUANT PROYER *Emberiza calandra*

A noter systématiquement entre nov et fev (nombre et milieu)..