

Synthèse des observations ornithologiques de 1987 en Picardie

Les remarques faites à l'occasion de notre synthèse régionale 1986 restent valables pour cette année :

- des imperfections dans la réalisation technique (hormis les Passereaux)
- une bonne couverture ornithologique du département de l'Oise (données collectées par le GEOR 60) et la Somme, données ponctuelles dans l'Aisne
- toujours plus de tableaux des résultats de dénombrements dans les sites régulièrement suivis; n'oublions pas qu'une telle synthèse doit être la mémoire ornithologique de notre région aussi doit elle contenir un maximum d'informations sans pour cela être noyée dans les détails; des choix toujours difficiles à faire dans la masse des informations reçues sont nécessaires.

Bien que nous ne soyons pas le 1 Janvier, ces quelques lignes d'introduction sont toujours pour nous l'occasion d'émettre des vœux : - la synthèse 1988 sera bientôt prête...si nous recevons vos données (eh oui, il en manque encore!)

- la synthèse 1989 peut sortir rapidement...si...(cf ligne précédente)

Une remarque encore; malgré son retard de parution, et même avec ses imperfections techniques, il faut compter environ 1 heure (sans compter le travail de regroupement des données, de synthèse et de rédaction) pour réaliser 1 page de synthèse, alors aidez les rédacteurs bénévoles en fournissant régulièrement des rapports clairs.

Rédacteurs : Anatidés, limicoles et laridés : F. SUEUR et X. COMMECY
 Passereaux : G. FLOHART et L. GAVORY
 Le reste : X. COMMECY

Quelques éléments climatologiques pour l'année 1987; ils peuvent aider à comprendre certaines de nos observations (couvées précoces ou tardives, détournements de routes de migrations traditionnelles, importance ou non d'un hivernage...)

Températures :

Bien sûr le coup de froid de Janvier (24 jours de gel dans ce mois, 15 jours sans dégel entre le 7 et le 21) a été remarquable, Février et Mars sont aussi anormalement froids. Avril est lui chaud mais on relève des gelées au sol du 4 au 15 Mai. Juin est frais, l'été est chaud, le début de l'hiver doux (mis à part les premiers jours de Décembre).

Précipitations : Année pluvieuse avec un mois de Mai particulièrement exécentaire en pluie de même que Juin; seuls les mois de Septembre et décembre seront secs dans la suite de cette année.

Vents : Année venteuse, à noter une tempête fin Mars (122 Km/h d'W le 27, encore 94 Km/h le 28), 72 Km/h deNW le 11 Mars. Mai que nous avons vu froid et humide est très venteux, beaucoup de vents d'W dans la première quinzaine (83 Km/h le 3, 79 le 4) retour des vents forts en Avril (90 Km/h d'WSW le 5, 86 le 7). Tempête le 16 Octobre (119 Km/h de SSW, déjà 76 Km/h le 15). Beaucoup de vents forts WSW du 10 au 15 Novembre.

Liste des observateurs : P. Bridon, M. Baumann, M. Baumann, V. Pawedin, J.P. Bonnel, D. Bled, V. Caron, P. Carruette, E. Challet, M. Chatelain, L. Colindre, X. et A.M. Combecy, A. et Y. Corbeau, F. Coutois, B. Couvreur, R. Daix, R. Damery, C. M. et P. Garroisne, L. Delacour, D. Delville, D. Demany, M. Desprez, H. Dupuich, S. Fargess, J.P. Ferne, G. Flohart, M. Fournier, R. François, S. Garnier, L. Savory, A. Godart, R. Gomes, O. Hernandez, S. Kowacks, R.H.D. Lambeck, D. et E. Lapied, J. Law, N. Lawnixack, Y. Leconte, C. Louvet, J.M. Mallard, F. Meyer, J. Mouton, L. Tullie, A. Macqueron, J.P. Marant, M. et V. Mennecart, E. Mercier, J. Mouton, J.B. Mouronval, D. Mure, A. Picquémal, T. Plomion, J. Poidevin, T. Rigaux, A. Rouge, P. Royer, J.M. Sennier, F. Spinelli, F. et M. Sueur, M. Sueur-Bellart, J.C. et C. Tombal, M. Thueux, B. Tunc, A. Vaghoute, C. Viez.

Liste des abréviations employées :

A.S.L. : Aulnois-sous-Laon (Bassins de décantation -02-)
 B.S. : Baie de Somme (ou RBS : Réserve de Baie de Somme)
 BdA : Baie d'Authie; B.de ch/Le Crottoy : Bassin de chasse du Crottoy (80), DSM : Cayeux-sur-mer (80), H.A. : Hâble d'Ault (80), H.V.S. : Haute vallée de la Somme (80), L.S.M. : Longueuil Sainte Marie (60), M.P. : Moru-Pontpoint (60), N/M : Noyelles sur mer (80)
 P.O.M. : Parc Ornithologique du Marquenterre (80), P.M.P. : Plaine maritime picarde, PeA : Plan d'eau de l'Ailette (02),
 SNE : Saint Nicolas aux Bois (02), VSS : Villers Saint Sépulcre (60).

PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica

2 données en terres, dans l'Oise, pour un même (?) animal:
1 le 2 Décembre à L.S.M. (D.D.) et 1 les 24 et 31 Déc. à Verneuil
en Halatte.

Sur le littoral:

1 les 8 et 11 Janv. au H.A. et 1 à Cayeux/mer le 28 Dec. (L.G.)
1 trouvé mort le 28 Fev. à Cayeux/mer (C.V.).

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata

Uniquement observé sur le littoral, jusqu'au 2 Mai et à partir
du 8 Novembre.

En mer : Littoral Sud, beau passage fin Janvier : 1 le 17, 7 (et
28 Gavia sp.) le 20, 97 le 24, 31 le 25, 1 le 26.

Quelques Gavia sp. en Fev. (max. 13), 1 G. stellata le 8, 5 le 14
Mars (et 1 mort le 16)

Novembre : 3 le 8, 4 le 29 (et 2 trouvés morts); 5 le 12 Dec.

RBdS : 1 le 19 Dec. BdA : 1 (+3 sp.) le 24 Dec.

H.A. : : Janv. : Fev. : Mars : Avril : Mai : Dec. :

1 dec. : 4 : 1 : 6 : 2 : 1 : :

2 DEC. : 5 : : 10 : 2 : : :

3 DEC. : 2 : 3 : 9 : 1 : : 1 :

Le Crotoy : 1 les 3 et 8 Janv.

P.O.M. : 1 du 2 au 16 Mars puis du 19 au 21 Avril

GREBE HUPPE Podiceps cristatus

Signalé de 11 localités de l'Aisne, 16 localités pour l'Oise et
41 localités pour la Somme.

Nidification : Aisne : 4 sites pour 9 c. (Hirson : 2c.,
Pierrepont : 1c., SNB : 1 c., Vendeuil : 5c.) 2 familles de 2 et
1 de 3 juv.

Oise : certaine en 5 localités pour 7 c.; 4
familles pour 1, 2, 3 et 4 juv.

probable pour 3 autres localités

Somme : 35 sites pour 113 couples.

Vallée de la Somme : 89 c. (2 nouvelles localités occupées cette
année, Fouilloy et Sailly-le-sec.

Vallée de l'Avre : 17 couples Autres vallées : 3 couples

Littoral (P.M.P.) : 9 c.

Répartition de la taille des familles :

nombre de poussins : 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :

nombre de cas : 8 : 19 : 13 : 15 : 1 :

Soit une moyenne de 2,68 p./c. pour 56 familles repérées.

Le retour sur les lieux de nidification se fait dès le dégel des
étangs : le 10 Fev. à Boves, le 13 à Famechon, le 14 en H.V.S.
(parades), le 16 à St Sauveur...

Stationnements :

En Janv. et dec., surtout en mer et sur les rivières (3 obs.
pour 1 et 2 oiseaux sur des rivières et 6 le 22 Janv. sur le
canal de la Somme de Boismont à Port le Grand) pendant le gel des
étangs; dispersé et en petit nombre sur les plans d'eau pendant
cette période, à part :

Aisne ; 35 le 25 Oct. et 38 le 28 Nov. au PeA

20 le 25 Oct. et 21 le 21 Nov. à Soissons

Oise ; 15 le 13 Sept. et 14 le 11 Nov. à M.P., 18 le 21 Sept. à
Pimprez, 35 le 2 Août et 13 le 17 Oct. à V. en H., 16 le 22 Nov.

à Vic/Aisne.

Somme ; 12 le 7 Mars à Camon, 16 le 14 Fev. et 18 le 5 Mars à
Cléry/Somme, 11 le 3 Mars à Condé Folie, 11 le 6 Mars à St
Sauveur.

Pour les localités suivies :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
P.O.M.	1	2	5	1			2	4	2	1		1
H.A.	15	21	27	N	N	N	N	21	22	31	11	11
Le Crotoy	11	6	46	18	1	1			2	5	1	
Nord B.S.	220	10	20	83	20		2	2	1	9	47	8
Sud B.S.	2530	10	40					4	1		160	2400

POM, absent du 6 Avril au 10 Juillet

Nord B.S. : absent du 21 Mai au 12 Août

Sud B.S. : 1420 le 20 Janv., 2530 le 25, 2400 le 12 Dec.; retour le 22 Août.

Les passages de fin Fev., Mars et début Avril sont nets de même que ceux de Sept. à mi Nov. autant en terres que sur le littoral. L'hivernage maritime au large de Cayeux/mer est toujours impressionnant.

GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis

Nombreuses observations, pas de nidification prouvée: 2 paraded le 5 Juin au H.A. (80).

Littoral : (max. mensuels) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
H.A.			1	1	3	4		3	1	3	3	1
Le Crotoy				4	2						1	
P.O.M.												
Boismont			1									

En terres: A.S.L.(02) : 1 le 22 Août; Bucy le Long(02) : 1 les 8 Août, 21 et 26 Sept.; Estrées Mons(80) : 3 les 7, 2 les 18 et 23 Août, 2 le 3, 4 le 4, 1 le 17 Sept.; M.P.(60) : 2 le 19 Oct.; Pimprez(60) : 1 les 5 et 21 Sept.; Roye(80) : 1 les 4, 5 et 10, 4 le 25 Sept., 1 le 9 Oct. Vauciennes(60) : 7 le 10 Oct. et 1 le 24.

Toutes ces observations en terres dans des milieux artificiels, bassins de décantation (5 cas) ou gravières récentes (2 cas); le passage pré-nuptial n'a pas été remarqué; pas d'hivernant.

GREBE ESCLAVON Podiceps auritus

Toutes les données sur le littoral sauf 1 en P.N. le 20 Avril à Famechon (B.C. et L.G.).

H.A.: 1 le 3 et 2 le 8 Janv., 1 du 11 Nov. au 22 Dec. (2 le 5)
 Le Crotoy : 1 les 22 Janv. et 7 Fev.
 B.S. Sud : 5 le 14 Mars, 1 le 12 Dec. (L. GAVORY)

GREBE JOUGRIS Podiceps grisegenia

En terres : 1 le 1 Janv. à Pimprez (60)
 1 en P.N. le 25 Avril à Rivery (80)
 3 Im. les 5 et 21 Sept. à Pimprez (60)
 1 le 6 Dec. à Verneuil en Halate (60)
Littoral : H.A. 3 le 3, 2 le 8 Janv.; 1 les 1 et 8 Avril; 1 le 6 Mai, 2 du 10 au 25 Oct.; 3 le 28 Nov.
 Boismont : 1 les 19 Mars et 1 Avril
 En mer, B.S. Sud : 9 le 14 Mars, 3 le 28 Nov. (L.GAV)

GREBE CASTAGNEUX Podiceps rufficollis

Nidification :

Aisne : 1 c./nid le 23 Avril à Vendeuil. 1 c./3p. le 23 Août à S.N.B.

Oise : L.S.M. : 1 c. ; Pimprez : 2 c. (Nicheur probable à Couloisy et Pondron)

Somme : 14 localités pour 18 c. (3 au POM, 2 au marais du Crotoy, 2 à Régnières Ecluse) où la nidification est certaine.

11 localités pour 11 c. où la nidification est probable.
26 pulli repérés pour 13 familles (2 p./c.) avec 5 familles de 1, 8 de 2, 1 de 3 et 2 de 4 poussins.

Encore des éclosions fin Août au POM. A noter une reproduction réussie dans une mare d'eau douce sur la plage en RBdS (anse Bidard).

Stationnements :

Aisne : repéré dans 13 localités, max. 11 le 22 Juillet et 12 le 21 Sept. à Bucy le Long; 7 le 25 Oct. à Pommiers...

Oise : repéré dans 11 localités. Hors sites de nidification, observé jusque mi-Mars et retour mi-Août. Au total, 38 observations, surtout en Fev. et Oct.

Seulement 6 groupes de plus de 10 individus : 13 le 2 Août à B/Th, 21 le 27 Nov. à Pimprez, 22 le 3 Oct. à Vauciennes, 55 le 17 Oct. et 44 le 28, 15 le 11 Nov. à V.en H.

Somme : repéré dans 40 localités

Max./mois:	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
P.O.M	3	1		1	N	N	N	N	37	3	45	5
H.A.	3			5	N	N	N	10	22	55	43	5
H.V.S.	35			6			6	22	31			2
V. Evois.	21	14	13	N	N	N	N			6	18	14
Amiens	3	2	5	7	2	8			25		22	11

Quelques rassemblements ailleurs :

Bergicourt : 16 le 11 Janv. et 11 le 17 (étang à 90% gelé!)

Le Crotoy : 25 le 3 Janv., 23 le 8,

Curly : 14 le 18 Janv.

Estrées-Mons : 22 le 18 Août, 33 le 4 Sept.

St Christ Briost : 13 le 18 Janv.

Face au froid de Janvier-Février, de nombreux oiseaux se réfugient sur les rivières : 52 le 18 Janv. de Choisy au Bac à Vic/Aisne et 12 à Francport.

Vieille Somme à St Valéry/Somme: noté du 15 Janv. au 4 Mars : 10 les 15 et 23 Janv., 9 le 18 Fev...15 le 12 Dec.; 16 le 21 Janv.

sur le canal de la Somme de Boismont à Abbeville.

de même dans les ports : St Valéry/Somme : 11 le 8 Janv. et jusqu'au 21 Fev. (8 individus).

FOU DE BASSAN Sula bassana

Les sites privilégiés d'observation sont Cayeux/mer et Quend-plage.

Max./mois:	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BDS	4	18		22	1		7	150	100	250	2	30

Les obs. de Sept. concernent surtout des oiseaux en mouvements (beaucoup de juvéniles et d'immatures).

FULMAR *Fulmaris glacialis*

Retour des nicheurs aux falaises dès le 3 Janvier;
 Quelques uns observés en mer en dehors des sites de nidification:
 1 en Fev., 6 en Avril, 2 en Mai et 4 en Août.

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo*

Peu d'observations en terres cette année; 5 concernants des
 migrateurs actifs, 4 en Octobre : 12 à Gouvieux(60) et 1 à
 Fouencamps (80) le 11, 1 Im. le 17 à B/Th.(60) et 27 le 27 à
 Choisy-au-Bac (60) et 1 en Novembre : 11 le 12 à Blangy-
 Tronville (80)
 6 des stationnements : 2 Im. à L.S.M. (60) le 14 Oct., au PeA(02)
 1 le 23 Août, 5 les 10 Sept. et 23 Oct., 1 le 14 Dec. et 1 le 23
 Dec. à Bitry (60).

Littoral: Max. mensuels

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
P.O.M.	25	15	48	44	11	5	25	105	140	174	18	29
H.A.	2	3	5	3	23	4	3	4		3	3	2
B.S./SUD*	63	17	4		17	1	1	6		13	26	4

* Y compris les individus en vol venant du Sud (falaises
 normandes?) le matin et y repartant le soir. Du fait de ces
 mouvements quotidiens, les migrateurs actifs sont difficiles à
 discriminer; ils furent nets les 1 et 4 Avril au Nord de la Baie
 de Somme (50 et 40 migrateurs) et à mi-Août et en Octobre.
 Détail par décade des stationnements en RBdS-POM au passage post-
 nuptial :

Août : 16/26/105 SEPT.:118/136/140 OCT.:165/174/20

Sur le canal de la Somme à Port le Grand : 25 le 22 Janv.
 (dortoir possible), 1 le 4 Fev., 8 le 14 Mars et 5 le 21 Avril.
 Quelques observations dispersées sur les mares et étangs des
 communes littorales.

HERON CENDRE *Ardea cinerea*

Aisne : signalé de 7 localités, tous les mois sauf de Mars à
 Juin; pas de nidification repérée, pas de groupe de plus de 4
 oiseaux.

Oise : Pas de nidification repérée, pas d'observation en Mai-Juin
 et peu en Avril et Juillet sauf à M.P.: 6 le 10 Mai, 10 le 20
 Juin, 17 le 9 Juillet (max. mensuels); colonie près du site?
 Nombre de données et nombre de sites par mois :
 J.: 16/8; F.: 10/5; M.: 4/4; A.: 2/2; Juill.:4/3; A.: 19/7; S.:
 4/3; O.: 11/7; N.:8/4; D.: 9/5.

Somme : Nidification

Boisment : 121 nids (occupation de la colonie le 11 Fev.)

Péronne : 53 nids (colonie occupée le 14 Fev.)

Marais de Fresnes/Nampont : 1 ad./1 nid le 22 Avril, nouveau site
 (J. MOUTON)

Nidification possible à Régnières Ecluse : 1 ad. 1 juv. le 8 Sept

P.O.M. : 47 nids (premiers pulli le 30 Avril, derniers envols fin
 Juillet)

Nombreuses données de moins de 10 oiseaux en Janv., Fev., Mars
 et de Sept. à Dec., plus rares d'Avril à Juillet (plus de 50
 obs.). Quelques rassemblements : 10 le 9 Fev. à Fossemanant, 25
 le 9 Mars à Nampty et 11 le 13 à Neuville-les-Loeuilly et 28 le 5
 Dec. à Nampty.

Quelques indices de migration en Mars-Avril et d'Août à Octobre tant sur le littoral qu'en terres.

1 en fuite devant le froid le 15 Janv. à Cayeux/mer.

1 trouvé mort de faim (1Kg.) le 18 Janv. à Saulchoix/Poix; il avait été bague poussin le 8 Mai 1986 au Danemark.

Max. mensuels

	: J	: F	: M	: A	: M	: J	: J	: A	: S	: O	: N	: D
P.O.M.	: 24	: 11	: 41	: 24	: N	: N	: N	: 37	: 38	: 20	: 25	: 19
H.A.	: :	: :	: 55	: 8	: 6	: 5	: 3	: 2	: 1	: 1	: 1	: 1

HERON POURPRE Ardea purpurea

2 le 23 Avril au H.A. (J. MOUTON).

GRANDE AIGRETTE Egretta alba

1 stationne à Neuville-les-Loeilley (80) du 6 au 15 Mars.

AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta

1 donnée en terres : 1 le 19 Août à Beautor (02); toutes les autres sur le littoral où l'espèce niche au P.O.M. ; 2 c./2 et 3 pulli (construction du premier nid le 14 Juin, envois les 19 et 24 Juillet)

Max. mensuels en RBdS-POM :

	: J	: F	: M	: A	: M	: J	: J	: A	: S	: O	: N	: D
	: :	: :	: 1*	: 5	: 3	: 6	: 9	: 11	: 11	: 8	: 4	:

* arrivée le 11

1 le 27 Avril, 17, 20 et 26 Mai à Boismont et 1 le 28 en BdA.

En Août-Septembre, 1 ou 2 oiseaux du POM-RBdS se nourrissent pendant la journée au marais du Crotoy et retournent dormir avec les autres.

HERON BIHOREAU Nycticorax nycticorax

1 ad. les 31 Janv. et 1 Fev. au P.O.M.; dates inhabituelles.

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus

1 donnée dans l'Aisne : 1 F./Im. le 22 Juillet à Chivres-en-Laonnois.

7 sites de reproduction probable dans la Somme ; 3 M. à Bray/Somme, 1 oiseau par site ailleurs.

Premiers le 24 Avril à Fouencamps, derniers le 23 Août à Long.

GRAND BUTOR Botaurus stellaris

3-4 chanteurs dans le marais de Sacy(60), seul site connu pour ce département.

Somme : chanteurs repérés dans 13 sites (8 sur le littoral, 2 en vallée de la Somme, 3 en vallée de l'Avre). Seuls les sites de Sailly le Bray (Noyelles/mer), Régnières Ecluse et Thézy-Glimont accueillent 2 chanteurs.

Hivernage d'un individu au H.A., observé à 5 reprises entre le 12 Octobre et le 28 Dec., 1 le 27 Dec. à Vron.

CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra

Passage post-nuptial repéré comme chaque année :
sur le littoral au P.O.M. : 1 le 7 Juillet, 3 migratrices le 12
Août, 2 stationnent du 21 au 1 Sept. (les 2 mêmes observées le 20
à Favières?); 1 le 5 et 1 juv. en mig. le 19).
H.A.: 1 im. le 13 Sept. (le même repéré ce jour là à La
Mollière/Cayeux/mer?)

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia

P.O.M.: 1 du 3 au 10 Janv.; 1 du 5 Avril au 14 (transporte des
matériaux les 11 et 13), 3 les 24 et 25. 1 du 7 au 10 Juin.
Juillet : 2 migratrices le 5, 1 le 8
Sept.: 1 juv. le 15, 11 du 16 au 23, 6 Im. du 26 au 6 Dec.
4 Im. le 14 Dec.
En terres : 2 observations de migratrices, 1 le 13 Août à Amiens
et 8 le 17 Oct. à Corbie (80)

SPATULE BLANCHE Spatula leucorodia

2 ad. le 23 Avril à Boismont, 1 le 15 Mai à Villers/Authie.
P.O.M.:

Max./mois: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :
: 2 : : 1 : 4 : 7 : 10 : 5 : 15 : 16 : 9 : : 1 :
1 Im. le 4 Janv. au Hourdel, 1 le 9 et 4 le 25 Mars à Boismont.
Juillet : 1 à Nampont St Martin le 30, 1 le 23 et 24.
Août : 1 au marais du Crotoy le 30
Sept.: 2 juv. le 6 au Crotoy (BdC), 6 le 14 à Quend
Oct.: 1 le 3, 8 Im. le 12

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor

Nidification: Non nicheur dans l'Aisne; Oise, 2 localités de
reproduction: Longueuil St Marie et Moru-Pontpoint (également
principaux sites de stationnements
Somme: P.O.M., 1c. (8p.); Rue 1c. (1nid); Noyelles/mer 6c. (4
nids dont 1 ou 2 détruits 5,6 et 8 pulli); Boismont 2c. (1 nid
détruit, 8 p. dès le 25 Mai); H.A.: 7c. (7 et 8 p.)
Long-le-Catelet 1c. (6p., éclosions le 31 Mai); Amiens 1c.;
Bray/Somme 1c. (échec); Feuillières 2c. (6p. le 14 Juin);
Fouencamps 1c. (7p. et 5 juv. à l'envol); Famechon 1c.

Stationnements: Aisne: PeA 1 le 7 Mars, 4 le 10 Sept., 2 le 22;
2 le 25 Oct.

Oise: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :
Moru-Pontpoint: 34: 25: 17: 11: 10: 9 : 17: 2 : 15: 26: 9 : 25:
Long.-St-Marie: : 18: 17: 15: 13: 19: : 16: 13: 22: 47: 36:
Mortefontaine (L'Epine) constitue le seul autre site où des
stationnements importants peuvent être remarqués avec : 62 le 15
Fev. et 68 le 3 Dec.

Somme: Plaine maritime

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :
P.O.M.: 10 : 10 : 6 : 7 : 12 : 12 : 12 : 12 : 12 : 13 : 13 : 21
N/M : 58 : 75 : 77 : 85 : 30 : 18 : 24 : 1 : 16 : 30 : 44 : 80
H.A. : 62 : 21 : 51 : 35 : 98 : 104 : 58 : 108 : 117 : 133 : 137 : 140

BdA : 6 le 24 Janv.; 12 le 17 Mars, 9 le 25; présence régulière de fin Janv. au 25 Mars (échanges avec Conchil-le-Temple 62) Observés aussi à Argoule, Le Crotoy, Fort-Mahon, Lanchères, Régnières-Ecluses, Rue, St Quentin en Tourmont, Woignarue (tous moins de 10 sauf 26 le 28 Avril; 23 le 5 Mai au Crotoy) 80 (+1 cadavre) le 22 Janv. sur le canal de la Somme entre Boismont et Abbeville; 33 le 12 Dec.

Vallée de Somme : Observés à Amiens; Argoeuves; Boves; Bray/Somme; Brie; Cappy (1c.); Feuillières; Fouencamps; Dompierre-Becquincourt (2 le 18 Sept.); La Chaussée-Tirancourt (12 le 23 Fev.); Fontaine/Somme; Péronne (43 le 18 Janv.) St Christ Briost (10 le 18 Aout).

Long-le-Catelet: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :
: 7 : 5 : 4 : 2 : 5 : 8 : 6 : 13: 15: 15: 10: 8 :

Vallée des Evoissons:

Famechon : 8 : 6 : 8 : 4 : 2 : : 9 : : 5 : : 2 : 6 :
Bergicourt 2 le 24 Janv.; 3 en Mars; 2 le 14 Dec.; Fleury : 2 le 13 Fev.; 1 le 13 Mars.

Vallée de la Selle : Conty (max. 5 le 9 Fev., observé en Mars, Mai et Dec.) Nampty : 1 c. le 13 Mars.

Vermandois : Estrées-Mons: Max. 5 le 8 Janv.; observé en Avril, Aout, Sept, Dec.

CYGNE SAUVAGE Cygnus cygnus

P.O.M.: 2 ad. 1 juv. le 10 Janv.; 2 ad. le 15 Mars
13 le 29 en B.S.; 1 le 25 Janv. à N/M et 3 à Boismont; 2 du 10 au 18 Fev. à N/M; 1 le 11 au Crotoy; 1 ad. le 21 à Rue, 1 le 22 à Cayeux/mer. 1 le 17 Janv. 1 le 23 Fev. et 2 le 29 au H.A.

En terres : 3 le 23 Janv. et 1 le 3 Mars à Boves(80); 1 du 12 au 19 Avril à Fouencamps (80); Longueuil-St-Marie (60) : 5 ad. 2 Im. le 17 Fev. et 3 ad. 2 Im. le 15 Mars; 7 (dont 5 ad.) le 22 Fev. à Chevières (60).

CYGNE DE BEWICK Cygnus columbarius bewickii

1 groupe de 10 a probablement séjourné dans le Marquenterre Nord (Le Crotoy, St Quentin en Tourmont, BdS) du 16 Janvier au 12 Février (5 observations). 2 ad. le 14 Mars à N/M.
1 ad. le 22 Fev. à Verneuil-en-Halatte (60)
1 le 12 Dec. sur le canal de la Somme entre St Val./Somme et Abbeville le 12 Dec., 1 les 12 et 27 à Boismont.

OIE DES MOISSONS Anser fabalis

BdS-POM : Stationnements max. par décade
:Janv. : Fev. : Nov. : Dec. :
1 dec. : 19 : 15 : 29 : 43 :
2 dec. : 160 : 1 : : 50 : 13 en vol vers le Nord le 4
3 dec. : 185 : 3 : 20 : 125 : Avril.
154 le 22 Nov. au PeA (02) (R. GOMES), donnée maximale pour l'Aisne depuis la création de la centrale.

OIE A BEC COURT Anser brachyrhynchus

1 le 31 Janv. en BdS (J. MOUTON).

OIE RIEUSE Anser albifrons

BdS-POM : 2 le 18 Janv., 1 du 21 Janv. au 2 Mars, 1 le 22 Mars.
2 ad. 2 juv. du 3 au 18 Oct., 2 ad. 1 juv. du 24 au 31. 4 le 1 Nov., 1 le 20, 2 ad. 1 juv. le 21; 5 les 8 et 9 Dec., 8 le 14, 10 le 22.
Rue (mouvements locaux du 2 au 15 Dec. à Froise): 14 le 2, 23 le

OIE CENDREE Anser anser

Stationnements en RBdS-POM ; H.A. (Max. mensuels)

Janv.: 18 Avril : 6 ; 30 Juil.: 1 Oct.: 5
 Fev. : 7 ; Mai : 3 Août : 2 Nov.: 18
 Mars : 6 ; 350 Juin : 1 Sept.: 2 Dec.: 9

BdA: 150 le 7 Fev.; 117 à N/M le 14 Fev.

Notons l'absence de stationnements au H.A. (secteur très favorable) à l'automne, en raison de l'importante pression de chasse (comme dans de nombreux autres sites).

Migrations : Nombre de données par mois (moyenne)

Littoral :

Janv.: 2 (18) Mars : 13 (52) Oct.: 7 (85) Dec. : 3 (25)
 Fev. : 20 (114) Avril: 5 (74) Nov.: 2 (250)

En terres (Somme):

Fev.: 2 (4) Oct.: 3 (33) Dec.: 1 (50)
 Mars: 5 (14,5) Nov.: 3 (43)

Aisne : 2 le 15 Fev. à Soissons, 2 le 7 Mars à Beautor, 39 le 22 Nov. au PeA.

Oise : 2 vols de 40 à 45 le 19 Mars à Comelles, 1 le 26 à L.S.M.

Estivage (?) : 1 volante les 25 Avril, 8 Mai, 4 Juillet à Rue(80)

Rares données hivernales: 7 en vol Sud le 7 Janv. à Amiens; 9 le 23 Dec. à Rue (Hivernage?).

BERNACHE DU CANADA Branta canadensis

6 le 6 Juin à Ercheu(80), très probablement échappées de captivité ou issues de populations férales mais groupe le plus important noté en Picardie à ce jour.

BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis

P.O.M. : 9 le 10 Janv., 6 le 12; 1 du 28 Mars au 8 Dec..

H.A.: 1 le 3 Oct.

1 le 3 Dec. à Mortefontaine (60), observée régulièrement depuis et serait une échappée de captivité.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla

Stationnements en RBdS-POM: Max. mensuels

J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :
 1 : 6 : 47: 3 : 3 : : 1 : : : 2 : 5 : 1 :

Migrations actives : 1 le 11 Janv.; 314 le 2 Mars, 7 le 24; 2 le 12 Oct., 7 le 20; 10 le 24 Dec.

BdA : 70 le 7 Mars, 12 le 17; 1 le 18 Avril.

1 le 14 Mars à N/M; 4 le 23 Avril au Crotoy.

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna

Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	7110	6000	1080	1528	625	800	911	18	1170	2500	2500	6110
2decade	3044	5000	3500	830	620	305		4	1057	2500	1114	7000
3decade	2000	4400	1508	600	505	600	90	820	2570	2000	7000	10000

Nidification : en dehors de la RBdS où 450 juv. sont comptés le 27 Août, des couples cantonnés sont vus à BdA (9c.); Fort-Mahon (3 c.); Quend (12 c.); St Q.en T.(20 c.); Rue (3 c.); Le Crotoy (10 c.); Boismont-N/M (5 c.); Grand Laviers (1c.); H.A. (13 c.).

Stationnements sur le littoral :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
BdA :	650:	600:	470:	200:	120:			10:		42:	350:	840:
H.A.:	10:	20:	60:	64:	79:	25:	36:	20:	12:	4:	3:	6:
Crotoy	2:	31:	30:	38:	80:	34:	60:					
N/M :			19:	17:	2:	2:		7:			10:	

Observé plus irrégulièrement et en petit nombre dans d'autres localités littorales. 14 le 22 Janv. sur le canal de la Somme entre Boismont et Port-le-Grand.

En terres : Aisne: 3 le 10 Janv. à A/L; 2 le 5 Mars à Bihécourt. Oise : Moru-Ponpoint : 2 le 8 Janv.; 2 M. 3 F. le 14 Mars; 2 M. 2 F. les 11 et 14 Avril, idem en Mai et le 16 Juin (nidification à rechercher).

Ailleurs, en hiver, 1 le 15 Fev. à Pimprez et 5 du 15 au 22 à Vauciennes.

Somme : Nidification: à Estrées-Mons 3 c. en Avril, 1 juv. et 4 et 10 pulli le 11 Juillet, dernier juv. 1 le 23 Août. 1 c. le 23 Avril à Roye et 1 ad. à Dompierre-Becquincourt. Un nouveau site de reproduction certaine, Ercheu, où 1 famille élève 8 jeunes.

En hiver : 10 le 11 Janv. à Péronne, 2 le 19 à Ailly/S., 4 le 24 à Frise et 1 à Curly. 1 le 14 Fev. à Péronne. 3 du 11 Janv. au 14 Fev. à Famechon.

TADORNE DE BELON X TADORNE DU CAP Tadorna tadorna X Tadorna cana
1 de Janvier au 2 Mars en RBdS-POM et de nouveau du 5 Nov. au 29 Dec. (F. SUEUR et coll.)

TADORNE CASARCA Tadorna ferrugina

RBdS-POM : 1 F. le 5 Janv.; 1 M. le 24 Mai.
6 le 6 Nov. en BdA.

CANARD MANDARIN Aix galericulata

1 c. le 21 Sept. à Ermenonville (60) (J. LHEUILLIER).

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos

Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	367	200	147	54	39	54	163	347	380	640	527	400
2decade	1500	233	200	41	32	76	271	378	532	377	398	300
3decade	500	129	101	29	32	100	465	565	346	394	395	400

Nicheur en P.M.P. bien sûr mais aussi à l'anse Bidard en B.S. (1 F./8 p. le 18 Mai M. FOURNIER) traduisant la faible salinité de ce site.

Autres stationnements sur le littoral

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
H.A. :	45:	9:	30:	10:	15:	75:	45:	40:	12:	19:	12:	9:
BdA :	60:	340:	10:							3:		

Autres stationnements, Rue (Froise): quelques uns au printemps, regroupements debut juillet, 6 le 9, 24 le 10, 50 les 14 et 15, 60 le 16...2 le 20 et 4 le 21 (la chasse a ouvert), peu nombreux ensuite jusqu'en Décembre. (50 M. 40 F. le 23 Mars à Rue (marais) Boismont-N/M: Stationnements uniquement en dehors des périodes de chasse (10 le 4 Mars...max. 28 le 25 Juin. A noter 2 F./9 et 55! poussins le 6 Mai...)

25 le 22 Janv. sur le canal de la Somme entre Boismont et Port-le-Grand.

Vallées : Long-le-Câtelet : stationnements (moins de 10) uniquement après l'arrêt de la chasse (obs. régulières); Amiens (MBdM), régulier, max. 47 le 23 Oct.; Péronne, 380 le 11 Janv?, 360 le 18 (570 ce jour là en HVS (de Frise à Péronne)); Estrées-Mons : 75 le 11 Juillet, 110 le 7 Août, 25 le 3 Sept. (moins de 10 stationnés les autres mois); Famechon, 41 le 6 Mars, 11 le 3 Avril, 40 le 15 Nov., 60 le 8 Dec. (moins de 10 les autres mois).

Nidification : Les couvées du mois d'Avril semblent un peu plus faibles que celles des mois suivants :

7,9 p./c. en Avril (n=10; extrêmes, 1 et 13 pulli)

8,4 p./c. en Mai (n=28; extrêmes 3 et 16 pulli) et 10,7 p./c. si nous incluons des données correspondant à des pontes constituées par 2 femelles (21 et 22 p.) et un éventuel regroupement de couvées (55 p.)

8,4 p./c. en Juin (n=11; extrêmes 2 et 11 pulli)

8,5 p./c. en Juillet (n=2 avec 7 et 10 pulli)

Aisne : Vendeuil : 185 le 10 Janv.; 80 le 28 Dec.

Soissons : 125 le 15 Fev.; 65 le 25 Oct.; 360 le 22 Nov.; 1100 le 14 Dec. et 800 le 27.

Bucy-le-Long : 40 le 8 Août, 26 le 22; 77 le 21 Sept.

PeA : 1230 le 10 Janv.; 167 le 7 Mars; 5 le 23 Août; 62 le 10 Sept.; 115 le 25 Oct.; 1570 le 14 Dec.

S.N.B. : 1F./11 p. le 11 Juillet; 257 le 28 Dec.

Vermand : 133 le 28 Dec..

Dans l'ensemble, les stationnements sont plus importants que dans les régions intérieures de la Somme. Faut-il voir là une influence de la moindre pression de chasse?

Oise : Nidification, à noter, 1 F./6 p. le 12 Juillet à Ourscamps

Les observations en période internuptiale sont nombreuses mais peu font mention de groupes importants. Les effectifs les plus élevés sont observés sur les bassins de décantation et certains étangs peu chassés.

130 le 11 Janv. à Ermenonville; 180 le 17 à Bailleul/Thérain, 148 le 18 à Pierrefonds étangs St-Pierre), 185 le 25 à Coye-la-forêt (Commelles) et 140 le 6 Fev., 850 le 9 à Mortefontaine.

120 le 2 Août à Bailleul/Th; 155 le 13 Sept. à L.S.M. et 100 le 14 Oct.; 710 le 3 Dec. à Mortefontaine.

SARCELLE D'HIVER Anas crecca

Stationnements en RBdS :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	260	14	166	101		1	5	13	361	313	276	240
2decade	9	55	245	15		10	2	36	265	293	269	71
3decade	14	113	54	4	1	2	5	123	215	265	205	55

BdA : Nombreuses tuées à la chasse pendant la 1ère quinzaine de Fev. Stationnements tout le mois de Mars avec un max. de 350 le 17; 7 le 16 Avril.

Rue (Froise) : 30 à 50 à la passée du soir du 15 au 30 Mars, encore 10 le 5 Avril; 17 le 25 Dec.

(marais) : 280 le 23 Mars, 15 le 22 Avril.

Boismont-N/M : 125 le 8 Mars, 120 le 11, 110 le 25; 170 le 1 Avril, 3 le 18, 25 le 21; 2 le 2 Mai; 1 le 28 Oct.

H.A. : 2 le 3 Janv.; 2 le 18 Fev., 6 le 21; 237 le 10 Mars, 187 le 14, 80 le 25; 37 le 1 Avril, 28 le 18, 50 le 23; 9 le 2 Mai; 4 le 18 Août, 5 le 22; 13 le 5 Sept., 24 le 13, 17 le 30; 4 le 3 Oct., 5 le 11, 6 le 25; 5 le 8 Nov., 1 du 11 au 21, 10 le 28; 29 le 5 Dec., 2 le 28.

Quelques observations, surtout en Mars dans les étangs de la vallée de la Somme; des stationnements à la descente dans les bassins de décantation. (20 le 6 Sept. à Estrées-Mons, 15 le 4 à Roye...)

Aisne : 8 le 22 Nov. à Soissons, 1 le 8 Août à Bucy-le-Long,
 A-S-L : 8 le 10 Janv., 8 le 22 Août, 2 le 10 Sept.
 PeA : 60 le 10 Janv.; 1 le 7 Mars; 2 le 25 Oct.; 50 le 22 Nov.;
 150 le 20 Dec....
 Un seul signe de nidification probable, 1 c. le 26 Juin à
 Marchais.

Oise : Assez régulière sur 2 sites

Vauciennes : 50 le 4 Janv.; 10 le 15 Fev.; 9 le 21 Mars; 37 le 5
 Avril; 1 le 17 Mai, 3 le 27; 2 le 6 Juin; 1 le 5 Juillet, 19 le
 12. Les données de Mai à Juillet rendent la nidif. possible.
 Vez (Wallu) : 4 le 17 Janv.; 37 le 18 Fev.; 12 le 12 Juillet; 130
 le 3 Oct.
 Quelques données sur d'autres sites de Janv. à Avril (max. 29 le
 14 Mars à Moru-Pontpoint) et de Juillet à Dec. (max. 25 le 10
 Oct. à Chevrières)

CANARD CHIPEAU Anas strepera
 Stationnements en RBdS-POM

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	25	7	9	6	5	3	10	6	10	12	39	17
2decade	14	9	38	2	2	5	20	5	13	31	22	12
3decade	1	9	10	6	1	12	17	7	7	43	18	8

Nidification : 2 F./10 juv. non volants le 25 Juillet.

BdA : espèce présente du 7 au 31 Mars avec un max. de 40 le 17,
 les individus se dispersent chaque soir sur les mares et les
 fossés des prairies humides au Sud de la baie (J. MOUTON).

Quelques obs. en PMP en Mars, Avril, 1c. le 6 Mai à N/M.

H.A.:Max./mois

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :
 : 3 : 2 : 70 : 42 : 9 : : : : 4 : 1 : 4 : 3 :

Détail par décade pour Mars-Avril : 22, 48, 70; 42, 15, 9.

16 le 22 Janv. sur le canal de la Somme entre Boismont et Port-
 le-Grand.

Peu de données à l'intérieur : 8 le 11 Janv. à Péronne, 1 le 15
 Mars à Long-le-Câtelet, 4 le 24 à Camon, 3 le 9 Avril à
 Fossemanant.

Aisne : 3 les 10 Janv. et 22 Sept. au PeA.

Oise : 1 le 11 Janv. à Ermenonville et 3 à St Leu d'Esserent; 8
 le 14 Mars à M.P. et 5 le 13 Avril, 2 le 22 Avril à L.S.M.; 5 le
 12 Juillet à Pimprez; 4 le 11 Nov. à L.S.M.; 1 le 3 Dec. à
 Mortefontaine et 3 le 6 à Verneuil-en-Halatte.

CANARD SIFFLEUR Anas penelope
 Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	19	226	245	2	2		1		15	58	80	66
2decade	2500	22	43		2				20	69	81	81
3decade	250	34	11	2					31	88	62	45

BdA : peu abondant en Janv.-Fev., abondant en Mars avec au max.
 140 le 7 et 110 le 17. 34 le 10 Dec., 10 le 24.

80 en vol Sud le 11 Janv. à Quend, nombreux à la passée du soir
 fin Janv. début fev. à Rue(Froise), grosses bandes les soirs des 4
 et 5 fev.; 20 le 15 Mars, 14 le 23 à Rue(marais).

Boismont-N/M : 2 le 22 Janv.; 42 le 8 Mars, 34 le 14; 8 le 1
 Avril, 6 le 21; 3 le 26 Mai; 1 le 28 Oct.

H.A. Max./mois

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :
: 6 : 45 : 45 : 8 : 1 : : : 2 : 16 : 1 : 13 : 6 :

En mer à Cayeux/mer : 8 le 3 Janv., 162 (Sud) le 11, 28 le 25; 95 (Nord) le 7 Fev.; 122 (Sud) le 10 Dec.

Quelques données à l'intérieur des terres en Janv. (vague de froid) et de Mars à début Avril (migration pré-nuptiale).

Aisne : PeA : 7 le 10 Janv.; 5 le 7 Mars; 1 le 21 Sept; 3 le 14 Dec. 6 le 22 Nov. à Soissons.

Oise : 4 le 17 Janv. à Bresles; 1 M. le 14 Mars à M.P. et 26 le 4 Nov.; 2 les 14 et 27 Nov. à Pimprez, 3 le 22 à Bitry; 3 le 2 Dec. à M.P., 3 le 7 à Augy.

CANARD FILET Anas acuta

Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	385	500	305	5	3	4	2		4	53	330	700
2decade	2000	555	280	6	2	2	5	2	14	80	235	520
3decade	1000	375	65	3	3	2		3	10	400	520	605

BdA : 340 le 17 Mars

Rue : 360 le 23 Mars (marais), 6 le 1 juillet (Flandre); 28 le 20 Oct. (Froise).

Boismont-N/M : 30 le 8 Mars, 50 le 14, 6 le 25; 1 M. les 21 et 25 Avril; 1 le 6 Mai, 1 c. le 26.

H.A. : 3 le 4 Mars, 53 le 19, 37 le 25; 5 le 1 Avril; 1 les 6 et 28 Nov.; 2 le 5 Dec.

Rares données à l'intérieur : 1 le 24 Fev. à Frise; 5 le 3 Mars à St-Sauveur; 5 le 26 Mars et 1 le 31 Oct. à Boves; 21 le 20 Mars à Fouencamps.

Aisne : 1 M. le 15 Fev. à Soissons; 2 M. le 28 Dec. au PeA

Oise : Nombre de données en progression dans ce département, très probablement en relation avec l'augmentation de la pression d'observation : 4 le 9 Fev. à Mortefontaine; 4 le 18 à Vez (Wallu); 1 le 22 à Verneuil-en-Halatte; 1 les 19 et 22 Mars à M.P.; 7 le 12 Avril à Brétigny; 4 le 4 Nov. à M.P., 1 le 21 à Vauciennes, 3 le 22 à Bitry.

CANARD COLVERT X CANARD FILET Anas platyrhynchos x Anas acuta

2 M. le 6 Nov. au P.O.M. et 1 M. le 27 en BdS.

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

Aisne : 1 le 8 Août à Bucy-le-Long, 6 le 23 à AsL et 1 le 10 Sept.; 10 le 22 Sept. au PeA.

Oise : 2M.2F. le 12 Avril à Brétigny-Varesnes et 2 le 2 Août à Bailleul/Thérain.

Somme : Littoral et P.M.P., plus de 30 données; première, 1 le 3 Mars, 4 autres obs. de ce mois (max. 9 le 25 au H.A.)

Avril, 9 obs. (max. 10 le 27 au H.A.)

Mai : 6 obs. (max. 8 le 28 au H.A.)

Juin : 4 le 5 au H.A.

Juillet : 3 obs. (max. 3 le 12 au P.O.M.)

Août : 2 obs. (max. 8 le 17 au H.A. dernière obs.)

Couples cantonnés au H.A. et au marais du Crotoy.

En terres : 4 le 15 Mars, 1 le 22 et 5 le 12 Avril à Long-le-Câtelet. 2 le 21 Avril à La Chaussée-Tirancourt; 2 le 4 Sept. à Roye.

CANARD SOUCHET Anas clypeata

Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	17	1	20	29	5	5	7	20	103	52	37	7
2decade	3		22	20	2	9	4	18	65	42	9	3
3decade			35	17	3	4	15	69	95	46	15	1

BdA : 1 le 7 Mars, 75 le 25; 26 le 16 Avril.

P.M.P. : Mars, 120 le 23 à Rue, 120 le 24 à St Q.en T., 50 le 14 et 65 le 29 à N/M Boismont.

Avril : 5 obs. (max. 36 le 1 à N/M Boismont)

Mai : 4 obs. (max. 9 le 26 à N/M Boismont)

H.A.:

1 dcade	1		26	77	15	4			2	3	27	11
2 dcade		1	105	62	1			1	2	10	23	
3 dcade			139	110	2			4	13	22	38	

Des migrateurs actifs en Oct., 13 le 10 et 2 le 25 à Cayeux/mer.

1 nid/ 10 oeufs dans une friche au H.A. le 2 Mai.

En terres : Nombre de données (moyenne observée)

	Aisne	Oise	Somme
Janvier	1 (1)		1 (1)
Fevrier		1 (2)	
Mars		2 (29)	7 (10)
Avril		4 (8)	1 (2)
Mai		2 (1)	1 (2)
Juin			
Juillet	1 (1)	1 (11)	1 (2)
Août	3 (22)	1 (1)	2 (17)
Septembre	2 (9)	1 (2)	3 (12)
Octobre	1 (12)	1 (6)	
Novembre	2 (8)	1 (5)	
Décembre		1 (9)	

NETTE ROUSSE Netta rufina

Oise : 1 M. le 18 Janv. à Morlincourt, 1 M.lm. le 6 Dec. à Creil

Somme : POM : 1 M. le 3 Mai, 1 F. du 17 Oct. au 1 Nov.

1 F. le 23 Avril au crottoy, 1 M. du 21 Avril au 6 Mai au H.A.;

1 F. le 16 Fev. à Amiens (La Hotoie, près du zoo, origine?)

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina

Stationnements au P.O.M. :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	72	12	18	4			2		4	2	24	48
2decade	13	43	20	1			1	3	2	12	41	1
3decade		55	8	1		1		16	2	19	30	30

Stationnements au H.A.

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	69		10	109	14			7	7	12	72	143
2decade	78	7	53	39	8			12	7	19	66	64
3decade		10	54	13	8	10	11	2	9	45	109	66

En dehors de ces 2 sites sur le littoral et en terres O2 et 80, on note : nombre de données et max. observé

	: J	: F	: M	: A	: M	: J	: J	: A	: S	: O	: N	: D
P.M.P.	: 1	: 4	: 4	: 3	: 2	: 0	: 0	: 0	: 0	: 1	: 1	: 1
	: 13	: 4	: 85	: 11	: 3	:	:	:	:	: 8	: 5	: 29
Aisne	: 0	: 0	: 0	: 0	: 0	: 0	: 0	: 3	: 2	: 1	: 2	: 3
	:	:	:	:	:	:	:	: 17	: 19	: 11	: 33	: 180

Somme	: 2	: 1	: 10	: 5	: 0	: 0	: 1	: 2	: 3	: 1	: 1	: 1
	: 33	: 160	: 43	: 21	:	:	: 3	: 8	: 4	: 1	: 43	: 1

Les maxima enregistrés l'ont été à Péronne (80): 160 en Fev. et Vendeuil (O2), 180 en Décembre.

115 le 22 Janv. sur le canal de la Somme entre Boismont et Port-le-Grand et 3 le 14 Mars.

Pour l'Oise, espèce assez régulière sur 5 sites,

	: J	: F	: M	: A	: M	: J	: J	: A	: S	: O	: N	: D
Moru-Ponpoint:	5	: 5	: 4	:	:	:	:	:	:	: 4	: 13	: 8
Beaurepaire	: 10	: 17	:	:	:	:	:	:	:	: 22	: 33	: 185
Verneuill-en-H:	390	: 425	:	:	:	:	:	: 3	:	: 75	: 219	: 19
Pimprez	:	:	:	:	:	:	:	: 10	:	: 41	: 40	: 0
L.S.M.	: 35	: 28	: 3	: 1	:	:	:	:	: 2	: 89	: 60	: 267

Les données sur les autres sites concernent les mois de janvier (max. de 38 le 18 à Morlincourt), Février (max. de 65 le 9 à Mortefontaine), Novembre (max. de 5 à Couloisy) et Décembre (max; de 40 à Mortefontaine).

Nidification : Une seule mention de reproduction certaine : 14 pulli le 2 Août à Bailleul/Thérain (X. COMMECY et L. GAVORY) et une possibilité de reproduction : 10 (famille) le 12 Août à Pimprez.

FULIGULE MORILLON *Aythya fuligula*

Stationnements au P.O.M. :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade			2			4	1	1		1		6
2decade		2		2		3		1	2	1	1	7
3decade					3					4	5	6

Stationnements au H.A. :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	9		53	109	14			7	7	12	72	143
2decade	78	7	35	39	8			12	7	19	66	64
3decade		10	54	13	8	10	11	2	9	45	9	66

Observé ailleurs de Janv. à Avril en P.M.P. en petit nombre (max. 15 le 10 Mars à N/M-Boismont).

En terres : 12 obs. en petit nombre (max. 8) surtout en H.V.S. de Janv. à Avril et en Dec.

100 le 22 Janv. sur le canal de la Somme entre Boismont et Port-le-Grand, 1 le 1 Fev; et 5 le 14 Mars.

Aisne : Soissons : 39 le 15 Fev.; 3 le 22 Nov.; 10 le 27 Dec.

Pommiers : 3 le 22 Nov.; 3 le 27 Dec.

Bucy-le-Long : 1 le 22 Août; 4 le 21 Sept.

PeA : 170 le 10 Janv.; 20 le 7 Mars; 14 le 10 Sept.; 42 le 25 Oct.; 100 le 22 Nov.; 20 le 20 Dec.

Oise : Assez régulièrement observé sur 3 sites.

	: J	: F	: M	: A	: M	: J	: J	: A	: S	: O	: N	: D
Moru-Ponpoint:	3	: 2	: 8	:	:	:	:	:	:	: 1	: 2	: 11
Verneuill-en-H:	30	: 60	:	:	:	:	:	:	:	: 6	: 9	: 21
L.S.M.	: 8	: 3	: 8	:	: 2	:	:	: 3	:	: 1	: 6	:

Ailleurs, noté de Janvier à Mars et d'Octobre à Décembre souvent en petit nombre sauf 14 le 23 Janv. à Compiègne-Venette et 10 le 7 Dec. à Montleuil-sur-Thérain.

Nidification : au H.A. (80), 1 c./6 pulli le 28 Juin et 1 F./6 pulli le 25 Juillet.

FULIGULE MILOUINNAN Aythya marila

15 en vol Sud en 1 h. le 11 Janv. à Quend.
 Cayeux/mer : 5M. 11F. le 11 Janv., 7M. 10F. le 20, 2 M. 5F. le 31; 2M. 2F. le 22 Fev.
 H.A.: 1 F. du 3 au 11 Janv., 3M. 3F. le 24; 1M. 1F. le 17 Août; 6 F./lm. du 8 au 21 Nov., 11 F./lm. le 28; 6 F./lm. le 5 Dec., 1M. 7F./lm. le 19, 5 F./lm. le 26.
 1M. 1F. le 29 Mars au Crotoy
 POM : 1 F. le 5 Sept. et du 7 au 21 Dec.
 BdA : 2M. 1F. le 29 Nov. et 14F./lm. du 9 au 29 Dec.
 Seule mention de l'intérieur des terres dans la Somme : 1 M. en mue du 6 au 13 Mars à Famechon.
Oise : 1 F. le 11 Janv. à St-Leu-d'Esserent, 1 M. juv. du 17 au 21 à Compiègne et 1 M. (le même?) le 18 à Venette.

EIDER A DUVET Somateria mollissima

Toutes les ob. dans la Somme, une seule en terres, 2M. 2F. le 10 Janv. à Estrées-Mons.
 BdS : 70 les 3 et 17 Janv.; 3 le 3 Avril, 1 le 13, 3 le 29; 3 le 1 Mai, 7 le 11, 6 le 29; 11 le 10 Juin, 14 le 25; 17 le 28 Juillet, 12 le 1 Août, 13 le 17; 1 le 17 Sept.; 8 le 23 Oct., 4 le 1 Nov.; 25 le 4 Dec.
 9 le 18 Janv. en BdA
 5 le 5 Avril à Quend; 5 le 3 Janv. au Crotoy; 8 le 4 Janv. à Cayeux/mer, 2 le 3 Oct. et 6 le 8 Nov. à Woignarue.

MACREUSE NOIRE Melanitta negra

Stationnements sur le littoral :
 : J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :
 Nord B.S. : 260 : 2 : 1 : 45 : : : : : 38 : 12 : 5 : 225 :
 Sud B.S. : 350 : 425 : 100 : 340 : 290 : : : : : 6 : 400 : 1510 :
 BdA : 140 en Janv.; 50 le 10 Dec., 300 le 24.

MACREUSE BRUNE Melanitta fusca

P.O.M. : 1 M. du 11 au 21 Fev. et les 11 Nov. et 27 Dec.
 1M. les 1 et 18 Avril au bassin de chasse du Crotoy
 Cayeux/mer : 2 le 4 Janv., 7 le 25; 1 M. les 25 Mars et 8 Avril;
 2 du 21 au 29 Nov.; 1 le 28 Dec.

HARELDE DE MIQUELON Clangula hyemalis

1 F./lm. du 4 au 11 Dec. en BdA (O. HERNANDEZ, J. MOUTON, T. RIGAUX).

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula

Stationnements en P.M.P. (max. mensuels)

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :
 BS-POM : 69: 10: 3 : 1 : : : : : : 4 : 2 :
 Le Crotoy: 23: 11: 22: 2 : 1 : : : : : : : :
 H.A. : 2 : 3 : 22: 2 : : : : : : : : 1 :
 Woignarue: 2 : 20: : : : : : : : : : : :
 BdA : 3F. le 18 Janv., 5 le 24; 2 le 13 Mars.

En terres :

Aisne : PeA : 1 le 10 Janv.; 6 le 7 Mars; 1 le 22 Nov.; 2 le 14 Dec. et 1 le 28.

Oise : Quelques données hivernales de Janvier à Mars et en décembre, 8 oiseaux le 18 Janv. sur 6 sites; 1 le 27 Fev. à Verneuil-en-Halatte; 3 le 15 Mars et 5 le 22 à M.P.; 2 le 6 Dec. à Verneuil-en-H.

Somme : 3 le 18 Janv. et 2 du 20 au 25 à Amiens; 1 les 10 Janv. et 5 Mars à Estrées-Mons; 1F. le 30 Mai à Daours (P. ROYER), donnée relativement tardive.

HARLE PIETTE Mergus albellus

Aisne : 2M. 6F./1m. le 10 Janv. et 1M. 3F. le 7 Mars au PeA.

Oise : Seules des femelles notées en janv. alors qu'en 1986 quelques mâles avaient été observés en fev. lors de la vague de froid.

1 le 1 à M.P., 1 le 17 à Sarron, 4 les 18 et 21 à Compiègne, 1 le 18 à Vic/Aisne, 2 à Verberir et 1 confluent de l'Oise et de l'Aisne.

Somme: 5 mâles observés seulement en Janvier

3 les 3 et 8 au Crotoy, 1 le 7 en BdA et 3 le 18, 2 le 11 au H.A., 4 le 18 à Frise, 6 le 22 à Boismont (canal de la Somme) et 4 au Crotoy, 1 le 31 à Cayeux/mer.

POM: 4 le 31 Janv. et 1 Fev.; 1 les 7 Fev. 8 et 10 Mars.

2 les 11 et 14 Mars au H.A.; 1 F. le 5 Avril au POM puis du 21 au 31 Dec.

HARLE HUPPE Mergus serrator

Stationnements sur le littoral (max. mensuels)

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :
 : 22: 19: 25: 26: 15: 2 : 3 : 2 : 2 : 4 : 11:

H.A. : 1F. les 14 et 18 Fev., 5 les 21 et 22; 3M. 5F. les 4 et 11 Mars, 13M. 12F. le 10, 3M. 10F. le 22; 4M. 15F. le 1 Avril.

Le Crotoy : 1M. le 17 Janv., 9 le 22; 1F. les 7 et 26 Fev.; 1 les 1 et 8 Avril, 6 le 23.

HARLE BIEVRE Mergus serrator

Aisne : 3F. le 7 Mars au PeA

Oise : Quelques observations essentiellement en Janvier et février :

13 le 17 J. à Sarron et 5F. de Verberie à M.P., 1F. le 18 à Clairoix, 1M. à Verberie et 1F. à Boran, 11 le 21 à Compiègne, 1F. le 18 à Clairoix et 2 le 27 à L.S.M.; 2F. le 15 Mars à L.S.M.; 1F. les 21 et 22 Avril à M.P.

Somme : Essentiellement des données du début de l'année liées à une vague de froid : 2 le 11 Janv. à Quend et 3 à Bergicourt, 2 en vol Sud le 15 à Woignarue, 1 les 15 et 17 au Crotoy, 2 le 16 à Amiens; 6M. 17F. le 17 à Cléry/Somme, 2M. 3F. le 18 en BdA et 3F. le 24, 2M. 11F. le 18 à Frise et 2M. 19F. le 24.

1F. le 22 à St Valéry/Somme; 5M. 38F. le 22 Janv. à Boismont (canal de la Somme) et 1F. le 14 Mars.

1F. le 1 Fev. en BS, 1M. en vol Sud le 26 à Woignarue.

2F. le 15 Mars au POM et 1F. le 9 Dec.

1 F. le 5 Dec. au H.A.

AIGLE BOTTE

3 obs. du 5 au 18 Juillet (1 oiseau en phase claire, l'autre en phase sombre) à Marchais (02) (G. FLOHART et L. GAVORY).
Nicheur probable.

BUSE VARIABLE Buteo buteo

Aisne : Présente toute l'année et semble-t-il plus abondante en hiver; (par exemple, 9 repérées en 7 localités le 28 Dec. sans recherches particulières). Repérées dans 25 sites.

Dans le secteur d'Hirson-Rozoy/Serre, L. LARZILLIERE découvre 19 aires avec 6X3, 9X2, 4X1 jeunes.

Dans la vallée de la Souche, L. GAVORY repère 7 c. en 4 localités

Oise : Notée toute l'année, présente en période de nidification dans tous les grands massifs forestiers (une dizaine de couples repérés en F. de Compiègne...); surtout repérée en Mars-Avril au moment des parades. Quelques individus très clairs observés en Janvier-Février.

Somme : Des observations rapportées de 64 communes différents, un record. Plus de couples repérés cantonnés qu'habituellement : 23 à 25 c. (plus 9 données isolées dans 9 autres communes entre Mars et Juin)

Secteur Nord de la Somme : 6 c. (5 c. en F. de Lucheux)

Littoral et P.M.P. : 3 c.

Vallée la Somme : 4 c.

Bois du Sud-amiénois : 12 c. Quelques traces de migration en Avril puis en Sept.-Oct. (voir synthèse des migrations).

Les nicheurs semblent sédentaires et rejoints en hiver par des oiseaux exogènes.

EPERVIER D'EUROPE Accipiter nisusNidification :

Aisne : 2-3 c. en vallée de la Souche.

Oise : 2 c. en F. de Compiègne (3-4 juv./1c. et mini 2 juv./l'autre; nids en Epicéa à 7 et 4 m. de haut (D. DELVILLE).
Nicheur en F. de Hez.

Somme : Forêts du Nord du département : 3 c. (Barly, Lucheux, Neuville). Forêt de Crécy : 3 c. 1 c. à Mollènes-dreuil.

Sud amiénois : 4 c. probables (Contre, Fleury, Frémontiers, Loeuilly) P.M.P. : 4 c. (Clampont St Martin, Noyelles/mer, Rue, Vron.

En dehors des migrateurs actifs suivis sur le littoral, les passages de printemps (Mars-Avril) et d'automne (Oct.-Nov.) sont aussi nets. L'hivernage est conséquent au moins dans la Somme et particulièrement en P.M.P.

Nombre de localités de contact/mois/département (hors sites de nidification)

: J : F : M : A : M : J : J : A : S : O : N : D :

Aisne : 2 : : : : : : : : 1 : : 1 : 2 :

Oise : 2 : 6 : 5 : 5 : : : 1 : 1 : 1 : 5 : 1 : 2 :

Somme : 16 : 14 : 17 : 5 : 4 : : 1 : 1 : 4 : 10 : 15 : 22 :

Quelques proies (ou tentatives de captures sur) : Hirondelle de cheminée. Alouette des champs. Linotte mélodieuse, Mésange bleue.

AUTOUR DES PALOMBES Accipiter gentilis

2 données dans l'Aisne ; 1 les 10 Janv. et 7 Août à Marchais.

MILAN ROYAL Milvus milvus

1 hivernant en RBdS-PDM du 19 Janv. au 15 Fev.
Premiers : 1 les 7 et 11 Mars à N/M, 1 le 8 à St O en T (80), 1 le 20 à Compiègne (60).
6 obs. d'Avril, traces du passage pré-nuptial
1 le 13 Juin à Bray/Somme (80)
1 le 14 Juillet à Ribecourt (60)
1 donnée de Sept. et 8 en Oct.
1 le 3 Nov. au P.O.M. et le dernier le 21 à Ormoy-Villers (60).

MILAN NOIR Milvus migrans

Premier : 1 le 5 Avril en forêt de Retz (60)
10 données de fin Avril dont 3 au P.O.M., 3 encore à Traverzy (02) et 1 c. paradant à Chivres en Laonnois (02) le 23.
6 données de Mai dans les 3 départements
1 c. nicheur probable à Marchais (02)
Dernier, 1 le 2 Oct. 0 Plessis-Belleville (60), seule observation de la migration postnuptiale.

BONDREE APIVORE Pernis apivorus

Premières : 1 le 1 Avril à Froise/Rue (80), très précoce (J. MOUTON) puis, 1 le 17 Mai en F. de Compiègne (60)
3 données dans l'Oise, 1 dans l'Aisne et 2 dans la Somme au cours du mois de Mai marquent le passage pré-nuptial.
Quelques couples repérés dans les forêts de l'Oise (Compiègne, Cinqueux, Monchy-Humière, Sempigny); de l'Aisne (Marchais 2c., Sissonne, Eppes, Pierrepont, Vesles et Caumont) et dans la Somme (Luchaux 3c., Villers/Authie, Fouencamps) (Nicheurs certains ou probables).
Quelques observations d'Août (13) surtout après le 15 (par ex. 5 le 28 Août à Froise/Rue) montrent le début du passage d'automne qui s'achève en Septembre (6 obs.); dernière, 1 le 26 à Rocquemont (60). Puis 2 très tardives les 19 Oct. à Froise/Rue (80) et 1 Nov. à St Quentin en Tourmont (80) (J. MOUTON).

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus

1 hivernant (F./Im.) le 3 Janv. au H.A. (80) (L. GAVDRY)
1 F./Im. le 14 Fev. à Cinqueux (60) (A. ROUGE)
Début du passage fin Mars avec 6 données après le 22 dans la Somme et poursuite en Avril où les sites de nidif. sont occupés. Déjà un nid avec 2 oeufs le 11 à Bray/Somme (L. TULLIE)
Nidification : (* = site de nidif. certaine)
Aisne : 1 c./2 juv. à l'envol à Montcornet*, 8 c. pour 6 localités de la vallée de la Souche (2 c. à Vesles et Caumont*/2 et 3 juv., encore au nid le 22 Juillet)

Oise : 1 seule donnée, 1 M. en Mai à Sacy

Somme : 12 c. en P.M.P. (+1 possible) : Boismont, Forest-Montiers, H.A.*, Nampont St-Martin*, Noyelles/mer* (X2), Ponthoile* (X2), Rue, Saily le Bray* (X2), Villers/Authie* (+ Argoule)

6 c. en vallée de Somme (+2 possibles) : Bray/Somme*, Cerisy-Gailly*, Daours*, Eclusier-Vaux* (Xé), La Chaussée-Tirancourt (+ Dompierre-Becquincourt et Vaux/Some)

Pour 7 familles, ont été relevés : 2X1 jeune, 4X2, 1X3.

Dispersion des familles fin Juillet-début Août.

Plusieurs obs. (1 en 02, 7 en 60 et 11 en 80) en terres, loin de tout site de reproduction connu en Sept., 3 en Oct. (pas de M. observés pendant ces 2 mois en dehors des migrateurs actifs du littoral).

Nov. : 4 obs. entre le 1 et le 3 sur le littoral

1 Im. à Rue (80) le 20 Dec. (G. FLOHART).

BUSARD SAINT-MARTIN (Circus pygargus)

Nidification :

Aisne : Bucilly X2, La Haye d'Aubenton X2 (dont 1/3 juv.)

Oise : pas de reproduction?

Somme : 9 c. certains* ou probables en 7 localités : Fleury* (3 pulli), Frémontiers* X2 (dont 1/4 juv.), Loeuilly, Lucheux X2, Riencourt, Romainil, Vignacourt et 3 c. possibles : Lamotte-Warfusée, Corbie (La Neuville), La Chaussée-Tirancourt

Quelques dortoirs hivernaux suivis :

Blangy-Tronville (80) : 2 les 4 Janv., 8 Fev. et 2 Mars

La Chaussée-Tirancourt (80) : 2 le 11, 3 le 16 Fev., 4 le 9 Mars, 3 en Oct., 3 en Dec.

Frémontiers (80) : 2 les 13 Fev. et 6 Mars

Marchais (02) : 4 le 10 Janv.

Noyelles/mer (Saily le Bray) (80) : 7 le 22 Fev., 4 le 8 Mars, 3 le 24 Oct., 3 le 8 et 4 le 28 Nov., 5 le 21 Dec.

Vaux en amiénois (80) : 2 le 6 Janv.

et quelques uns repérés dormant isolément dans les champs et les marais.

Bilan annuel : Nombre d'individus/mois/localité (Nombre de M.)

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Aisne:	5(2)		1	2(1)	N	N	N					6(1)
Oise :	8(2)	13/2	5(1)	1	1(1)			1	1	8	4(1)	9(2)
Somme:	36	30/7	26	18/8	N	N	N	3(1)	3(1)	13/2	21/2	95/7
	(10)		(10)									

Migrateurs littoraux actifs non comptabilisés.

BUSARD CENDRE Circus cyaneus

Premiers : 1 le 23 Avril à Bucilly (02), 3 paradant le 29 Avril à Bugny St Maclou (80) et 3 le même jour à La Chaussée-Tirancourt (80) (L. GAVORY).

A noter, 1 mélanique le 24 Avril en Baie de Somme.

Nicheurs certains* ou probables :

15 c. dans le secteurs Hirson*-Montcornet* (02) (nids en Blé, Luzerne ou prairie humide, envols fin Juillet début Août; 12 juv. pour 4 couvées suivies : 1X2, 2X3, 1X4) (L. LARZILLIERE)

Bouquemaison (80), La Chaussée-Tirancourt* (80), Vignacourt* X2 (80) (3 juv./1c.)

Quelques données ailleurs : Noyelles/mer (8 Mai), Ville le Marcelet (9 Mai), Nampont St Martin (9 Juin), H.A. (28 Juin),

Saint-Riquier (20 Juin), Flandre/Rue (15 Juillet) et Bayonvillers (23 Août) (tous 80).

BALBUZARD PECHEUR Pandion haliaetus

Peu observé cette année :

Printemps : 1 le 23 Avril au H.A. et 1 à Lanchères le 2 Mai.

1 stationne en RBdS-POM du 28 Août au 1 Sept., encore 1 les 6 et 21.
1 juv. au PeA (O2) le 28 Août
1 juv. en mig. le 15 Sept. au P.O.M. et 1 le 19 à Rue (80).

FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo

Premiers : 1 le 6 Avril et 1 le 21 à Rue, 1 autre ce dernier jour à Noyelles/mer; 3 autres obs. ce mois.
3 données en Mai-Juin dans l'Oise (Compiègne, Moru, Venette) : nicheurs?

9 c. cantonnés dans la Somme; 3 à Noyelles/mer (renclôture Eluin, Bois de Nolette, Gailly le Bray), 1 à Quend, 1 à Grouches-Luchuel, 1 à Villers/Authie, 1 à Villeroy, 1 à Saigneville et 1 à Boyes.

1 le 30 Juin à Amiens (80) et 1 en Juillet à Marchais (O2), 1 en Août à Nampont St Martin (80).

14 données de Septembre (surtout sur le littoral et hors migrateurs actifs)

1 stationne du 3 au 11 Oct. au P.O.M.

Derniers : 1 les 19 et 28 Oct. au P.O.M.

PERDRIX GRISE Perdix perdix

Nombre de c. estimé pour 100 hectares au printemps (données Fédération des chasseurs de la Somme), maxima relevés
Vimeux-Marquenterre : 22; Ponthieu : 21; Plateau picard nord : 16
Santerre : 15, Vermandois : 25, Plateau picard sud : 25, mais très faible réussite des couvées (-2p./c.)
Peu de gros rassemblements observés : 19 le 31 Dec. à Hailles...
peu observée dans l'Oise, 1 seule famille repérée.

PERDRIX ROUGE Alectoris rufa

1 c. à Demuin le 25 Mars, 1 le 18 Dec. au P.O.M (issue des lâchers de 1986?). Oiseaux de tir.

CAILLE DES BLES Coturnix coturnix

Une progression du nombre de chanteurs repérés, surtout dans la Somme : repérée dans 6 localités du 8 Mai au 19 Octobre.
A noter 2 observations les 11 et 19 Oct. sur le banc de l'ilette en Baie de Somme.

Aisne : 3 chanteurs en Mai à Beautor, 1 en Juin à Montceau le Vaast.

Oise : 1 chanteur le 17 Août à Pierrefonds

GRUE CENDREE Grus grus

2 le 7 Mars à N/M.

Le 27 Oct., 150 à Beautor-O2-, 21 et 77 à Nanteuil le Haudouin-60

Le 31 Oct., 200 posées à Beautor; tirées! elles s'envolent

Le 01 Nov., 70 posées et 19 passant à Beautor, 1 en RBdS-POM

Le 02 Nov., 6 au P.O.M.

RALE D'EAU Rallus aquaticus

4 données dans l'Oise à Comelles (Fev.), Verberie, L.S.M. (Sept.) et Wallu (Juillet-Octobre)
 Mieux représenté dans la Somme; 12 localités d'audition.
 De Mars à Juin, entendu à Argoules (2), Boves, Bray/Somme, Fouencamps, Long, Noyelles/mer (7 dont 4 à Sailly le Bray)
 Passage apparemment dès la mi-Août et surtout de fin Oct. à début décembre (max. 3 entendus au POM)

MARQUETTE POUSSIN Porzana porzana

1 F. le 20 Oct. (F. SUEUR) et 1 M. le 31 (R. GOMES) au P.O.M.

MARQUETTE PONCTUEE Porzana porzana

1 ad. le 20 Sept. à Vauciennes (60) (A. ROUGE)
 Chanteur en Juin à Noyelles/mer (G. FLOHART).

POULE D'EAU Galinula chloropus

Nidification : Certainement très abondant mais peu de rapports
 Oise : repérée dans 6 localités
 Somme : 13 localités de reproduction certaine (9 familles observées au P.O.M.), éclosions de mi-Mai à fin Août, maximum début Août.
 Pour 15 familles : 2X1, 2X2, 2X3, 6X4, 3X5 pulli soit 3,4 p./c.

Stationnements :

Oise : 2 données de plus de 10 oiseaux en Janv. (max. 18 le 25 à Comelles), 3 de Fev., 1 de Mars, 1 d'Oct., 2 de Dec.
Somme : 4 données de plus de 10 oiseaux en Janv., 8 en Fev., 5 en Mars, 1 en Oct., 1 en Nov., 3 en Dec. (POM exclus)
 A noter : 65 sur la Somme d'Amiens à Ailly/Noye le 19 Janv.
 50 à Ignaucourt le 11 Fev. et autant le 14 à Famechon.
 31 à St Valery/Somme le 2 Dec. et 30 le 28 à St Christ-Briost.

P.O.M. (Max./mois) :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
31	23	40	19	15	9	13	24	37	107	77	25

FOULQUE MACROULE Fulica atra

Nidification : bien répandue mais tous les rapports ne la mentionnent pas.

Oise : 10 localités de nidif. certaine
 Somme : 16 localités de nidif. certaine; premier nid fin Mars, dernières éclosions début Mai, (10 c. au marais du Crotty)
 Pour 25 familles repérées : 8X2, 8X3, 4X4, 3X5, 2X6 pulli soit 3 poussins/couple.

Stationnements :

Aisne : Seuls les sites du PeA (540 le 10 Janv., 360 le 3 Mars, 630 le 3 Août, 380 le 10 Sept., 330 le 25 Oct., 425 le 28 Dec.) et les gravières de Pommiers (430 le 21 Sept., 775 le 25 Oct., 765 le 22 Nov., 164 le 27 Dec.) ont été recensés plusieurs fois cette année.

Ailleurs : 115 le 22 Août à Bucy le Long, 90 le 18 Janv. à
 Pontoise les Noyons... (quelques données de moins de 100 à
 Beautor, S.N.B., Soissons...)
 Oise : 11 sites ont au moins 1 fois accueilli plus de 100 oiseaux
 Beaurepaire : 370 le 10/1, 150 le 14/11, 120 le 24/XII
 Chantilly : 135 le 11/XI
 Comelles : 70 le 29/1, 105 le 22/11
 Compiègne : 165 le 18/1
 Couloisy : 250 le 11/XI, 310 le 22
 l'Épine : 300 le 26 Dec.
 L.S.M. : 500 le 17/1, 200 le 28 Fev.
 M.P. : 95 le 25/1, 150 le 22/11
 St Félix : 200 le 7/XII
 V.H. : 350 le 10/1, 150 le 28/11, 550 le 28/X, 380 le
 11/XI, 200 le 6/XII
 V.S.S. : 380 le 7/XII
 D'autres rassemblements hivernaux moins importants sont notés
 dans une dizaine d'autres sites.

Somme : Peu de sites de stationnements mis à part le H.A. et le
 P.O.M. et les étangs de Cléry/Somme (180 le 24/1), de Péronne
 (200 le 18/1), de Bouvaincourt (350 le 5/XII)... mais de nombreux
 sites à petits stationnements qui augmentent en Mars (arrêt de la
 chasse)

Les grands froids de Janvier ayant gelé l'essentiel des étangs et
 gravières, des concentrations inhabituelles sont notées sur les
 rivières : 300 le 18/1 sur l'Oise de Compiègne à Creil (60), 205
 le même jour sur l'Aisne de Compiègne à Vic/Aisne (60) et
 toujours ce même jour, 1050 sont comptés dans la HVS et 580 en
 MVS (dont 500 à Frise sur le canal); 190 d'Amiens à Ailly/Somme
 le 19 sur la Somme...

C. et P. Dancoisne signalent de nombreux cadavres d'oiseaux morts
 de froid sur les rives du canal à Voyennes (80)
 Des rassemblements aussi en eau saumâtre dans le port de St
 Valéry/Somme : 145 le 15 Janv., une vingtaine ensuite (derniers
 fin Fev.)
 31 en mer le 12 Dec. à Woignarue.

HUITRIER PIE Haematopus ostralegus
Stationnements en B.S.:

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1dcade	2300	8228	3268	1400	1050	430	760	1400	4000	5000	3500	4000
2dcade	9000	6520	2700	721	612	632	860	2017	5000	5365	4000	5150
3dcade	7600	5000	2000	800	650	390	1300	3500	5460	5000	3575	5000

Signalons qu'en janvier plus de 40 000 individus furent tués à la chasse sur les côtes françaises dont 80% sur le littoral Nord/Pas de Calais/Somme.

Nidification :

14 couples le 25 Mars au P.O.M., 2 couples le 28 en RBdS, 16 couples le 26 Avril au POM, encore 1 pullus le 31 Mai.

Baie d'Authie : 2000 à 2600 du 16 au 26 Janvier; 115 le 16 Avril, 38 le 9 Mai, 1 couple nicheur, 18 le 25 Juillet, 4 le 10 Sept., 14 le 25 Oct., 34 le 6 Nov., 55 le 10 Dec., 180 le 11 et 600 le 24

P.M.P. : quelques couples cantonnés, St Quentin en Tourmont, Rue (Froise), Noyelles/mer (Sailly-Bray), Boismont
50 le 5 Fev. à Quend (village), passage nocturne le 14 Mars à Rue (Froise), plusieurs grandes bandes le 15 et encore des passages nocturnes les 16 et 17.

H.A. : 2 couples cantonnés, observé de Janvier à Août, toujours moins de 10 individus sauf, 13 le 28 Juin et 12 le 18 Août.

Quelques migrateurs actifs à Cayeux/mer : 40 le 24 Janv., 175 le 7 Fev.

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus

Aisne : Nidification : 1 c. à Chivres en Laonnois, 3 c. à Missy les Pierrepont, 5 c. à Sissonne, 1 c. à Travericy, 2 c. à Vesles et Caumont.

Migration postnuptiale : 500 le 13 Juillet à Beautor, 170 le 26 Sept. à Bucy le Long.

Oise : Migration pré-nuptiale peu remarquée avec un max. de 300 le 15 Fev. à Sempigny.

Nidification : 7 à 8 c. à Montlognon, présence à Moru-Pontpoint, disparition à Mortefontaine.

Mouvement estival : 170 le 4 Juillet à Mortefontaine

Migration postnuptiale : 250 le 18 Oct. à Pimprez, 200 le 19 à Tremilly, 790 le 24 à Pierrefonds, 5 groupes de plus de 100 en Nov. (max. 320 le 11 à Gouvieux), 3 en Dec. (max. 150 le 11 à Sempigny).

Somme : Migrateurs actifs sur le littoral :

les 3, 9, 10 et 11 Janv., quelques dizaines par heure; quelques mouvements en Mars, 22 Juin, mi-Juillet, mi-Septembre; passages importants de début Octobre à mi-Décembre : 100 le 1 Oct., 855/6 h. le 18, 1125/5 h. le 19..., 281/2 h. le 2 Nov..., 288/3 h. le

13 Décembre...

Les mouvements de fuite face au froid sont aussi repérés en terres : de fin Fev. à début Mars 5 obs.

Stationnements hivernaux : 6 obs. de plus de 100 en terres en Janvier (100 le 2 à Famechon, 337 le 2 à Velennes, 486 le 2 à Equennes, 350 le 2 à Belleuse, 430 le 8 à Rue (aucun du 10 au 6 Fev.), 150 le 9 à Croixrault. En Dec., 205 le 2 à Abbeville, 150 le 5 à Poix, 50 le 10 à Fouencamps.
Début du passage pré-nuptial du 7 au 18 Fev., 9 observations de bandes en mouvement, quelques dizaines d'oiseau à chaque fois, max. 125 le 12 à Poix.

Stationnements printaniers :

9 obs. de plus de 100 entre le 6 et le 17 Mars : 154 le 6 à Fleury, 675 le 8 à Boismont, 513 le 11 à Pendé, 350 le 14 à Noyelles/mer...

Mouvements printaniers : 4 obs. entre le 7 et le 12 Mars : 60 le 7 à Rue, 100 le 10 à Boves, 50 le 12 à Mézières en Santerre et 70 le 10 à Hangar.

Nidification : surtout littorale avec 189 c. repérés en P.M.P. (en diminution dans le Marquenterre), 25 c. en BdA (bas-champs), 4 c. à Nampont St Martin, 2 c. à Villers/Authie, 1 c. à Quend(Froise), 5 c. en RBdS, 11 c. à St Q. en T., 5 c. à Rue, 7 c. au Crotoy, 7 c. à Forest-Montiers, 43 c. à Noyelles/mer (8 à Sailly-Bray, 10 rencloture Elluin, 25 autres sites), 29 c. à Boismont, 1 c. à Pendé, 6 c. à Lanchères, 35 c. au H.A.
3 c. en terres à Ham (Bassin de décantation).
Premières parades, le 22 Fev. à Rue(Froise); premiers cantons le 11 Mars et 3 premiers pulli le 2 Mai au H.A.

Migration estivale : 27 le 19 Juin à Rue, 25 le 8 Juillet.

Migration postnuptiale : du 15 Septembre (30 à Rue) au 9 Dec. (85 à Machy), 15 obs. de plus de 50 en vol ou posés, max. du passage à mi-October.

PLUVIER DORE Pluvialis apricaria

Oise : Peu remarqué à la fin de l'hiver (14 le 9 Fev. à Mortefontaine, 37 le 15 à Sempigny) comme à l'automne (1 le 24 Oct. à Sennevières et 55 le 28 Nov. à Crapaumesnil) et au début de l'hiver (17 le 26 Dec. à Rémérangles).

Somme : suivi du stationnement à Rue (Froise) : 26 le 8 Janv., 30 le 15 Fev., 5 le 7 Mars, 54 le 13 et 3 le 24; 6 le 4 Oct., 56 le 25 Dec. et suivi du passage, 18 le 13 Mars, 8 le 20 Oct., 7 le 24 Nov., 5 le 7 Dec, 2 le 17, 1 le 23 (J. MOUTON).

Ailleurs : Fin d'hivernage : 23 le 2 Janv. à Equennes, 4 le 9 à Frémontiers et 8 à Bergicourt.

Migration pré-nuptiale : notée le 1 Mars à St Q. en T. (suivie d'un léger mouvement de descente, 30 en vol Sud le 3 lors d'un coup de froid), 40 le 4 à Noyelles/mer, 13 données du 6 Mars au 29 Avril (surtout à mi-Mars avec des effectifs importants 160 le 19 à Noyelles/mer, 245 le 29 à Boismont, et en fin Février avec des effectifs plus modestes)

1 de la forme nordique en plumage nuptial le 2 Mai au H.A.

Migration postnuptiale :

1 du 6 au 27 Sept. au POM, 8 données entre la fin Septembre et le début Décembre (max. 180 le 2 Nov. à Mézières en Santerre), 100 en vol Sud le 27 Dec. à Bellancourt.

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola

Stationnements en RBdS :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D
1decade	335	125	310	23	355	6	3	140	170	46	175	200
2decade	180	80	43	13	150	5	0	160	115	70	145	100
3decade	240	210	12	68	340	3	16	215	140	115	210	150

Quelques migrateurs : 34/4 h. 30 le 1 Mai, 107/5 h. le 11, 300 (dont 70% en P.N.) le 12, 150 le 21, 5 le 16 Juin... en RBdS, 13 le 1 Mai au Crotoy, 18 le 22 au H.A.

BdA : 24 en Janv., 73 en Mars; 6 le 18 Avril; 17 le 29, 140 le 9 Mai, 70 le 18, 55 le 25; 4 le 7 Nov.

H.A. : 1 le 14 et 15 Mars, 2 le 27 Avril, 5 les 1 et 6 Mai, 1 le 5 Juin.

En terres, une seule donnée, 1 le 17 Mai à Moru (60) (D. DELVILLE)

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula*

Stationnements en Baie de Somme :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade			7	180	3500	26	100	1000	980	25	2	
2decade		3	2400	59	3150	44	5	800	1030	180		
3decade		2	60	900	1000	20	100	2200	65	18		55

BdA : 90 en Mars, 17 le 18 Avril et 170 le 29; 580 le 9 Mai, 350 le 15 et 750 le 25; 120 le 13 Août, 250 le 25; 380 le 10 Sept.; 3 le 6 Novembre.

10 le 14 Fev. à Cayeux/ler (Le Hourdel).

H.A. : 3 le 4 Mars, 6 le 11; 4 le 8 Avril, 2 le 15, 6 le 27; 5 le 2 Mai, 125 migrateurs le 17, 30 le 22; 5 le 5 Juin, 2 le 28; 3 le 25 Juillet, 3 les 12 et 18 Août; 5 le 19 Sept.; 4 le 3 Oct.; 1 le 2 Nov. Nicheur probable, 1 à 2 couples.

Quelques données en terres :

Aisne : 2 le 8 Août et 4 le 21 Sept. à Bucy le Long, 1 ad. le 22 Août à Aulnois/Laon (A. ROUGE)

Oise : 2 le 11 Avril à Moru (D. DELVILLE), 1 le 18 Juillet à Chevières et 3 le 27 Sept. à Vauciennes (A. ROUGE).

Somme : 1 le 3 Mars à St Sauveur (L. GAVORY), 3 le 7 Août, 4 le 10 Sept. à Roye; 2 ad. 1 juv. le 4 Sept. à Eppeville, 2 le 25 à Estrées-Mons.

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius*

Littoral : BdS-POM

2 le 24 Avril, 130 le 7 Mai (dans un groupe de 3500 Grands gravelots (R. BALEJ, P. CARRUETTE, M. FOURNIER), 3 le 16, 6 le 21 2 du 7 au 20 Juin, 4/3 pulli le 22; 2/1 nid le 1 Juillet, 6 le 10, 18 le 16, 14 le 28; 37 le 6 Août, 9 le 13, 6 le 28; 19 le 6 Sept., 7 le 15, 3 le 27; 1 le 8 Oct.

1 cantonné en Avril à Boismont, 1 le 23 Mai à Villers/Authie, 1 c. cantonné le 28 Juin au Crotoy.

H.A. : 1 les 25 Mars et 1 Avril, 5 le 8, 5 c. le 18, 9 c. le 27; 5 le 6 Mai, 11 le 17; 14 le 5 Juin, 7 le 28; 1 le 4 Juillet; 12 le 4 Août, 10 le 18, 3 le 22; 1 le 26 Sept.

Au moins 17 c. dans la P.M.P. : 9 au H.A., 1 à Boismont, 1 au Crotoy (La Maye), 2 au POM, 2 à Rue, 2 en BdA.

Derniers (tardifs) : 2 migrateurs le 21 Octobre à Rue (Froise) (J. MOUTON).

En terres : Aisne : 6 le 19 Avril à Boué, 2 c. à Beautor, 30 le 8 Août et 12 le 22 à Bucy le Long, 2 juv. le 8 Août et 8 le 23 à Aulnois/Laon et 3 le 10 Sept.; 10 le 21 Sept. à Bucy le Long
Oise : Migration pré-nuptiale : notée du 12 au 20 Avril à Bearepaire

nidification : 2-3 c. à Moru, 1 c. cantonné à Morlincourt, nicheur possible à Verberie (noté du 13 Avril au 21 Juin).

Migration post-nuptiale : 3 le 12 Juillet à Vauciennes et 9 le 9 Août; 10 le 18 Juil. à Chevières, 23 le 9 Août, 4 le 23; 6 le 5 Sept., 2 le 25; 4 le 10 Oct.; 5 le 19 Juillet à Courtieux, 2 le 2 Août à St Waast les Mello.

Somme : Roze : 2 le 23 Avril et le 17 Juillet, 1 le 7 Août, 5 le 21; 5 le 5 Sept.
 1 le 16 Mai à Boves et 1 c./2 p. le 19 Juillet.
 2 ad. 2 juv. le 5 Juillet à Ailly/Noye
 1 cantonné le 11 Juillet à Estrées-Mons où 6 oiseaux sont notés le 23 Août, 3 le 3 Sept.
 5 le 21 Juillet à Vecquemont, 7 le 21 Août à Eppeville, 1 le 10 Sept. à Dompierre-Becquincourt, 1 le 25 à Estrées-Mons.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus

1 hivernant le 4 Janvier à Cayeux/mer (A. ROUGE)
 Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade				17	54	17	50	250	50	5		
2decade				80	51	15	200	100	45	15		
3decade			46	50	14	12	175	100				

Premiers le 28 Mars, derniers le 11 Octobre.

Nidification, 3 c. au POM, 6 c. en RBdS

BdA : 3 le 16 Avril, 2 le 15 Mai, 6 le 25; 2 c. cantonnés en Mai-Juin, 19 le 1 Août, 1 le 13; 5 le 10 Sept.

H.A. : 3 le 15 Avril, 2 le 26; 3 c. en Mai; 25 (dont 2X 1ad./2p) le 28 Juin, 1 le 4 Août, 8 le 12, 1 le 30.

PLUVIER GUIGNARD Charadrius morinellus

1 en P.N. le 7 Mai à Fontaine/Maye

1 le 30 Août en RBdS, 1 autre le 31.

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres

BdS : 30 le 24 Avril; 38 le 6 Mai, 16 le 17, 1 le 28; 6 le 20 Juillet, 55 le 30; 55 le 10 Août, 12 ad. 3 juv. le 12, 1 ad. 6 juv. le 31; 30 le 8 Sept., 7 le 11, 1 du 25 au 29.

H.A. : 5 le 27 Avril, 6 le 1 Mai, 10 le 17

BdA : 2 le 16 Avril, 5 le 22; 2 le 9 Mai, 11 le 15; 2 le 25 Juillet; 15 le 11 Sept.

1 en vol Sud le 18 Oct. à Cayeux/mer

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago

Somme : RBdS-POM

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	3		1	1				3	19	12	12	
2decade	4							8	11	11	1	1
3decade	1						2	30	16	27	1	6

Froise (Rue) : max./décade : Janv. : 7, 1, 0; Fev. : 0, 0, 7 ;
 Mars : 1, 7, 5; Avril : 1, 0, 0; retour le 28 Juillet (1); Août :
 0, 4, 1; Sept. : 0, 0, 1; Oct. : 0, 9, 23; Nov. : 2, 13, 3; Dec. : 0,
 1, 4.

Noyelles/mer-Boismont : 10 le 10 Mars, 25 le 14 (parades); Avril :
 5, 2, 3; Mai : 1, 0, 1; retour le 25 Juillet; 17 le 30 Août; 7 le
 19 Sept.; 11 le 24 Oct.; 9 le 28 Nov. (serait nicheuse probable à
 la renclôture Elluin selon J. MOUTON).

H.A. : 3 le 3 Janv., 2 le 14 Mars; 8 les 23 Avril et 2 Mai; 5 le 4
 Août, 10 le 22; Sept. : 2, 3, 10; Oct. : 18, 7, 24; Nov. : 13, 25,
 6; Dec. : 19 le 5.

Hors littoral: Aisne : 4 obs. en Août (max. 7 le 23); 3 en Sept.
 (max. 25 le 3 à Beautor, 20 le 21 à Bucy-le-Long); 1 le 14 Dec.
 au PeA. (L'essentiel des obs. se fait en bassins de décantation).

Oise : Une seule donnée hivernale, 1 le 11 Janv. à Boran
 Mig. pré-nuptiale peu notée: 1 le 19 Mars à Montlognon et 1 le 30
 Mig. post-nuptiale : Vauciennes :Août: 18, 7, 35; Sept.: 10, 60,
 35; Oct.: 26, 0, 1. Ailleurs, 2 autres obs. d'Août, 2 de Sept.
 (26 le 25 le Chevières); 2 aussi pour les mois d'Oct., Nov et
 Dec. (dernières 3 le 11 à Sempigny)
 Somme : 5 obs. de Janv. (dont 25 le 22 le long du canal de la
 Somme entre Boismont et Port-le-Grand); 3 obs. de Fev.; 8 de
 Mars; 4 d'Avril et 1 de Mai (le 10 à St Quentin en Tourmont).
 Nidification probable : à Noyelles/mer et des chevrotements le 26
 Avril à Bray/Somme.
 Migration post-nuptiale dès la fin Juillet mais surtout nette en
 Septembre : 10 données d'Août (max.: 13 à Estrées-Mons et 18 à
 Dompierre-Becquibecourt le 23), 9 données de Septembre (max.: 42
 le 3 à Estrées-Mons, 20 le 4 à Ham, 35 le 24 à Grand-Laviers ...
 2 obs. en Oct., 1 de Nov. et fin de migration ou début
 d'hivernage en Dec. avec 3 données dont 2 le 23 à Quend.

BECASSINE DOUBLE Gallinago media

2 le 18 Janvier et 1 le 22 à Boismont-Pinchevalise (J.C. ROBERT
 et coll.).
 1 le 24 Août au P.O.M. (P. CARRUETTE, A. GODART et M. MENNECART).

BECASSINE SOURDE Lymnocyptes minimus

1 trouvée morte à Longueau (80) le 20 Avril
 5 le 27 Oct. et 1 le 3 Nov. en B.S.; 3 le 9 Dec. et 1 le 14 à
 Fouencamps (80).

BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola

Aisne : Croûle le 25 Mai à St Nicolas aux bois.

Oise : Nidification probable en forêt de Compiègne : obs. d'Avril à
 Sept. (dont 10 le 23 Mai et 6 le 6 Juin) et en forêt d'Ermenon-
 ville (2 croûlent le 26 Juin); possible à Pierrefonds (6 le 17
 Avril).

2 données de Décembre.

Somme : Les données de ce département sont très loin de
 représenter le statut exact de cette espèce relativement
 abondante en migration dans le marquenterre avec un hivernage
 strict relativement faible.

1 le 19 Mars à Villers-Bretonneux; 1 le 3 Nov. à Rue (Froise); 1
 le 9 Dec. à Machy et 2 le 23 à Quend.

COURLIS CENDRE Numenius arquata

Stationnements en RBdS-POM

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	810	1330	658	400	7	21	320	890	1000	700	750	1300
2decade	800	1065	580	320	3	2	505	1295	900	875	1000	1040
3decade	1200	1000	270	40	1	77	800	830	950	920	850	1000

Quelques stationnements en terres, surtout au printemps :

8 le 8 Mars et 1 le 27 Avril à Boismont; 14 le 4 Mars à Noyelles
 sur mer; 18 le 4 Mars à Pendé et 21 le 11. 1 mâle chanteur le 22
 Avril à Forest-Montiers (marais de Neuville).

BdA : 20 le 8 Mars, 2 le 22 Avril, 1 le 9 Mai et 3 (dont 1 couple)
 le 28.

H.A. : 15 le 24 Janvier, 10 le 11 Mars, 9 le 27 Avril, 1 le 5
 Juin, 1 les 19 et 30 Septembre (et quelques migrateurs actifs
 observés les 4 Fev., 4 Mars et 22 Août.)

Aisne : 1 le 22 Avril à Sissonne et 1 à Chivres en Laonnois
 Bezutor : 5 c. nicheurs/2 pulli le 23 Mai (X. COMMECY et Y. CORBEAU), 1 ad./2 grands pulli le 5 Juillet et 2 ad./4 juv. le 13

Oise : 9 le 9 Fev. à Mortefontaine, 1 le 26 Sept. à Vauciennes.

COURLIS CORLIEU Numenius phaeopus

Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade					30		42	68	20			
2decade				58	16	1	60	150	100	1		
3decade				272	15	1	135	200	8			

BdA : 8 le 18 Avril, 105 le 22; 10 le 9 Mai, 11 en vol Sud le 19 Juillet.

En terres : 50 le 29 Avril à St Quentin en Tourmont; 8 en vol NE le 22 Avril à Rue, 41 le même jour à Forest-Montiers; 6 en vol NE le 28 Avril et 4 le 6 Mai à Boismont; 4 les 21 Avril et 6 Mai au Crotoy. (le passage est bien circonscrit).

H.A. : 8 le 21 Avril, 12 le 6 Mai et 1 en migration le 12 Sept.

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa

Stationnement en RBdS-POM:

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade				8	1	2	15	5	2	10	2	
2decade			1	3	5	3	11	2	8	2	1	
3decade			53	12			6	3	8	4		

Stationnement dans la P.M.P. en Mars-Avril (15 données du 4 Mars: 17 à Pendé au 28 Avril, 1 à Rue; quelques beaux groupes repérés 300 le 10 Mars, 875 le 11 et 66 le 1 Avril à Noyelles/mer.) 1 le 6 Mai au H.A. et 5 en vol N. le 17 Mai à Noyelles/mer.

En terres :

Oise : 6 le 15 Mars à Moru et 1 le 13 Mai à Brétigny et Varesnes

Somme : 38 le 15 Juillet à Grand Laviers et 3 le 21 Août à Roye.

BARGE ROUSSE Limosa limosa

Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	22	26	4	5	670		1	49	7	14	3	10
2decade	7		1		350	3		55	20	20		4
3decade	2		25	58	3	1	40	8	25	20	30	2

BdA : 7 le 18 Avril, 38 le 22; 70 le 9 Mai, 7 le 25.

45 le 21 Avril à Noyelles/mer et 51 le 6 Mai à Cayeux/mer.

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus

Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade				1	3	1	1		4	1	41	
2decade				1	1	1	1	1	1	3	2	
3decade				35		4		1	4	4	3	

BdA : 1 le 18 Avril, 26 le 22.

Boismont : 6 le 22 Avril, 10 le 6 Mai; H.A. : 1 le 19 Mars

En terres : Aisne : 4 le 22 Aout à Bucy le Long et 1 le 21 Sept.
 10 le 22 Aout à Aulnois/Laon et 8 le 10 Sept.
 Oise : Migration pré-nuptiale repérée à Moru : 1 les 1 et 13 Mai
 Retour : 1 le 4 Sept. et 6 le 13 à Vauciennes; 6 le 23 Aout et 1
 le 25 Sept. à Chevrières.
 Somme : 2 le 22 Avril à Estrées-Mons et 1 le 29 à Boves.
 Roye : 3 le 21 Aout; 4 les 4 et 10 Sept., 1 le 18.

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus

Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	16	22	35	45	1100	57	140	120	250	19	5	30
2decade	2	15	26	8	72	85	670	190	63	71		3
3decade	8	2	16	1400	860	150	175	450	49	20	5	7

BdA : 1 le 18 Avril, 85 le 22 et 160 le 9 Mai.
 P.M.P.: Nombreuses observations en Mars-Avril dont 100 le 25
 Mars, 158 le 8 Aril, 18 le 17 et 200 le 23; 370 le 6 Mai et 35 le
 24 au Bassin de chasse du Crotoy; 64 le 27 Avril à Boismont...
 H.A.:Max./mois, Janv.1; Mars 14; Avril 39; Mai 37; Juin 16 ;
 Juillet 7, Aout 7; Sept. 7. Un couple nicheur probable le 19 Juin
 Migrateurs actifs : 1 le 24 Janv. à Cayeux/mer, 80 le 17 Septembre
 au H.A.
 En terres : Aisne : 8 le 8 Aout et 4 le 23 à Aulnois/Laon et 12
 le 10 Set.
 Oise : Migration pré-nuptiale notée du 14 Mars au 16 Juin dans 2
 sites : Moru : 9 le 19 Mars, 2 le 26; Avril: 4 le 13, 5 le 22;
 Mai: 10 le 17, 2 le 27; 1 le 16 Juin
 Vauciennes : 11 le 21 Mars; 1 le 5 Avril; 5 le 17 et 7 le 27 Mai;
 1 le 6 Juin.
 Passage postnuptial plus discret à Chevrières (1 le 9 Aout et 2
 le 23) et Vauciennes (9 le 9 Aout et 3 le 13 Sept.)
 Somme : 1 le 22 Avril à Estrées-Mons; 1 le 17 Mai à Long-le-
 Catelet; 1 le 22 Mai à Boves.
 12 le 7 Aout à Roye; 1 le 3 Sept. à Dompierre-Becquincourt.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia

Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade					21	1	2	30	9	6	1	
2decade				2	28	2	42	37	6	2		
3decade				55	2	1	35	19	4	2		

BdA : 9 le 18 Avril et 13 le 22; 36 le 9 Mai.
 PMP: 2 obs. en Avril et 2 en Mai(max. 9 le 22 Avril et 18 le 10
 Mai) et 3 le 15 Juillet à Grand-Laviers.
 H.A.: Observé du 27 Avril au 28 Mai (max. 11) puis du 4 Aout au
 11 Oct. (max. 1)
 En terres : Aisne : 3 le 19 Avril à Boué, Aulnois/Laon : 10 le 8
 Aout, 7 le 28 et 4 le 10 Sept.; Bucy le Long: 1 les 8 et 22 Aout,
 4 le 21 Sept.
 Oise : migration pré-nuptiale en Avril-Mai; postnuptiale de
 Juillet à Octobre. Trois localités principales de suivi:
 Vauciennes, Moru, Chevrières : max./décades
 Avril, Mai, Juillet, Aout, Septembre, Octobre
 V: 2,?,2; ?,?,5; 1,1,?; 2,?,?; 1,3,1; 1,?,?;
 M: 7,1,3; 25,5,7; 7,7,7; 7,7,7; 7,7,7; 7,7,7;
 C: 1,7,7; 4,7,1; 1,?,?;
 Rares mentions ailleurs : 1 le 23 Avril à Morlincourt et 1 à
 Ponchon; 1 le 5 Sept. à Pimpres; 2 le 17 Oct. à Bailleul/Thérain.
 Somme: 20 données du 20 Avril au 25 Sept. en bassins de
 décantations,max., 14 le 21 Aout à Ham, 8 le 18 Aout à Estrées-
 Mons...

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus

Stationnements au POM: 1 le 7 Avril, max. par décade en Juillet: 1, 2, 1; Août: 5, 7, 7; Sept.: 2, 4, 3; Oct.: 0, 3, 3; 1 le 1 Nov. P.M.P.: Observé en Avril (1 le 8, 8 le 22...), de Juin à Sept. (dernier le 26).

En terres : Aisne, 9 le 19 Avril à Boué, 3 obs. en Août (max. 16 le 23 à Aulnois/Laon) et 3 obs. de Sept. (max. 11 le 21 à Bucy le Long).

Oise : Régulièrement observé à Moru, Vauciennes et Chevrières de fin Mars (2 les 19 et 22 à Moru) à Décembre (4 données dont 2 en fin de mois).; max. en mi-Juillet début Août. (max. 15 le 18 Juillet à Vauciennes); au total plus de 30 données.

Somme : 2 données hivernales à Estrées-Mons, 5 le 10 Janv. et 5 le 4 Dec.; ces valeurs sont des maximales pour la saison depuis la création de la centrale ornithologique..

A noter : 1 le 1 Mars à Boves, 2 obs. en Avril, retour max. de mi-Juillet à fin Août (21 le 7 Août, 14 le 23 à Estrées-Mons), encore 12 le 4 Sept. à Eppeville/Ham. Pas de données en Oct. Nov.

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

Littoral : 2 les 29 Avril et 3 Mai; 1 du 3 au 20 Juillet; 5 le 6 Août, 2 du 17 au 30; 1 du 8 au 12 Sept., 3 le 20, 1 les 22 et 27; 4 le 3 Oct., 7 le 18, 2 les 24 et 25.

H.A.: 1 les 13 et 17 Sept., 2 les 26 et 30; 1 le 3 Oct.

En terres : 2 obs. de migration pré-nuptiale dans l'Oise : 1 les 21 Avril et 1 Mai à Moru.; 4 données de mi-Juillet à début Sept. pour ce département en 3 sites (max. 5 le 23 Août à Chevrières).

Aisne : 4 données d'Août à mi-Septembre (max. 6 le 22 Août à Aulnois/Laon).

Somme: 6 données de mi-Juillet à début Sept. (max. 4 le 4 Sept. à Dompierre-Becquincourt).

CHEVALIER GUIGNETTE Actinias hypoleucos

P.O.M.: 1 le 30 mars; 2 du 18 au 24 Avril, 4 le 30; 6 le 1 Mai, 11 le 12, 9 le 23; 1 le 3 Juin; 7 le 9 Juillet, 23 le 16, 15 les 22 et 24; 22 le 5 Août, 20 le 15, 28 le 21; 12 le 1 Sept., 10 le 11, 6 le 25; 3 le 3 Oct., 2 le 18, 3 le 21.

H.A.: observé du 26 Avril au 5 Juin (max. 5) puis du 25 Juillet au 8 Nov. (max. 10 le 4 Août).

Migrateurs actifs : 5/1h. le 13 Juillet à Fort-Mahon.

En terres: Aisne, 2 le 19 Avril à Boué; 5 données entre le 8 Août (29 à Aulnois-Laon et 30 à Bucy le Long) et le 10 Sept. (max. 37 le 23 Août à Aulnois/Laon).

Oise : migration pré-nuptiale de mi-Mars à mi-Mai (7 données, max. 12 le 13 Mai à Moru, seule de plus de 10 individus premier, 1 le 14 Mars à Moru); post-nuptiale de Juillet à Octobre (23 observations, 8 données de plus de 10 oiseaux, surtout dans la première moitié d'Août, 20 le 18 Juillet à Courtieux, 18 le 7 Août à Moru, 18 le 9 à Vauciennes, 19 le 9 à Chevrières...). Derniers, 3 le 24 Oct. à Vauciennes.

Somme: de fin Avril à fin Mai (12 données, 2 de plus de 10, 17 le 10 Mai à Long le Câtelet et 14 le 23 à Roye) puis de mi-Juillet à fin Septembre (24 données, 8 de plus de 10 oiseaux, 75 le 7 Août à Estrées-Mons, 33 le 21 à Eppeville/Ham..., derniers le 25 Septembre, 3 données).

LIMNODROME A LONG BEC Limnodromus scolopaceus

Première donnée pour le département de l'Oise : 1 juv. les 26 et 27 Sept. à Vauciennes (A. ROUGE), accepté par le C.H.N.

BECASSEAU MAUBECHE Calidris canutus

Stationnements en RBdS-POM:

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	10	5		21	1100		4	100	170	255	100	100
2decade	5				900	24	25	25	245	400		
3decade	1	1		35	175	17	50	150	315	230	22	50

BdA: 24 le 18 Avril, 14 le 22; 140 le 9 Mai, 95 le 10 Sept.

H.AZ.: 2 le 27 Avril, 11 le 17 Mai, 1 les 26 Sept. et 3 Oct.

1 migrateur actif/1h. le 7 Fev. à Cayeux/mer

Toujours rare en terres : 5 le 17 Mai à Moru (60) (D. DELVILLE)

et 1 le 25 Sept. à Estrées-Mons (P. ROYER).

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta

Stationnements en RBdS-POM: 5 le 29 Avril; 3 le 1 Mai, 2 du 10 au 13; 1 du 28 au 31 Juillet; Août, 4 le 1, 12 du 20 au 30; Sept. 16 le 2 et 6, 4 le 19, 3 le 27; Octobre 4 le 10, 8 le 18, 10 du 25 au 30; 5 le 1 Nov.

BdA : 1 le 10 Sept.

H.A.: 1 les 17 Mai et 25 Juillet; 5 le 18 Août; 2 le 19 Sept., 11 le 26; 4 le 3 Oct.

En terres : Aisne, 1 le 22 Août à AsL; 1 les 21 et 26 Sept. à Bucy le Long.

Oise : 1 les 23 Août et 25 Sept. à Chevrières; 9 le 20 Sept. à Vauciennes, 1 le 27; 15 le 3 Oct. et 1 le 10.

Somme: 1 le 3 Sept. à Estrées-Mons; 1 juv. le 4 à Dompierre-Becq.

BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii

BdS-POM: 3 le 9 Mai, 2 le 16; 1 les 15 Juillet et 6 Sept.

1 le 6 Mai au H.A.; 7 le 10 Mai à Noyelles/mer (P. ROYER)

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina

Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	1800	4000	500	360	843	1	200	960	500	300	1050	4000
2decade	3000	2000	1600	80	1100	2	610	1200	350	200	1000	7000
3decade	2000	2100	138	1200	100	150	1300	500	12	800	2000	7000

BdA: 199 le 18 Avril, 295 le 29; 60 le 9 Mai; 50 le 10 Sept.; 45 le 6 Nov.; 500 le 29 Dec.

H.A.: observé du 10 Mars au 28 Juin (9 données, max. 25 le 17 Mai, 19 le 18 Avril...) puis du 25 Juillet au 28 Nov. (11 données max. 100 le 3 Oct., 15 le 26 Sept., 10 le 25 Juillet...)

Migrateurs actifs: 7 (sud)/1h. le 11 Janv.; 10 (N)/1h. le 7 Fev. sur le littoral.

En terres: Aisne, 2 le 10 Sept. à AsL; 2 le 21 à Bucy le Long

Oise: Moru, 3 le 19 Mars, 1 le 22, 1 le 1 Mai)

Vauciennes (6 le 5 Avril, 1 le 10 Oct.)

Chevrières (3 le 10 Oct.)

Somme : 2 le 3 Mars à St Sauveur; 4 le 7 Août à Roye; 1 le 3 Sept. à Domp. Becq.; 2 ad. le 4 à Roye; 1 le 25 à Estrées-Mons.

BECASSEAU COCORLI Calidris ferrugina

Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade						1		15	4	1	1	
2decade					4			14	10	2		

4 le 29 Avril en BdA, 10 le 11 Sept.
 3 les 26 et 30 Sept. au H.A.
 En terres: Aisne, 3 les 3 Août et 21 Sept. à Bucy le Long
 Oise : 1 donnée printanière remarquable : 1 les 14 et 15 Mars à
 Moru (D. DELVILLE).
 Somme : 1 le 4 Sept. à Roye

BECASSEAU SANDERLING Calidris alba
 Stationnements en RBdS-POM:

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade					246	95		1385	300	60		
2decade				6	850			1500	90	185		
3decade				225	365		400	500	65	30		

BdA: 430 le 18 Avril, 580 le 24 Juin, 250 le 25 Juillet, 100 le 10 Sept.;
 290 le 6 Nov.; 120 le 29 Dec.
 Quend-plage: 23 le 11 Janv.; 180 le 25 Sept.; 25 le 25 Dec.
 H.A.: 2 le 26 Avril.

BECASSEAU ROUSSET Tryngites subruficollis
 1 le 10 Août en B.S. (T. RIGAUX) et 1 du 21 au 23 Août au POM
 (M. FOURNIER, L. GAVORY et F. SUEUR)

COMBATTANT Philomachus pugnax

BdS-POM, premier, 1 le 1 Avril, 10 le 10, 1 le 13, 25 le 22;
 observé en mai, Juillet, Août, Sept. (max 9 le 9 Mai); 2 le 1
 Juin, 4 du 1 au 4 Oct. et 1 le 29 Nov.
 BdA: 12 le 18 Avril, 180 le 21; 52 le 9 Mai
 Plus abondant en P.M.P.: Le Crotoy, 5 le 11 Mars, 12 le 8 Avril;
 Noyelles/mer-Boismont : 41 le 10 Mars, 70 le 14, 25 le 22; 32 le
 8 Avril, 28 le 15; 171 le 22; 88 le 6 Mai; 10 le 3 Juillet et 100
 le 5 Mai à St Quentin en tourmont. 15 le 8 Mars à Pendé.
 H.A.: 23 le 10 Mars, 21 le 11; 13 le 15 Avril, 57 le 22; 43 le 6
 Mai, 1 le 17; 6 le 8 Sept., 2 le 26.
 En terres: Aisne: 85 le 5 mars à Beautor; 2 le 8 Août et 1 le 22
 à Bucy-le-Long, 1 F.juv. le 26 Sept.; un autre le 22 Août à
 Aulnois/Laon.
 Oise : Moru: 3 le 14 Mars, 2 le 11 Avril, 14 le 22; 6 le 1 Mai
 Vauciennes : 1 le 21 Mars; 6 le 5 Avril, 16 le 26; 2 les 9 Août
 et 13 Sept.
 Chevrières: 1 les 18 Juillet, 25 Sept. et 1M.3F. le 10 Octobre.
 Somme : 10 obs., 17 le 23 Avril à Roye, 19 le 30 Juin à
 Grand-Laviers, les autres entre le début Août et mi-Septembre
 sauf 160 le 15 Juillet à Grand-Laviers.

ECHASSE BLANCHE Himantopus himantopus

1 le 10 Mai à Noyelles/mer et 1 F. le 23 au P.O.M.

AVOCETTE Recurvirostra avocetta

Stationnements en RBdS-POM:

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	1		9	217	193	125	162	105	75	42	42	
2decade			35	183	163	81	135	86	36	49		6
3decade		1	250	189	144	60	111	89	60	61	1	

Nidification: 20 nids le 19 Avril, 61 le 30; 72 nids le 8 Mai, 85
 le 11, 3 pulli le 13; encore 4 pulli et 22 nids le 14 Juin; 1 nid
 le 16 Juillet; encore 4 jeunes non volants le 12 Août.
 2 ad. et 1 juv. à Grand-Laviers le 15 Juillet (nicheurs locaux?)
 une dizaine d'obs. en P.M.P. dont 210 le 25 Mars et 170 le 23
 Avril au Crotoy
 En terres: 1 le 19 Avril à Boué(02) et 2 le 18 Sept. à Dompiere-

PHALAROPE A BEC ETROIT Phalaropus lobatus

1 F. ad. le 2 Août au POM; 1 les 29 et 30 en RBdS
 Une donnée remarquable à l'intérieur des terres : 1 le 4 Sept. à
 Dompierre-Becquincourt (A. ROUGE).

ODICNEME CRIARD Burhinus oedicnemus

3 chanteurs le 24 Avril à Vaux-en-amiénois; 2 le 7 Mai et 1 le
 16 à Querrieu; 3 le 3 Juillet à Vignacourt. 1 le 8 à Fleury; 1 le
 5 Août à Berteaucourt-les-Dames. 2 le 1 Sept. à Daouers et 1 à
 Corbie. Toutes ces obs. se rapportent probablement à des nicheurs.

GRAND LABBE Stercorarius skua

Seulement deux données cette année : 1 le 9 Sept. en BdS et 1
 le 28 Dec. à Cayeux/mer.

LABBE PARASITE Stercorarius parasiticus

BdS: 1 les 28 et 30 Juillet; 2 ad. (phases sombres et
 intermédiaires) le 1 Août, 1 ad. (ph. interm.) et 1 lm. le 17, 2
 le 30.
 1 les 5 et 9 Sept. à Cayeux/mer.

GOELAND MARIN Larus marinus

Stationnements en RBdS-POM:

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	67	170	104	235	79	66	190	225	545	575	750	850
2decade	75	121	105	83	86	120	395	405	300	520	1070	190
3decade	65	15	50	61	175	170	365	1015	175	255	840	117

H.A.: 2 le 15 Avril; 13 le 11 Nov. 4 le 28; 6 le 26 Dec.
 93 le 3 Oct. entre Ault et Cayeux/mer.
 Toujours rare à l'intérieur des terres : 1 lm. (3ème année) le 27
 Juin à Barly(60) et 1 le 3 Oct. à Port-le-Grand(80).

GOELAND BRUN Larus fuscus

Stationnements en RBdS-POM:

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	2		4	15	6	1	130	10	100	75	50	3
2decade		5	5	12	25	15	100	70	10	70	10	
3decade			12	10	16	61	136	125	70	30	17	3

21 fuscus/intermedius 7 graellsii 11 lm. le 3 Oct de Ault à Cayeux
 1 fuscus/intermedius 3 graellsii et 5 lm. le 4 Oct. à Quend
 Quelques uns observés au H.A. de Janvier à mi-Mai, 12 lm. le 19
 Juin; puis en Oct.-Nov.

En terres: 1 ad. fuscus (ou intermedius ?) le 19 Août à Sains-en-
 amiénois(80) (X. COMMECY).
 1 ad. le 1 Janv. à Moru-Pontpoint (60) (D. DELVILLE , A. ROUGE)
 1 lm. (1er hiver) et 1 lm. (3ème hiver) type fuscus (ou
intermedius ?) le 26 Dec. sur la décharge de Rochy-Condé (60),
 l'oiseau de 3ème hiver est revu le soir même au dortoir de
 Montreuil/Thérain.

GOELAND LEUCOPHEE Larus cachinnans

RBdS: 1 ad. les 10 Août, 7 Sept., 10 oct. et 3 ad. le 5 Nov.
 Quend/Fort-Mahon: Absent les 2 Fev. et 5 Avril; plus abondant que
 l'argenté fin Août-début Septembre (mini 300) (T. RIGAUX);
 plusieurs fin Sept.; 10 le 4 Oct., 3 le 11
 Toujours rare au Sud du littoral picard : 1 ad. le 19 Sept. à
 Cayeux/mer et au H.A.; 3 le 3 Oct. entre Ault et Cayeux/mer.
 ... d'une stationnement vers l'intérieur des terres

52
 dans la Somme : 1 ad. trouvé mort le 1 Août à Forest-Montiers (G. FLOHART).

GOELAND ARGENTE Larus argentatus
 Stationnements en RBdS-POM:

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	1005	300	392	947	724	940	2342	4380	6010	1070	705	600
2decade	203	485	813	878	1027	828	1806	4290	2980	1700	355	545
3decade	202	526	748	800	990	730	3216	7450	3960	325	1010	410

Nidification: 14 à 16 couples le 19 Avril au POM; 7 nids le 10 Juin, 1 pullus le 11; encore 1 nid le 16 Juillet.

1 couple cantonné le 21 Avril au H.A. (X. COMMECY), devenir? La colonie des falaises n'a pas été recensée.

1 "omisus" repéré le 5 Avril sur le littoral.

Mini 1000 le 10 Sept. en BdA

286 ad. 140 im. le 3 Oct. d'Ault à Cayeux/mer (Le Hourdel)

Quelques observations en vallée de Somme et dans le Sud-Ouest amiénois de Janv. à Avril et en Nov.

Une seule donnée (!) de la décharge de sains en amiénois : 13 ad. 11 juv. le 19 Août (Un effort à faire pour les recenser plus régulièrement).

Oise: Données obtenues de Janvier à Mars et en décembre. Il serait intéressant de vérifier si parmi les Goélands argentés ne se glissent pas des Goélands leucophées. Ex.: 180 le 7 Dec. au dortoir de Montreuil/Thérain et 436 le 26. Ces oiseaux fréquentent essentiellement dans la journée la décharge de Rochy-Condé où 190 ad. ou subad. et 67 im. (1er et 2ème hiver) sont observés le 26 Dec.

GOELAND BOURGMESTRE Larus hyperboreus

1 ad. du 7 au 20 Janv. à Cayeux/mer, 1 juv. les 20 et 24 au H.A., 1 ad. 1 juv. le 25 à C/m, 1 juv. le 21 Fev. au H.A., 1 ad. le 22 à C/m.

1 (3ème-4ème hiver) le 26 juillet en BdS-POM

1 ad. le 12 Oct. à C/m et 1 im. le 14 Nov., 1 ad. 1 im. le 18; 1 im. (1er hiver les 21 et 30 Nov. au H.A.; 1 ad. 1 im. (1er-2ème hiver) le 19 Dec.

2 individus au moins fréquentent donc régulièrement le sud du littoral picard en automne-hiver.

GOELAND CENDRE Larus canus
 Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade	370	1300	188	395	15	29	441	4350	4800	2000	400	224
2decade	2122	500	757	38	28	21	145	4225	257	2250	500	200
3decade	1000	200	195	5	6	1	2800	2300	1400	575	307	200

127 le 3 Oct. d'Ault à Cayeux/mer (Le Hourdel). Quelques uns en Mars et Décembre dans le Ponthieu et dans les vallées de Somme (Janvier à mi-Mars).

Aisne : 4 (1er hiver) le 27 Dec. au dortoir de Soissons

Oise : Quelques uns de Janvier à Mars (max. 20 à Moru-Pontpoint et 10 à Pont St Maxence le 10 Janv.) puis en Décembre.

MOUETTE MELANOCEPHALE Larus melanocephalus

1 ad. les 15 Janv. et 11 Fev. à Woignarue; 1 ad. les 8 Avril, 22 Août et 29 Nov. au H.A.; 1 ad. le 21 Dec. à Cayeux/mer.

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus
Stationnements en RBdS-POM :

Nidification : POM: 6 nids le 19 Avril, 43 le 25; 48 le 18 Mai, 93 le 27, max. 135 nids le 10 Juin pour 144 couples présents. Premiers pulli le 6 Juin, max. en fin Juin (73 le 21) début Juil. derniers 3 le 26 Juillet.
nombreux pulli et juv. le 18 Juillet au marais du Crotoy.
300 à 500 couples le 28 Avril à Rue; une colonie tente de s'implanter à St Quentin en Tourmont dans une zone marécageuse où des nids sont observés le 13 Mai.
30 ad./3+2 juv. non volants le 21 Juillet à Vecquemont; 1 juv. non volant le 10 Août à Roye.
Estrées-Mons : 150 le 6 Sept., 790 le 17, 345 le 25.
Encore 1 en plumage nuptial le 28 Nov. à Cayeux/mer (C. VIEZ).
Aisne: Une grande colonie le 22 Avril à Athies/Laon.
Dortoir à Soissons (2400 le 27 Dec.) dont les oiseaux fréquentent dans la journée la vallée de l'Aisne, y compris la portion située dans le département de l'Oise au moins jusque Choisy au Bac.
Oise: Seule concentration importante en Mars : 3000 le 14 à Moru.
Nidifications à Vauciennes (Max. 600 oiseaux le 27 Mai) et Chevrières.
2 dortoirs repérés : Montreuil/Thérain (1650 le 26) où se rassemblent les oiseaux fréquentant dans la journée la décharge de Rochy-Condé distante de quelques kilomètres.
Creil/Montataire (3000 oiseaux) dont l'influence semble s'étendre au-delà de Compiègne.

MOUETTE PYGMEE Larus minutus

Aisne : 4 juv. le 23 Août à AsL et 1 juv. au PeA (L. GAVORY)
Oise : 1 Im. le 13 Mai à Verberie (D. DELVILLE).
Somme : BdS-POM: 1 le 20 Avril; 8 Im. le 24 Mai; 1 Im. le 25 Juin; 1 juv. le 22 Août; 1 Im. le 8 Oct.; 120 le 29 Nov.
H.A.: 2 le 19 Mars, 1 Im. du 22 Mars au 1 Avril, 1 les 21 Avril, 5 Juin et 30 Août. 2 ad. 4 Im. le 10 Oct., 3 juv. le 11, 1 ad. les 25 Oct. et 29 Nov.; 1 Im. le 27 Dec.
7 le 9 Fev. à Woignarue, quelques obs. en PMP en Avril-Mai, 9 le 30 Juin à Grand-Laviers, 1 juv. le 13 Sept. à Favières.

MOUETTE DE SABINE Larus sabini

1 Im. (2ème année) le 13 Mai en BdS (F. SUEUR).

MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla

RBdS-POM: 2 Im. mourantes le 2 Août, 1 juv. le 26; 1 ad. le 20 Dec.
H.A.: 1 juv. les 2 Août et 30 Nov. et 1 ad. le 21 Dec.

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger

RBdS-POM: 36 le 28 Avril; 7 le 1 Mai, 53 le 10, 1 le 28; 1 le 9 Juillet; 1 les 28 et 30 Août; 2 les 9 et 17 Sept., 1 le 25.
Rue: 6 le 28 Avril; Favières : 17 le 13 Sept., 1 le 30
Le Crotoy : 3 le 6 Mai; 40 le 28 Août; 13 le 7 Sept., 18 le 12.
H.A.: 4 le 22 Avril; 6 le 30 Août; 34 le 8 Sept., 19 le 13, 1 les 26 et 30; 2 le 12 Oct.
En terres : Aisne: une seule donnée! 1 le 23 Mai à Beautor
Oise: 3 le 13 Mai à Verberie; 4 le 27 Mai à Moru; 1 le 23 Août à Chevrières; 21 le 4 Sept. et 1 le 26 à Vauciennes.
Somme: 1 le 3 Sept. à Dompierre-Becquincourt et 14 le 4 à Roye.

GUIFETTE DE COULEUR CHLIDONIAS HYBRIDUS

1 les 29 et 31 Août au Crotoy (G. FLOHART, L. GAVORY, O. HERNANDEZ et T. RIGAUX)
1 juv. les 8 et 10 Sept. au H.A. (A. ROUGE).

GUIFETTE MOUSTAC Chlidonias hybridus

2 le 13 Mai en B.S. (F. SUEUR); 2 ad. le 10 Juin au Crotoy (G. FLOHART), 1 le 13 à Bray/Somme (L. TULLIE); 1 juv. le 28 Août au Crotoy (A. ROUGE).

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo

Stationnements en RBdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade					52		2	200	2			
2decade				45	205	14	65	100	2	1		
3decade				27	2	2	64	228	3			

Quend: 1 le 25 Sept.; 5 le 3 Oct...

Cayeux/mer: 2 en vol sud le 18 Oct....

H.A.: 2 le 25 Juillet; 10 le 18 Août, 32 le 22; 100 le 10 Sept., 18 le 12.

1 les 20 Juin, 5 Juillet et 28 Août à Moru (60).

STERNE ARCTIQUE Sterna paradisaea

2 le 29 Août; 1 juv. du 12 au 30 Sept. en RBdS-POM.

STERNE NAINNE Sterna albifrons

Stationnements en RBdS-POM : 40 le 13 Avril, 80 le 28; 139 le 1 Mai, 12 le 11, 5 le 29; 1 le 10 Juin, 2 le 11; 5 le 12 Juillet, 19 le 31; 90 le 10 Août, 34 le 12, 5 le 28; 11 le 6 Sept., 2 le 15

BdA: 127 le 18 Avril, 34 le 29; 12 le 25 Mai.

H.A.: 3 le 27 Avril; 4 le 18 Août, 2 juv. le 8 Sept.

Oise : 1 le 13 Mai à Verberie.

STERNE CAUGEK Sterna sansvicensis

Stationnements en RbdS-POM :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1decade				70	50	3	34	320	10			
2decade				157	20	22	417	90	10			
3decade			9	62	7	12	400	44	24			

BdA: 8 le 18 Avril, 7 le 29; 10 le 25 Mai.

H.A.: 3 le 25 Mars; 2 le 8 Avril, 29 le 15, 3 le 27; 24 le 25

Juillet; 1 le 4 Août, 130 le 18, 10 le 29; 9 les 8 et 10 Sept., 5 le 19. Ault : 7 le 13 Sept.

Dernière : 3 le 3 Oct. à Cayeux/mer.

GUILLENOT DE TROIL Uria alba

33 ramassés morts sur le littoral.
6 observations pour 7 oiseaux sur le littoral sud : 2 en Janv., 1 en Sept., 2 en Nov; et 2 Dec.

PETIT PINGUIN Alca torda

5 ramassés morts sur le littoral.
3 obs; 4 le 2 et 1 le 25 Nov. et 5 le 5 dec. en B.S.

PIGEON COLOMBIN Columba oenas

Nidification : Bien répandu dans les secteurs forestiers de l'Oise, en extension en F. de Hez (11 secteurs de présence contre 4 auparavant). Chants entendus du 24 Avril au 21 Août.
Pas d'obs. en Janv. et dec. (comme en 86), 40 le 21 Juin à L.S.M. et 50 le 11 Nov. à Gouvieux.

Migration de printemps sur le littoral : 20/2 h. le 14 Mars au POM (1 au H.A. ce même jour).
Quelques uns en hiver sur le littoral, 2 à Amiens le 20 Dec.
Une seule donnée dans l'Aisne, et en Décembre! 4 le 14 à Villers en Prayères.

PIGEON RAMIER Columba palombus

Abondant en nidification...mais non signalé par les observateurs. Troupes plus abondantes dans l'Oise (et dans l'Aisne?) que dans la Somme.

Janvier : 200 le 25 à Beaufort, 300 le 17 à Vauciennes (60)
450 le 9 en F. de Crécy, 250 le 26 à Villers/Authie(80)
Février : 1500 le 7 à l'Epine (60), 150 le 13 à Poix de Picardie
Octobre : 500 le 19 à Durscamp (60)
Novembre: 700 le 11 à L.S.M., 300 le 5 en F. de Compiègne, 1000 le 27 à Durscamp...
700 le 17 à Frémontiers
Décembre: 500 le 5 à Ornoy Villers, 1000 le 26 à Estrées, 7000 le 26 à Rémy...(80)
400 à Berrioux et 1500 à Chivres en Laonnois le 28 (02)
3000 le 29 en F. de Crécy.

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto

Nicheuse abondante, encore un nid le 3 Oct. à St Quentin en Tourmont (80). Quelques rassemblements hivernaux comptabilisés dans l'Oise : 30 le 11/XI à LSM, 50 à Crécy en Valois et 70 à Nanteuil le Haudoin le 6/XII...

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur

Premières : le 18 Avril à Fouencamps (80), 6 autres obs. ce mois dans le département.
le 28 Avril à V.S.S. (60)
Migration nette sur le littoral dans les dix premiers jours de Mai. Nicheuse abondante : 1 juv. volant le 28 Juin au POM, dernier chant noté le 9 Juillet
11 observations de Septembre dans la Somme.
Derniers, le 20 Sept. à Vauciennes (60)
le 3 Oct. en B.S. (2 oiseaux, déjà 1 la veille).

COUCOU GRIS Cuculus canorus

Premiers : le 7 Avril en F. d'Ermenonville (60)
le 8 Avril à Thézy-Glimont (80), arrivées nettes surtout autour du 20 du mois.
Nicheur abondant, parasite du Pipit farlouse (Beautor-02-) et du Pouillot véloce (POM-80-)
Derniers chants : le 17 Juin en F. de Compiègne, le 28 à Long (80)
Traces de passage : 7 le 17 Juillet au H.A., assez rare en Abôt.
5 obs. de Septembre, derniers : le 4 à Vauciennes (60), le 10 à AssL (02) et le 17 à N/M (80).

HIBOU DES MARAIS Asio FLAMMEUS

Uniquement observé dans la Somme et surtout en hiver sur le littoral :H.A.: 7 le 17/I, 1 en Fev. et Mars, 1 les 18 et 22/X, 13 le 8 (7 le 21)/XI, 12 le 22 (11 le 12)/XII. (maxima)
RBdS-POM : 1 les 31/I, 11/II, 27/IX, 3 le 4/X, 1 le 1/XI (max.)
1 à Rue les 29 et 31 Janvier.
Des nicheurs possibles à l'intérieur : Bray/Somme, Querrieu.

HIBOU MOYEN-DUC Asio otus

2 données dans l'Aisne : 2 tués par voiture en Janvier.
 4 données de nidification certaine (Berval, jeunes en Juillet) ou probables (Champlieu, F. de Compiègne, Moru) et un dortoir de 5 individus à Plailly en Dec. pour l'Oise.
 9 données dans la Somme, nicheur probable (Blangy/Poix, Flixecourt, Long, PDM, Vaux en amiénois, Velennes) vu aussi à Boves (Août) et Daours (Sept. et Dec.).

HIBOU GRAND-DUC

1 possible le 21 Janvier à Bouchoir (80) (C. VIEZ)

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua

3 sites d'observation dans l'Oise (Mortefontaine, Pierrefond, Pondron) et 4 dans la Somme (Amiens, Long, Méricourt/Somme, St Quentin en Tourmont).

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco

Entendue dans 11 localités de l'Oise (5 chanteurs en F. de Coye, 5 à Pierrefonds...); dans 13 de la Somme (3 chanteurs à Frémontiers, 2 c. à St Q. en T. poussins à mi-Juillet et mi-Août) et en forêt de St Gobain (02).

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba

3 sites de présence dans l'Oise en période de nidification et 9 dans la Somme.

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus

3 sites de présence dans l'Oise. Ermenonville (bois de Perthé 2c.), Mortefontaine (1 c.), Péroy les Gombries (2 c.) et 8 chanteurs à St Quentin en tourmont (80).

MARTINET NOIR Apus apus

Premiers : le 27 Avril au H.A. et le 28 en terres dans l'Oise (Compiègne) et dans la Somme (Long); arrivée massive vers le 10 Mai, encore 100 le 5 Juin au H.A. Nicheur abondant.
 Migrateurs actifs observés dès la mi-Juillet, 150 le 22 au H.A.
 3 données dans la Somme après le 20 Août.
 Derniers : le 4 sept. dans l'Oise (Chevrières et Vauciennes)
 le 10 sept. dans l'Aisne (A s L)
 le 13 sept. dans la Somme (Port le grand).

MARTIN PECHEUR Alcedo atthis

Encore peu d'observations pendant la période de nidification (Avril à Juillet) : 3 pour l'Oise, 5 pour la Somme (conséquence de l'hiver froid).
 2 localités d'observation dans l'Oise et 4 pour la Somme de Janvier à mars.

6 localités de présence dans chacun des 3 départements picards après la nidification.

A noter 1 à 2 pêchant en eau saumâtre (embouchure de la-Maye)-de mi-Sept. à début Novembre.

HUPPE FASCIEE Upupa epops

3 localités de nidification certaine ou probable dans l'Aisne : Plomion (nid en pommier, 4 juv. à l'envol), Harcigny et Marchais. 1 observation sur la carte de Rozoy/Serre.

GUEPIER D'EUROPE Merops apiaster

4 sites de nidification probable ou certaine dans l'Aisne dont un dans le camp militaire de Sissonne (3 autres tenus secrets par protection). Max.: 20 le 7 Août et 12 le 3 sept. ailleurs. Les sites concernent de 1 à 5 c. au maximum semble-t-il.

PIC MAR Dendrocopos medius

Aisne : population nicheuse importante en Forêt de St Michel; on compte 1 c. de Pic mar pour 2 c. d' Epeiche (L. LARZILLIERE)
Oise : nicheur en F. de Compiègne (juv. peu volants le 13 Juin) et en F. de Hez. Observé aussi en Avril à Pierrefonds.

PIC VERT Picus viridis

Plusieurs données toute l'année dans l'Oise et la Somme. (10 localités citées pour les 2 départements), plus localisé dans l'Aisne?
Premiers chants dès début Février.

PIC EPEICHE Dendrocopos major

Le plus abondant des Pics : 11 localités dans l'Oise, 13 dans la Somme. Premières manifestations nuptiales en Mars, nourrissages fin Mai (Camon-80-) et juin (le 13 en F. de Laigue -60- et le 14 à Frise-80).

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor

Observé en période de nidification (Mars à Juillet) dans 3 localités de l'Oise, 12 de la Somme et 1 de l'Aisne. En dehors de cette période, 4 fois dans l'Oise et 5 dans la Somme. Encore un M. creusant une cavité le 13 Août à Boves-80-.

TORCÔL FOURMILIER Jynx torquilla

Nicheur certain en F. de Compiègne (jeunes au nid le 3 juillet), mini 2 couples.
1 au POM du 14 Juin au 27 Sept. (3 données) nicheur?

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata*

Nidification constatée à Quend-Plage (80) (2 couples), Cayeux-sur-mer (80) (2), Amiens (80) (3), Noyon (60) (1), Nanteuil-le-Haudoin (60), Saint-Just-en-Chaussée (60), Crépy-en-Valois (60), Compiègne (60), Saint-Quentin (02)
des données hors période de nidification sont réalisées à Senlis (60) le 15.II, Loeuilly (80) le 11.II, au H.A le 8.XI.

ALOUETTE LULU *Lullula arborea*

Une donnée printanière concerne un migrateur : 1 le 5.IV au POM
migration postnuptiale beaucoup plus fournie : 415 migrateurs en BdS du 27.IX au 6.XI, 492 au POM du 11 au 24.X
une observation hivernale 11 le 26.XII à Rue(80) (Flandre)
Aucune donnée dans les terres!

ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris*

Bien peu de données! peu suivie
Cayeux-sur-mer/Brighton (80) : 27 le 03.I, 32 le 20, 10 le 28, 2 le 12.XI
BdS : 1 le 2.XI

HIRONDELLE DE CHEMINEE *Hirundo rustica*

première : le 25.III à Noyelles-sur-mer (80)
dernière : 1 le 2.XI en BdS

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*

première : le 25.III à Noyelles-sur-mer (80) et au HA
Nidification : un couple à Rue (80) (Flandre)
30 couples le 14.VII au Crotoy (80) (Saint-Firmin)
dans l'Aisne, 10 couples à Beautor, seule donnée?
dans l'Oise, meilleure prospection Pimprez (110 trous), Chevrières (400/500), Verneuil-en-Halatte (20), Breuil-le-Vert (445), Merlincourt (2), Moru (100)
La situation est largement sous-estimée dans la Somme et l'Oise
Passage postnuptial de début août à mi-septembre. Le dortoir de BdS compte jusque 6000 oiseaux le 19.VIII.
dernière : le 4.X en BdS

HIRONDELLE DE FENETRE *Delichon urbica*

première : le 29.III à Camon (80)
Passage postnuptial de fin août à fin octobre sur le littoral
dernière : le 18.X à Pimprez (60) et 1 le 4.XI en BdS

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*

premier : le 31.III à la Neuville-en-Hez (60)
passage postnuptial de début août à mi-octobre avec quelques retardataires jusque la fin du mois
dernier : le 30.X en BdS

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*

Près de 15000 migrateurs entre mi-septembre et début novembre en BdS

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*

Renseigné dans l'Oise à Moru, Vauciennes, Bitry, Pimprez, Courtigny, Verneuil et en Plaine maritime picarde : Rue (80), Villers-sur-Authie (80),
maximum : 10 le 14.II à Moru (60) et 15 le 5.XII à Vauciennes (60)
présent jusqu'au 11.IV et à partir du 24.X

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus*

Présent sur le littoral de fin octobre à ?
maximum : 28 le 30.XII en BdS

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris*

Uniquement signalé sur le littoral du 23.VIII au 12.X : 14 migrateurs actifs et 14 oiseaux/jours en stationnement en BdS
1 juv le 12.X au HA

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*

présente de fin mars à fin octobre (dernière date tardive : 1 le 2.XI en BdS)

- type *M.f. flava* : nidification courante

- flavéole *M.f. flavissima* : abondante en plaine maritime picarde, ailleurs 1 à Camon (80) le 13.V, 1 à Moru (60) le 11.IV, 1 le 30.III à Montlognon (60).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea*

Nidification possible ou probable dans l'Oise à Saintines, Vauciennes, Brétigny, Pontdron, dans la Somme à Long et à Amiens

migration postnuptiale de fin août (1 le 28.VIII en BdS) à fin octobre

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba*

- type *M.a. alba*

données hivernales rares : 1 le 15.II à Long (80), 1 le 25.XII à Quend-Plage (80), 1 le 28.XII à Noyelles-sur-mer (80) et à Rue (80), 3 le 26.XII à Pimprez (60), le 15, le 04.XII à Estrées-Mons (80).

- de yarrel *M.a. yarrelli*

1 couple mixte nourrit des pulli au POM le 23.V (F. SUEUR), 1 couple nicheur à Quend-Plage (80)

TROGLODYTE *Troglodytes troglodytes***ROUGEGORGE *Erithacus rubecula*****ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos***

premier : 1 le 8.IV à Saint-Quentin-en-Tourmont (80)

dernier : 1 le 6.IX à Verberie (60)

GORGEBLEUE *Luscinia svecica*

L'espèce poursuit son avancée annoncée en 1986.

Fouencamps (80) : 3 observations dont 1 le 17.IV (G. NEVEU et P. ROYER)

Genvry (60) : 1 couple nicheur certain dans une plantation récente de Peuplier *Populus sp.* (A.

PIQUEMAL, M. et P. SENGEZ)

Enfin signalé à Courteuil-sur-Vic, 1 femelle le 22.VIII (A. ROUGE)

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*

retour noté dès le 11.III

nicheur commun

dernier : 2 au POM le 1.XI

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*

premier : 1 le 8.IV en Forêt de Compiègne (60)

Nicheur uniquement dans l'Oise (?) : Forêt de Compiègne (vieilles futaies de Hêtres), Cuise-la-Motte

Le passage postnuptial est bien noté dans la Somme, plus particulièrement sur le littoral du 10.VIII au 18.X (maximum fin octobre)

dernier : 1 le 18.X en BdS

TRAQUET TARIER *Saxicola rubetra*

premier : 1 mâle à Forest-Montiers (80) et à Noyelles-sur-mer (80) le 22

Le passage pré-nuptial est noté dès cette date et son maximum est atteint la première quinzaine de mai (nombre de données : 15)

Nidification : il est connu de 2 sites dans la Somme (Noyelles-sur-mer : 9 couples et Rue : 1 couples)

Dans l'Oise, il est signalé à Varesnes (1 couple ?) et dans l'Aisne, il reste plus abondant : Sissonne (Camp militaire), Beautor...etc.

le passage postnuptial débute fin août (le 18) et s'achève en octobre (le 11) (nombre de données : 22)

TRAQUET PATRE *Saxicola torquata*

Quelques observations hivernales toutes en plaine maritime picarde : 1 mâle le 26.II au HA, 1 femelle le 3.XI au POM, 1 mâle le 21.XII à Noyelles-sur-mer (80) et, 1 le 29.XI et le 5.XII au HA.

retour sur les lieux de reproduction dès le mois de mars

Il est signalé nicheur un peu partout mais les effectifs sont peu importants (25 sites). Des oiseaux sont signalés en stationnement lors du passage postnuptial (août, septembre, octobre)

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*

Le premier est signalé le 11.III au HA

La migration de retour débute fin mars et s'achève mi-mai (nombre de données : 33)

Il nidifie en plaine maritime picarde : POM : 1 femelle nourrit le 23 et 24.VI, HA : 2/3 couples
le passage postnuptial débute fin août, culmine fin septembre et s'achève en octobre (nombre de données : 50)

derrière : 1 le 3.XI en BdS

MERLE NOIR *Turdus merula*

signalons un début de nidification hivernale : construction d'un nid le 9.II à Amiens (80)

MERLE A PLASTRON *Turdus torquata*

C'est surtout le passage pré-nuptial qui est noté

avril : 1 le 15 à Pierrefonds (60)

1 mâle à Forest-Montiers (80)

1 le 29 à Quends (80) (dunes)

1 femelle le 31 à La Chaussée-Tirancourt (80)

mai : 1 femelle le 9 à Boves (80)

octobre : 7 le 24 en BdS (G. FLOHART et L. GAVORY) , effectif remarquable

1 mâle le 26 à Amiens (80)

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*

signalée en hiver avec des effectifs peu conséquents, la majorité des données concerne des bandes inférieures à 100 individus. Néanmoins, quelques beaux rassemblements sont observés : + de 1000 le 15.II à Varesnes (60), 600 le 24.XII à Saint-Quentin-en-Tourmont (80), 300 le 25 à Froise (80)

dernière : 20 le 29.IV à Merlincourt (60)

première : 1 le 25.IX à Estrées-Mons (80)

Nidification : dans l'Aisne : Sissonne,...etc; dans la Somme : 2 le 9.VIII au POM

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos*

commune

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*

Les stationnements sont peu conséquents, signalons 1000 à Neuville (80) le 23.III. Cette donnée fut la dernière de la saison.

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus*

signalée nicheuse un peu partout, un rassemblement de 13 le 23.VIII à Poeuilly (02)

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*

conforte ses effectifs qui avaient été durement touchés lors des hivers rigoureux précédents, elle est signalée :

Marais de Sacy-le-Grand (60) : 1 cht (c'est peu 11 en 86)

Plaine maritime picarde (80) : 6 chts (4 localités)

Vallée de la Somme (80) : 14 chts (7 localités)

Vallée de l'Avre et de la Noye (80) : 3 chts (3 localités)

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*

première : 1 cht le 12.IV au POM

Assez bien répandue que ce soit sur des milieux secs (larris, coupe forestière...) que sur des milieux humides (marais...).

Signalée en Vallée de la Somme (80), Plaine maritime picarde (80), Vallée de la Noye (80), Forêt de Compiègne (60), Bois de Frémontiers (80), Vallée de la Souche (02) mais les effectifs sont peu significatifs. Quelques données intéressantes : 6 chts à Rue (60), 12 chts à Noyelles-sur-mer (80), 10 chts à Villers-sur-Authie (80)

dernière : 2 chts le 5.IX à Boves (80)

LOCUSTELLE LUSCINOIDE *Locustella luscinioides*

première : 2 chts le 18.VIII à Rue (80)

peu notée, elle est relativement localisée

Plaine maritime picarde (80) : 10 chts (3 localités), Vallée de la Somme (80) : 1 cht (1 localité), Vallée de la Noye (80) : 2chts (2 localités), Vallée de la Souche (02) : 1cht (1 localité), Travecy (02) : 1 cht
 Tout cela est peu significatif !

PHRAGMITE DES JONC *Acrocephalus schoenobaenus*
 premier : 3 chts le 6.IV au POM
 signalé un peu partout
 dernier : 1 le 12.IX au HA

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris*
 première : 1 cht le 16.V à Boves (80)
 dans l'ensemble, elle est peu notée : 14 localités
 dernière : 1 cht le 28.VIII à Vaux-sur-Somme (80)

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus*
 premier : 1 cht le 25.IV au POM
 commune en vallée
 dernier : 2 à Boves (80) le 2.X

ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus*
 première : 1 cht le 26.IV à Long (80)
 signalée en vallée de la Somme : Long (80) : 1 cht, Breilly (80) : 1 cht, Sailly-le-Sec (80) : 1 cht, Daours (80) : 1 cht, Morcourt (80) : 2 cht, La Chaussée-Tirancourt (80) : 2 chts, Picquigny (80) : 3 chts, Bray-sur-Somme (80) : 3 cht, Camon (80) : 1 cht, en vallée de la Noye et de l'Avre : Boves (80) : 3 chts, Fouencamps (80) : 3 chts, en vallée de la Souche : Marchais (02) : 3 chts enfin à Travercy (02) : 1 cht.
 dernière : 1 le 21.IX à Borest (60)

HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina*
 le 8.V : 1 cht à Noyelles-sur-mer (80) (G. FLOHART)
 le 24.V : 1 à Rue (80) (V. BAWEDIN)
 le 20.VI : 1 à Varesnes (60)

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta*
 premier : 1 cht le 26.IV à Bergicourt (80)
 signalé un peu partout, Forêt de Compiègne (60), Pontdron (60), Sissonne (02), Marchais (02), Velennes (80), Argoules (80)...

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*
 première : 1 cht le 22.IV à Forest-Montiers (80)
 Nicheur bien reparté mais toujours avec des effectifs réduits. Quelques données intéressantes : 3 chts à Quends (80), 5chts à Saint-Quentin-en-Tourmont (80), 3 chts à Bouquemaison (80); surtout bien représentée en milieu dunaire et bocagé.
 dernière : 1 le 8.IX à Saint-Quentin-en-Tourmont (80)

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*
 première : le 19.IV
 nicheuse commune
 dernière : 1 le 8.IX à Saint-Quentin-en-Tourmont (80)

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*
 première : 1 le 9.IV en Forêt de Compiègne (60)
 commune

FAUVETTE A TETE NOIRE *Sylvia atricapilla*
 quelques données hivernales : 1 femelle le 11.I au POM et le 29.XI en BdS
 retour dès la fin mars
 commune

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*
 nicheur rare dans la région, signalé de l'Oise uniquement : Forêt de Compiègne du 21.IV au 6.VIII (D. MURE et D. DELVILLE)

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*

premier : 2 chts le 20.IV à Fleury (80), passage important le 26
noté un peu partout : Lucheux (80), Frémontiers (80), Forêt de Hez-Froidmont (60), Ermenonville (60)...

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*

commun

deux individus de la sous-espèce *tristis* sont signalés sur le littoral :

1 le . en BdS (G. FLOHART, B. COUVREUR et L. GAVORY)

1 le 23.XII au Crotoy (T. RIGAUX et F. SUEUR)

quelques mentions hivernales : 1 le 20.II à Saint-Quentin-en-Tourmont (80), 2 le 28.XII à Villers-sur-Authie (80) et 1 au POM le 29.XII

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus*

premier : 1 le 1.IV au POM

dernier : 1 le 13.IX à Dompierre-Becquincourt (80) (A. ROUGE)

ROITELET HUPPE *Regulus regulus*

peu de données

ROITELET TRIPLE-BANDEAU *Regulus ignicapillus*

peu de données

GOBEMOUCHE GRIS *Musciapa striata*

premier : 1 le 15.IV à Amiens (80)

dernier : 1 le 15.IX à Saint-Quentin-en-Tourmont (80)

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca*

premier : 1 le 9.IV en Forêt de Compiègne (60)

nicheur certain en Forêt de Compiègne (60) (observation d'un nid (D. DELVILLE))

passage postnuptial : 5 observations

dernier : 1 le 15.IX à saint-Quentin-en-Tourmont (80)

MESANGE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus*

nicheuse en plaine maritime picarde (80), deux sites sur la commune de Noyelles-sur-mer (80)
pour un minimum de 6 couples; nourrissage le 26.IV

MESANGE A LONGUE QUEUE *aegithalos caudatus*

commune

MESANGE NONNETTE *Parus palustris*

peu de données

MESANGE BOREALE *Parus montanus*

rien de significatif

MESANGE HUPPEE *Parus cristatus*

peu signalée

MESANGE NOIRE *Parus ater*

surtout signlée dans les forêt de l'Oise (Forêt de Laigue, de Compiègne, de Retz, d'Hormoy-Villers) et à Mortefontaine (60)

MESANGE BLEUE *Parus caeruleus*

MESANGE CHARBONNIERE *Parus major*

SITELLE TORCHEPOT *Sitta europaea*

GRIMPEREAU DES JARDINS *Certhia brachydactyla*

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*

premier : 1 cht le 28.IV à Boves (80)

nicheur un peu partout : 15 sites signalés ?
dernier : 1 le 23.VIII à Aulnoy-sous-Laon (02)

PIE GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*

- bonne année avec des observations réparties sur une quarantaine de sites
- hivernage signalé sur 15 sites en Plaine maritime picarde, en vallée de Somme et d'Authie, dans l'Aisne et dans l'Oise (Forêt de Compiègne (60))
nidification : 21 couples cantonnés signalés : Vallée de la Somme (80) (7 couples), de l'Authie (80) (4 couples), de la Maye (80) (2 couples), Plaine maritime picarde (80) (3 couples), Aisne (6 couples)
dispersion postnuptiale et migration signalées à proximité des sites de nidification ou plus loin : -
POM 1 le 28.X

-Oise : Compiègne (28.X), Retz (17.IX et 3.X), Vauciennes (3.X, 29.XI)

quelques hivernants signalés en décembre hors sites traditionnels : Berneuil (23.XII)

PIE GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*

signalée uniquement dans l'Aisne :

- Vesles-et-Caumont : 1 couple le 27.VI, 2 femelles/juv le 18.VII
- Sissonne (Camp militaire) : 3 couples et un mâle le 5.VII, 2 couples et 3juv le 18.VII

CHOUCAS DES TOURS *Corvus monedula*

migration signalée sur le littoral dans la deuxième quinzaine d'octobre et début novembre, maximum 320 en 1 heure au POM le 24.X

CORBEAU FREUX *Corvus frugileus*

CORNEILLE NOIRE *Corvus corone corone*

59 migratrices signalées entre le 27.IX et le 18.X en BdS
un rassemblement de 150 le 18.XI au Bois du Tillet (60)

CORNEILLE MANTELEE *Corvus corone cornix*

poursuite lente de la diminution des effectifs hivernants

	J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1 / O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
BdS/POM :	6	4	2	4	12	5	2	2	2	2	2	10	10
St-Quentin :				1	18							15	
en-Tmt													
Le Hourdel :											1	1	
TOTAL				23							26		

CASSENOIX MOUCHETE *Nucifraga caryocatactes*

1 le 5.X à Saveuse (80) (M. DERFERNAND)

PIE BAVARDE *Pica pica*

un nid en construction à Poix (80) le 12.II
effectif comptées au POM
I : 60, II : 12, III : 9 / XI : 25, XII : 62

GEAI DES CHENES *Garrulus glandarius*

des mouvements signalés du 17.IX au 3.XI sur le littoral avec 153 individus comptés.

PISON DES ARBRES *Fringilla coelebs*

256000 migrants en BdS du 26.IX au 5.XI

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla*

quelques grosses troupes signalées en janvier-février, sur le littoral (maximum 100 le 20.I à Cayeux-sur-mer (80) ou dans les forêts de l'Oise (maximum 2000 le 17.I à Villers-Cotterêt (60))
quelques individus s'attardent en avril-mai laissant même des couples avec mâles chanteurs : 1 couple le 9.V à Pontdrion (60), plusieurs chanteurs en Forêt de Hez (60) le 31.III...
retour dès fin septembre (3 le 30.IX en BdS) en nombres relativement faibles.

SERIN CINI *Serinus serinus*

1 cht dès le 17.II à Amiens (80)

pas d'hivernage noté cette année

TARIN DES AULNES *Carduelis spinus*

seulement 5 données hivernales pour 84 oiseaux

quelques chanteurs signalés dans l'Oise (Boulincourt le 8.V, Breuil-le-Vert (Le 9.V) et dans la Somme : 1 cht le 19.IV à Barly où il avait été noté en V.85

LINOTTE MELODIEUSE *Carduelis cannabina*

LINOTTE A BEC JAUNE *Carduelis flavirostris*

uniquement signalée sur le littoral ou à proximité, en petites quantités

	J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1	M2	M3 / O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
BdS	3	1	2						3					10	
Noyelles-s/mer						2									
Le Hourdel	3			200	15		25				120		25	140	
Brighton						15				110	100				
HA							5			30					
Sailly-Bray										3			5		
BdA												150			

VERDIER *Carduelis chloris*

quelques hivernants signalés en bandes à l'intérieur comme sur le littoral

Noyelles-sur-mer (80) : 300 le 11.II, MBdM : 30 le 2.XII, POM : max 4 le 31.I, Estrées-Mons (80) : 50 le 10.I

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea*

quelques hivernants à l'intérieur 25 le 21.II en Forêt de Laigue (60), 5 le 1.III à Cuise-la-Motte (60)

des chts sont signalés à l'intérieur comme sur le littoral Forêt de Hez (60) 3 chts le 7.IV (G. FLOHART), Forêt de Compiègne (60) 1 cht le 22.IV et 4.VI (D. MURE), Forêt de Luceaux (80) 3 chts début avril (G. FLOHART). Quel est le statut de ces oiseaux ?

CHARDONNERET *Carduelis carduelis*

GROS BEC *Coccothraustes coccothraustes*

nicheur dans la plupart des massifs forestiers

BEC CROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*

signlé dans quelques massifs forestiers :

Bouquemaison (80) : 1 mâle, 2 femelles/juv le 26.III (G. FLOHART)

Compiègne (60) : 1 mâle les 9.VII, 7.VIII, 2 les 11.VIII, 22.VIII et 23.IX (D. DELVILLE)

Bois du Tillet (60) : 12 le 4.X (D. DELVILLE)

uniquement une donnée sur le littoral, 3 en vol Sud le 2.IX en BdS (G. FLOHART)

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis*

hivernage conséquent sur le littoral

	J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1	M2	M3 / O2	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
HA	19	15	17	20	16	14	13	13	1		50	33	25		3	
BdS	16	15	15	12	14		13			2	1	2	3		62	
Brighton								3							12	

deux données à l'intérieur

Vauciennes (60) 1 le 21.XI (A. ROUGE)

Warvignies (60) 1 le 26.XII (A. ROUGE)

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

une donnée hivernale 1 les 18 et 19.I en BdS (F. SUEUR)

confirmation de l'existence d'un passage prénuptial sur le littoral au HA : 20 le 20.III (B. COUVREUR, L. GAVORY et P. ROYER)

la migration postnuptiale donne bien des observations régulières

	S2	S3	O1	O2	O3	N1	N2	N3	D1
Sailly-Bray								1	
BdS	3	3	8	7	5	13	1		
HA			2	1		2	3	1	

trois données tardives :

- 1 le 24.XII à Saint-Quentin-en Tourmont (80) (G. FLOHART)
- 1 le 24.XII à Froise/Rue (80) (G. FLOHART)
- 1 le 19.XII à Neuville (80) à 70 kms de la mer (G. FLOHART)
- 2 le 23.XII à Cayeux-sur-mer (Le Hourdel) (80) (T. RIGAUX)

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus*

quelques hivernants sur le littoral (maximum 10 au POM le 24.I) ou dans les friches et marais de l'intérieur (trois données : 200 le 17.I et 100 le 18.II à Vauciennes (60), noté le 26.I au Paraclet (80))

BRUANT JAUNE *Emberiza citrinella*

BRUANT ZIZI *Emberiza cirlus*

trois données de l'Oise : 1 mâle et 1 femelle le 18.I à Compiègne (A. ROUGE) et 1 ou 2 le 20 et 27 à Cuise-la-Motte (A. ROUGE)