

COMPLÉMENTS A L'AVIFAUNE DU HÂBLE D'AULT

par F. Sueur

Cette courte note constitue une addition au rapport "Contribution à la connaissance de l'avifaune du Hâble d'Ault (Somme)". Elle regroupe des données anciennes, des émissions lors de la rédaction du rapport et des observations réalisées ou publiées depuis.

LISTE SYSTEMATIQUE

Grèbe jougris, Pétrel tempête, Fou de Bassan, Cormoran huppé, Héron bihoreau, Cygne de Bewick, Oie d'Egypte, espèces signalées par Duchaussoy (1913).

Nette rousse, signalons une autre observation de cette espèce : 1 mâle le 29 avril 1976 (Kérautrot, 1977).

Pulicula myroca, Bider à duvet, Harle bièvre, Fusard candré, Salicard pêcheur, espèces signalées par Duchaussoy (1913).

Faucon pèlerin, signalé par Duchaussoy (1913), il faut noter qu'à cette époque il nichait encore dans les Salicades littorales du sud du département.

Faucon hobereau et émérillon, Marcotte de Baillon, Pintier noir et guignard, Bécassine double et gourde, Chevalier stramon, culblanc et sylvain, Bécasseau marécage, minute, de Semard et sanderling, espèces signalées par Duchaussoy (1913). Bécasseau faicinelle, espèce signalée par Marcotte (1880) et Duchaussoy (1913).

Bécasse blanche, Phalarope à bec étroit, Cedronne orland, Grand labbe, Labbe pomarin, espèces signalées par Duchaussoy (1913).

Labbe parasite, 1 mâle adulte du 30 septembre 1958 figure dans la collection Van Eespen (1912).

Goéland bourgmestre et Monette mélanocéphale, ces 2 larvées sont signalées par Duchaussoy (1913).

Monette pygmée, le rapport ne mentionnait qu'une observation de 3 individus le 25 avril 1976 ; cette espèce était déjà signalée par Duchaussoy (1913) ; 2 autres observations récentes celles-ci : 45 le 29 avril 1976 (Kérautrot, 1977) et 1 adulte le 24 avril 1977 (P. Royer, F. et M. Sueur).

Monette tridactyle, Sterne hansel, caspienne et noire, Pinguin torda, Mergule nain, Guillemot de Troil et à miroir, espèces signalées par Duchaussoy (1913).

Troglodyte et Accenteur rouchet, espèces omises lors de la rédaction du rapport, toutes deux fréquentent les zones de buissons.

Locustelle tachetée, Phragmite aquatique, Rousserolle turdoïde, Bruant prover et fou, espèces signalées par Duchaussoy (1913).

NOTES BREVES SUR L'EVOLUTION DE L'AVIFAUNE

A la lecture du rapport et de cette courte note on remarque la richesse avifaunistique du Hâble d'Ault, toutefois depuis plusieurs mois on observe une certaine diminution des stationnements de Plongeurs (effectifs maxima observés : Royer et Sucur, 1977 ; observations non publiées)

- * Fuligule milouin : janvier 600 en 1975, 40 en 76, 35 en 77
décembre 130 en 1975, 32 en 76
- * Fuligule morillon : février 20 en 1975, 6 en 77
décembre 110 en 1975, 2 en 76
- * Foulque macroule : janvier 400 en 1975, 330 en 77
février 300 en 1975, 400 en 76
novembre 400 en 1975, 355 en 76
décembre 380 en 1975, 370 en 76

La météorologie ne peut être la cause de ces différences d'effectifs, en effet les hivers 1974-75 et 1975-76, notamment les mois de décembre, furent doux tandis que l'hiver 1976-77 fut plus froid : décembre étant "en 7e position parmi les mois de décembre les plus froids depuis 30 ans" et janvier "le plus froid" (Bull. Clim. Somme n°115 et 116). Comparativement les stationnements d'Anatidés notamment auraient dû être plus importants durant l'hiver 1976-77 que pendant les hivers précédents plus doux par arrivée de populations hivernant habituellement plus au nord ; il n'en a rien été bien au contraire. Remarquons toutefois que pour la Foulque macroule, la diminution des effectifs n'est guère sensible en janvier et novembre, le coup plus marqué en décembre (environ 42 % en moins) mais il y a une progression en février (un tiers en plus). Il faut donc noter que les stationnements de cette espèce ont beaucoup diminué sur le grand étang tandis qu'ils ont progressé sur une gravière abandonnée et dépassent parfois ceux du grand étang comme le 16 janvier 1977 : 225 contre 110. C'est donc au niveau de ce dernier qu'il faut rechercher les causes de diminution des effectifs de Plongeurs.

L'exploitation d'une gravière à proximité est peut-être probable à moins qu'il y ait eu une modification de la flore et de la microfaune du Hâble (par infiltration d'eau de mer par exemple), une étude précise serait nécessaire. A noter que le 24 avril 1977, nous avons remarqué la présence de 3 vieillards sur cette gravière désormais abandonnée, la fréquentation prolongée de celle-ci risque de diminuer l'intérêt ornithologique du grand étang.

En conclusion, des mesures pour la protection du Hâble d'Ault s'avèrent nécessaires :

- contrôle de l'implantation des gravières
- interdiction de la voile dans cette zone, la proximité de la mer ne rendant pas utile la fréquentation de ce site pour ces activités.

BIBLIOGRAPHIE

- Anonyme (1977) - Contribution à la connaissance de l'avifaune du Hâble d'Ault (Somme) - Sect. Orn. GEPOP, Rapport n°1, 1977, 9 p.

Bulletin Climatologique. Département de la Somme.

Décembre 1976 (n°110) et Janvier 1977 (n°112).

Duchaussoy H. (1913) - Contribution à l'étude des oiseaux en Picardie - Bull. Soc. Lin. N. Fr. 21 (411) 320-324.

Héautret L. (1977) - Centrale ornithologique régionale. Synthèse des observations du printemps et de la saison de nidification 1976 (mars à juin 1976) - Le Héron (1) 7-41.

Marcotte F. (1860) - Les animaux vertébrés de l'arrondissement d'Abbeville - Mém. Soc. Imp. Emul. Abb., in 8°, 256p. (oiseaux 39-150).

Royer P. et Sueur F. (1977) - Centrale Ornithologique GEPOP. Synthèse des observations 1975. L'Avocette 1 (1) 1-15.

Van Kempen Ch. (1912) - Contribution à l'étude des oiseaux du nord de la France - Bull. Soc. Lin. N. Fr. 21 (405) 10-42, (406) 55-83.