

CENTRALE ORNITHOLOGIQUE G.E.P.O.P.

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 1976

\*\*\*\*\*

Depuis 1973, les synthèses ne font que s'accroître en volume et en informations ornithologiques variées. D'énormes progrès ont été réalisés depuis la création de la Centrale (relevés quantitatifs fréquents particulièrement pour les Anatidés et les Limicoles, recensements d'espèces nicheuses pour certains secteurs...) ; cependant notre grande faiblesse provient de l'absence d'ornithologues dans une grande partie de la Somme, et du peu de données nous parvenant, malgré leur accroissement spectaculaire cette année, de l'Aisne et de l'Oise. Les zones activement prospectées sont la vallée de la Somme d'Amiens à Péronne, le secteur de Boves, le littoral particulièrement la Baie de Somme, le Marquenterre et le Hâble d'Ault, les secteurs les plus extrêmes (falaises au sud et Baie d'Authie au nord) étant quelque peu délaissés par les observateurs.

Au point de vue climatologique, cette année a été marquée par une forte sécheresse estivale.

Parmi les faits ornithologiques marquants, signalons seulement la nidification du Héron pourpré, du Busard Saint-Martin et l'observation dans l'Oise de la Fauvette pitchou.

P. Royer et F. Sueur

Observateurs : L. Allouche, F. et G. Baudry, G. Boccourt, S. Boutinot, E. Chacron, E. Conty, J.F. Cornuet (G.O.P.), E. Corrado, L.N. Darras, J. Debergue, J.F. Dejonghe (G.O.P.), C. Delahoche, R. Delcourt, F. Dordain, G. Dubois, M. Duclercq, G. Duhamel, Y. Flament, E. Feurcy, J. Hédin (P.O.M.), G. Hernandez, A. Jouve, L. Kérautret (G.O.N.), G. Landos, V. Lefebvre (G.O.N.), G. Lemiel, A.J. Loiseau (A.P.O.), M. Mannecart (P.O.M.), P. Maréchal, D. Masson, J. Mouton (G.O.N.), G. Noveu, P. Pigeon, E. et N. Ranson, Y. Ridet (P.O.M.), T. Rigaux, C. Riols (C.O.C.A.), P. Royer, F. et M. Sueur, P. Thiery, P. de Thieulloy.

Abréviations : BA = Baie d'Authie 80  
BS = Baie de Somme 80  
HA = Hâble d'Ault 80  
POM = Parc Ornithologique du Marquenterre 80  
M! = mâle  
F. = femelle  
ad. = adulte  
subad. = subadulte

Abréviations : im. = immature  
 juv. = juvénile  
 pull. = pullus, pulli (poussin)

Lorsque le département n'est pas mentionné après la localité, il s'agit de la Somme.

Plongeon arctique (*Gavia arctica*)

1 les 11 et 17 avril au HA, 1 im. recueilli le 19 déc. à Cayeux-sur-Mer ; 1 les 16, 24 et 30 au PCM.

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)

BS-POM : 1 les 18 et 25 janvier, les 1er et 23 février, les 27 et 30 mars, les 22 et 29 déc.

1 le 15 février à Saint-Valery-sur-Somme.

HA : 1 les 25 et 26 mars, le 17 avril.

2 le 19 déc. à Cayeux-sur-Mer.

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)

6 le 20 mars à Quend-Plage, 7 le 3 avril au HA.

Nidification : localité, nombre de couples (moyenne de pulli /couple)

Bray-sur-Somme 4 à 6 (2,5)

Cappy\* 1 (0)

Cléry-sur-Somme min. 7

Corbie\* 2 (3)

Le Hamel 2 (2,5)

Vaux-sur-Somme\* 1 (1)

\*nouvelles localités de nidification

Signalé aussi en période de nidification à Amiens (hertillon-nages), Boves, Brie, HA-30 et Saint-Boetien-02.

Cléry-sur-Somme : 11 le 29 mars, 18 le 16 mai, 30 le 27 juillet, 20 le 1er août, 35 le 8 sept., 58 le 26, 42 le 10 oct., 30 le 24, 15 le 14 nov., 10 le 27.

Bray-sur-Somme : 12 le 8 sept., 5 le 17 oct.

BS : 3 le 3 oct., 12 le 17 nov., 28 le 19, 3 le 2 déc.

Grèbe jougris (*Podiceps griseigena*)

Littoral : 2 trouvés morts le 19 déc., 1 recueilli quelques jours auparavant.

BS : 1 les 2, 14 et 16 déc.

Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)

1 le 3 janvier au POM, 2 le 10 déc. en BA, 1 le 30 à Bernay-en-Ponthieu.

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)

BS-POM : 2 le 21 février, 1 le 22, 1 les 19 et 21 nov.  
 2 juv. le 10 oct. à Vermand-02.

Grèbe castagneux (*Podiceps ruficollis*)

Nicheur commun.

BS-POM : 9 le 22 février, 8 le 27 mars et le 2 avril, 2 ad.  
/1 nid le 2 juin, 1er oeuf pondu le 2 ou 3, 1 les  
29 août et 3 sept., 3 le 18 sept., 4 le 3 oct., 9  
le 31, 26 le 17 nov., 15 le 27, 18 le 2 déc., 21 le  
7, 18 le 14, 12 le 16, 6 le 22.  
10 les 8 et 9 mai à Saint-Boetien-02.  
8 le 27 nov. à Brie.

Fou de Bassan (*Sula bassana*)

1 ad. 3 im. le 18 sept. à Quend-Plage, 3 ad. 3 im. le 2 oct. en  
BA, 4 ad. 1 im. le 3 en BS.

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)

HA : 1 les 25 et 31 mars, 1 le 3 avril.  
Quend-Plage : 2 le 2 avril, 3 le 3, 1 le 12.  
BS-POM : 1 le 7 mai, 2 le 26 août, 1 les 27 et 28, 1 le 3  
sept., 10 le 10, 7 le 3 oct., 4 le 24, 1 im. le  
7 déc.  
2 le 28 août à Cayeux-sur-Mer.  
Cléry-sur-Somme : 1 le 17 oct. et le 24, 2 le 14 nov., 1 le  
21 (aussi 2 le 28 mars).  
2 ad. le 11 déc. au Hourdel.

Héron cendré (*Ardea cinerea*)

Colonie de Boismont : 24 couples.

Signalé assez régulièrement le long de la Somme (cartes  
50.000e : Amiens, Albert et Péronne) en juin. La nidification  
à l'intérieur du département de la Somme n'est pas connue.

BS-PCM (max. mensuels) : 25 en janvier, 4 en février, 15 en  
mars, 9 en avril, 4 en mai, 12 en août, 50 le 3 sept.,  
45 le 3 oct., 18 les ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 17 nov. et 29 déc.

Cléry-sur-Somme : 10 le 1er août, 6 le 8 sept., 10 le 17 oct.,  
15 le 24, 1 les 27 nov. et 28 déc.

Héron pourpre (*Ardea purpurea*)

1 couple/1 nid/4 oeufs au Hamel, pas d'éclosion semble-t-il.

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)

POM : 1 le 27 mai, 1 les 2 et 3 juin, 3 le 8 août, 2 le 26,  
1 du 27 au 29, 1 les 3 et 18 sept.

Blongios nain (*ixobrychus minutus*)

Boves : 1ière observation le 7 mai, 1M. 1F. le 23 juin, 2  
couples au marais communal le 7 août.

HA : 1F./im. le 4 juillet.

Bray-sur-Somme : 2M. le 10 juillet, 1M. le 1er août.

Corbie : 2M. le 9 juillet, 1M./2 juv. non velants le 30,  
1M. le 11 août.

Grand Butor (*Botaurus stellaris*)

1 le 30 mars à Noyelles-sur-Mer.

3 chanteurs le 11 avril dans la zone de marais comprise entre  
Boves et Fouencamps (Le Paralet), 2 le 23 mai à Fouencamps.

1 chanteur le 31 mai à Frise.

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)

1 du 19 au 21 mai à Lignières-Châtelain. 6 le 9 juin à Fienvillers, 2 les 5 et 6 août à Doullens (Presse locale), 1 le 7 août au POM, 4 le 29 sept. à Fresneville (Presse locale), 1 le 6 oct. à Daours.

Cigogne noire (Ciconia nigra)

1 ad. le 29 août à Noyelles-sur-Mer.

Spatule blanche (Platalea leucorodia)

POM : 1 à 6 fin mars-début avril, 3 le 2 juin, 1 le 3, 7 le 19 août, 1 subad. le 29, 3 le 3 sept., 12 le 10, 6 le 15, 3 le 17, 1 subad. le 18, 1 ad. lim. les 25 et 26, 1 juv. du 19 au 23 oct., 2 juv. du 24 oct. au 31 déc. 1 subad. le 28 août au HA, 1 tiré fin août à Boisment.

Cygne tuberculé (Cygnus olor)

1 le 5 février au POM.

HA (max. mensuels) : 5 en mars, 6 en avril, 26 en mai, 16 en juillet, 4 en août, 9 en sept., 25 en oct. et nov., 24 en déc.

Erie : 10 le 2 mai, 1 le 8 sept., 4 le 27 nov., 2 le 19 déc.

Cléry-sur-Somme : 6 le 8 sept., 4 ad. le 17 oct., 8 le 24, 11 le 27 nov., 4 le 28 déc.

Nidification signalée dans quelques localités : Dompierre-sur-AuThie (Presse locale), Dreuil-les-Amiens, HA (2 ad./4 pulli : 3 blancs et 1 gris le 4 juillet, plus que 3 juv. les 16 et 17 sept.) et Péronne.

Cygne de Bewick (Cygnus bewickii)

1 le 5 février au POM.

Oie des moissons (Anser fabalis)

BS-POM : +100 début février, 200 le 24, 2 le 30 mars, 3 le 21 nov., 15 les 26 et 27, 20 le 3 déc., 30 le 17, 10 le 31.

24 le 21 nov. à Rue.

A l'intérieur, 1 le 14 déc. au Hamel.

Oie cendrée (Anser anser)

BS-POM : les individus "sauvages" et semi-domestiques cantonnés dans le POM ayant quitté la région en fév. les observations suivantes concernent donc des oiseaux réellement sauvages.

26 le 20 mars, 2 le 28, 25 le 18 avril, 15 le 27 mai, 115 le 17 nov., 7 le 24, 1 du 27 au 29, 1 les 14 et 22 déc., 2 le 24, 1 le 29.

1 le 3 avril au HA, 45 le 26 oct. à Amiens, 150 le 26 et 220 le 31 à Corbie, 87 le 27 à Boves, 20 le 1er nov. à Quend-Plage. Des passages sont notés les 14 et 15 nov. à Corbie et Hangest-sur-Somme, le 15 à Amiens. 3 le 15 déc. à Bray-sur-Somme, 70 le 18 à Quend-PLAGE.

Bernache nonnette (Branta leucopsis)

2 le 1er février et du 14 mars au 14 avril au POM.

Bernache cravant (Branta bernicla)

## - ventre sombre (B. b. bernicla)

BS-POM : 1 le 25 janvier, 1 blessée le 9 mai, 1 les 3  
et 26 oct., 6 le 17 nov., 4 le 21, 13 les 24  
et 29, 13 les 2 et 7 déc., 2 le 18, 1 le 22.

## - ventre pâle (B. b. hrota)

Le 7 mai en BS, i courtise 1 Tadorne F. dont le M.  
cherche à chasser la Bernache (G. Duhamel, A. Jouve).  
Mayaud (Alauda 1956, 24 : 53-61) ne cite qu'une donnée  
pour la France concernant cette sous-espèce : 1 le 18  
février 1879 au Crotcy (Coll. Marmottan n°8 et non pas  
n°10 comme l'indique Mayaud). Actuellement cette sous-  
espèce est considérée comme assez régulière dans notre  
pays.

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)

BS-POM : 1500 le 22 février, 1300 le 14 mars, 1200 le 21,  
220 le 30, 250 le 18 avril, +100 HEM ad. le 27  
mai, 65 ad. le 2 juin, +70 le 4 juillet, 62 le  
26 août (surtout jeunes de l'année : migration de  
mue des ad.), 16 (1 seul ad.) le 28, 30 le 30, 3  
ad. et 20 juv. le 3 sept., 60 le 18, 125 le 25,  
200 le 27, 450 le 3 oct., 1200 les 17 et 19 nov.,  
1000 le 24, 900 le 29 nov. et le 7 déc., 1100 les  
14 et 16 déc., 1500 le 29.

nidification : environ 120 couples, premiers pull. notés  
le 27 mai, 3 à 15 par couvée.

Cléry-sur-Somme : 23 le 4 janvier, 6 de fin février à fin  
mars, 10 le 27 nov., 11 le 28 déc.

Péronne : 5 le 11 nov., 6 le 28, 11 le 12 déc.

2 en vol le 31 janvier à Saveuse.

Canard colvert (Anas platyrhynchos)

BS-POM : 116 le 27 août, 150 le 3 sept., 200 le 10, 60 les  
17 et 18, 250 le 3 oct. ; 200 les 24, 26 et 29 nov.,  
260 le 2 déc., 280 le 7, 300 les 16 et 29.

150 le 4 juillet au HA.

Cléry-sur-Somme : 25 le 1er août, 200 le 8 sept., 350 le 16  
oct., 100 le 24, 215 le 28 déc.

200 le 19 déc. à Bihécourt-02.

Sarcelle d'hiver (Anas crecca)

BS-POM : 50 le 3 janvier, +1000 début février, 143 le 14  
mars, 48 le 14 avril, 32 le 27 août, 100 le 3 sept.,  
70 le 17, 200 le 3 oct., 125 le 24, 400 les 17 et  
19 nov., 350 les 24 et 29, 1000 le 2 déc., 450 le  
7, 300 le 14, 250 le 16, 220 le 29.

HA : 32 le 22 mars, 3 le 17 avril, 24 le 30 août, 25 le 16  
sept.

15 le 26 mars à Boisment et 3M.3F. à Boves.

Cléry-sur-Somme : 7 le 25 août, 1 le 24 oct., 6 le 28 déc.

Plusieurs centaines en novembre à Péronne, encore nombreuses  
en déc.

Canard chipeau (Anas strepera)

BS-POM : 2 le 25 janvier, 9 le 14 mars, 10 le 24, 9 le 27,  
4 le 30, 3 les 9 et 10 avril, 2 le 3 oct., 4 le  
17 nov., 1F. le 26, 10 le 7 déc., 12 le 29.  
HA : 1M. le 21 mars, 11M.11F. le 22, 20 le 3 avril, 16 le  
17, 4 le 4 juillet, 1M. le 2 nov.  
4M.8F. le 5 nov. à Corbie, 1F. le 1er déc. à Quend.

Canard siffleur (Anas penelope)

BS-POM : 150 le 14 mars, 8 le 2 avril, 3M.3F. le 27 mai,  
4 les 26 et 27 août, 6 les 3, 17 et 18 sept.,  
60 le 3 oct., 50 le 24, 180 le 17 nov., 150 le  
19, 125 le 26, 75 le 27, 200 le 29, 170 le 2  
déc., 50 le 29, 40 le 30.  
HA : 4 le 17 avril et le 17 sept., 1 le 17 oct.  
1M.1F. le 4 avril à Reneuil-02.

Canard pilet (Anas acuta)

BS-POM : 10 le 3 janvier, passage important début février,  
674 le 14 mars, 90 le 27, 30 le 30, 3 le 2 avril,  
1M.1F. le 14, 1M. le 16 mai (3 couples auraient  
niché), 75 les 25 et 26 sept., 120 le 3 oct., 50  
le 24, 180 le 17 nov., 150 le 19, 120 le 24, 200  
le 29, 160 le 2 déc., 180 le 7, 200 les 14 et 29.  
HA : 3M.3F. le 21 mars, 15 le 22, 36 le 26, 10 le 3 avril,  
1M.1F. le 27 mai.  
2 le 28 mars à Cléry-sur-Somme, 10 le 31 oct. à Vermand-02,  
2 le 11 nov. à Péronne.

Sarcelle d'été (Anas querquedula)

HA : 2M. le 22 mars, 1M.1F. le 29, 4 les 3 et 17 avril.  
POM : 1M.1F. le 28 mars, 1 le 27 mai.  
1 le 26 mars à Boisment, 1M. les 8 et 9 mai à Saint-Boetien-  
02, 1M. le 19 août à Corbie.

Canard souchet (Anas clypeata)

BS-POM : 3 le 25 janvier, 55 le 14 mars, 4M.1F. le 28, 16  
le 4 avril, 11M.7F. le 11, 10 le 18, 3M.2pull. le  
27 mai, 5 fin août, 7 le 10 sept., 8 le 3 oct.,  
28 le 17 nov., 18 le 19, 12 les 24 et 29, 42 le  
16 déc., 24 le 29.  
HA : 1M. le 21 mars, 38 le 22, 50 le 25, 3M. le 27 mai, 1F.  
le 30 août.  
Péronne : 3 couples en mars, 1M. le 25 avril, 3M.4F. en nov.  
10 le 26 mars à Boisment, 1M.1F. le 28 mai à Corbie, 9 le 8  
sept. à Cléry-sur-Somme.

Nette rousse (Netta rufina)

3F. le 30 déc. au POM.

Fuligule milouin (Aythya ferina)

POM : 1F. les 3 et 18 janvier, 27 le 24 nov., 5 le 29, 34 le  
16 déc., 16 le 29.  
HA : 40 le 24 janvier, 51 le 22 mars, 16 les 17 avril et 27  
mai, 1M. le 28 août, 4 le 30, 21 le 2 nov., 40 le 21,

49 le 28 nov., 52 le 11 déc., 12 le 19.  
1 le 2 mai à Brie, 2M.5F./im. le 23 août et 2M. le 9 déc.  
à Corbie, 1 le 23 déc. à Saint-Valery-sur-Somme.  
Cléry-sur-Somme : 23 le 29 février, 200 le 14 mars, 10 le  
8 sept., 40 le 17 oct., 50 les 24 et 31,  
58 le 27 nov., 1 le 28 déc.

Fuligule milouinane (Aythya marila)

1M.1F. les 1, 18, 25 janvier et 1er février au POM, 2M.  
1F. le 16 déc.

Fuligule morillon (Aythya fuligula)

HA : 6 le 24 janvier, 11 le 21 mars, 2 les 2 et 17 avril,  
5 le 28 nov., 2 le 11 déc.  
POM : 1M.1F. les 24 et 28 mars, 2 le 2 avril, 2M. le 27  
mai, 1M. le 17 sept. et le 26 nov., 2 le 29 déc.  
Sailly-Laurette : 1M.1F. le 16 avril, 1M. le 30 déc.  
Cléry-sur-Somme : 2M.1F. le 10 juillet, 5 le 27 nov.

Fider à duvet (Somateria mollissima)

BS : 12 le 2 sept., 24 le 27, 4 le 3 oct., 2M. le 2 déc.,  
4 le 14.  
2M. le 27 nov. à Quend-Plage.

Macreuse noire (Melanitta nigra)

Quend-Plage : +100 le 24 janvier, +30 le 22 février, +50  
les 20 et 26 mars, 800 le 10 avril, 300 le  
12, 50 le 16, 20 le 28 mai, 30 le 31 oct.,  
+20 le 27 nov.  
A l'intérieur, 6 le 21 nov. à Cléry-sur-Somme.

Macreuse brune (Melanitta fusca)

26 le 25 janvier à Cayeux-sur-Mer, 1ère le 19 sept. à Quend-  
Plage, 57 le 16 déc. en BS.  
(nombreuses données non significatives).

Harelde de Michelien (Clangula hyemalis)

2M.1F. le 10 déc. en BA.

Garrot à œil d'or (Bucephala clangula)

BS-POM : 1F. les 3 et 4 février, 3F. le 6, 1F. le 24 mars,  
1F. les 1er et 2 avril, 1F./im. le 19 nov., 1F.  
les 2 et 14 déc.

Harle piette (Mergus albellus)

POM : 1F. les 3 et 4 février, 2F. le 24 déc., 1M.3F. le 30.

Harle bièvre (Mergus merganser)

POM : 1F. le 4 février, 1M. le 9 avril.

Harle huppé (Mergus serrator)

BS-POM : 1 le 25 janvier, 5M.1F. le 27 mars, 14 le 30, 3M.  
2F. le 1er avril, 1M. le 2, 3 le 25 sept., 9 le  
17 nov., 4 le 24, 5 le 14 déc.  
1 le 3 avril à Quend-Plage, 1M. les 17 avril et 28 nov. au HA.

Buse variable (Buteo buteo)

Localités d'observation dans l'Aisne : Saint-Basien  
" " " l'Oise : forêt de Compiègne  
" " " la Somme : BS, Beves, Corbie,  
Fouencamps, Frémontiers, La Chaussée-Tirancourt. POM  
(à la 16 déc...), Monchaux, Quend-Piège, Rue, Saint-  
Quentin-en-Tourmont, Savenne et Velennes.

Buse pattue (Buteo lagopus)

1 du 22 nov. au 17 déc. dans la Marquenterre (peut-être  
une 2e le 17 déc.).

Bœrvier d'Europe (Accipiter nisus)

Cette espèce discrète n'a été signalée qu'en 5 localités :  
Forêt de Compiègne-60, BS, Le Hamel, POM et Rue.

Milan royal (Milvus milvus)

3 fin août au POM.

Milan noir (Milvus migrans)

1 les 3 et 9 mai à Saint-Basien-02.

Bondrée apivore (Pernis apivorus)

1 le 6 juin en forêt de Compiègne-60.

Bucard des roseaux (Circus aeruginosus)

MA : 1F. le 22 mars, 1 le 25 avril.  
2M, 1F. les 8 et 9 mai à Saint-Basien-02, 1F./im. le 7 août  
à Fouencamps/Beves.  
Cléry-sur-Somme : 2 le 29 février, 1F.im. le 1er août, 3 le  
22, 1F.im. le 3 sept., 2 le 3 oct., 1F. le  
10.  
1F./im. le 17 sept. à Moyelles-sur-Mer, 1 im. les 18 et 27  
dans la Marquenterre, 1M. le 30 oct. à Vermand-02.  
Nidification : 1 couple dans la Marquenterre, nidification  
échoua à la suite de la mort du M.

Bucard Saint-Martin (Circus cyaneus)

1F./im. le 25 janvier au Crotoy, 1 le 30 à Saint-Grotien.  
1F./im. le 21 mars à Soissons, 1M, 1F. le 23 à Vercourt, 1  
le 28 à Cléry-sur-Somme.  
BS-POM : 1F./im. le 27 mars et du 17 nov. au 29 déc.  
Quend : 1F./im. les 1er et 3 avril, 1M. le 9.  
1 le 19 avril en forêt de Compiègne-60, 1 le 1er mai à  
Beves, 1M, 1F. les 8 et 9 mai à Saint-Basien-02, 1M, 2F./im.  
le 15 août à Buire-Courcelles, 1F./im. le 10 déc. en BA,  
1M. le 15 à Cappy, 1F./im. fin déc. à Velennes.  
Nidification d'un couple en forêt de Crécy (Balscourt R. 1977,  
L'Avocette 1(1)15-18).

Balbusard pêcheur (Pandion haliaetus)

BS-POM : 1 du 10 au 30 août, 2 le 3 sept., 1 les 10 et 25,  
1 le 3 oct.  
Hailly : 1 le 19 sept., 2 le 21.  
2 le 3 oct. à Cléry-sur-Somme, 1 le 10 à Vermand-02.

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) (Buteo buteo) Buteo variabilis  
1 le 26 sept. au POM, 1 im. le 7 déc.  
1 im. blessé au fusil le 27 déc. à Luchaux.

Faucon hobereau (Falco subbuteo)  
1 le 25 sept. au POM.

Faucon émerillon (Falco columbarius)  
BS-POM : 1F./im. le 24 oct., les 17 et 21 nov., 2M. 1F. le  
22 nov., 1M. le 29 nov. et le 17 déc., 1F. le 29  
déc.

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)  
Seul rapace répandu dans notre région : 37 localités d'ob-  
servation dans la Somme, 2 dans l'Aisne (Saint-Boetien  
et Vermand).  
Max. observés en août : 10 à 15 sur l'aérodrome d'Abbeville,  
11 entre le Hourdel et Saint-Valery-sur-Somme le 30.  
Dans le secteur de Corbie en oct., 1F./im. occupe une zone  
de 90 ha environ dont 46 de marais, 36,5 de laris et  
cultures et 7,5 de bois.

Caille des blés (Coturnix coturnix)  
Dernière : le 19 sept. à Corbie.

Grue cendrée (Grus grus)  
2 le 19 avril à Herbécourt (Presse locale), 6 le 7 oct. à  
Vermand-02.

Râle de genêts (Crex crex)  
1 chanteur le 13 mai à Fouencamps.

Foule macroule (Fulica atra)  
Erie : 70 le 8 sept., 310 le 27 nov., 300 le 19 déc.  
Cléry-sur-Somme : 80-90 le 10 juillet, 100 le 1er août,  
500 le 8 sept., 600 le 17 oct., 500 le 27 nov.,  
645 le 23 déc.  
80 le 28 déc. à Feuillères, 80 le 30 à Bernay-en-Ponthieu.  
HA : 150 le 22 mars, 90 le 3 avril, 150 le 27 mai et le 4  
juillet, 400 les 28 et 30 août, 400 le 16 sept., 250  
les 17 sept. et 24 oct., 365 le 2 nov., 180 le 21,  
250 les 28 et 29, 230 le 11 déc., 370 le 19.  
Nidification : 2ad./6 pull. le 20 avril à Boves (date précoce)  
2ad./6 pull. d'environ 1 semaine le 3 sept. à  
Cléry-sur-Somme (date tardive).

Outarde canepetière (Otis tetraz)  
1 le 4 avril à Reneuil-02.

Huitrier-pie (Haematopus ostralegus)  
BS-POM : 2000 le 3 janvier, +800 le 25, 5000 les 21 et 22  
février, 3400 le 14 mars, 800 les 21 et 30, 300  
les 4 et 14 avril, 450 le 18, 300 le 16 mai, 10  
le 27, 450 le 26 août, 600 le 27, 900 le 28, 600  
le 29, 500 le 30, 1600 le 2 sept., 750 le 10,

3500 le 26, 1500 le 27, 1500 le 3 oct., 2000 le  
24 nov., 3000 le 27, 3200 le 7 déc., 2000 le 29.  
nidification : min. 6 couples.  
60 le 2 oct., en BA, 140 le 10 déc.

#### Vanneau huppé (Vanellus vanellus)

Nidification : Min. 30 couples dans le Marquenterre (1 à  
4 pulli/couvés), 1 couple le 2 juin à Rue  
et 1 ad./1 pullus au Crottoy, 3 ou 4 couples  
au HA (juillet).

Max. observés : 200 le 2 oct. à Gueschart, 250 le 3 à Rue,  
400 le 10 à Cléry-sur-Somme, 250 le 13 à Bussy-les-Dacours  
/Vecquemont/Lamotte-Brobière, +200 le 17 à Montdidier,  
250 le 3 déc. à Rue, 1200 le 16 en BS, 295 le 19 au Haurdel,  
310 le 22 en BS, 300 le 28 à Cappy, 600 le 29 et 210 le 30  
en BS.

Des décomptes réguliers le long d'un parcours fixe (Corbie,  
Hamelet, Vaire-sous-Corbie, Le Hamel, Sailly-laurette,  
Sailly-le-Sec, Vaux-sur-Somme, Corbie) donnent un aperçu de  
l'abondance de cette espèce dans notre région au cours des  
5 derniers mois de l'année (voir Figure 1). Lors du dernier  
décompte effectué pendant une période de gel ininterrompue  
et après les chutes de neige du 28 déc., aucun individu n'a  
pu être observé : à l'intérieur, départ de cette espèce  
vers des régions plus méridionales comme le prouve notamment  
l'observation d'un vol de 300 vers le sud le 28 déc. à Cappy

#### Pluvier doré (Pluvialis apricaria)

BS-POM : 1 le 27 août, 9 le 29, 4 le 10 sept., 550 vers le  
sud le 16 déc. (en 6h), 240 vers le sud le 29 (en  
5h), 35 le 30 déc.

7 le 19 sept. à Abbeville.

Rue : en vol vers le sud, 14 le 12 déc., 31 le 15, 60 le 16,  
48 le 17, 35 le 31.

#### Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)

Quend-Plage : 1 le 16 avril, 2 le 17.

BS-POM : 14 le 7 mai, 12 le 27, 8 le 4 juillet, 6 le 26  
août, 45 le 27, 120 le 29, 100 les 3 et 26 sept.,  
300 le 27, 100 le 3 oct., +200 le 24, 40 le 17  
nov., 15 le 24, 110 le 2 déc., 160 le 7, 100 le  
29.

#### Grand Gravelot (Charadrius hiaticula)

BS-POM : 2500 le 14 mars, 1000 le 28, 600 le 30, 30 le 4  
avril, 6 le 17, 40 le 16 mai, 24 le 27, 4 le 3  
juin, 6 le 4 juillet, +800 le 29 août, 300 le 3  
sept., +1000 le 26, 30 le 3 oct., 4 le 24.

nidification : 1 couple.

HA : 2 le 25 mars, 5 le 27 mai, 1 le 24 oct.  
150 le 2 oct. en BA.

#### Petit Gravelot (Charadrius dubius)

1ers : le 1er avril au POM, 1 le 4 à Reneuil-02.

HA : 8 le 27 mai, 2ad./1 pullus le 4 juillet.

Nombre  
d'individus




Fig. 1 - Abondance du Vanneau huppé

2 ad./1 nid/3 oeufs le 3 juin au POM, 2 le 3 sept. en BS.

Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)

1er : le 25 mars au HA.

BS-POM : 10 le 14 avril, 3 ad. 1 ad./1 pull. 1 ad./1 juv. le 2 juin, min. 4 couples le 3, 15 le 4 juillet, +32 le 26 août, 27 le 3 sept., 1 le 18.

Tournepierre (Arenaria interpres)

HA : 2 les 1er et 11 avril, 3 le 25, 1 le 28 août.

BS-POM : 15 le 16 mai, 1 les 28 et 29 août, 1 le 3 sept., 2 le 17.

1 le 1er nov. à Quend-Plage.

Bécassine des marais (Gallinago gallinago)

BS-POM : 30 le 26 mars, 5 le 14 avril, 2 le 29 août, 5 le 3 sept., 3 le 27, 1 les 19 nov., 2 et 16 déc., 7 le 29 déc.

Rue : 1 le 16 nov., 5 le 17, 8 le 25, 12 le 27, 23 le 17 déc.

Boves/Fouencamps : 3 le 30 mars, 4 le 2 avril, 1 les 1er et 2 mai, 3 le 23 sept., 20 le 10 oct., 4 le 31, 5 le 12 déc.

Bécassine sourde (Lymnocyptes minimus)

2 le 26 mars à Boismont, 1 le 29 nov. en BS.

Bécasse des bois (Scolopax rusticola)

3 tuées début novembre au Hamel, 4 tuées le 5 déc. dans le bois de Francières.

12 le 14 déc. dans les dunes du Marquenterre (J. Mouton : "probablement assez nombreuses dans ces dunes puisque les chasseurs en tuent plusieurs presque quotidiennement!").

Courlis cendré (Numenius arquata)

BS-POM : 800 le 22 février, 1200 le 14 mars, 1100 le 30, 500 le 14 avril, 600 le 18, 60 le 27 mai, 620 le 27 août, 800 le 28, 550 le 30, 650 le 3 sept., 380 le 10, 500 le 27, 550 le 3 oct., 400 le 24, 500 les 17 et 19 nov., 1200 les 24 et 27, 700 le 29 nov. et le 2 déc., 1200 le 7 déc., 1450 le 29.

nidification probable : 2 chanteurs dans les dunes de Quend-Plage le 22 février, 3 "couples" dans des prés du Marquenterre le 14 avril.

28 le 2 oct. en RA, 34 le 10 déc.

1 le 14 nov. à Fouencamps.

Courlis corlieu (Numenius phaeopus)

BS-POM : 1 le 21 mars, 7 le 11 avril, 10 le 16 mai, 400 le 4 juillet, 10 le 26 août, 32 le 3 sept., 1 les 17 et 26.

14 le 16 avril à Quend-Plage, 3 en vol vers le sud le 6 déc. à Rue.

Barge à queue noire (Limosa limosa)

1 le 20 mars à Boismont, 3 le 29 à Péronne.

BS-POM : 2 (1 chanteur) le 21 mars, 2 le 27, 3 le 14 avril,

1 les 16 et 27 mai, 1 le 4 juillet, 2 le 27 août,  
4 le 3 sept., 15 le 26, 1 les 2 et 7 déc.  
1 le 27 mai à Reneuil-02.

Barge rousse (Limosa lapponica)

BS-POM : 1 le 23 février et le 29 mars, 2 le 26 mars, 2 le  
9 mai, 4 le 16, 57 le 27 août, 75 le 29, 60 le 3  
sept., 40 le 10, 100 le 26, 8 le 3 oct., 2 le 24,  
1 le 17 nov., 40 le 29, 24 le 7 déc., 35 le 29.  
4 le 25 avril au Bourdel.

Chevalier arlequin (Tringa erythropus)

1 le 13 avril à Reneuil-02, 3 le 17 au BA, 1 les 3 et 27  
sept. en BS et au POM, 1 le 21 oct. à Cléry-sur-Somme.

Chevalier gambette (Tringa totanus)

BS-POM : 10 le 3 janvier, 18 le 21 février, 2000 le 14  
mars, 80 le 18 avril, 15 le 16 mai, 19 le 2 juin,  
1 le 19 août, 5 le 20, 14 le 30, 0 le 3 sept., 3  
le 27, 9 le 3 oct., 15 le 19 nov., 13 le 21, 13  
le 27 nov. et les 2 et 7 déc., 14 le 14, 11 le 29.  
HA : 10 le 12 mars, 3 le 9 avril, 4 le 17, 3 le 27 mai,  
35 le 22 mars à Quend-Plage, 1 le 20 avril et le 13 mai à  
Fouencamps, 1 le 19 août à Corbie.

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)

1 le 4 avril à Reneuil-02, 1 le 2 mai à Fouencamps.  
BS-POM : 5 le 26 août, 2 le 28, 3 le 30, 5 les 3 et 27  
sept., 12 le 3 oct.

Chevalier culblanc (Tringa ochropus)

1 le 1er mai à Boves.  
Fouencamps : 1 le 1er mai, 3 les 4 et 7 août.  
1 le 3 oct. au POM, 1 le 10 à Vermand-02, 1 le 17 nov. à  
Dacurs.

Chevalier sylvestre (Tringa glareola)

1 le 27 mai au POM.

Chevalier guignette (Tringa hypoleucos)

1 le 21 février au POM.  
Dernières données à l'intérieur : 1 les 10 et 31 oct. à  
Vermand-02.  
1 hivernant le 29 déc. en BS.

Bécasseau maubèche (Calidris canutus)

1 le 21 mars à Quend-Plage.  
BS-POM : 7 le 16 mai, 4 le 27 août, 8 du 28 au 30, 28 le  
3 sept., 25 le 3 oct., 28 le 17 nov., 26 le 29,  
11 le 7 déc., 12 le 29.

Bécasseau minuscule (Calidris minuta)

BS-POM : 2 le 3 janvier, 6 le 4 juillet, 5 le 29 août,  
10 le 3 sept., 2 le 18.  
1 le 2 oct. au BA.

Bécasseau variable (Calidris alpina)

BS-POM : 750 le 22 février, 3400 le 14 mars, 2500 le 29,  
20 le 14 avril, 50 le 29 août, 200 le 3 sept.,  
120 le 3 oct., 700 le 24, 1200 le 17 nov., 700  
le 19, 400 le 24, 100 le 29, 5500 le 7 déc.  
HA : 6 le 26 mars, 43 le 3 avril, 60 le 11.  
50 le 29 mars à Quend-Plage.  
BA : 40 le 2 oct., 450 le 10 déc.

Bécasseau coccyzine (Calidris ferruginea)

BS-POM : 1 le 28 août, 5 le 29, 12 le 30, 4 le 3 sept.  
2 le 19 sept. à Quend-Plage.

Bécasseau sanderling (Calidris alba)

BS-POM : 10 le 30 mars, 20 le 28 août, 60 le 3 sept., 5 le  
10, 2 le 3 oct., 1 les 17, 19 et 29 nov.  
BA : 4 le 2 oct., 32 le 10 déc.

Combattant (Philomachus pugnax)

HA : 32 le 3 avril, 60 le 11, 15 le 17, 10 le 21, 4 le 16  
sept.  
Reneuil-02 : 1M, 1F. le 4 avril, 1M, 4F. le 13.  
8 le 18 sept. au POM, 2 le 24 nov. en BS.

Echasse blanche (Himantopus himantopus)

1 le 3 juin au POM.

Avocette (Recurvirostra avosetta)

BS-POM : 3 le 14 mars, 6 le 21, 9 le 30, 47 le 12 avril,  
12 le 29 août, 11 le 3 sept., 37 le 27, 3 les 3  
oct. et 21 nov.

nidification : 6 couples (parades) le 14 avril, 11 couples  
/nids le 9 mai, ensuite 23 nids dont 22  
furent détruits par des Géolands argentés  
lors d'une grande marée, 26 couples au  
total, 18 couples le 3 juin (4 avec pulli :  
1, 1, 2 et 4 ; 12 avec nids, 2 cherchant à  
s'installer). Au total 20 couvées donnèrent  
51 pulli à l'éclosion (Ass. Marq. Nat. 1977)  
moyenne 2,55 pull./couvée.

4 le 27 mai au HA.

A l'intérieur, 8 le 2 mai à Fouencamps et 1 à Reneuil-02.

Phalarope à bec étroit (Phalaropus lobatus)

1 le 27 sept. dans le Marquenterre.

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)

Noté à Querrieu le 3 oct. et les jours suivants.

Grand Labbe (Stercorarius skua)

1 im. le 27 sept. en BS, 1 le 3 oct. à Vermand-02.

Labbe pomarin (Stercorarius pomarinus)

POM : 1 le 18 juillet (Ass. Marq. Nat. 1977), 1 vers la  
mi-août.

Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*)  
3, le 3 sept. en BS.

Goéland marin (*Larus marinus*)

A l'intérieur, 1 le 4 avril à Reneuil-02.  
BS : 2 im. le 4 juillet, 200 le 27 août, 350 le 10 sept.,  
180 les 17 et 18, 150 le 21 nov., 230 le 7 déc., 40  
le 22.

Goéland argenté (*Larus argentatus*)

BS : 1000 le 3 sept., 1200 le 3 oct.  
A l'intérieur, présent à l'automne sur le plateau jusqu'à  
Gueschart.

Goéland pendré (*Larus eanus*)

BS-POM : 10 le 4 avril, 50 le 3 juin, +200 le 4 juillet,  
70 le 28 août, 1000 les 3 sept. et 3 oct.  
A l'intérieur, présent à l'automne sur le plateau jusqu'à  
Gueschart.

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)

2000 le 25 mars à Boisnon, 1000 le 14 avril et 1500 le 7  
oct. en BS.  
Nidification : environ 30 couples en mai près de Scissons-02.  
15 à 20 couples (5 juv./2 couvées) le 10 juillet à  
Cléry-sur-Somme  
Sous-estimation pour cette dernière colonie vu  
la date tardive : nombreux ad. déjà dispersés  
dans toute la région.  
1974 : 30 couples (Bull. GEPOF 1976 n°7)  
1975 : pas de nidification (5 ad. seulement le  
8 juin).  
A Saint-Vaast-sur-Somme, venant de la vallée, 3000 (en 1h)  
regagnent le doctoir en Baie le 11 déc.

Mouette pygmée (*Larus minutus*)

3 le 25 avril au HA, 1 le 30 août à Cayeux-sur-Mer, 1 ad.  
le 11 déc. au Hourdel, 1 im. le 16 en BS.

Guifette noire (*Chlidonias niger*)

HA : 6 le 16 sept., 12 le 17.  
2 le 27 sept. en BS.

Guifette leucopère (*Chlidonias leucopterus*)

1 le 14 sept. à Hamelot.

Guifette moustac (*Chlidonias hybrida*)

1 le 2 mai à Reneuil-02.

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)

HA : 1 le 27 avril, 2 le 28 août, 4 le 16 sept.  
BS : 150 le 3 sept.  
(nombreuses données concernant des ST. pierregarins/arctiques).

Sterne naine (Sterna albifrons)

BS-POM : 20 le 14 avril, 1 le 27 mai, 1 le 28 août, 3 le 29, 2 le 30, 4 le 3 sept.

Sterne caudale (Sterna sandvicensis)

BS : 2 le 30 mars, 6 le 14 avril, 20 le 18, 30 le 7 mai, 8 le 4 juillet, 200 le 26 août, 120 le 3 sept., 50 le 10, 30 le 27, 16 le 3 oct.

MA : 1 le 17 avril, 37 le 16 sept., 24 le 17. 3 le 18 sept. à Quend-Plage.

Macareux arctique (Fregata arctica)

1 le 7 déc. en BS (ajoutons une donnée inédite : 1 trouvé mort sur le littoral le 9 déc. 1973).

Pigeon colombin (Columba oenas)

Signalé dans la Somme : Amiens, Ault, Corbie, Dacure, Marquenterre (53 le 7 déc...) et Saint-Gratien (chanteurs en déc.)

Dans l'AISNE : Saint-Étienne (mai).

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)

Vèzes : le 1er mai à Boves, Cottency et Sains-en-Amiénois. Dernière : le 10 oct. à Blencourt.

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)

Corbie : 20 couples nicheurs. Bande de 50 à 55 du 20 au 26 août, 60 le 1er sept., 44 le 8, 40 le 12, 12 le 19, 19 les 28 et 29 nov. et le 9 déc.

Sailly-Laurette : 3 couples nicheurs. Dortoir de 14 le 15 nov.

Dortoir de 10-12 du 14 au 17 sept. à Sailly-Flibeaucourt.

Coucou gris (Cuculus canorus)

1ers : le 4 avril à Boves, Fouencamps, Molliens-Drouil-80, forêt de Compiègne-60 et Renuil-02.

Dernier : le 1er sept. à Corbie.

Hibou moyen-dug (Asio otus)

POM : 3 du 14 au 24 mars, 1 le 14 avril et le 3 sept.

1 le 18 nov. à Corbie, présent en déc. à Sailly-Laurette (pelotes).

Hibou des marais (Asio flammeus)

1 le 7 mars à Cléry-sur-Somme, 1 le 3 avril au Bourdel,

1 le 12 à Abbeville, 1 les 21 nov. et 22 déc. dans le Marquenterre.

Chouette chevêche (Athene noctua)

Localités d'observation dans la Somme : Boismont, Fouencamps, Le crotoy, Marquenterre et Sailly-Flibeaucourt.

Chouette hulotte (Strix aluco)

1 chanteur le 23 mars dans le Marquenterre, 1 chanteur les 8 et 9 mai à Saint-Étienne-02, 2 chanteurs le 14 août à

Velennes, 1 chanteur le 26 à Corbie, 1 autre à Vaux-sur-Somme, 1 chanteur le 17 sept, au Crotoy, 3 chanteurs sur 50 ha en automne à Rue.  
Signalée aussi à Moliens-Dreuil, Quend, Sailly-Flibeaucourt, Saint-Quentin-en-Tourmont, Saint-Valery-sur-Somme et Saveuse.

Chouette effraie (Tyto alba)

Localités d'observation dans la Somme : Amiens, Camon, Conty, Corbie, Noyelles-sur-Mer, Rue, Sailly-Flibeaucourt et Velennes.

Dans L'Aisne : Pierrepont.

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)

1 le 3 juin dans le Marquenterre.

Martinet noir (Apus apus)

1ers : le 2 mai à Fouencamps, Boves et Brie.

Derniers : le 21 sept. à Saint-Gratien.

Huppe fasciée (Upupa epops)

1 le 19 avril près de Moreuil, 1 le 25 à Saint-Fuscien.

Pic cendré (Picus canus)

1 le 25 mars en forêt de Compiègne-60.

Pic mar (Dendrocopos medius)

1 les 24 et 25 mars, 1 le 21 sept. en forêt de Compiègne-60.

Pic épeichette (Dendrocopos minor)

Localités d'observation dans la Somme : Amiens, Bonnav, Corbie, Eclusier-Vaux, forêt de Crécy, Le Hamel, Quend, Rue (sept. à déc.), Saint-Quentin-en-Tourmont, Saint-Valery-sur-Somme et Vairo-sous-Corbie.

Dans l'Oise : forêt de Compiègne.

Torcol fourmilier (Jynx torquilla)

1 le 22 sept. à Amiens.

Alouette lulu (Lullula arborea)

8 le 15 déc. dans le Marquenterre.

Alouette des champs (Alauda arvensis)

Nicheuse très commune. Migration importante le 24 oct. en BS. Pendant une période de gel ininterrompue et après les chutes de neige du 28 déc., des bandes importantes sont observées le 30 : +150 au Hamel, +100 à Sailly-Laurette...

Alouette haussecol (Bremophila alpestris)

BS : 1 le 22 février, 4 le 4 avril, 13 le 9, 24 le 10.

Hirondelle de rivage (Riparia riparia)

1ères : 5 le 3 avril à Vercourt.

Dernière : le 5 oct. à Daours.

Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica)

1ère le 3 mars à Boves, dernière le 31 oct. à Thennes.

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*)

ières : le 3 mai à Amiens.

Dernières : le 10 oct. à Fouencamps.

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)

ier : le 12 avril à Corbie.

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)

une sous-espèce non précisée

ES : 5 le 2 déc., 1 les 14 et 29.

le 11 déc. au Hourdel.

- type (*A. sp. spinoletta*)

1 le 9 avril en BS, 2 le 9 nov. et 1 le 17 à Daours,

1 le 21 à Noyelles-sur-Mer, 1 le 1er déc. à Corbie,

1 le 9 à Daours, 1 le 10 en BA, 2 le 15 à Fouencamps.

- maritime (*A. sp. petrosus*)

BS-POM : 1 les 23 et 30 mars, 1 le 14 avril, 1 le 3

oct., 2 le 24, 3 le 19 nov., 1 le 29.

7 le 10 déc. en BA.

Ferruginette printanière (*Motacilla flava*)

Nicheuse assez commune. Dortoir d'environ 500 à la mi-sept.  
à Ponthoile-Romaine, 50 le 16 au HA.

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)

1 le 1er mai à Fouencamps, 2 ad. le 16 juin et 2 ad./3 juv.  
le 19 à Boves.

1 le 10 sept. à Corbie, 1 le 8 oct. à Vaux-sur-Somme, 2 le

5 oct. et 1 les 9 nov. et 9 déc. à Daours, 1 les 1er et 3

déc. à Rue.

Traquet tarier (*Saxicola rubetra*)

ier : le 1er avril dans le Marquenterre.

Passage postnuptial noté du 20 août au 4 oct. (max. : 17

le 25 août à Corbie).

Traquet pâle (*Saxicola torquata*)

Pas d'observations en janvier-février dans la zone littorale.

Observations en nov. et déc. dans la zone littorale

(hivernage régulier) :

- Rue : 1M. le 17 nov., 1F. les 18 et 29, 1F. les 3 et 11  
déc., 1M. les 30 et 31

- Le Crotoy : 1M. le 7<sup>e</sup> déc., 4 le 22

- 1M. le 10 déc. à Quend et 1M. 2F. en BA, 2 le 22 dans le  
Marquenterre, 1F. le 26 à Vron.

A l'intérieur : 1M. les 14 et 18 nov. à Fouencamps, 1M. le

15 nov. et le 3 déc. au Hamel, 2M. le 15

déc. à Daours, 1F. le 22 à Sailly-le-Sec.

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)

ier : 1M. le 28 mars au HA.

Dernier : le 24 oct. au HA.

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)

ier : 1M. le 21 mars à Saveuse ; dernier le 23 oct. à  
Saint-Gratien.

Hougeguene à Frontignan (*Phoenicurus phoenicurus*)

1<sup>er</sup> : le 26 avril à Amiens

Derniers : 3 le 8 oct. à Corbie, 2 à Vaux-sur-Somme

Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)

1<sup>er</sup> : le 12 avril à Picquigny.

Grive litorne (*Turdus pilaris*)

1<sup>ères</sup> : le 31 oct. à Corbie.

Fin 76, les effectifs sont moins importants que les années précédentes (max. 600 le 22 nov. dans le Marquenterre).

Merle à plastron (*Turdus torquatus*)

1 le 1<sup>er</sup> mai à Reneuil-02.

Grive mauvis (*Turdus iliacus*)

1<sup>ères</sup> : le 3 oct. à Amiens et en BS.

Locustelle lusciniode (*Locustella luscinioides*)

Signalée en mai à Biangy-Tronville, Boves, Frise-SO, et Saint-Doetien-02.

Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)

1<sup>ère</sup> : le 26 mars au POM.

Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)

1<sup>ers</sup> : le 11 avril à Boves et Fouencamps.

Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*)

Signalée en 3 localités : Fouencamps, Le Hamel et Noyelles-sur-Mer.

Rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*)

1<sup>ères</sup> : le 5 avril à Amiens.

Dernière : le 23 sept. à Fouencamps.

Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*)

1<sup>ère</sup> : le 8 mai à Sailly-le-Sec.

Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)

1<sup>ère</sup> : le 15 avril à Corbie.

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)

1<sup>ère</sup> : le 30 mars à Fouencamps.

1<sup>er</sup> F. le 7 nov. et 3 le 5 déc. à Amiens.

Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)

1<sup>ère</sup> : le 4 mai à Saint-Gratien.

Fauvette grisette (*Sylvia communis*)

1<sup>ère</sup> : le 1<sup>er</sup> avril à Cayeux-sur-Mer.

Dernière : le 23 sept. à Boves.

Fauvette pitchou (*Sylvia undata*)

1 le 24 mars en forêt de Compiègne-60. La Seine constitue l'extrême limite nord de nidification de cette espèce.

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)

1er : le 2 avril à Fouencamps.

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)

1er : le 3 mars à Reneuil-02.

Nov. : 1 le 12 à Corbie, 1 le 23 à Saily-Laurette, 1 les 25 et 26 à Saint-Gratien.

Déc. : 2 le 9 à Daours.

Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix)

1 chanteur le 19 avril en forêt de Compiègne-60.

Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus)

1 le 13 mai au PCM. Cette espèce n'est pas signalée par "l'Atlas des Oiseaux Nicheurs de France" comme ayant été observée en période de nidification sur la carte de Rue.

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)

1 chanteur le 19 avril en forêt de Compiègne-60.

Migration postnuptiale notée du 25 août au 18 sept.

Gobemouche gris (Muscicapa striata)

Des jeunes sont encore nourris par les parents le 5 sept. à Saint-Gratien.

Dernier : le 14 sept. à Corbie.

Signalé en 2 autres localités : Bray-sur-Somme et Le Hamel.

Mésange à moustaches (Panurus biarmicus)

Nicheuse pour la 2e année consécutive à Noyelles-sur-Mer.

Bruant zizi (Emberiza cirius)

1 le 2 mai à Brie, signalé les 8 et 9 à Saint-Boetien-02, 2 le 10 à Amiens.

Corbie : 1M. 1F. le 10 oct., 1M. 2F./1m. le 31, 1M. du 9 nov. au 3 déc.

D'après "l'Atlas..." : "...La plupart de ces oiseaux quittent en hiver les provinces au nord de Lyon et rejoignent leurs congénères plus méridionaux qui sont relativement sédentaires..."

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)

Nicheur commun. 50 les 9 et 17 nov. à Daours, 70 le 26, 40 le 9 déc.

Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis)

HA : 10 début février, 30 les 13 et 28 nov., 20 le 19 déc.

BS : 7 le 17 nov., 12 le 19, 8 le 24.

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla)

Derniers : 1M. 3F. le 12 avril à Saily-le-Sec.

Tarin des aulnes (Carduelis spinus)

10 le 4 janvier à Amiens.

1er : les 23 et 24 sept. à Amiens.

5 le 16 nov. à Corbie.

Linotte à bec jaune (*Carduelis flavirostris*)

2 le 3 janvier en BS, 6 le 17 nov., 2 le 19.  
1 le 20 nov. à Rue, 10 le 10 déc. en BA, 3 le 11 au Hourdel,

Sizerin flammé (*Carduelis flammea*)

Signalé le 31 oct. à Vermand-02, 2 le 1er déc. à Quend.

Serin cini (*Carduelis serinus*)

1er : le 21 février à Saint-Gnatiens.  
Derniers (à l'intérieur) : 2 le 3 oct. à Amiens.  
Hivernage sur le littoral : 1 le 11 déc. à Saint-Valery-sur-Somme.

Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)

9 le 3 oct. dans le Marquenterre.

Gros-bec (*Coccothraustes coccothraustes*)

1 le 24 mars et le 19 avril en forêt de Compiègne-60.

Moineau friquet (*Passer montanus*)

50 le 29 février à Boves.  
Dacurs : 100 le 9 nov., 300-400 le 17, 120 le 26, 400 les  
9 et 15 déc.

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

1500 le 10 oct. à Riencourt.

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)

1er : le 8 mai à Sailly-Laurette.  
Dernier : le 23 août au Hamel.

Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*)

BS-POM : 50 les 25 janvier et 22 février, 40 le 27 mars,  
1 le 4 avril (dernière), 1 le 22 oct. (ière), 60  
à 80 pendant la 2<sup>e</sup> quinzaine de nov., 110 le 2  
déc., 160 le 7, 150 le 29.  
A l'intérieur, 1 le 7 février à Saveuse, 1 le 9 déc. à  
Saint-Fuscien.

\*\*\*\*\*

CORRIGENDA (Synthèse 1975 - L'Avocette 1(1) 1-15)Héron cendré (*Ardea cinerea*)

La présence d'une colonie dans l'Oise demanderait à être confirmée.

Faucon kobez (*Falco vespertinus*)

La commune de Baillon ne se trouve pas dans l'Oise mais dans le Val d'Oise.