

SACHEZ LES RECONNAÎTRE

P.Triplet P.Royer

Dans ce deuxième volet de notre rubrique, nous ne parlerons que des oies communes dans la région, exception faite pour l'Oie à bec court. En plus des ouvrages généraux sur les oiseaux que nous publierons en fin de rubrique, nous avons utilisé la synthèse des observations effectuées dans la Somme en 1979 et publiées dans la revue ornithologique du GEPCP : l'Avocette.

OIE DES MOISSONS: (Anser fabalis)

De taille comprise entre 70 et 80 cm pour une envergure moyenne de 160 cm, l'Oie des moissons se distingue à ses teintes, très sombres, notamment sur le cou et la tête. Les ailes ne présentent pas de contraste de couleur important. Au sol on notera les pattes oranges et le bec divisé en trois zones: noir à la base orange ensuite, noir à la pointe. Il convient de ne pas confondre cette espèce avec une proche parente très rare dans la région : l'Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*) qui se distingue à sa taille plus petite, au contraste important entre le dessus gris bleu pâle et le cou très sombre. Les pattes sont roses, le bec est rose et noir. L'Oie des moissons niche dans le nord de la Scandinavie et de l'URSS, elle hiverne en nombre variable dans la Somme avec parfois quelques belles concentrations: jusque 1500 en Janvier 1979 au nord de la Baie de Somme.

OIE RIEUSE : (Anser albifrons)

Légèrement plus petite que l'Oie des moissons (longueur 70 cm et envergure 110 cm) l'Oie rieuse a un plumage gris sombre et montre un dessous rayé de noir. Les pattes sont oranges et le bec rosâtre est cerné de blanc. Les jeunes ne présentent ni rayures ni marques mais ils restent reconnaissables à leurs pattes oranges les distinguant des oies cendrées et à leur bec non marqué de noir contrairement à l'Oie des moissons. Elle niche dans l'extrême nord de l'Europe. Entre 1500 et 2000 individus ont hiverné en baie de Somme en 1979.



OIE CENDRÉE (Anser anser)

Ancêtre des oies domestiques l'Oie cendrée est la plus grosse des oies européennes. De longueur atteignant 85 cm elle présente un plumage beaucoup plus clair avec de larges zones grisâtres sur les ailes qui permettent de la distinguer immédiatement en vol. Le bec est orange uniforme non borduré par une zone blanche, les pattes sont roses. Elle est commune et niche en Scandinavie, en Pologne et en URSS. Elle a été introduite au nord de la Baie de Somme où 7 couples volants se sont reproduits en 1979.


A vendre:

Longue vue d'observation grossissement 15x30x45x60 x 60
avec trépied




s'adresser à Pierre Royer



OIE RIEUSE



OIE DES MOISSONS



OIE CENDRÉE