



LES LIMICOLES NICHEURS DU LITTORAL PICARD

par F. Sueur

Huîtrier-pie Haematopus ostralegus

Nicheur présent toute l'année, la population de cet oiseau est estimée à une vingtaine de couples pour l'ensemble du Littoral picard (SUEUR 1979). Contrairement à ce que l'on pouvait espérer, celle-ci ne s'est pas accrue depuis la création de la réserve en baie de Somme en 1968 alors que les effectifs hivernants et estivants ont fortement augmenté.

Vanneau huppé Vanellus vanellus

Sa population compte de 60 à 100 couples selon les années. Le Vanneau huppé est surtout répandu dans les prés humides du Marquenterre.

Grand Gravelot Charadrius hiaticula

Nicheur essentiellement nordique, le Grand Gravelot ne se reproduit que de manière épisodique sur le Littoral picard : 1 couple en 1976 et 4 couples en 1977. Aucun cas de nidification semble s'être produit depuis cette date.

Petit Gravelot Charadrius dubius

Il niche actuellement dans les zones de galets (Hâble d'Ault, gravières...) et semble céder la place au Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus là où cette espèce se reproduit.

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus

Ce Gravelot niche à la fois dans le secteur sud de la baie de Somme (6 couples en 1979 à Cayeux-sur-Mer) et dans le secteur nord (10 couples en 1971 dans le Marquenterre et dans la Réserve, 12 ou 13 en 1972, au moins 11 en 1975 et 27 en 1981).

Bécassine des marais Gallinago gallinago

Elle niche en très petit nombre dans certaines zones humides de la Plaine maritime picarde.

Bécasse des bois Scolopax rusticola

Un seul cas de nidification est connu sur le Littoral picard : découverte de poussins dans le courant des années 50 dans le Marquenterre. La reproduction était possible ou probable en 1974, 1980 et 1981. La Bécasse ne doit être qu'une nicheuse épisodique dans la Plaine maritime picarde.

Courlis cendré Numenius arquata

Probable de 1973 à 1976, la nidification du Courlis cendré est prouvée en 1977 : un jeune non volant accompagné par deux adultes le 11 juillet dans les mollières de la Maye (SUEUR 1979).

Barge à queue noire Limosa limosa et Chevalier gambette Tringa totanus

Aucune preuve récente de nidification certaine n'a été obtenue ces dernières années pour ces 2 espèces.

Chevalier guignette Tringa hypoleucos

1 couple s'est reproduit en 1976 et 1977 dans le Marquenterre.

Avocette Recurvirostra avosetta

Cette espèce niche dans le Marquenterre depuis 1975 : 12 couples (SUEUR 1975). Depuis la colonie ne cesse de se développer : 26 couples en 1976, 31 en 1977, 52 en 1978 (SUEUR 1979), 57 en 1979, 58 en 1980 et 68 en 1981.

Bibliographie

Sueur F. (1975) Nidification de l'Avocette Recurvirostra avosetta en baie de Somme - Alauda 43 : 482-483.

- (1979) Données complémentaires sur l'avifaune nicheuse de la Somme - ORFO 49 : 39-43.

Au Calendrier

- 21 Mars: Découverte de la réserve de chasse de la Baie de Somme
A la découverte de la faune et de la flore du nord de la Baie de Somme. Observations des premiers migrants de printemps accompagnée par des ornithologues.
Rendez vous à 8h30 place du cirque à Amiens, 9h30 à Abbeville 10 h 00 gare de Noyelles sur mer; Sortie la journée.
- 28 Mars: Sortie à La Madeleine, Rue St Maurice; initiation à l'ornithologie: techniques d'observation et détermination des oiseaux hivernants et premiers migrants. Rendez vous à 9h parc de la Madeleine. La matinée seulement.
- 18 Avril: Sortie en forêt de Crécy guidée par François Sueur. A la découverte de la faune et de la flore de la forêt.
Les oiseaux forestiers et les premiers nicheurs.
Rendez vous à 8h30 place du cirque à Amiens, 9h30 à Abbeville 10h00 place de la mairie à Crécy (la journée)
- 25 Avril: Initiation à l'étude des amphibiens et ornithologie au Hable d'Ault. Sortie guidée par Patrick Triplet.
Rendez vous à 8h30 à Amiens, 10h00 à Cayeux sur l'esplanade devant la mer. (sortie la journée)

EXPOSITION DU GEPOP
ST VALERY (pendant les vacances de Pâques)

Rapaces, petits carnivores, littoral

