

TRITONS DE LA SOMME

par F. Sueur

Les Tritons sont des Batraciens Urodèles que l'on distingue des Anoures par leur corps allongé et leur queue persistante à l'état adulte. DUQUEF (1979) avait déjà publié quelques intéressantes données sur la répartition des Tritons en Picardie. Dans le présent article, nous complétons celles-ci (un astérisque suivant le nom de la carte indique que l'espèce de Triton n'était pas connue auparavant sur celle-ci) et relatons quelques observations biologiques.

TRITON PONCTUE Triturus vulgaris (Linné 1758)

Cette espèce mesure de 80 à 110 mm selon les sexes, chez les Tritons les femelles sont un peu plus grandes que les mâles. Le dos est de coloration variable : brunâtre, verdâtre ou rougeâtre avec des taches sombres. Le ventre est clair avec une bande médiane orangée, coloration que l'on retrouve au niveau de la gorge souvent un peu plus claire mais marquée de taches sombres comme le ventre.

Alors que FRETEY (1975) signale l'hibernation de cette espèce de mi-octobre à février-mars, nous avons noté un individu encore actif le 27 novembre 1981 à Rue tandis qu'un autre était déjà actif le 14 février 1982 dans cette même localité.

Dans la Somme, le Triton ponctué a été observé sur les cartes d'Abbeville (*), Amiens, Doullens (*) (D. MASSON), Poix, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.

TRITON PALME Triturus helveticus (Razoumoswsky 1789)

Il s'agit de la plus petite espèce française de Triton puisqu'elle mesure de 72 à 92 mm. Sa coloration est voisine du Triton ponctué mais sa gorge est rose et ne possède pas de taches qui sont également absentes ou peu marquées sur le ventre.

Nous avons noté un individu actif le 4 décembre 1981 à Rue.

Dans la Somme, le Triton palmé a été noté sur les cartes d'Amiens, Poix (*), Rue et Saint-Valery-sur-Somme.

TRITON ALPESTRE Triturus alpestris (Laurenti 1768)

Cette espèce mesure de 80 à 120 mm. Son dos est le plus souvent bleu sombre fortement marqué de noirâtre, son ventre et sa gorge sont orange vif à vermillon.

Alors que FRETEY (1975) signale l'hibernation du Triton alpestre d'octobre à mars, nous avons noté au moins un adulte et un juvénile actifs le 8 décembre 1981 à Rue et un adulte les 5 et 30 janvier 1982 ainsi que le 9 février dans cette même localité.

Dans la Somme, le Triton alpestre a été observé sur les cartes d'Abbeville, Amiens, Poix, Rue et Saint-Valery-sur-Somme.

TRITON CRETE Triturus cristatus (Laurenti 1768)

Il s'agit du plus grand des Tritons de France puisqu'il mesure de 135 à 180 mm. Son dos est brun olive, pourpre, bleu noir ou grisâtre avec des taches noirâtres ; les flancs sont parsemés de minuscules points blancs. Son ventre est jaune orangé à orange avec de grandes taches noires soit une coloration fort proche de celui du Triton alpestre mais sa gorge est gris-noir ponctuée de blanc ou de jaune. Le mâle possède une grande crête dorsale d'où le nom attribué à cette espèce.

Le Triton crêté est en régression dans la Somme mais il a été noté sur les cartes d'Amiens (M. DUQUEF et C. MARTIN), Abbeville (*) (F. MONTEL), Rue (*) (P. ETIENNE) et Saint-valery-sur-Somme.

Nous tenons à remercier Messieurs M. Duquef, P. Etienne, C. Martin, D. Masson et F. Montel pour les observations qu'ils ont bien voulu nous communiquer.

Bibliographie

- DUQUEF M. (1979) Tritons et Salamandres en Picardie - Picardie Ecologie (2) 34-40.
FRETEY J. (1975) Guide des Reptiles et Batraciens de France - Paris (Hatier), 239p.

