

# PREMIERE MENTION DU VANNEAU A QUEUE BLANCHE *VANELLUS LEUCURUS* EN PICARDIE ET TROISIEME FRANCAISE.

Par Laurent GAVORY

Le 14 mai 2000, vers 14 h 00 (heure légale), je suis arrivé sur le lieu-dit Fond de Grébault sur la commune de Martainneville (Somme) en vue d'y dénombrer les oiseaux présents. Ce secteur est une ancienne zone de dépôt de sable, graviers et autres matériaux de chantier utilisés lors de la construction de l'autoroute A28. Il comprend une dépression dont le fond est imperméable et qui se remplit d'eau au gré des pluies. Ce site fait l'objet de visites régulières depuis 2 à 3 années par les ornithologues locaux.

A mon arrivée sur le site, mon attention a été attirée par un oiseau de type « limicole » de grande taille juché sur de longues pattes d'un jaune éclatant et présentant un plumage chamois à fauve. J'ai pu approcher l'oiseau à une vingtaine de mètres pour le détailler. J'ai pu relever les caractéristiques suivantes qui m'ont amené à le déterminer comme étant un Vanneau à queue blanche :

Sur l'oiseau posé :

- silhouette très élancée d'un oiseau, apparaissant de taille moyenne mais juché sur de longues pattes ;
- patte d'un jaune assez éclatant et bec noir (plus court que la largeur de la tête) ;
- calotte, manteau, scapulaires, couvertures, tertiaires, bas de la poitrine et haut du ventre : chamois à fauve ;
- front, menton, gorge, nuque : sable qui donne une face plus claire avec une calotte qui tranche ;
- au niveau du manteau présence d'une zone plus foncée sur le haut du dos ;
- bas du ventre : blanc ; la limite de la zone chamois est nette du fait qu'au niveau de cette limite la coloration est plus foncée. Elle fonce progressivement de la poitrine vers le ventre. Poitrine et ventre sont aussi foncés que le manteau ;
- rémiges primaires noires et blanches en partie. Au repos, l'aile est cernée d'un liseré noir et blanc ;
- queue blanche ;
- œil noir cerclé de rouge.

Sur l'oiseau bougeant les ailes et en vol (de dessus) :

- queue blanche ;

- extrémités des rémiges primaires noires ;
- parties basales des primaires internes, couvertures primaires, rémiges secondaires blanches ;
- couvertures secondaires et scapulaires chamois ;
- bord des grandes couvertures secondaires noires.

L'absence de gris au dessus de la limite entre la zone chamois et blanche du ventre peut laisser supposer qu'il s'agit d'une femelle (MARCHANT & PRATER, 1986).

L'oiseau a ensuite été observé le jour de sa découverte par de nombreux observateurs jusque vers 19 h 30. Le 15, il a été recherché activement mais sans succès.

L'observation de cette espèce est la première pour la Picardie et la troisième pour la France (DUBOIS & al., 2000). Il s'agit de la seule mention française pour l'année 2000 qui trahit un afflux exceptionnel de cette espèce en Europe. Ce dernier s'est traduit par au moins 30 mentions occasionnelles dans 11 pays et par la nidification de certainement 22 à 25 couples en Roumanie. L'ensemble des observations (n=38) ont été réalisées du 3 avril au 9 septembre dont plus de la moitié du 10 avril au 20 mai. (BOTOND & al., 2001)

## REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier J.L. HERCENT, V. et R. DELCOURT pour les clichés qu'ils ont eu la gentillesse de me fournir ainsi que les observateurs dont les noms suivent qui ont contribué au suivi de l'individu : BARDET O., DELOISON G., FLOHART G., SENGEZ P. & M. ...

## BIBLIOGRAPHIE

- BOTOND K.J., SZABO L. & DUQUET M. (2001). Le Vanneau à queue blanche *Vanellus leucurus* une nouvelle espèce nicheuse pour l'Europe. *Ornithos* 8-3 : 100-107.
- DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSSO G. & YESOU P. (2000). Inventaire des Oiseaux de France. Nathan/HER, Paris. 397 p.
- HAYMAN P., MARCHANT J. & PRATER T. (1986). Shorebirds. An identification guide to the waders of the world. Croom Helm, London. 412 p.

Laurent GAVORY  
Square de Darlington ESC F  
80000 Amiens.  
[l.gavory@club-internet.fr](mailto:l.gavory@club-internet.fr)