

# apprenez à les reconnaître



par P. Royer  
P. Triplet

## BARGES ET CHEVALIERS

Barge rousse (Limosa lapponica), Barge à queue noire (Limosa limosa)

La première, plus petite, se distingue de l'espèce voisine par l'absence de barre alaire blanche et de contraste noir et blanc au croupion. Toutes deux ont un long bec, légèrement plus recourbé chez la Barge rousse. Leurs tailles et leurs couleurs les distinguent aisément des Courlis et des Chevaliers.

La Barge rousse fréquente le littoral picard presque toute l'année en nombre très variable, de quelques unités à plusieurs centaines d'oiseaux..

La Barge à queue noire ne fréquente normalement la Somme qu'en période estivale sauf un cas d'hivernage pendant l'hiver clément 1982-1983. Les parades nuptiales observées chaque printemps ne permettent pas de l'inscrire parmi les nicheurs potentiels de la Somme.

Chevalier guignette (Tringa hypoleucos)

Peu fréquent sur les rivages, le Chevalier guignette s'observe au bord des eaux douces: mares, ruisseaux, rivières. Trois caractéristiques permettent de le reconnaître à tout coup: au sol, il hoche constamment le corps de haut en bas et son vol saccadé permet en même temps l'observation d'une fine barre alaire.

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)

Outre un cri caractéristique, le plus grand de nos chevaliers présente un plumage grisâtre, un dos blanc, un bec très légèrement retroussé et surtout des pattes verdâtres très caractéristiques qui lui valent son nom en langue anglaise "Greenshank". Il est observé principalement lors des migrations en Baie de Somme.

Chevalier gambette (Tringa totanus)


Des pattes rouges et une bande blanche large sur l'aile permettent de le reconnaître aisément. La confusion avec le Chevalier arlequin est fréquente chez les débutants observant des oiseaux posés mais ce dernier n'a pas de bande alaire et apparaît plus svelte et plus haut sur pattes. L'arlequin est beaucoup moins fréquent et n'hiverné pas en Baie de Somme contrairement au gambette.

Chevalier sylvain (Tringa glareola)

Chevalier culblanc (Tringa ochropus)

Ces deux espèces se ressemblent énormément mais le sylvain se distingue en vol par le dessous des ailes blanc, alors qu'il est noir chez le culblanc. Le sylvain est assez peu noté dans la Somme et toujours en petit nombre, on l'observe d'Avril à Septembre

BARGE A QUEUE NOIRE



en été.

roux (que poitrine)


+ recourbe toute année

queue noire

roux (de ventre)

barée

BARGE ROUSSE



CHEVALIER

GUIGNETTE


peu sur rivaies  
plutot eau douce  
hoché constamment  
le haut du corp,

dessins :  
Etienne Pascal


CHEVALIER

ABOYEUR

letgd des chevations  
croupion blanc




CHEVALIER  
GAMBETTE




verdâtre  
pattes


CHEVALIER  
ARLEQUIN



roux  
roux



CHEVALIER  
COMBATTANT ♀



CHEVALIER  
SYLVAIN

Le culblanc est assez rare en hiver, ce migrateur est noté dans l'ensemble du département de la Somme, toujours en petit nombre.

#### Chevalier combattant (Philomachus pugnax)

Le combattant présente un bec court, un dos "écailleux", le ventre est dépourvu de pointillés. En vol les ailes ont un liseré blanc et le croupion présente deux tâches ovales blanches. Il est absent en hiver chez nous, c'est un migrateur que l'on rencontre en Avril-Mai puis en Juillet-Août-Septembre principalement sur le littoral, rarement à l'intérieur des terres.

### CREATION D'UNE NOUVELLE ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE EN PICARDIE

Le 1er Décembre 1982, la C.O.P. (Centrale ornithologique Picarde) déposait ses statuts à la sous-préfecture d'Amiens. Cette nouvelle association se donne pour but l'étude des oiseaux en Picardie en particulier par le biais de différentes études réalisées par des ornithologues. Un Atlas des oiseaux nicheurs des trois départements picards marquera la naissance de ce nouveau groupe et constituera le moyen de motiver de nombreux observateurs. Une originalité de cette association est de regrouper des gens du GEPOP, du CALIDRIS, du Groupe Ornithologique Nord, de l'association Marquenterre Nature de la Station d'études en Baie de Somme et des indépendants. L'enquête est prévue pour trois ans avec une synthèse publiée la première année. Un bulletin dévoilera le résultat de ces études, il s'agit de l'"Avocette" qui devient "Bulletin de la Centrale Ornithologique Picarde".

Un comité de lecture a été mis en place pour ce bulletin ainsi qu'un comité de rédaction des synthèses. Une commission d'homologation a été créée et regroupe les membres du comité de rédaction des synthèses. Son siège social est la Salle Polyvalente de l'Île aux Fagots, 43 Chemin de Halage 80000 Amiens

Le Conseil d'administration est composé comme suit:

Président: F. Sueur  
 Trésorier: X. Combecy  
 Secrétaire: J.C. Robert  
 Membres: P. Biet, P.J. Le Morvan .....

#### Matériel optique:

La SNPN (Société Nationale de Protection de la Nature) met à la disposition de ses membres des jumelles "10x40 Minolta mariner" à prisme en toit et mise au point interne ainsi que des longues vues terrestres "Kowa type TS1" à grossissement 25 fois.

La LPO (Ligue Française pour la Protection des Oiseaux) quand à elle, permet à ses membres d'acquérir des jumelles compactes à prisme en toit gainées "Perl 10x40" ainsi que des optiques classiques "Binopet 8x30". Des modèles de longues vues "Kowa" sont également vendus par la LPO.

Pour tous renseignements: LPO La Corderie Royale BP 263  
 17305 Rochefort Cedex

SNPN 57 Rue Cuvier Paris Vème