
UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE PRINTEMPS

Résultats de l'enquête Printemps 1987


Lancée au Printemps 1987 par la LPO, cette enquête nationale concerne la date d'arrivée de 8 espèces migratrices

MILAN NOIR. COUCOU. MARTINET. TOURTERELLE DES BOIS. HIRONDELLE DES CHEMINEES. HIRONDELLE DES FENETRES. HIRONDELLE DE RIVAGE. ROSSIGNOL


les résultats complets sont publiés dans "L'oiseau magazine" n°9 (1987-4). Nous en avons tiré 3 cartes où sont indiquées par des courbes isochrones les dates d'arrivée de 3 espèces. Ces courbes sont tracées par intrapolation à partir de respectivement 124, 132, et 229 données pour toute la France. On constate que d'après ces intrapolations, la situation serait complexe en Picardie et qu'il y aurait des differences significatives selon les secteurs.



COUCOU



MARTINET



HIRONDELLE DES CHEMINEES

Enquête Printemps 1988

La LPO prolonge l'enquête pour cette année, il nous a semblé qu'il était souhaitable que l'ensemble des ornithologues Picards s'y associe de façon à profiter de cette occasion pour affiner notre connaissance du phénomène migratoire et confirmer l'existence de différences entre nos petites régions naturelles.

Vous êtes donc priés d'envoyer très rapidement (avant le 1 Juin) vos observations concernant les premiers contacts 1988 avec ces 8 espèces à

Eric MERCIER 17 rue Jean Catelas 80420 VILLE-LE-MARCLET

qui centralisera et transmettra à la LPO. Les resultats Picards seront publiés dans L'AVOCETTE. D'avance merci...

ENQUETE REPRODUCTION OISEAUX D'EAU.

Afin d'encore préciser nos certitudes sur les dates de reproduction des espèces gibier*, nous demandons à chaque observateur d'essayer d'évaluer grâce à la grille ci-jointe l'age des oiseaux observés à chaque fois que nous découvrez une famille.
Les résultats seront envoyés en même temps que votre synthèse annuelle et nous pourrons éventuellement faire un bilan annuel (ou pluri-annuel s'il y a trop peu de couvées contactées en une saison).
D'avance merci de votre collaboration.

*(et des autres oiseaux d'eau)

Rapport TAILLE / AGE chez les poussins d'oiseaux d'eau

(proportion avec l'adulte ♀ établie en fonction du volume - c'est à dire en réalité de la surface visible des oiseaux - et non en fonction de la longueur)

Taille pull./ad	ESPECE (âge en jours, approximativement)						
	COLVERT	CHIPEAU	SARCELLE H	SARCELLE E	SOUCHET	MILOUIN	MORILLON
1/4	10 j	8	6	7	9	10	8
1/3	17	14	10	11	14	17	14
1/2	21	18	13	15	19	21	18
2/3	24	21	16	19	24	24	21
3/4	28	27	19	23	28	30	28
4/5	35	34					
= ad	42	40	24	30	37	38	35
volant	60	50	30	40	45	55	50

(les jeunes atteignant la taille adulte sont encore duveteux, et l'appréciation de l'âge se fait ensuite en fonction de l'évolution du plumage)