

NIDIFICATION DE LA
MESANGE A MOUSTACHES (*Panurus biarmicus*)
DANS LA MOYENNE VALLEE DE LA SOMME EN
EN 1988

par L. TULLIE

La Mésange à moustaches (*Panurus biarmicus*) nichait dans le Nord de la France au début du XIX siècle. Pour le Picardie DEGLAND (1831) signale sa nidification en haute vallée de la Somme à Péronne. MARCOTTE (1860) mentionne sa reproduction possible dans les marais entre Long et Longpré à l'Ouest d'Amiens. LEGENDRE (1927) signale 3 observations à Corbie. En 1951, BOUTINOT (1955) observe de nouveau la nidification sur le secteur de Péronne, secteur particulièrement favorable à l'espèce avec ses grandes roselières.

Plus récemment et toujours en terres dans le département de la Somme, un couple d'adultes est noté en vallée des Evoissons en Avril, Mai et Juin 1970 sans preuve de nidification (ROBERT 1978) et en Avril 72 elle est signalée dans les marais de Boves (FOURCY et ROBERT 1973).

Aujourd'hui en Picardie, les seuls sites de nidification connus sont localisés en Plaine Maritime Picarde.


L'espèce a été signalée en période de nidification en 1981 à Rue où un cas de reproduction est noté avec un mâle transportant de la nourriture le 30 Mai (COMMECY, RIGAUX et SUEUR 1983). La vague de froid de l'hiver 81-82 fit disparaître ce fragile noyau (TRIPLÉ 1982), néanmoins ce site difficile d'accès (zone privée pour la chasse au gibier d'eau) reste mal prospecté et des couples pourraient toujours y nicher.

Le marais du Hable d'Ault où la première nidification a été prouvée en Mai 1972 avec 3 nids, l'espèce étant notée dans ce secteur depuis le printemps 1963 par N. RANSON (FOURCY et ROBERT 1973). Le nombre de couples ne doit encore actuellement guère important (moins de 10 probablement) mais là encore les Mésanges à moustaches nichent dans des secteurs difficilement prospectables.

Dernier secteur, les marais de Noyelles sur mer (renclôture Elluin) où les oiseaux nichent depuis 1975) 4 à 5 couples régulièrement au début des années 80. En 85 avec la vague de froid l'espèce semble avoir régressé; cette année (1988) plusieurs adultes furent observés en Juin avec un regroupement de 17 juvéniles (CARON et LEGOUFFE com. pers.).

La nidification décrite ci après à Bray sur Somme en cette année 88, à près de 100 kilomètres des côtes semble donc pour l'instant le seul site intérieur de nidification de l'espèce en Picardie; il est peu éloigné de Péronne où deux nidifications anciennes furent déjà prouvées.

Les lieux d'observations sont localisées sur le schéma suivant.



Situé après une zone d'étangs presque continue, dans une phragmitaie bordant la Somme, le site présente le biotope préféré de la Mésange à moustaches : une roselière de moyenne dimension, très touffue où s'enchevêtrent les chaumes du Roseau phragmite (*Phragmites communis*), quelques Aulnes glutineux (*Alnus glutinosa*) poussant dans les parties les plus humides. Le sol est très vaseux et une eau peu profonde partout présente en font une zone difficile d'accès donc une localité protégée de toute intrusion humaine.

Les observations:

20 Juin, arrivé sur le site, le chant d'une Rousserolle attire mon attention et pendant que je la cherche je repère un oiseau roux au vol onduleux qui traverse la Somme; sa silhouette rappelle celle de la Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*). Je pense aussitôt à la Mésange à moustaches déjà observée les années précédentes au même endroit (3 individus en Mars 86 et 2 en 87). Suivant toujours l'oiseau avec mes jumelles mon attention est décuplée : je vois en effet 6 oiseaux ensemble! (un record pour l'endroit). Il y a 2 mâles (avec leurs superbes moustaches noires se détachant sur le gris perle de leur tête) et 4 femelles (de couleur

fauve, la tête brune sans moustaches). Malheureusement avec le peu de visibilité dont je dispose, je ne peux les suivre bien longtemps et les oiseaux disparaissent bientôt, escaladant les roseaux ou rasant les pointes d'un vol légèrement ondulant, rythmé d'une curieuse torsion de la queue.

23 Juin: de retour sur le site, je revois une femelle avec une plume au bec. L'éventualité d'une nidification se précise. La tentative pour trouver un nid échoue le milieu se prêtant mal à de telles recherches et de plus je n'ai pas voulu déranger ces oiseaux.

27 Juin: les oiseaux sont toujours là et leur comportement est identique à celui observé précédemment.

Nos obligations nous empêchent de prospecter ultérieurement le site pendant l'été.

Dernière observation au moment où nous écrivons ces lignes, le 3 Décembre où un mâle est observé. Il se nourrissait de graines de Phragmites et se manifestait par des appels incessants.

BIBLIOGRAPHIE:

BOUTINOT S. (1955) Faune ornithologique du Vermandois (Région de Saint-Quentin) ORFO25(4)256-294.

COMMECY X. et SUEUR F. (1983) Avifaune de la Baie de Somme et de la Plaine maritime picarde. Amiens (GEPOP), 235 p.

COMMECY X., RIGAUX T. et SUEUR F. (1983) Synthèse des observations 1981 dans la Somme L'Avocette 7(3-4)89-102.

COMMECY X., RIGAUX T. et SUEUR F. (1984) Synthèse des observations 1982 dans la Somme L'Avocette 8(3-4)49-122

DEGLAND C.D. (1831) Tableau des oiseaux observés dans le Nord de la France Lille 20 p.

FOURCY E. et ROBERT J.C. (1973) La Mésange à moustaches en Baie de Somme. Bull. Inf. Liais. GEPOP(4) 1 p.

LEGENDRE M. (1927) Les Mésanges à moustaches de la faune européenne. Oiseau8 : 113-114

MARCOTTE F. (1860) Les animaux vertébrés de l'arrondissement d'Abbeville. Mém. Soc. Imp. Emul. Abbeville. 8 256 p.

NEVEU G. et SUEUR F. (1978) Avifaune de la moyenne vallée de la Somme: secteurs de Bray/Somme et Corbie. Les autres vertébrés. Avocette 2(1)1-2

TRIPLET P. (1982) Les conséquences des vagues de froid de l'hiver 81-82 sur les populations de Bouscarle de Cetti Cettia cetti, de Cisticole des joncs Cisticola juncidis et de la Mésange à moustaches Panurus biarmicus du littoral picard. L'Avocette 6(1-2-3-4) 129-130.