A PROPOS DE

LA NOTE SUR CORDULEGASTER BOLTONI

par L. GAVORY

Les observations de J.M. SANNIER sont très intéressantes, Cordulegaster boltonii n'avait en effet pas été signalé dans la Somme au cours des années 80 et auparavant il n'avait été noté que dans 3 localités.
Cet anisoptère est donc rare dans le département tout comme dans l'ensemble de la région où il n'est connu que de 8 sites (BRUNEL et col. 1988 et L. GAVORY 1988). Cette rareté peut s'expliquer entre autres par le manque de milieux propices à l'espèce en Picardie comme l'a montré J.M. SANNIER mais aussi par l'altération croissante de nos milieux aquatiques.

Sur le plan national, DOMMANGET (1987) considère le Cordulégastre annelé comme étant une espèce localisée et disséminée dont les effectifs sont en général faibles. Il la signale de façon récente de 32 départements pour la plupart situés dans la moitié Sud du pays, plutôt dans la zone méditerranéenne et les régions de montagne. Elle est vu sa rareté inscrite sur la liste rouge des espèces menacées de France.

BIBLIOGRAPHIE

BRUNEL C., DUQUEF M. et GAVORY L. (1988): les Odonates de Picardie (2 note) Martinia 4(1), 11-16

DOMMANGET J.L. (1987): Etude faunistique et bibliographique des Odonates de France. Inventaire de Faune et de Flore (36) M.N.H.N.; S.F.F., 283p.

