
TOTAL DES OISEAUX TROUVES MORTS
AU COURS DES RAMASSAGES EFFECTUES SUR LE
LITTORAL PICARD DE MERS A LA BAIE
D'AUTHIE DE JANVIER 1974 A DECEMBRE 1974.
(CLASSIFICATION PAR FAMILLES)

| n° | Familles | Exemples | TOTAL | Fusil | Mazout | Causes indéterminées | Espèces Protégées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaviidae | Plongeons | 5 | 4 | 1 | - | 1 |
| 2 | Podicipedidae | Grèbes | 4 | 2 | 2 | - | 4 |
| 3 | Procellariidae | Puffins, Pétrels | 8 | 1 | 2 | 5 | - |
| 4 | Sulidae | Fous | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 5 | Phalacrocoracidae | Cormorans | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | Anatidae | Cygnes, Oies, Canards | 52 | 30 | 14 | 8 | 13 |
| 7 | Falconidae | Faucons | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Rallidae | Foulques, Râles | 2 | 2 | - | - | - |
| 9 | Haematopodidae | Huitriers | 9 | 8 | 1 | - | - |
| 10 | Charadriidae | Pluviers, Vanneaux, Gravelots | 5 | 5 | - | - | - |
| 11 | Scolopacidae | Bécasseaux, Chevaliers, Courlis, Barges, | 15 | 13 | - | 2 | - |
| 12 | Stercorariidae | Labbes | 2 | - | 2 | - | - |
| 13 | Laridae | Mouettes, Goelands, Sternes | 121 | 54 | 27 | 40 | 121 |
| 14 | Alcidae | Petits Pingouins, Guillemots, Mergules, Macareux | 146 | 9 | 130 | 7 | 146 |
| 15 | Corvidae | Corneilles, Corbeaux, Choucas | 2 | 2 | - | - | - |
| 16 | Sturnidae | Etourneaux | 1 | - | - | 1 | - |
| 17 | Emberizidae | Bruants | 1 | - | - | 1 | - |
| 18 | Indéterminés | | 3 | 2 | - | 1 | - |
| | | Totaux: | 388 | 137 | 184 | 67 | 300 |
| | | Protégés: | 300 | 82 | 167 | 51 | |

Les espèces protégées sont soulignées (ex: tous les Plongeons , les Grèbes, les Laridae, les Alcidae, etc...), le pointillé indique que certaines espèces seulement sont protégées (ex: chez les Anatidae: les Bernaches, le Tadorne).

La représentation des chiffres ci-dessus sur l'histogramme des fréquences ci-contre met en lumière que les deux familles principalement touchées sur le littoral picard sont les Laridae et les Alcidæ.

Mouettes et Goélands fréquents tout le long du littoral servent trop souvent de cibles aux chasseurs en mal de gibier et méconnaissant totalement les rudiments des règlements de chasse. Les Pingouins et les Guillemots qui eux sont des oiseaux pélagiques de surface s'engluent dans les nappes de mazout rejeté en dehors des eaux territoriales par les pétroliers qui n'ont pas le temps de dégazer à quai (immobilisé au port, iln'est plus rentable pour la compagnie...). En comparaison avec 1970: 370 Alcidae avaient été ramassés en 7 opérations; depuis cette époque le mazout n'a pas diminué bien au contraire, quant aux colonies de Guillemots et de Pingouins de la Mer du Nord et de la Manche, elles sont en constante régression.C.Q.F.D....


Fréquences
150
100
50
Gavidae
Podicipedidae
Procellariidae
Sulidae
Phalacrocoracidae
Anatidae
Falconidae
Rallidae
Haematopodidae
Charadriidae
Scolopacidae
Stercorariidae
Laridae
Alcidae
Corvidae
Sturnidae
Emberizidae
Indéterminés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
nos d'ordre des Familles
Causes de la mort:
Plombs
Mazout
causes indéterminées