au printemps 1975 ....

VOYAGE ORNITHOLOGIQUE à MAJORQUE

Comme son nom l'indique, MAJORQUE est la plus grande des îles formant les BALEARES.

Cette île de la Méditerranée, se trouvent à environ deux cents kilomètres de la terre la plus proche, l'ESPAGNE, présente un double intérêt du point de vue ornithologique :

- tout d'abord, de par sa situation, elle sert d'étage aux migrateurs.

- d'autre part, elle offre une grande diversité de paysages (montagnes - maquis - marais - falaises rocheuses - terres cultivées - salins - espaces ouverts ...)

Après la liste des observations, nous ferons quelques remarques.

Le relevé des observations (effectué du 22-3 au 2-4-75) est donné en fonction des lieux où les oiseaux sont observés le plus généralement.

DANS LES SALINS ET LES MARAIS

(La Albufera, Pollensa, Carr'Picafort ...)

Héron cendré - héron pourpré - Aigrette garzette - Tadorne de Belon - Colvert - Siffleur - Balbuzard - Milan Royal - Buse variable - Busard des roseaux - Râle d'eau (entendu) - Poule d'eau - Foulque macroule - Echasse - Avocette - Petit gravelot - gravelot à collier interrompu - Becasseau de Temminck - Becasseau Minute - Bécasseau Sanderling - Chevalier gambette - Chevalier arlequin - chevalier guignette - Chevalier cul-blanc - Chevalier combattant - Courlis cendré - Barge à queue noire - Becassine des marais - Mouette rieuse - Chouette effraie (pelotes) Martinet noir - Huppe - torcol - hirondelle des cheminées , de fenêtre, de rivage, de rocher - Pipit spioncelle - Bergeronnette printanière (sous espèce iberiae) Bergeronnette grise - Pie grièche à tête rousse - Lusciniole à moustaches - Bouscarle de Cetti - Cisticoles des joncs - Gorge-bleue - grive draine - Bruant des roseaux.

PINEDES

Chardonneret - serin cini - verdier - pinson des arbres - pinson du nord - roitelet triple bandeau - mésange charbonnière - pouillot véloce.

VERGERS, PRES ET CHAMPS

Bruant proyer - bruant zizi - Perdrix rouge - huppe traquet pâtre - bec croisé des sapins - cochevis de Théla - troglodyte - merle noir - mouette des champs.

MAQUIS ET BORDS DE MER

Fauvettes sarde, à tête noire, mélanocéphale, pitchou - Linotte mélodieuse - rouge-gorge - royge-queue noir Grive musicienne - grive draine - martinet alpin - hibou petit-duc (entendu) oedicnème criard - Moineau domestique - coucou (entendu) - Ramier.

FALAISES

Merle bleu - cormoran huppé - accenteur alpin - pigeon biset - hirondelle de rocher - faucon crécerellette - goëland argenté - Grand corbeau.

EN MER ET PRES DES CÔTES

Puffin des Baléares - Puffin cendré - Goëland d'Audouin.

EN MONTAGNE (chaîne septentrionale)

Grand corbeau - Vautour moine - Aigle botté - faucon crécerellette - Milan noir - hirondelle de rocher.

REMARQUES : Cette liste n'est pas limitative : d'une part, car il nous est impossible d'observer toutes les espèces présente sur l'île, en une douzaine de jours d'observation ; d'autre part car certains migrateurs n'arrivent que dans le courant du mois d'avril (faucon d'Eléonore - Agrobate roux, merles de roche - Sternes, guifettes - certains bécasseaux, certains chevaliers).

AIGLE BOTTE : tous les oiseaux observés étaient en phase claire, sauf un en phase sombre.

VAUTOUR MOINE : observé une quinzaine de fois durant le séjo Le 31/3/75, nous pûmes en observer 5 ensemble dans le ciel. Espèce localisée dans la chaîne de montagnes septentrionale.

GOELAND D'AUDOUIN : deux immatures observés le 27/3/75, à Perto Colom (presqu'île) et trois adultes le même jour à C. de Salinas.

TORCOL : Observation le 25/3/75 d'un oiseau dans des roseau

GORGE-BLEUE : Un seul oiseau observé (♂) le I/4/75 au soir et le 2/4/75 au matin au même endroit.

Il est à noter l'absence totale de Pies, de geaies et de corneilles.

En définitive le nombre d'espèces observées, s'élèv à une centaine environ. Cette liste aurait pu être plus impo tante si notre séjour avait eu lieu trois ou quatre semaines plus tard. C'est-à-dire fin avril début mai. Nous aurions alors observé un plus grand nombre de migrateurs.

Ce voyage fut néanmoins très enrichissant.

J.L BOURDENS

B. de WAZIERES