


LES RAPACES NICHEURS DU MARQUENTERRE EN 1997

par Vincent BAWEDIN et Xavier COMMECY



Nous avons organisé au printemps 1997 deux sorties collectives avec des membres de l'association Picardie Nature pour essayer de cartographier les rapaces potentiellement nicheurs de la plaine maritime picarde (P.M.P.). Les participants à ces sorties des 30 mars et 29 juin étaient répartis par petits groupes (2 à 5 selon les demi-journées), munis d'une copie de carte I.G.N. 1/25 000 et avaient à y reporter tout contact avec un rapace.

Ont été ainsi obtenus sur environ 53 km² prospectés dans la partie nord de la P.M.P., zone de bocage et de marais arrière-littoraux entre Saint-Valery, Noyelles-sur-Mer et le nord de Rue, incluant la basse vallée de la Somme et une partie de la vallée de l'Authie :

Le 30 mars (temps ensoleillé et frais puis couvert et très frais) :

- Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* : 6 contacts.
- Epervier d'Europe *Accipiter nisus* : 2 contacts.
- Buse variable *Buteo buteo* : 7 contacts.
- Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* : 27 contacts. (un contact égale un oiseau ou un couple).
- 1 Faucon pèlerin *Falco peregrinus* a été observé ce jour chassant dans un secteur bocager de Favières, migrateur ou hivernant ? L'espèce ne niche pas dans ce type de milieu.

Le 29 juin (temps variable et vent) :

- Busard cendré *Circus pygargus* : 1 contact.
- Epervier d'Europe : 1 contact (autre site).
- Buse variable *Buteo buteo* : 1 contact (autre site) et 1 confirmant un canton, repéré le 30 mars.
- Faucon hobereau *Falco subbuteo* : 1 contact.
- Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* : 5 contacts (confirmant des cantons, repérés le 30 mars) et 2 nouveaux en bordure de la P.M.P.

Par la suite en juillet-août, des prospections occasionnelles ont été réalisées par les ornithologues picards traversant cette région, elles ont permis de certifier la nidification du Busard cendré, d'ajouter deux sites pour l'Epervier d'Europe, un pour la Bondrée apivore *Pernis apivorus*, quatre pour le Faucon crécerelle et de confirmer plusieurs cantons de ces Faucons et de Buses variables.

A ces données nous pouvons ajouter les nidifications dans le Parc Ornithologique du Marquenterre, qui n'a pas été prospecté lors des sorties collectives :

- Buse variable : 1 couple.
- Bondrée apivore : 1 couple.
- Epervier d'Europe : 2 couples.
- Faucon hobereau : 1 couple.
- Faucon crécerelle : 1 couple.

COMMENTAIRES

Busard Saint-Martin : 6 contacts fin mars, aucun ensuite, traces à cette période de la migration prénuptiale.

Busard cendré : observation du nourrissage des jeunes début juillet dans un marais arrière-littoral.

Bondrée apivore : 2 cantons repérés, cette espèce qui affectionne les massifs boisés assez étendus ne trouve pas ici son milieu de prédilection. Une meilleure étude permettrait de mieux cerner ses effectifs dans le Marquenterre.

Buse variable : 9-10 couples pour 53 Km², ce qui semble être une bonne densité pour ce secteur bocager mais nous manquons actuellement d'éléments de comparaison avec les autres secteurs bocager de la région picarde. A noter un individu trouvé mort (fusil ?) accroché dans des arbustes le 30 mars.

Epervier d'Europe : 7 cantons repérés, l'espèce confirme son redressement en tant que nicheur dans la région picarde, les potentialités maximales pour les nicheurs de cette espèce ne sont certainement pas encore atteintes.

Faucon crécerelle : 34 couples pour 53 km², soit 0,64 couple par km² (1 à 2 couples par km² observés dans les secteurs favorables de bocage). Cette densité importante est l'une des surprises de ces sorties, d'autant que l'année 1997 vient après un hiver particulièrement rigoureux qui n'est jamais bénéfique pour cette espèce. On peut remarquer que la fin mars est une période idéale pour la détection des couples cantonnés de cette espèce : un nid sera trouvé le 30 mars et aucun ne sera trouvé lors des prospections ultérieures dans les secteurs visités.

Faucon hobereau : Espèce plus discrète, seulement deux couples repérés. Pour cette espèce la période idéale pour détecter les couples se situe en été (juillet-août, voire début septembre avec l'observation des familles), soit en dehors de la période des recherches cette année, ce qui explique une sous estimation des effectifs dans un secteur où cette espèce est habituellement bien représentée.

Ces résultats probablement partiels pour plusieurs espèces renseignent sur les populations de rapaces de cette région bien explorée par les ornithologues mais peu renseignée pour cette catégorie d'oiseaux et montrent d'ores et déjà que les rapaces y sont nombreux à nicher. D'autres études ultérieures pourront utilement préciser ce bilan.

RAPACES NICHEURS DANS LE MARQUENTERRE EN 1997

Espèce	Nombre de couples repérés	Densité (couples/Km ²)
Bondrée apivore	2	0,038
Buse variable	10	0,19
Busard cendré	1	0,019
Epervier d'Europe	7	0,13
Faucon crécerelle	34	0,64
Faucon hobereau	2	N.S.