LES OISEAUX CONSOMMATEURS DE FAINES

par François SUEUR

INTRODUCTION

Nous avons apporté récemment un certain nombre de précisions sur les oiseaux consommateurs de baies d'Argousier *Hippophae rhamnoides* (SUEUR 1988 et 1990), aussi nous est-il venu à l'idée de publier nos résultats concernant les faînes, fruits du Hêtre *Fagus sylvatica*, dans le régime alimentaire des oiseaux.

Nos observations ont été menées lors de l'automne 1990 et de l'hiver 1990-91 à Nouvionen-Ponthieu (Somme), non loin de la forêt de Crécy, sur un site dont la rangée de Hêtres doit constituer une trace de l'ancienne extension de cette dernière.

LISTE SYSTEMATIQUE

Merle noir Turdus merula

Un mâle se nourrit d'une faîne en décembre.

Grive musicienne Turdus philomelos

Mésange bleue Parus caeruleus

Consommatrices probables le 5 février.

Mésange charbonnière Parus major

2 cas d'ingestion de faînes en novembre, 5 en décembre et 2 en janvier.

Sittelle torchepot Sitta europaea

1 individu consomme une faîne en janvier.

Pinson des arbres Fingilla coelebs

20 cas d'ingestion de faînes en septembre, 37 en octobre, 171 en novembre, 170 en décembre, 155 en janvier et 195 en février.

CONCLUSION

Nous avons noté 4 espèces aviennes se nourrissant des fruits du Hêtre et 2 autres consommatrices probables. Il est certain que d'autres oiseaux doivent utiliser cette ressource alimentaire. Nos collègues picards, qui prospectent les milieux forestiers notamment dans l'Oise, seront sans doute à même d'apporter des renseignements complémentaires.

CRAMP (1988), GLUTZ VON BLOTZHEIM et BAUER (1988) ne mentionnent pas la consommation de faînes par le Merle noir.

BIBLIOGRAPHIE

- Cramp S. (1988) The Birds of the Western Palearctic, Vol. V Oxford, New York (Oxford University Press), 1063 p.
- Glutz von Blotzheim U.N. et Bauer K.M. (1988) Hanbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 11/II. Passeriformes (2. Teil) Wiesbaden (Aula-Verlag), 730-1226.
- Sueur F. (1988) La consommation des baies d'Argousier Hippophae rhamnoides par les oiseaux ORfO 58: 156-158.
- Sueur F. (1990) Nouvelles données sur la consommation des baies d'Argousier Hippophae rhamnoides par les oiseaux ORfO 60: 63-65.