

## LES OISEAUX CONSOMMATEURS DE FAINES

par François SUEUR

### INTRODUCTION

Nous avons apporté récemment un certain nombre de précisions sur les oiseaux consommateurs de baies d'Argousier *Hippophae rhamnoides* (SUEUR 1988 et 1990), aussi nous est-il venu à l'idée de publier nos résultats concernant les faînes, fruits du Hêtre *Fagus sylvatica*, dans le régime alimentaire des oiseaux.

Nos observations ont été menées lors de l'automne 1990 et de l'hiver 1990-91 à Nouvion-en-Ponthieu (Somme), non loin de la forêt de Crécy, sur un site dont la rangée de Hêtres doit constituer une trace de l'ancienne extension de cette dernière.

### LISTE SYSTEMATIQUE

Merle noir *Turdus merula*

Un mâle se nourrit d'une faîne en décembre.

Grive musicienne *Turdus philomelos*

Mésange bleue *Parus caeruleus*

Consommatrices probables le 5 février.

Mésange charbonnière *Parus major*

2 cas d'ingestion de faînes en novembre, 5 en décembre et 2 en janvier.

Sittelle torchepot *Sitta europaea*

1 individu consomme une faîne en janvier.

Pinson des arbres *Fingilla coelebs*

20 cas d'ingestion de faînes en septembre, 37 en octobre, 171 en novembre, 170 en décembre, 155 en janvier et 195 en février.

### CONCLUSION

Nous avons noté 4 espèces aviennes se nourrissant des fruits du Hêtre et 2 autres consommatrices probables. Il est certain que d'autres oiseaux doivent utiliser cette ressource alimentaire. Nos collègues picards, qui prospectent les milieux forestiers notamment dans l'Oise, seront sans doute à même d'apporter des renseignements complémentaires.

CRAMP (1988), GLUTZ VON BLOTZHEIM et BAUER (1988) ne mentionnent pas la consommation de faînes par le Merle noir.

**BIBLIOGRAPHIE**

- Cramp S. (1988) *The Birds of the Western Palearctic* , Vol. V - Oxford, New York (Oxford University Press), 1063 p.
- Glutz von Blotzheim U.N. et Bauer K.M. (1988) *Hanbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 11/II. Passeriformes (2. Teil)* - Wiesbaden (Aula-Verlag), 730-1226.
- Sueur F. (1988) La consommation des baies d'Argousier *Hippophae rhamnoides* par les oiseaux - *ORfO* 58 : 156-158.
- Sueur F. (1990) Nouvelles données sur la consommation des baies d'Argousier *Hippophae rhamnoides* par les oiseaux - *ORfO* 60 : 63-65.