

Nidification de l'Epervier d'Europe
Accipiter nisus dans le
 Marquenterre (Somme).

par Michel FOURNIER

La reproduction de l'Epervier d'Europe n'étant pas connue dans le Marquenterre, nous relatons dans la présente note les résultats du suivi plus ou moins régulier de l'espèce dans cette région de mars à septembre 1987.

La recherche des aires s'est faite dans le Domaine du Marquenterre et dans l'enceinte du Parc Ornithologique. Le suivi d'oiseaux observés visiblement sur leur territoire de reproduction puis la recherche d'aires anciennes ont contribué à la définition de trois territoires et à la découverte d'un couple reproducteur certain.

Le premier territoire situé en bordure de la baie de Somme non loin de l'anse Bidard n'a pas fait l'objet d'un suivi continu faute de temps. Un mâle est observé sur ce site puis deux nids anciens et un autre fraîchement construit sont trouvés.

Le second territoire correspond à l'observation régulière d'une femelle adulte chassant aux abords du Parc. En juillet, elle est notée quotidiennement, passant au-dessus de la grande volière pour se rendre sur son terrain de chasse. Elle doit probablement nicher aux environs de la héronnière et pour ne pas déranger la colonie, nous évitons d'effectuer des recherches dans ce secteur. Des contacts avec la femelle aux abords de son lieu de reproduction, derrière la héronnière, ont lieu également tard le soir.

Sur le troisième site, la femelle est régulièrement vue posée sur un arbre lui servant d'observatoire. Son terrain de chasse s'étend vers la Maye où nous apercevons quelquefois le mâle. Trois aires anciennes sont découvertes, puis un nid occupé d'où la femelle s'éclipse discrètement à

notre approche pour se poser non loin de là. Les fientes fraîches sur le sol au-dessous du nid trahissent la présence des jeunes. Leur étalement sur un quart de la circonférence indique une couvée de faible taille. Projettées à environ deux mètres du nid, elles tombent sur un Sureau noir Sambucus nigra. La distance des projections démontre le jeune âge des occupants. En contrôlant ultérieurement l'évolution de la couvée, nous pouvons apercevoir deux jeunes bien emplumés sur le nid. Le 20 juillet, arrivant discrètement pour contrôler l'âge des oisillons en vue d'un éventuel baguage, nous constatons que le nid est vide. La femelle voletant non loin de là doit probablement chercher à éloigner sa progéniture.

La distance séparant probablement les nids des deux derniers territoires doit se situer aux environs de 1 000 mètres, distance largement respectable pour la reproduction des deux couples, les zones de chasse étant souvent situées à l'opposé l'une de l'autre. En forêt de Mormal (Nord), deux nids séparés de 450 mètres ont été occupés simultanément deux années de suite.

Le support idéal pour le nid de l'Epervier étant un Conifère et la progression constante de l'espèce depuis quelques années devraient permettre son implantation durable dans le Marquenterre où elle doit se reproduire depuis quelque temps déjà.