ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES PICARDES 1991

Par X. COMMECY

Une nouvelle livraison (un peu tardive mais l'arrivée de vos observations le fut aussi...) des actualités ornithologiques picardes. Rappelons que ces A.O. ne sont pas une présynthèse; la synthèse annuelle se fait en parallèle (encore plus lentement...les observations de quelques uns arrivant toujours bien tard) ni un compte rendu de Comité d'Homologation, mais une mise en évidence des faits ornithologiques marquants pour la région (migration plus abondante, plus précoce ou plus tardive ou plus ou moins... qu'habituellement; stationnement maximum observé jusqu'alors d'une espèce, même banale, à une époque donnée...) et bien sûr les observations inhabituelles. De ce fait, des observations intéressantes mais entrant dans le cadre de ce que nous connaissons sur l'espèce ne sont pas reprises et elles figureront dans la synthèse.
Plus encore que d'habitude nous avons essayé d'expliquer pour chaque donnée en quoi elle apportait une information nouvelle pour notre connaissance de l'avifaune régionale par un petit commentaire.

Abréviations :BdS Baie de Somme; H.A. Hâble d'Ault; P.O.M. Parc Ornithologique du Marquenterre (80)
ad. adulte; Im. Immature; Juv. Juvénile.

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus*

1 le 5 Septembre au P.O.M. (V. BAWEDIN); donnée la plus précoce connue, précédente le ...6 Septembre 1974 en BdS. 1 le 15 Janvier à Verneuil en Halatte -60- (A. ROUGE), espèce rare en terres (précédente mention dans l'Oise, 1 le 21 Nov. 1988 à Montreil/Thérain).

PETREL TEMPETE *Hydrobates pelagicus*

1 le 3 Novembre au POM (C. BERNUZEAU et P. CARRUETTE); date sans surprise de fin de passage mais celà n'est que la quatrième donnée picarde pour le XX siècle.

FOU DE BASSAN *Sula bassana*
110 (la plupart ad.) le 11 Décembre en BdS (F. SUEUR), effectif record pour la saison. Les maxima habituels (de l'ordre d'une centaine aussi) sont plus souvent notés en fin d'été. En hiver c'est généralement une dizaine d'oiseaux qui sont observés; max. antérieurs 20-25.

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo*

157 le 6 et 184 le 13 Novembre; 104 le 4 Décembre à Régnières-Ecluses -80- (F. SUEUR). Nouveaux maxima de début d'hiver pour ce dortoir qui regroupe les Cormorans du littoral nord. Combien de temps tiendra ce record? A noter aussi, 95 le 16 Juin au dortoir à Arry -80- (T. RIGAUX)

HERON CENDRE *Ardea cinerea*

4 nids à Fouencamps -80- (P. ROYER et al.); nidification attendue depuis longtemps dans ce secteur.

CIGOGNE NOIRE *Ciconia nigra*

1 le 8 Septembre à Villers-Bretonneux -80- (G. NEVEU), date traditionnelle mais espèce rarement observée en terres.

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia*

2 le 28 Février en BdS (V. COHEZ), 1 juv. en Novembre-Décembre au POM (P. CARRUETTE) ; toujours rare en hiver.

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna*

Un nouveau site de nidification réussie en terres, les bassins de la sucrerie de Chevrières -60- aprés des tentatives en 1989 et 1990; 2 juv. à l'envol (A. ROUGE). 10400 le 29 Décembre en BdS (T. RIGAUX).

SARCELLE MARBREE *Marmaronetta angustirostris*

1 F./Im. àChevrières -60- du 22 Août au 2 Sept. (A. ROUGE et al.) , oiseau volant et farouche, origine? L'espèce niche au Maroc et de l'Espagne (très rare) à l'Asie orientale. Les données françaises (in Inventaire des espèces d'oiseaux occasionnelles en France P. DUBOIS et P. YESOU Ministère de l'Environnement 1986) sont d'Août-Septembre; ce serait la troisième donnée française depuis 1980.

EIDER A DUVET *Someria molissima*

500 le 4 Janvier à Quend -80- (E. MERCIER) effectif record égalé (précédent le 22 Décembre 1983), encore 400 le 20 Fevrier (F. SUEUR). 1 le 12 Janvier à Monampteuil -02-(L. GAVORY).

HARELDE DE MIQUELON *Clangula hyemalis*
1 F. Im. en mue du 23 au 25 Juin au POM (S. ATINAULT et P. CARRUETTE); un autre stationnement estival avait déja été observé pour cette espèce nordique, 1 M. Im. du 8 au 11 Juin 1985 dans le même site.

GARROT A OEIL D'OR *Bucephala clangula*

26 migrateurs vers le Sud en 5 heures le 16 Janvier en BdS (F. SUEUR), effectif hivernal record et plus fort passage repéré à ce jour. 32 le 9 Février sur le canal de la Somme d'Abbeville à St Valery/Somme -80- (L. GAVORY).

MILAN NOIR *Milvus migrans*

Observé en Avril, Mai et Juillet à Pontpoint -60-; nicheur possible, ce qui serait une première pour le département (A. ROUGE et al.). Des observations sur le même site avaient été faites l'année précédente.-

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeroginosus*

Progression numérique de l'hivernage, en particulier sur le littoral, 4 au dortoir le 2 Février à Noyelles/mer -80- (L. GAVORY).

BUSE PATTUE *Buteo lagopus*

Hivernage de 2 individus au H.A. -80- (V. BAWEDIN, G. FLOHART,L. GAVORY et C. LOUVET).

FAUCON CRECERELLE *Falco tinnunculus*

Un minimum de 26 vus simultanément d'un même point d'observation au H.A.
-80- le 3 Août (T. RIGAUX); rassemblement de plusieurs familles reproductrices voisines.

PERDRIX GRISE *Perdix perdix*

60 ensemble le 15 Décembre à St Quentin en Tourmont -80- (M. THUEUX); regroupement important lié aux conditions météorologiques très défavorables.

MAROUETTE PONTUEE *Porzana porzana*

1 ad. et 2 juv. en Août, Septembre à Noyelles/mer -80- (G. FLOHART)

Pour les limicoles en terres, les commentaires sont faits par rapport à ce qui était connu entre 1980-1989 synthétisé par X. COMMECY L'Avocette 1989 13 (2-3-4) p. 99-117, complété par les actualités ornithologiques.

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus*

6010 le 31 Juillet et 7500 le 8 Août en BdS-POM (P. CARRUETTE et F. SUEUR), effectifs records pour ces mois, il n'y a en moyenne que 1500 à 2500 oiseaux à cette époque. Abondance à mettre en relation avec une grande abondance de jeunes coques dans l'estuaire cette année (F. SUEUR).

AVOCETTE *Recurvirostra avosetta*

1 couple mène 4 jeunes à l'envol au H.A. -80- (L. GAVORY et al.)

PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola*

1 ad. du 28 Août au 12 Septembre à Chevrières -60- et 1 juv. le 16 Octobre à Pontpoint -60- (A. ROUGE); 3ème et 4ème données en terres pour le passage postnuptial, précédentes : début Octobre-mi Novembre.

VANNEAU HUPPE *Vanellus vanellus*

950 (dont 450 migrateurs) le 29 Juillet au POM (P. CARRUETTE), époque sans surprise pour le moment de descente de cet oiseau mais effectif record pour la période; habituellement une centaine notés en Juillet début Août.

BECASSEAU MAUBECHE *Calidris canutus*

1 le 7 Septembre à Chevrières -60- (B. BOUGEARD), 3ème donnée en terres pour ce mois.

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*

6 juv. le 28 Septembre à Vauciennes -60- (G. BALANDRAS), 5 ème donnée en terres connue. Plus de 1100 en BdS le 28 Août (A. ROUGE). 1800 le 27 Juillet en BdS (T. RIGAUX).

BECASSEAU MINUTE *Calidris minutus*

1 le 8 Juin à Vauciennes -60- (J.P. BONNEL); première donnée connue pour le passage prénuptial en terres (précédente ? 1 observé début Juillet).

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temmickii*

1 le 6 Mai à Pontpoint -60- (A. ROUGE); première donnée en terres du passage prénuptial.

BECASSINE SOURDE *Lymnocryptes minutus*

1 le 9 Février à Boismont -80- (L. GAVORY) et 1 le 27 Avril à Fouencamps -80-, les données de cet oiseau sont toujours rares chez nous.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica*

Date classique pour le top-jour de la migration prénuptiale : 1 Mai mais effectif des plus importants, 2090 en BdS (F. SUEUR).

BARGE A QUEUE NOIRE *Limosa limosa*

3 juv. du 27 au 29 Septembre à Pontpoint -60- (D. DELVILLE et A. ROUGE) puis 1 en Octobre et 1 le 31 Octobre (le même?) à Chevrières -60- (A. ROUGE).

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus*

3 en vol Nord le 5 Mai à Pondron -60- (J.P. BONNEL) date classique de migration sur le littoral mais l'espèce est très rarement notée en terres (une donnée antérieure en Avril 1985).

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*

1 le 4 Janvier à Pontpoint -60- (A. ROUGE), pas d'observation hivernale connue antérieurement.

CHEVALIER GUIGNETTE *Actinis hypoleucos*

1 le 12 Janvier à Bailleul/Thérain -60- (N. et J. BLOND), seconde donnée en terres connue pour ce mois, précédente en 1989 à Longueuil St Marie -60-.

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres*

1 du 19 au 24 Août à Pontpoint -60- ,3ème observation pour la migration postnuptiale en terres, toujours centrée sur cette période.

PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicarius*

1 le 11 Novembre au POM (C. BERMUZEAU et P. CARRUETTE), première donnée pour ce mois, fin du passage postnuptial.

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*

1 ad. à Fouencamps -80- le 16 Juin (P. ROYER); passage tardif pour cet oiseau peu fréquent plus généralement observé en Avril-Mai puis aprés la mi-Juillet.

MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus*

1 Im. le 25 Août à Pontpoint -60- (D. DELVILLE et P. MALIGNAT), probablement la première donnée pour l'Oise.

MARTINET NOIR *Apus apus*

3000 le 27 Mai au H.A.-80- (G. FLOHART); date classique pour la migration prénuptiale mais quel nombre!

CHOUETTE CHEVECHE *Athene noctua*

17 individus le 10 Avril sur la carte 1/50000 de Gisors (D. DELVILLE); exemple de recherche spécifique à suivre!

ALOUETTE LULU *Lullula arborea*

Une observation du 18 Mars 1988 (A.O. 1988, L'Avocette 13 (1) p.1-4) avait confirmé la période de la mi-Mars comme période du passage prénuptial si discret sur le littoral; un migrateur le 4 Mars à Camon -80- (V. BAWEDIN) montre ce passage en terres à une période très similaire.

PIPIT SPIONCELLE (MONTAGNARD) *Anthus spinoletta*

120 le 1 Janvier à VRON -80- (G. FLOHART), effectif record.

FAUVETTE EPERVIERE *Sylvia nisoria*

1 le 4 Septembre à St Quentin en Tourmont -80- (G. FLOHART), observation des plus rare en France, en attente d'une homologation nationale.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*

1 M. le 30 Avril à Pontpoint -60- , 2 F. le 8 Mai à Chevrières -60- (A. ROUGE), 1 F. le 18 Mai à Pontpoint -60- (CORIF); la migration prénuptiale est rarement observée en Picardie (précédente observation dans l'Oise, 1 M. le 12 Mars 1988 en F. de Compiègne).

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

40 le 27 Janvier au H.A. -80- (L. GAVORY), nombre et date intéressants.

BEC CROISE BIFASCIEE *Loxia leucoptera*

2 F. les 27 et 31 Janvier, 11 et 27 Février à Fleurines -60- (A. PICQUEMAL, A. ROUGE, G. FLOHART et al.). Ils ont été observés dans un boisement de Mélèzes en compagnie de Becs croisé des Sapins *Loxia curvirostra.* Rappelons que de fin Juillet à début Octobre 1990 s'est développée une invasion de Becs croisés des Sapins dans toute l'Europe septentrionale et occidentale (Suède, Danemarck, Pays-Bas, France, Islande...) qui a été aussi observée en Picardie (voir A.O. 1990 dans l'Avocette 1991 15(1) p.6). A cette occasion quelques Becs croisés bifasciée ont du "suivre le mouvement" : plusieurs observations en Belgique, plus de 10 en Hollande (contre 7 jusqu'alors pour le XX siècle, précédentes observations groupées de 1889), plus de 100 au Danemark, 15 en Grande-Bretagne. En France, 4 données étaient connues pour le XX siècle, une observation dans le Bas-Rhin le 16 Décembre 1990 et cette donnée picarde est donc la 6ème pour le pays (d'aprés Européan news in British Birds Juin 1991, Janvier 1992 et Août
1992).