LE CIRCAETE JEAN-LE-BLANC Circaetus gallicus DANS L'AISNE : OBSERVATIONS RECENTES

par H. Dupuich

Le Circaete Jean-le-Blanc est un rapace d'observation rare dans l'Aisne, la dernière observation connue remontant à I968 dans le secteur des marais de Laon-Sissone.
Pour sa part, S. Boutinot ne l'a jamais rencontré dans le Vermandois.
Les années I982 et I983 nous ont permis néanmoins d'avoir deux contacts avec cette espèce.
La première observation a eu lieu le 3 Septembre I982 à Boué, en compagnie de C. Scuotto. Dénombrant comme à l'habitude les espèces aquatiques de l'étang, nous sommes intrigués par un rapace dont la grande taille et l'allure ne nous rappelle pas les Buses variables (Buteo buteo) observées régulièrement. L'oiseau traversant l'étang dans sa longueur nous pouvons le détailler: le dessous des ailes et du corps très clairs, la tête et le haut du cou sombres et un mince liseré noir aux rémiges ainsi qu'une barre terminale à la queue confirment nos soupçons: nous sommes en présence d'un Circaete en phase sombre.
La deuxième observation, elle, a eu lieu le 30 Avril I983 à Autreppes prés de l'Oise qui forme à cet endroit une vallée bocagère proche d'une forêt. Observant les parades de 2 couples de Buses variables et les évolutions d'un Milan royal (Milvus milvus) et d'un Epervier d'Europe (Accipiter nisus), nous repérons un rapace assez éloigné dont le dessus est très clair, le dessous gris-marron; la manière de tenir les ailes légèrement arquées, les rémiges vers le haut et, semble-t-il, une taille plus grande que les Buses variables éveillent nos soupçons.Tout en planant, il se rapproche et croise alors les 2 Buses et le Milan royal. Nous pouvons alors comparer les envergures; la sienne domine celle des Buses et légèrement celle du Milan royal: il s'agit bien, là encore, d'un Circaete en phase claire.
Ces deux observations rapprochées d'un oiseau rare en Picardie peuvent sembler exceptionnelles et bien que l'espèce n'est pas été observée depuis le début du siècle dans la Somme, il existe

deux observations dans le Nord : I individu en phase typique le 27 Mai I979 au marais de Merlimont (G. Decroix et L. Herautret) et I le 23 Septembre I979 à Louette (Arnould, Beilliard, Fosse, Jougleux, Leclercq, Morel, Martinet, Molin, Trouvilliez) qui montrent, que notre région, bien que située à environ 280 kilomètres des premiers couples nicheurs, peut recevoir la visite d'oiseaux égarés au printemps comme à l'automne.

BIBLIOGRAPHIE

Boutinot S. (I980) Etude écologique de l'avifaune du Vermandois. Structure, dynamique et évolution des populations depuis I950 Thèse Docteur Université Reims, 444p.

Additif:

Depuis la rédaction de cette note relatant l'observation d'I Circaete Jean-le-Blanc dans l'Aisne et ceci à deux reprises, 2 nouveaux contacts ont été de nouveaux obtenus , toujours dans l'Aisne et tous les deux le même jour à une vingtaine de kilomètres l'un de l'autre; des différences dans la coloration du plumage excluent qu'il puisse s'agir du même oiseau. Ces 2 observations faites le 4 Avril I984, l'une à Verneuil-sur-Serre et l'autre à Vesles-et-Caumont ne font que confirmer notre précédente conclusion.

Observateurs : X. Commecy, H. Dupuich, L. Gavory et F. Sueur.