

**NOTE SUR L'OBSERVATION DE LA REMIZ PENDULINE,
 REMIZ *PENDULINUS A* GAMACHES (80);
 VALLEE DE LA BRESLE**

Par J.M. SANNIER

1° Statut de l'espèce

*** Statut national :**

La Remiz penduline (Mésange rémiz selon l'ancienne nomenclature taxinomique) est une espèce de passereau migratrice partielle qui niche en Europe centrale et méridionale. C'est la sous-espèce type *Remiz Pendulinus pendulinus* qui habite l'Europe occidentale. Elle est de passage en Belgique et très rare en Suisse. Si la population nicheuse du midi de la France est connue depuis longtemps quoique très parcimonieuse, puisque présente en Languedoc-Roussillon et en camargue où elle se reproduit avec de faibles effectifs. YEATMAN (1975) cite 7 départements potentiels, GEROUDET (1984) indique l'Alsace comme site de reproduction ponctuelle.

Depuis cette période l'espèce a élargi son aire d'expansion dans l'Est du pays (à moins que ce soit le développement de l'ornithologie qui ait permis de mieux cerner le statut de l'espèce). Jusqu'alors uniquement soupçonnés, six sites de nidification sont découverts en Mai 1992 en Lorraine (l'OISEAU MAGAZINE 1992 et 1993); le retour sur les lieux de nidification s'effectuant début Avril dans cette région (voir carte).

Son habitat consiste en bosquets épars au bord des cours d'eau, ou des marais arrière-littoraux, des prairies humides et des endroits marécageux avec buissons.

*** Observations régionales**

Dans la région, la première observation picarde commentée concerne le département de l'Aisne (BOUTINOT 1960) à la fin des années cinquante.

Compte tenu de la pression d'observation récente, plusieurs données ont été recensées.

Dans le département de l'Oise, où un oiseau a été observé le 4 Avril 1992 à Verneuil en Halatte (DUBOIS P. in ROUGE A. 1992).

Sur le littoral picard : SUEUR F. et COMMECY X. (1990) ne mentionnent pas l'espèce dans leur ouvrage de synthèse et il faut attendre le 27 Septembre 1992 avec l'observation de 4 migrateurs au Parc Ornithologique du Marquenterre (BERNUZEAU C. et ROUGE A. in SUEUR 1993).

Conformément aux découvertes de nouvelles colonies de reproduction, cet oiseau doit être présent probablement ici ou là

dans notre région en adéquation des flux migratoires qui la traversent, puisque dès le mois de Juillet des petits groupes se dispersent assez loin des sites de nidification. Par ailleurs des couples erratiques peuvent se reproduire, mais leur fixation définitive est sujette à précarité (YEATMAN-BERTHELOT 1991).

2° Circonstances de l'observation :

L'observation a été réalisée le 13 Avril 1986 aux abords d'une ripisylve délimitant l'étang du stade de l'étang à Voile à Gamaches (ensemble de 60 hectares connu sous l'appellation étangs Sainte Marguerite). Il s'agit d'anciens marais communaux dont l'extraction du ballast remonte à la fin de la décennie cinquante. Une partie du site (environ 1/3) fait actuellement l'objet d'une classification en réserve ornithologique. Les abords de cette ripisylve sont occupés par une phragmitaie embryonnaire et par une vasière.

L'oiseau peu farouche a été longuement observé et photographié puisqu'il s'alimentait exclusivement sur les massettes de *Typha* sp. (quelques pieds sur le site!) en faisant des allées et venues régulières entre la phragmitaie et les Typhas, pratiquement dépouillés à cette époque de l'année.

La ripisylve résonnait ce jour là des chants de Pouillots véloce *Phylloscopus collybita*, Pouillots fitis *Phylloscopus trochilus*, Rousserolles effarvates *Acrocephalus scirpaceus*, Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*, Phragmites de joncs *Acrocephalus schoenobaenus* et Pinsons des arbres *Fringilla coelebs*. Un couple de Cygnes tuberculés *Cygnus olor* occupait un nid avec 4 oeufs, tandis qu'à trois mètres de là une femelle de Foulque macroule *Fulica atra* couvait.

BIBLIOGRAPHIE

- BOUTINOT S. (1960) : Observation d'une Mésange rémiz (*Remis pendulinus*) dans la région de Saint-Quentin. Orfo 30 p. 285-286.
- DUBOIS P.J. et ROUGE A. (1992-1993) : "Le coin des branchés", L'oiseau magazine, N° 28 et N° 32
- GEROUDET P. (1984) : LES PASSEREAUX D'EUROPE Tome 2, des Mésanges aux fauvettes. 3ème édition. Neuchâtel (Delachaux et Niestlé), 287p.
- ROUGE A. (1992) : Actualités ornithologiques; du 15 Février au 15 Mai 1992. G.E.O.R.-60. Bull. Liais. (11).
- SUEUR F. et COMMECY X. (1990) : Guide des Oiseaux de la Baie de Somme. EDF, DRAE Picardie, GEPOP, 192 p.
- SUEUR F. (1993) : Observations ornithologiques remarquables réalisées en 1992 en Picardie. Bull. Soc. Linn. Nord-Pic. T.11 p116-118.

YEATMAN L. (1976) : Atlas des oiseaux nicheurs de France. Paris (SOF, Ministère Qualité Vie Environnement), 283p.

L.P.O. (1993) : Liste des oiseaux de l'Ouest paléarctique et des noms français des oiseaux. 24 p.

LUCCHESI J.L., PAMBOUR B. et PINEAU O. (1991) : Mésange rémiz *in* YEATMAN - BERTHELOT D. Atlas des oiseaux de France en hiver. Paris, S.O.F.: 432-433.

Carte 1 : Aire de répartition européenne de la Rémiz penduline *Remiz p. pendulina*.

