CENTRALE ORNITHOLOGIQUE G.E.P.O.P.

SYNTHESE DES OBSERVATIONS DE L'AISNE EN I978

Pour la première fois, nous pouvons parler de synthèse de l'Aisne, ayant reçu en nombre des observations couvrant à peu près tout le département de l'Aisne.

Toutefois, certains biotopes restent peu prospectés. La Thiérache est désormais bien couverte, ainsi que Le Laonnois. Les marais de Saint-Boétien sont peu visités, c'est dommage, étant donné leur richesse. Le Vermandois, pourtant prospecté, est absent de cette synthèse.

Nous avons noté plusieurs faits intéressants cette année : en particulier la nidification de la Cigogne blanche dans la vallée de l'Aisne, ainsi que les observations du Petit Chevalier à pattes jaunes près de Laon, du Cincle plongeur sur la vallée de l'Oise, du Pygargue, de la Mouette tridactyle à l'intérieur des terres, enfin celles du Grèbe à cou noir, du Torcol et du Bruant zizi en Thiérache.

L'année I978 s'avère donc être intéressante. Nous espérons dans les années à venir avoir encore plus de données concernant l'Aisne.

H. Dupuich et F. Sueur

OBSERVATEURS :

J. Bellard (Calidris), P. Biet, R. Blackburn (G.O.N.), S. Boutinot, X. Commecy, C., F. et H. Dupuich, M. Dutoit (G.O.N.), A. Goulliart (G.E.M.O.), P. Grangé (C.O.C.A.), M. Jeanson (P.O.M.), L. Kérautret (G.O.N.), P. Luce, M. Mannecart (P.O.M.), E. Mercier (M.E.P.), E. Novak, P. Pigeon, Y. Ridel (P.O.M.), A. M. Rouvillain, F. et M. Sueur, B. Venet, J. L. Wiart, L. Eloy.

ABREVIATIONS :
M. = mâle
F. = femelle
ad. = adulte
im. = immature
juv. = juvénile
ind. = individu

=======

GREBE HUPPE Podiceps cristatus
Aulnois-sous-Laon : 1 le 1er avril.
Boué : 1 le 5 avril, 2 le 2 août.
Vailly-sur-Aisne et Vénizel : nidification : environ 10 couples (2 ad./min., 2 grands (juv., I ad./I nid/I oeuf) le 2 juillet.
Guignicourt : 4 ad. et juv. le 2 juillet, noté le 21 oct.
Villers-en-Prayères : 15 (1couple parade) le 21 avril, 5 le 14 août.

GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis
1 juv. le 7 août à Boué (H. Dupuich)

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollis
Aulnois-sous-Laon (bassins de décantation) : 2 le 25 juin, pas de nidification cette année, 3 le 18 août, 1 le 22 août.
Boué : 1 couple nicheur suivi régulièrement, 5 ind. le 4 avril, 4 le 10, 3 le 29, 2 le 14 mai, 2 les 17 et 18 juin, 1 les 1er et 5 juillet, 2 ad. + 1 im. le 8 août : les plongées sont chronométrées.

Plongée n°	Grèbe 1 (ad.)	Grèbe 2 (ad.)	Grèbe 3 (im.)
1	13 s.	13 s.	7 s.
2	7 s.	8 s.	6 s.
3	13 s.	7 s.	8 s.
4	13 s.	13 s.	6 s.
5	20 s.	4 s.	
6	10 s.	8 s.	

2 ad. + 4 juv. le 9 août, 3 le 14 sept., 9 le 14 oct., 10 le 11 nov., 15 le 17, 11 le 25 nov., 2 les 16 et 27 déc.

Mondrepuis : 1 le 13 avril, Guignicourt : en juillet et en octobre.

HERON CENDRE Ardea cinerea
Aulnois-sous-Laon : 1 le 25 juin, 1 le 10 août.
1 fin sept. à Boué et 1 à Etreux.
1 le 13 juillet à Maizy.
1 le 24 déc. à Le Nouvion-en-Thiérache.
Villers-en-Prayères : 1 le 21 avril, 10 le 14 août.

HERON POURPRE Ardea purpurea
1 le 15 sept. à Saint-Simon (P. Biet).

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia
Passages notés au printemps à Montcornet et en avril au Nouvion-en-Thiérache.
1 couple nicheur sur la carte de Craonne : 4 juv. bagués au nid le 13 juillet (voir "L'Avocette" 1978/Nos 2-3-4 p. 75), disparition d'un jeune quelques jours plus tard (P. Pigeon).

OIE CENDREE Anser anser
4 posées le 12 février près de Saint-Quentin.
100 le 20 nov. au Nouvion-en-Thiérache, 25 en vol vers le S. le 1er déc.

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna
Boué : 1 de début janvier (présent depuis novembre 1977)jusque fin février, où il fut tué (réf. P. Luce, "viva voce"), 1 ad. le 14 oct., 1 F. le 14 nov.
Aulnois-sous-Laon : 1 M. 1F. les 18 mars et 1er avril, 1 le 21 mai, 1 M. le 12 août, 1 M. 1 F. le 20 nov. (P. Pigeon).
Le nombre des observations à l'intérieur des terres tend à augmenter, ce qui confirme l'efficacité d'une bonne protection.
Remarquons également, qu'il est fait mention d'un couple nicheur sur un bassin de décantation à l'ouest de Saint-Quentin (Aisne) : observation d'1 couple/10 pulli en juin par S. Boutinot (in Alauda).

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos
Aulnois-sous-Laon : 25 (dont 3 couples) le 18 mars, 6 (dont 1 couple) le 21 avril, 2 M. 1F. le 6 mai, 1 F. le 25 juin, 4 F. le 26 août, 40 le 5 nov., 3 le 18 déc., 10 le 22.
Boué : nicheur. Observé de janvier à avril, 1 F./12 pulli le 29 avril, 1 F./pulli le 18 juin, 50 le 5 juillet, 34 le 7, 15 le 15 août, 10 le 25 sept., 60 le 29 oct., 25 le 23 déc.
1 M. volant à Englancourt le 3 avril, 20 le 2 juillet à Bucy-le-Long, 13 le13 à Maizy, 18 le 14 août à Villers-en-Prayères, présent en déc. à Montceau-sur-Oise (nombreux tirs de chasseurs).

SARCELLE D'HIVER Anas crecca
Passage prénuptial et postnuptial, hivernage remarqué.
Aulnois-sous-Laon : 21 le18 mars, 130 le 19, 45 le 1er avril, 1 M. 1F. le 15, 30 le 16, 1 le 16 août, 6 le 22, 4 le 26, 8 le 28, 60 le 5 nov. 55 le 28, 70 le 18 déc., 50 le 22.
En l'absence de données, peut-être encore nicheuse sur le Vermandois.

CANARD CHIPEAU Anas strepera
Passage prénuptial faible.
1 F. le 26 mars à Boué (H. Dupuich).

SARCELLE D'ETE Anas querquedela
Passage postnuptial.
Aulnois-sous-Laon : 11 le 16 août, 9 le 28.
2 le 2 août à Boué.
En l'absence de données, peut-être encore nicheuse sur le Vermandois et le Laonnois.

CANARD SOUCHET Anas clypeata
Aulnois-sous-Laon : 2 M. 2 F. le 1er avril, 1 M. le 15, 1 M. 1 F. le 6 mai.
Boué : 1 M. 2 F. du 28 mars au 8 avril, 1 M. les 21 et 22 nov.
Maizy : 1 le 13 juillet.
Marle : 1 M. 1 F. les 2 et 16 avril.
En l'absence de données, peut-être encore nicheur sur le Vermandois et le Laonnois.

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina
Aulnois-sous-Laon : 3 M. 1 F. le 18 mars, 1 M. le 20 nov.
Boué : 6 le 18 juin, 1 les 4 et 5 juillet, 2 M. le 27 déc. (hivernant).

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula
Passage prénuptial et postnuptial.
Aulnois-sous-Laon : 1 M. 1 F. le 15 avril, les 1er et 6 mai.
Boué : 3 le 9 août, 4 (dont 2 tués) début nov.
Villers-en-Prayères : 1 M. 1 F. le 21 avril.

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila
Espèce peu commune à l'intérieur des terres, soit 1 observation :
1 M. le 18 déc. à Boué (P. Luce).

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula
1 F. le 22 déc. à Aulnois-sous-Laon (P. Pigeon).

BUSE VARIABLE Buteo buteo
Laonnois-Soissonnais :
Forêt de Saint-Gobain : 2 couples le 20 mars, 4 ind. le 17 avril.
1 ind. le 21 avril entre Maizy et Beaurieux.
1 ind. le 30 nov. à Erlon, 1 ind. le 18 déc. à Aulnois-sous-Laon.

Thiérache :
Forêt d'Hirson : 2 ind. les 13 avril et 6 mai.
Forêt du Nouvion-en-Thiérache :
- contacts en avril : à retenir 1 ind. trouvé mort le 30 avril (plumes sectionnées : tir), 1 ind. de la variété claire le 5 avril (parade).
- contacts en mai : à retenir 1 parade le 21 mai.
- contacts en juin : à retenir 3 ind. le 18 juin à l'étang de Boué dont 1 ind. avec une envergure plus petite (1 jeune avec ses parents?), 5 ind. le 25 juin dont 1 couple (1 phase claire + 1 phase foncée) avec comportement de défense de territoire : proximité d'une aire?
- contacts en juillet, août, septembre : 5 le 19 sept., 4 le 29.
- contacts en octobre, nov., déc.

Possibilité de 3 couples nicheurs sur la Queue de Boué malgré des individus tirés durant l'année en dépit de leur protection.

A noter : contacts en nov., déc. à Chigny, Buironfosse, Englancourt (également en avril), La Capelle, Leschelles, Le Grand Wez et présence notée en forêt de Saint-Michel, en forêt de la Haye d'Aubenton et en forêt de Coucy-Basse.

EPERVIER D'EUROPE Accipiter nisus
Localités d'observation :
Aulnois-sous-Laon : mars.
Boué : noté toute l'année, quelques plumées trouvées (dont un ramier en février près de l'étang de Boué et un ramier le I3 avril dans une bétulaie).
I ind. tué durant l'automne (réf. P. Luce, "viva voce").
I M. et I F. hivernant fin décembre en forêt du Nouvion-en-Thiérache.
Dohis : juin.
Monceau-sur-Oise : observé le 9 déc.

AUTOUR DES PALOMBES Accipiter gentilis
Toujours des ind. migrateurs.
Lerzy : I ind. observé en avril (M. Dutoit).
Forêt de Saint-Gobain : I ind. le 20 mars (P. Pigeon).
Complément : I ind. tué en forêt du Nouvion-en-Thiérache à l'automne 77 (P. Luce).

MILAN ROYAL Milvus milvus
Passages notés en avril et en mai en Thiérache sur Le Nouvion, La Capelle (réf. B. Venet, J. L. Wiart, "viva voce").

MILAN NOIR Milvus migrans
I ind. le I8 juin à Boué (H. Dupuich).

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla
I im. hivernant à partir du 22 déc. à l'étang de Caulaincourt (S. Boutinot).

BONDREE APIVORE Pernis apivorus
Beaurieux et Maizy : I le I3 juillet, d'après ses allées et venues, il semble s'agir d'un nicheur local (J. Bellard, A. Goulliard, M. Jeanson, M. Mannecart, Y. Ridel et F. Sueur).
Forêt de Coucy-Basse : 1 le I3 sept. sur un nid de guêpes (E. Novak).
Forêt du Nouvion-en-Thiérache : I les I3 mai et 28 juin (H. Dupuich).
Saint-Simon : I le 5 août (P. Biet).

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus
Verneuil-sur-Serre : 2 couples le I6 avril.
Faibles données sur cet oiseau

BUSARD SAINT-MARTIN Circus cyaneus
Aulnois-sous-Laon : I M. le 23 août.
Leschelles : I M. I F. le 26 nov., espèce observée régulièrement en déc. près de Leschelles et Esquéhéries.
Forêt de la Haye d'Aubenton : I F. le I8 juin.
Forêt de Saint-Gobain : I couple le I5 avril.
Guignicourt : I M. le I2 déc.
Cette espèce était peut-être nicheuse à Lerzy en 1977.

BALBUZARD PECHEUR Pandion haliaëtus
2 ind. observés durant la migration (pas de date) au Marais de Saint-Boëtien, d'après certaines données, passage noté tous les ans.

FAUCON EMERILLON Falco columbarius
Hivernant toujours rare.
I le I6 déc. à Boué (H. Dupuich).

FAUCON CRECERELLE Falco tinnunculus
Localités d'observation :
Aulnois-sous-Laon (mars, déc.), Barenton-Cel (nov.), Beautor, Boué (avril, mai, juillet), Buironfosse, Clairefontaine (avril), Chigny (avril, nov.), Esquéhéries, Hermès, La Capelle (avril), Lerzy (3 le 7 déc.), forêt du Nouvion-en-Thiérache (toute l'année), Laon, Origny-Sainte-Benoîte (janvier), forêt de Saint-Gobain (avril), Tergnier, Guignicourt.
Espèce nicheuse en Thiérache, observée régulièrement.

FAISAN DE COLCHIDE Phasianus colchicus
Nicheur sédentaire en forêt du Nouvion-en-Thiérache.
Observation de pulli et de juv. peu volant en juillet.

GRUE CENDREE Grus grus
I le I5 nov. à Montceau-sur-Oise (P. Luce).
4 en vol vers le SW le 28 nov. à Aulnois-sous-Laon (P. Pigeon).

POULE D'EAU Gallinula chloropus
Aulnois-sous-Laon (bassins de décantation) : 4 couples.
Boué :
Cette localité est le siège d'un important stationnement hivernant : I70 le I4 octobre, I80 le II nov., min. 400 le 26 nov.

FOULQUE MACROULE Fulica atra
Aulnois-sous-Laon (bassins de décantation) : 2 les 2I avril et 6 mai, 2 ad./I pullus d'environ I0 jours le 25 juin, I le 6 août, 3 le I2, I4 les I6 et I8, I8 le 28, 2 le 3 nov., 3 le I8 déc.
Boué : nicheur certain sur l'étang.
I ad. au nid le I4 mai, I ad./I pullus le II juin, I ad./juv./pulli le Ier juillet, 4I le 9 août, 50 le I9 sept., 30 le I9 octobre, 27 le 25 nov., 35 le I6 déc., 20 le 27 déc.
Englancourt : le 3 avril, Guignicourt : en juillet et en octobre.

OUTARDE CANEPETIERE Otis tetrax
I seule observation : 2 ind. le Ier mai à Flavy-le-Martel (H. Dupuich) dans un champ nu.
Rien ne confirme sa nidification dans le Saint-Quentinois.

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus
Aulnois-sous-Laon : peu noté au printemps : I les I9 mars et Ier avril, beaucoup plus abondant lors de la migration postnuptiale : 36 les 26 juin et I0 août, I50 le I2 août, 80 le 22 août, 30 le 5 nov., 60 le 28 nov.
Nicheur à Bercy-le-Long, 30 le 2 juillet.
80 le 30 nov. à Dercy et I20 à Barenton-Cel.
600 le 5 mars à Vaux-Andigny.

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula
Migrateur peu commun.
Aulnois-sous-Laon : 4 le I0 août, 2 le I2, I les 26 et 28.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus
Aulnois-sous-Laon : 2 les 26 et 28 août (P. Pigeon).

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius
Observations bien suivies. Nicheur dans le Laonnois.
Aulnois-sous-Laon : 3 (les Iers) le Ier avril, 3 couples le I2, I nid/2 oeufs le 6 mai, I nid détruit par la pluie le 2I, 5 ind. le 3 juin, I nid/3 oeufs et 2 pulli d'environ I semaine le 25, 8 le 8 août.
Marle : 3 (Ières parades) le 2 avril, I couple le I6.
Boué : I les I0 et II avril.
Bucy-le-Long : 2 alarment le 2 juillet.

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago
Migration prénuptiale et surtout postnuptiale.
Aulnois-sous-Laon : I le 2I mai, I le 6 août, 7 le I0, 4 le I2, 8 le I6, 5 le I8, I8 le 22, I3 le 26, 5 le 28, 60 les 3 et 5 nov., 5 le I2, 2 les 20 et 28.
Boué : 20 le 25 sept., passage important à la fin de ce même mois. 4 le 23 nov., 7 le 27 déc.
Englancourt : 2 le 27 nov.
Marle : 2 le 2 avril, I le I6.
Mondrepuis : I le I3 avril.
Villers-en-Prayères : I le 2I avril.

BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus
Migratrice assez rare.
I le I2 avril à Aulnois-sous-Laon (P. Pigeon).

BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola
I le 29 oct. à Guivry.
I le 26 nov. en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

COURLIS CENDRE Numenius arquata
Aulnois-sous-Laon : I ind. le Ier avril.
En l'absence totale de données, rien ne confirme sa présence comme nicheur dans les marais de Saint-Boétien.

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus
Boué : I le I3 avril.
Aulnois-sous-Laon : 5 le 30 avril, 4 le 6 mai.

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus
Aulnois-sous-Laon : 2 les 2I et 30 avril, 2 le 6 mai, I5 le 2I, I0 le I0 août, 3 le I2, I les I6 et 22;
Boué : I le I0 avril, 2 les II et I2.
Marle : I le 2 avril, I0 le I6.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia
Aulnois-sous-Laon : 4 le 2I mai, 5 le I0 août, 2 le I2, 4 le I6, 2 le 22.
Boué : I les I2 et I3 avril, I le 25 sept.
Maizy : I le I3 juillet.

PETIT CHEVALIER A PATTES JAUNES Tringa flavipes
Observation exceptionnelle :
soit I ind. identifié le 3 juin par P. Pigeon sur un bassin de décantation de la sucrerie d'Aulnois-sous-Laon (existence d'un document photographique).
Il s'agit de la 7ème mention pour la France.

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus
Aulnois-sous-Laon : 2 le I8 mars, 2 le Ier avril, I les I2 et I5, 2 les 2I et 30, 2 le Ier mai, 7 le 25 juin, 2 le 6 août, 3 le 8, 4 le I0, 3 le I2, I le 22, 3 les 5 et I2 nov., 5 le 20, I le 28.
Boué : I les II et I2 avril, 8 le I3, 2 les 20 et 2I nov.
Marle : 9 le 2 avril, 7 le I6.
I le 2 juillet à Bucy-le-Long, I sur une gravière dans la vallée de l'Aisne à l'Est de Soissons,

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola
Aulnois-sous-Laon : 4 le 6 août, 8 les I0 et I2, 6 le I8, 5 le 22.
Boué : 2 le 25 septembre.

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos
Aulnois-sous-Laon : 2 le 30 avril, 5 le Ier mai, 3 le 6, 6 le 2I, I le 25 juin, 45 le 6 août, 30 le 8, 35 le I0, I5 le I2, I2 le I6, I0 le I8, 8 les 22, 26 et 28.
Boué : 6 le 5 avril, 5 les II et I2, I le 29, 2 le 2I mai.
Villers-en-Prayères : I le I4 août.
Dernière observation : le 25 nov. à Boué.

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina
Aulnois-sous-Laon : 3 le 3 juin, I le 25, I le I6 août.

COMBATTANT Philomachus pugnax
Aulnois-sous-Laon : I le 30 avril, 4 le 6 mai, I M. I F. le 6 août, I les I0 et I6, I M. I F. le I2 nov.
Marle : I M. le 2 avril.

AVOCETTE Recurvirostra avosetta
Aulnois-sous-Laon : I le 6 mai (P. Pigeon).
Boué : I le 29 mars (P. Luce).

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus
Aulnois-sous-Laon : observée après la période de nidification, 9 le 3 juin, 45 le 25, 8 le 6 août, 3 le I6.
Boué : notée en mars et en avril.
Des mouvements de retour au dortoir observés en fin de journée (vers W ou SW) en septembre et novembre. S'agit-il du dortoir de Cléry-sur-Somme (80) ? d'un dortoir plus proche ?
2 le I0 déc. dans le sens inverse à
Encore notée en avril le long de l'Aisne : 20 le 2I entre Beaurieux et Maizy. Guignicourt : alarme le 2 juillet : pulli ?

MOUETTE TRIDACTYLE Rissa tridactyla
I trouvée morte à Lesquielles-Saint-Germain et naturalisée (...
(réf. P. Luce, "viva voce").

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger
I le 2I mai à Boué, 2 le I2 août à Aulnois-sous-Laon.
Peu nombreuse en migration.

PIGEON RAMIER Columba palumbus
Aulnois-sous-Laon : 550 le 28 nov.
Forêt du Nouvion-en-Thiérache : présent toute l'année, très abondant le 28 oct.

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur
Aulnois-sousLaon : 6 (Ières) le 6 mai, 40 le 6 août.

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto
Nicheuse commune dans tout le département.

COUCOU GRIS Cuculus canorus
Iers observés : I le I3 avril à Mondrepuis, I le I5 avril en forêt de Saint-Gobain, min. de 8 chanteurs sur 6 kms de voie ferrée et I ind. à l'étang de Boué le I4 mai.
Guignicourt : 3 ind. notés le 2 juillet.

HIBOU MOYEN-DUC Asio otus
I le I6 avril à Aulnois-sous-Laon.

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua
Signalée dans la vallée de l'Oise (avril).
I nid/3 oeufs dans un vieux pommier le 2I mai à Aulnois-sous-Laon.
I le I6 nov. entre Hirson et Landouzy-la-Ville.

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco
Présente en forêt du Nouvion-en-Thiérache où elle niche.
Entendue pendant tout le printemps.

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba
Signalée au Nouvion-en-Thiérache.
Mais encore peu de données.

MARTINET NOIR Apus apus
30 (Iers) le Ier mai à Aulnois-sous-Laon.

MARTIN-PECHEUR Alcedo atthis
Localités d'observation :
Maizy (juillet), Guignicourt : I ind. le 2I oct.
Boué (août, nov.)
Peu de données.

HUPPE FASCIEE Upupa epops
I le I2 avril à Hirson.
Signalée : sud d'Hirson durant le printemps. Peut-on penser à l'existence d'un petit noyau dans cette région.?

PIC VERT Picus viridis
Nicheur en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

PIC NOIR Dryocopus martius
I loge dans un hêtre mort le I5 avril en forêt de Saint-Gobain, I autre loge creusée dans le même arbre le I9, cris entendus dans les environs ce jour-là (P. Pigeon).

PIC EPEICHE Dendrocopos major
Signalé en forêt du Nouvion-en-Thiérache : I M. I F. en comportement territorial et poursuite le I3 avril.

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor
Cette espèce non indiquée par "l'Atlas des Oiseaux nicheurs de France" sur la carte de Guise est notée par deux groupes d'observateurs le I3 avril en forêt du Nouvion-en-Thiérache dont I F. bien cantonnée.
Non indiquée auparavant sur la carte d'Hirson, une observation le I3 avril à Mondrepuis en bordure de la forêt d'Hirson.
Dans les deux cas, il peut s'agir de nicheurs possibles voire probables.

TORCOL FOURMILIER Jynx torquilla
I le 30 avril au Nouvion-en-Thiérache.

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis
Peu commune dans le bocage de la Thiérache.
Commune sur les champs et les régions cultivées.

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia
Ières : 2 le 2I avril entre Beaurieux et Maizy.
Plusieurs le 2I mai à Boué.
Plusieurs colonies dans les gravières de la vallée de l'Aisne à l'est de Soissons, à Guignicourt (juillet).

HIRONDELLE DE CHEMINEE Hirundo rustica
Ières : le 29 mars à Boué.
Aperçu du déroulement de la migration prénuptiale donné par quelques dénombrements à Aulnois-sous-Laon (bassins de décantation) :
8 le I2 avril, 40 le I5, I00 le Ier mai.
Dernière observation notée : début nov. au Nouvion-en-Thiérache.

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica
Ières : le 27 mars à Boué.
Dernières : le 29 septembre à Boué.

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis
Iers : I0 le I7 avril en forêt de Saint-Gobain.
Espèce commune en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis
Bien plus rare que l'espèce précédente en Thiérache.
Début d'hivernage à Boué : I les II et I7 nov., I le I6 déc.,
I le 27.

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava
Ières : le 2 avril à Marle.
Espèce commune à Boué, Guignicourt (M. + juv. le 2 juillet).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea
Non indiquée sur la carte de Guise par "l'Atlas des Oiseaux nicheurs de France", signalée comme nicheuse possible dans deux localités : Boué et Mondrepuis; deux autres localités étaient indiquées en I977 (voir l'Avocette I978/nos 2-3-4 page 68).

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba
M. a. alba : nicheuse présente toute l'année.
M. a. yarrelli : I le 5 avril à Boué (H. Dupuich).

PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor
I le I5 mai à Tergnier.
Nicheuse en forêt du Nouvion-en-Thiérache (non indiquée sur la carte de Guise par "l'Atlas des Oiseaux nicheurs de France").
I im. de la sous-espèce excubitor trouvée morte le I8 nov. au Nouvion-en-Thiérache. 1 ind. très clair le 26 Déc. Nouvion en Thiérache.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio
2 le II juin à Dohis (P. Grangé).
I ind. en juillet en forêt de Coucy-Basse, peut-être s'agit-il d'un nicheur local ?

CINCLE PLONGEUR Cinclus cinclus
Observé au printemps en forêt d'Hirson (Prud'homme).
Hivernant sur la vallée de l'Oise en limite des départements de l'Aisne et du Nord.
D'où probabilité d'une nidification dans ce secteur.

TROGLODYTE Troglodytes troglodytes
Espèce présente toute l'année, très commune en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis
Espèce présente toute l'année.
Nicheur noté

TRAQUET PATRE Saxicola torquata
Ier : le I8 mars à Aulnois-sous-Laon.
Dernier : le 26 sept. à Boué.

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe
Ier : I M. le I9 mars à Aulnois-sous-Laon.
Migration de printemps jusqu'au I6 avril : I M. à Marle.
Migration d'automne à partir du 23 août (I ind. à Aulnois-sous-Laon).

ROUGEQUEUE NOIR Phoenicurus ochruros
Iers : 4 le I2 avril à Aulnois-sous-Laon.
Nicheur à Boué.
Dernier : le 23 nov. à Boué.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus
Nicheur à Boué.

ROUGEGORGE Erithacus rubecula
Nicheur commun, présent toute l'année.

ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos
Ier : le 2I avril entre Beaurieux et Maizy.
Nicheur à Boué.

GRIVE LITORNE Turdus pilaris
Ières : le 26 nov. en Thiérache.
Bien observée en hivernage.

MERLE A PLASTRON Turdus torquatus
I ind: le I4 mai au Nouvion-en-Thiérache, I début déc.

MERLE NOIR Turdus merula
Nicheur commun.

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos
Nicheuse commune.

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus
Ières : le 26 nov. en Thiérache.
Dernière : le 5 avril en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus
Nicheuse un peu moins commune que la Grive musicienne.

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti
Nicheuse probable à Boué.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE Locustella luscinioides
Ières : le 2I avril entre Beaurieux et Maizy.
Signalée également à Boué : I ind. chanteur le I7 juin.

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia
Ière : I chanteur le I9 avril en forêt de Saint-Gobain, 6 le 29.
Signalée à Boué : I chanteur le 2I mai, I le I8 juin.

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus
Iers : 3 le 20 avril à Verneuil-sur-Serre.
Espèce peut-être nicheuse à Boué (P. Luce).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris
I ind. le 2I mai à Aulnois-sous-Laon.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus
Aulnois-sous-Laon : I ad./I nid/2 oeufs le 6 août, nid abandonné 6 jours plus tard.
Boué : comportements territoriaux le 2I mai, I ad./4 juv. peu volants le 30 juin, I juv. le 7 juillet, dernière le 25 septembre.
Bucy-le-Long : chanteurs le 2 juillet (bassin de décantation).

ROUSSEROLLE TURDOIDE Acrocephalus arundinaceus
Signalée près de Saint-Quentin au printemps (Etang de Ribécourt).

HYPOLAIS ICTERINE Hippolais icterina
Observée pendant la période de reproduction en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta
I chanteur le 22 mai sur une plantation de peupliers en forêt du Nouvion-en-Thiérache.
J. Mouton fixe la limite Nord de cette espèce quelques kilomètres plus au Nord (J. Mouton, observation de l'Hypolaïs polyglotte dans le Nord et Pas-de-Calais - "Le Héron" p. 70 à 74).

FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin
Ière : le 29 avril en forêt de Saint-Gobain.
Nicheuse commune.

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla
Ière : le 26 mars à Boué.
Nicheuse commune.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca
Ière : le 13 avril en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis
Ières : 8 le 29 avril en forêt de Saint-Gobain.

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus
Iers : le 5 avril à Boué.
Dernier : I chanteur le 23 nov. (P. Luce).

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita
Ier : le 9 mars à Aulnois-sous-Laon.
Signalé plus tard en Thiérache : Ier le 26 mars.
Boué : I le II nov. et I le 10 déc.

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix
I chanteur le 14 mai en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU Regulus ignicapillus
ROITELET HUPPE Regulus regulus
Hivernants très nombreux en nov. et en déc.

GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata
Signalé au printemps en Thiérache.

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus
I avec la tête blanche le 30 avril à Boué.
I troupe de 20 ind. le 18 nov.au Nouvion-en-Thiérache.

MESANGE NOIRE Parus ater
I le 13 avril à Boué, I le 25 déc. en forêt du Nouvion-en-Thiérache.
I le 25 déc. en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

MESANGE NONNETTE Parus palustris
Nicheuse commune.

MESANGE BOREALE Parus atricapillus
Nicheuse commune.

MESANGE HUPPEE Parus cristatus
I chanteur le 5 avril en forêt du Nouvion-en-Thiérache.
Est avec la Mésange noire la moins commune des Mésanges.

MESANGE BLEUE Parus caeruleus
Nicheuse commune.

MESANGE CHARBONNIERE Parus major
Nicheuse commune.

SITTELLE TORCHEPOT Sitta europaea
Des chanteurs signalés en forêt du Nouvion-en-Thiérache et à Mondrepuis en bordure de la forêt d'Hirson.

GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla
I le 3 avril à Chigny.
I le I4 mai en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

BRUANT PROYER Emberiza calandra
Peu commun en Thiérache.

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella
Commun en Thiérache.

BRUANT ZIZI Emberiza cirlus
I M. les 5 et 30 avril entre Le Nouvion-en-Thiérache et Boué (voir l'Avocette_ I978/nos 2-3-4 p. 80-8I).
Aucune donnée sur le sud de l'Aisne.
Le statut de cette espèce dans l'Aisne est malconnu, et plus particulièrement sa limite de répartition.

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus
Bassins de décantation de sucrerie : 3 couples à Aulnois-sous-Laon, IO couples à Marle.
Boué : commun en avril pourtant hivernant peu commun en ce lieu.

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs
Relativement peu abondant en forêt du Nouvion-en-Thiérache.

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla
Aulnois-sous-Laon : dernier le I8 mars, IO le 5 mars, 20 le 20, 25 le 28.
Forêt de Coucy-Basse : I M. le 6 juin

VERDIER Carduelis chloris
Présent toute l'année.

CHARDONNERET Carduelis carduelis
Nicheur (Buironfosse...), importants passages en Thiérache en octobre-novembre.

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina
Présente toute l'année.

SERIN CINI Carduelis serinus
I le 26 juin au Nouvion-en-Thiérache.

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula
Nombreux ind. le 25 nov.

GROS-BEC Coccothraustes coccothraustes
2 le I3 avril en forêt du Nouvion-en-Thiérache.
Gros hivernage en déc., I le 3I déc. sur le rebord d'une fenêtre de H. L. M. au Nouvion-en-Thiérache (J. L. Wiart).
2 le I9 avril en forêt de Saint-Gobain.

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus
Nicheur très commun.

MOINEAU FRIQUET Passer montanus
Nicheur présent toute l'année en forêt du Nouvion-en-Thiérache, (bétulaies principalement).

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris
Nicheur commun.

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus
Iers : 2 le Ier mai à Aulnois-sous-Laon, I ind. le 2 juillet à Guignicourt.
Dernier : le 28 août à Aulnois-sous-Laon.
Entendu en forêt du Nouvion-en-Thiérache au printemps et en été.

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius
Une migration nette est notée en Thiérache le I4 octobre :
- nombreuses troupes en vol vers le sud à Boué : I0 ind. en I5 minutes.
- 30 ind. en vol vers le sud dans un bocage aux environs du Nouvion-en-Thiérache.

PIE BAVARDE Pica pica
Redevenue commune en Thiérache.

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula
Nicheur commun. En bande janvier, février, nov., déc.

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus
Nombreuses colonies :
- I3 couples entre Barenton-sur-Serre et Mortiers.
- I6 couples entre Chalandry et Mortiers.
- I6 couples à Chigny.
- 24 couples entre Erlon et Marcy-sous-Marle.
- 45 couples près de Monceau-le-Neuf.
- I colonie à Mondrepuis.
- environ 20 couples à Saint-Quentin.

CORNEILLE NOIRE Corvus corone
Nicheuse commune.