



Le PIC MAR

Revue du Groupe d'Études ORnithologiques de l'Oise

PICARDIE NATURE
Mission des Sciences et de la Nature
14, Place Vogel - B.P. 835
80008 AMIENS Cedex 1
tel. : 22 97 97 87 - Fax : 22 92 08 72




SOMMAIRE

numéro 5

Synthèse des observations ornithologiques de l'Oise en 1995

mai 1999

- | | |
|--|---|
| 1 • Introduction
<u>H. de Lestanville</u> | 18 • Des Gallinacés aux Limicoles
<u>C. Louvet</u> |
| 3 • Des Plongeurs aux Anatidés
<u>F. Spinelli</u> | 27 • Des Laridés aux Rapaces
nocturnes
<u>W. Mathot</u> |
| 13 • Rapaces diurnes
<u>W. Mathot</u> | 31 • De l' Engoulevent d'Europe aux
Passereaux
<u>M. et P. Sengez</u> |



GEOR 60

Le *Pic mar* est édité par le Groupe d'Etudes Ornithologiques de l'Oise
-association loi 1901-

2, rue de Pierrefonds-Pondron-60127 Morienvil.
Tél : 03-44-88-61-51. E-mail : geor60@wanadoo.fr

Directeur de la publication : Franck Spinelli.

Comité de relecture : Yves Bas, Henri de Lestanville, Anne et Cédric Louvet, William Mathot, Pierre et Marc Sengez, Franck Spinelli.

Illustrations : Cf annotations. Couverture : C. Louvet.

Conception et mise en page : Anne et Cédric Louvet. **Contact :** 03-44-39-52-68.

Tirage : 120 exemplaires - **Prix d'un numéro :** 35f.

Dépôt légal : Préfecture de l'Oise - FR ISSN 1269-1194

Pour les rédacteurs d'articles, notes ou récits pour le *Pic mar* :

Nous vous demanderons de transmettre vos articles sur support informatique sans mise en page sur disquette 3,5" en format *.doc (document WORD) accompagné d'un tirage papier.

Appel aux dessinateurs : nous avons besoin de dessins pour illustrer les prochains numéros.

Merci de nous les envoyer sur papier à l'adresse suivante :

Anne et Cédric LOUVET
464 B rue du docteur Chopinet
60 320 BETHISY ST PIERRE

Introduction à la Synthèse 1995 (suite)

Enfin, côté Passereaux, les migrateurs comme le Pipit rousseline et à gorge rousse et les Bruant ortolanet zizi, ou l'hivernage du Sizerin flammé et du Bec-croisé, ne nous font pas oublier que tous les biotopes sont intéressants à prospecter

METEOROLOGIE

(d'après COP 1997)

Janvier : la première décade est fraîche et ensoleillée, ensuite un courant océanique se met en place engendrant une certaine douceur et d'importantes précipitations accompagnées de vents violents.

Février : le temps perturbé s'installe avec des températures clémentes et toujours des précipitations importantes.

Mars : ce mois est comme les précédents très arrosé et des vents violents sont notés avec des températures et une insolation moyennes.

Avril : la première moitié de ce mois sera anticyclonique sans pluie, la seconde perturbée mais peu pluvieuse.

Mai : la première décade est sèche, la seconde très humide et la troisième normale. Il gèle encore à la mi-mai.

Juin : durant les deux premières décades le temps est perturbé mais peu pluvieux. Il est ensuite anticyclonique. La pluviométrie et les températures sont en dessous de la moyenne.

Juillet : le mois est chaud, ensoleillé et orageux avec des précipitations soudaines parfois importantes.

Août : sécheresse et forte chaleur caractérisent ce mois.

Septembre : ce mois est perturbé par un courant océanique qui amène pluie (deux fois plus que la normale) et vent).

Octobre : mois sec et exceptionnellement doux. Les premières gelées sont notées vers le 20.

Novembre : ce mois sera doux, sec et ensoleillé avec une pluviométrie déficitaire et une insolation excédentaire.

Décembre : mois froid avec un début de vague de froid à la fin du mois, à partir du 20 prise de glace des étangs.

LISTE DES OBERVATEURS ET ABREVIATIONS UTILISEES

Rémi Baradez (RB), Serge Barande, Pierre Brichard, Henri de Lestanville (HdeL), Jen-Paul Fagard (JPF), Philippe Giovanni (PG), John Law (JLa), Jean-Bernard Marque (JBM), Alain Rouge (AR), Jérôme Votte (JV), Jean Becker, Sophie Canals, Dominique Delville (DD), Vincent Finet, Marie-Christine Jukowski (MCJ), Pascal Maire (PMai), Daniel Mure (DM), Pierre et Marc Sengez (PMS), Catherine Walbecque (CW), Jean-Philippe Bonnel (JPB), Laurent Colindre (LC), Jean-Pierre Dhermy (JPD), Rémi François (RF), Denis Laurent (DL), Pascal Malignat (PM), Joëlle Oberson (JO), Franck Spinelli (FS)...

FdC : Forêt Domaniale de Compiègne, chtr : chanteur, imm : immature, max obs : maximum observé.

Pour les histogrammes "limicoles" les effectifs maximaux correspondent aux maxima d'individus d'une même espèce observés sur un site donné.

Plongeon catmarin. *Gavia stellata*.

Seul le site de Moru-Pontpoint a accueilli cette espèce. Un individu de premier hiver a hiverné sur ce site du 01/01/1995 au 08/05/1995, date du dernier contact (JPF). Cet individu était présent à Moru depuis le 09/11/1994.

Il s'agit d'ailleurs du premier réel cas d'hivernage dans l'Oise, les autres stationnements connus n'ayant jamais excédé 10 à 15 jours comme en novembre 1981 à Beaurepaire ou en décembre 1990 déjà à Moru-Pontpoint.

Grèbe huppé. *Podiceps cristatus*.

Cette espèce commune dans notre département a été observée sur de nombreux sites : Chevières, Saint-Félix, Verberie, Verneuil-en-Halatte, Moru-Pontpoint, Longueil-Sainte-Marie, Pierrefonds, Marais de Sacy, Pont-Sainte-Maxence, Cisors, étangs de Saint-Pierre, étang de Comelle, Angy, Martincourt, Mortefontaine, Chantilly, Saint-Vaast-les-Mello, Tolvevoie, Royaumont (95), Grand Vivier (95), Beaurepaire, étang du désert (Ermenonville) et étang de l'Épine.

Les sites où l'espèce a été notée "Nicheuse Certaine" en 1995 sont les suivants : Étang de Saint-Félix (YL), Moru-Pontpoint (DD, AR, RB, PM, PMS), Longueil-Sainte-Marie (DD), étang de Comelle (Pierre Brichart, YL), étangs de Saint-Pierre (PMS, FS), Angy (YL, JMG), Martincourt (YL) et Chantilly (JMG).

Les effectifs maximum obtenus en hivernage concernent principalement les sites de :

- Verneuil-en-Halatte : 69 le 27/02 (DD) et 89 le 31/12 (JPB, CG).
- Moru-Pontpoint : 81 le 08/12 (RB, PMal) et 126 le 16/12 (JPB, CG).

Grèbe jougris. *Podiceps grisegena*.

Totalité des observations dans l'Oise :

Moru-Pontpoint :
1 le 04/03 (DD)
1 le 10/12 (PMS)
1 les 12 et 14/12 (PMS)
1 le 17/12 (HdL)
1 le 18/12 (PMS)

Neaufles-Saint-Martin (département 27) : 2 individus observés du 08/01 au 22/02/1995 (DD)

Grèbe castagneux. *Tachybaptus ruficollis*.

Cette espèce commune a été observée en 1995 sur les sites suivants : Chevières, Saint-Félix, Verberie, Verneuil-en-Halatte, Moru-Pontpoint, Longueil-Sainte-Marie, Vauciennes, Pont-Sainte-Maxence, Lavilletertre, étangs de Saint-Pierre, Pimprez, Villers-Saint-Sépulcre, étang de Litz, Chantilly, Saint-Vaast-les-Mello, Barbey, étang de Comelle, Beaurepaire et Pondron.

Les indices de "Nidification Certaine" ont été peu notés par les observateurs : Vauciennes (AR), Villers-Saint-Sépulcre (YL) et Litz (YL).

Les effectifs maximum obtenus en période postnuptiale et en hivernage concernent principalement les sites de :

- Chevières : 47 le 06/08 (PM) et environ 50 le 16/09 (AR).
- Moru-Pontpoint : 33 le 03/11 (AR) et 35 le 26/11 (DD).

Grèbe à cou noir. *Podiceps nigricollis*.

La totalité des observations 1995 ne concerne que les sites de Chevrières et de Moru-Pontpoint.

En 1995, comme depuis 1993, la nidification dans l'Oise n'est connue que pour le seul site de Chevrières :

- 17/06/1995 : 2 couples et 3 juvéniles (RB).
- 24/06/1995 : 4 juvéniles (RB)
- 02/07/1995 : 2 couples (un avec 5 juvéniles et l'autre avec 2 juvéniles) (PM)
- 14/07/1995 : 3 juvéniles (PM).

Grèbe esclavon. *Podiceps auritus*.

Totalité des observations 1995 dans l'Oise :

Moru-Pontpoint :
 1 le 05/02 (DD)
 1 le 14/02 (JBM, MCJ)
 1 le 18/02 (AR)
 1 le 26/02 (PM)
 1 le 04/03 (RB, PM)
 1 le 11/03 (RB, PM)

Faisant suite à deux données ponctuelles en novembre 1988 à Montreuil-sur-Thérain et en janvier 1991 à Verneuil-en-Halatte, il s'agit du premier réel stationnement de cette espèce dans l'Oise.

Grand cormoran. *Phalacrocorax carbo*.

Les effectifs de cette espèce en migration et en hivernage semblent en augmentation. En 1995, le Grand cormoran a été observé sur les localités suivantes : Chevrières, Saint-Félix, Brassoir, Morienvall, Verberie, Verneuil-en-Halatte, Moru-Pontpoint, Longueil-Sainte-Marie, Neaufles-Saint-Martin (27), Dangu, Pimprez, Grand Vivier (95), Creil, Breuil le vert, Villers-Saint-Sépulcre, Mortefontaine, Vineuil-Saint-Firmin, Chantilly, Royaumont, Compiègne, étang Vallière, étang du Désert (Ermenonville) et Cires-les-Mello.

Les effectifs les plus importants comptabilisés sont les suivants :

- 190 le 30/12 à Verberie (RB, PM)
- 141 en dortoir le 23/03 à Longueil-Sainte-Marie (DD)
- 127 en vol le 23/03 à Chevrières (DD)
- 89 le 28/03 à Moru-Pontpoint (JPF)

Butor étoilé. *Botaurus stellaris*.

En 1995, la totalité des observations provient du Marais de Sacy le Grand, qui est le seul site de l'Oise où la reproduction semble régulière. (En l'absence de comptage simultané il est très difficile de pouvoir estimer la population de ce marais privé de près de 1000 hectares).

Marais de Sacy :
 - 1 chtr le 19/03 (DD) - 1 chtr le 22/05 (PMS)
 - 1 chtr le 08/04 (DD) - 3 chtrs le 25/05 (AR)
 - 2 chtrs le 09/04 (JBM) - 2 chtrs le 27/05 (PM)
 - 1 chtr le 30/04 (PM) - 3 chtrs le 28/05 (JBM)
 - 2 chtrs le 01/05 (DD) - 1 chtr le 13/06 (PMS)
 - 5 chtrs le 11/05 (SB) - 1 chtr le 20/07 (DD)
 - 1 chtr le 14/05 (PMS)

Butor étoilé (suite)

Les mois d'avril à juin sont les plus favorables pour contacter cette espèce.
Pas de données hivernales en 1995.

Blongios nain. *Ixobrychus minutus*.

Une seule donnée en 1995 : 1 mâle vu à trois reprises le 25/06/1995 au Marais de Sacy (DD).

Le Marais de Sacy le grand est toujours le seul site connu où l'espèce se reproduit plus ou moins régulièrement.

Aigrette garzette. *Egretta garzetta*.

La totalité des observations est à mettre en relation avec la migration postnuptiale qui culmine en août dans notre département.

En 1995, l'Aigrette garzette n'a été observée que sur deux sites:

Chevrières: 1 le 13/08/1995 (PM)
 2 le 26/08/1995 (AR, PM)

Moru-Pontpoint: 2 le 12/08 (RB, PM)
 2 le 14/08 (PMS)
 1 le 20/08 (JPF)
 2 le 22/08 (PMS, FS)
 1 les 14 et 15/09 (PMS)
 1 les 19 et 21/09 (PMS)
 1 le 19/10 (PMS)

La donnée du 19/10/1995 est la plus tardive que nous connaissons pour l'Oise depuis 1978.

Grande aigrette. *Egretta alba*.

Les seuls contacts avec la Grande aigrette concernent 1 individu observé pendant plus d'un mois en limite sud de l'Oise à Baillon (Val d'Oise) à proximité de l'abbaye de Royaumont.

L'espèce a été observée du 03/11/1995 au 16/12/1995 (G et F Bêteille, JBM, JMG)

Il s'agit de la deuxième donnée "départementale". En effet, un individu avait été observé le 11/01/1993 à Neaufles-Saint-Martin (27). (Toujours en limite de l'Oise)

Héron cendré. *Ardea cinerea*.

Espèce très commune, le Héron cendré a été observé sur plus de 64 localités en 1995.

Cependant, aucun cas de nidification n'a pu être déterminé avec certitude en 1995. Trois secteurs ou leurs abords peuvent toutefois laisser présager une nidification "probable" :

Moru-Pontpoint: 1 adulte posé en plumage nuptial + 1 autre en vol le 04/03 (DD)
 Noté comme "nicheur probable" le 20/05 (RB, PM)
Etang de Wallu : 1 adulte + 1 immature le 28/05 (DD)
Parnes : L'espèce a été notée en 1995 près de l'étang de Bauves où elle avait déjà niché en 1992.

Héron cendré (suite)

Les plus gros effectifs (supérieur à 10) obtenus en période postnuptiale et en hivernage ont été noté sur les sites suivants:

Chevrières :	11 le 29/08 (PM)	
Moru-Pontpoint:	19 le 22/07 (DD)	12 le 06/08 (JPF)
	12 le 01/08 (PMS)	16 le 22/08 (FS)
Royaumont :	12 le 27/12 (JMG)	

Héron pourpré. *Ardea purpurea*.

Une seule observation dans l'Oise en 1995 :

1 immature le 19/08/1995 à Moru-Pontpoint (RB, PM)

Cigogne blanche. *Ciconia ciconia*.

La majorité des observations correspond à la migration postnuptiale :

1 le 10/07 à Villers-Saint-Sépulcre (YL)
 17 le 02/09 posées dans un champ à proximité de Chevrières (PM)
 1 le 16/09 à Montataire (JMG)
 6 le 08/10 à Brassoir près de Morienval (PMS, JPB, CG)
 1 le 19/10 à Baboeuf (YL)

Pas de nidification notée dans l'Oise en 1995. A noter toutefois le stationnement de 2 individus (1 couple?) de fin avril à juillet 1995 à Quierzy (02, en limite de l'Oise) mais, apparemment, sans tentative de nidification (RF).

Comme en 1993 à Ressons sur Matz ou en 1994 au Plessis Brion, un individu semble montrer des velléités d'hivernage : 1 noté le 12/11/1995 et le 07/12/1995 à Compiègne (quartier Royallieu) (info transmise à AR).

Spatule blanche. *Platalea leucorodia*.

Une donnée en 1995 pour cette espèce rarement observée à l'intérieur des terres.

2 le 16/04/1995 à Chevrières (D Laurent) (Première donnée départementale)

Cygne chanteur. *Cygnus cygnus*.

Selon le propriétaire de l'étang de Wallu, 2 individus auraient stationné environ 2 semaines sur ce site début 1995 (Info DD).

Cygne tuberculé. *Cygnus olor*.

Cette espèce commune a été notée sur de nombreux sites : Chevrières, Saint-Felix, Verberie, Verneuil-en-Halatte, Moru-Pontpoint, Litz, Longueil-Sainte-Marie, Marais de Sacy, Chantilly, Toutevoie, Beaurepaire, Angy, Lorteil, étang de Comelle, Bresles, Gouvieux et Royaumont.

Cygne tuberculé (suite)

L'espèce a été notée "nicheuse nertaine" sur seulement trois sites :

- Bassins de décantation de Chevrières (PM, DD, JBM, AR, RB)
- Etang communal de Litz (YL)
- Etang de Comelle (YL, JMG)

Cygne noir. *Cygnus atratus*.

1 individu échappé de captivité a été observé tout au long de l'année dans l'Oise, principalement à Chevrières mais aussi de temps à autre à Verneuil-en-Halatte (mars) ou Moru-Pontpoint (septembre et octobre).

Observateurs : (JBM, FS, AR, HdL, PM, JPD et PMS)

Oie rieuse. *Anser albifrons*.

Une seule donnée dans l'Oise en 1995 :

1 le 04/03/1995 (avec 4 Oies cendrées) à Chevrières (HdL)

Il s'agit de la troisième donnée départementale (première : Janvier 1985 à Chevrières et deuxième : Novembre 1989 à Longueil-Sainte-Marie).

Oie cendrée. *Anser anser*.

Ce sont les périodes de migration prénuptiale et postnuptiale qui sont les plus favorables à l'observation de l'Oie cendrée dans l'Oise.

En 1995, la migration prénuptiale semble avoir culminé la deuxième et la troisième décade de février et en ce qui concerne la migration postnuptiale, la majorité des observations a été recueillie la première décade de septembre.

Bernache du Canada. *Branta canadensis*.

Une seule donnée dans l'Oise en 1995 :

3 en vol le 17/04/1995 à La Croix Saint-Ouen (PM).

Tadorne de Belon. *Tadorna tadorna*.

En 1995, l'espèce a été observée sur les sites suivants : Chevrières, Verberie, Moru-Pontpoint, étang du Grand Vivier, étang de Wallu et gravières de Morlincourt.

La nidification n'a pu être prouvée que sur le site de Chevrières :

- 7 juvéniles le 24/06/1995 (RB) et 3 dont 1 juvénile le 02/07/1995 (PM)

Tadorne casarca. *Tadorna ferruginea*.

Deux observations dans l'Oise en 1995 pour cette espèce échappée de captivité :

2 le 17/06 au Grand Vivier (95 - Royaumont) (JPD)

1 femelle le 25/12 sur l'Oise à Compiègne (observée depuis plusieurs années) (RF)

Canard souchet. *Anas clypeata.*

En 1995, cette espèce a été notée sur les sites suivants : Chevrières, étang de Saint-Félix, étang du Grand Vivier (95), Verberie, Moru-Pontpoint, Lavillettertre, étang de Wallu et Verneuil-en-Halatte.

C'est une nouvelle fois les sites de Chevrières et de Moru-Pontpoint qui accueillent les plus gros effectifs que ce soit en période de migration ou en hivernage :

55 le 25/03 à Moru-Pontpoint (RB, PM) 35 le 02/12 à Moru-Pontpoint (RB)
54 le 18/03 à Moru-Pontpoint (RB, PM) 33 le 10/04 à Chevrières (PM)
48 le 16/04 à Chevrières (D Laurent) 32 le 04/03 à Moru-Pontpoint (DD)
38 le 11/03 à Moru-Pontpoint (RB, PM) 30 le 02/11 à Moru-Pontpoint (PMS)
35 le 25/11 à Moru-Pontpoint (RB, PM) 30 le 19/03 à Moru-Pontpoint (JPF)

Sarcelle d'hiver. *Anas crecca.*

En 1995, cette espèce a été notée sur les sites suivants : Chevrières, étang de Saint-Félix, Verberie, Verneuil-en-Halatte, Moru-Pontpoint, Lavillettertre, étang de Wallu, étang du Grand Vivier (95), Coyolles, Sempigny, étangs de Saint-Pierre et Marais de Sacy le grand.

Les indices de nidification chez cette espèce sont suffisamment rares pour que l'on note la présence d'un couple dans un pré inondé le 19/03/1995 à proximité de Sempigny (PMS)

Les plus gros rassemblements sont notés sur les sites de :

Etang de Wallu : 123 le 26/11 (JPB)
 Environ 90 le 29/08 (DD)
 Environ 80 le 24/09 (DD)

Chevrières : Environ 100 le 08/12 (PM)
 85 le 29/08 (F Jacob)
 83 le 31/12 (RB, PM)

Sarcelle d'été. *Anas querquedula.*

En 1995, cette espèce n'a été notée que sur trois sites : Moru-Pontpoint, Chevrières et Manicamp.

La seule donnée concernant la nidification se rapporte au site de Manicamp (02) : 1 couple "Nicheur Probable" en 1995. (RF)

On peut noter quelques observations relativement tardives :

2 individus le 02/09 à Chevrières (AR, PM)
1 le 06/09 à Chevrières (AR)
1 mâle le 09/09 à Chevrières (PM)

(Il s'agit des données les plus tardive connues pour le département de l'Oise)

Canard carolin. *Aix sponsa*.

Une seule donnée dans l'Oise en 1995 :

1 femelle le 14/01/1995 à Saint-Vaast-les-Mello (PMal).

Canard mandarin. *Aix galericulata*.

Trois données dans l'Oise en 1995 :

3 mâles et 1 femelle le 29/10 au Grand vivier (Royaumont) (JBM)

2 le 12/04 en Forêt de Laigue - parcelle 78. (M Diaz)

1 mâle le 05/06 à l'étang de Pierrefonds. (Info orale)

Erismature rousse. *Oxyura jamaicensis*.

Cette espèce a été observée sur cinq sites en 1995 :

Chevrières : Observations régulières d'un mâle du 10/06/1995 au 08/08/1995 (AR, HdL, RB, PM, JBM, PMS, JPD) et de 3 femelles le 01/11/1995 (PM).
A noter : 2 mâles le 25/07 (JBM) et le 01/08 (HdL).

Moru-Pontpoint : 3 femelles / Imm. le 30/10 (AR) puis observations régulières d'une femelle du 02 au 18/11/1995 (PMS, PM, RB, FS, G et F Béteille).

Marais de Sacy : 1 le 04/07 (DD). Egalement une Erismature sp le 05/02 (DD).

Royaumont : 1 les 06, 12 et 25/02 aux étangs du Grand Vivier (JBM, PM, CWa)

Neaufles-St-Martin : 1 femelle du 22/10 au 04/11/1995 (DD, C Jobin)

Ces observations répétées semblent vouloir prouver l'expansion de cette espèce.

Nette rousse. *Netta rufina*.

Neuf données pour l'ensemble de l'année 1995 sur les sites suivants :

Chevrières : 1 mâle le 27/05 (PM) 2 mâles et 1 femelle le 01/07 (PM)
1 mâle le 10/06 (RB) 1 mâle et 1 femelle le 02/07 (PM)
1 mâle le 24/06 (RB)

Verberie : 1 femelle le 01/11 (RB, PM, G et F Béteille)

Moru-Pontpoint : 1 femelle le 04/11 (PM)
1 le 05/11 (G Béteille)

Angy : 1 femelle le 02/04 (JMG)

Fuligule milouin. *Aythya ferina*.

Cette espèce commune en hivernage a été observée sur de très nombreuses localités. Pendant cette période les plus gros effectifs sont notés sur le site de Moru-Pontpoint et de Verberie.

Moru-Pontpoint : Environ 900 le 29/12/1995 (AR)
675 le 07/01/1995 (RF)
Plus de 650 le 12/11/1995 (YL)

Verberie : 550 le 15/01/1995 (D Laurent)
475 le 31/12/1995 (PM)


Les autres sites accueillant des populations hivernantes relativement importantes, sont :

Longueil-Sainte-Marie : Max observé : 411 le 23/01 (AR)
Saint-Vaast-les-Mello : Max observé : 214 le 21/01 (RF, FS)
Verneuil-en-Halatte : Max observé : 200 le 31/12 (JPB, CG)
Chevrières : Max observé : 100 le 26/12 (L Denis)
Saint-Félix : Max observé : 78 le 10/02 (YL)
Beaurepaire : Max observé : 55 le 08/11 (JMG)

En 1995 le Fuligule milouin a été noté nicheur "probable ou certain" sur deux sites :

Chevrières : 2 poussins (peut-être volants) le 28/05 (AR)
1 femelle adulte + 6 juvéniles le 01/07 (PM)
2 adultes + 6 juvéniles le 08/07 (PM)

Marais de Sacy : 2 couples le 19/03 (DD)
2 mâles + 2 femelles le 01/05 (DD)
3 juvéniles non volants le 25/06 (DD)



Fuligule milouin
Cécile Louvet

Fuligule nyroca. *Aythya nyroca*.

Neuf observations dans l'Oise en 1995, toutes sur le site de Moru-Pontpoint :

1 mâle le 04/11 (PM)	1 femelle / Im. le 24/11 (AR)
1 le 05/11 (G Béteille)	1 mâle le 25/11 (PMS)
1 mâle le 08/11 (PMS)	1 mâle le 03/12 (AR, G Béteille, JL Bigorne)
1 mâle le 18/11 (RB, PM)	1 le 09/12 (G et F Béteille)
1 mâle le 20/11 (PMS)	

Il s'agit du premier réel cas d'hivernage dans notre département, les observations précédentes ne concernaient que des stationnements ponctuels.

Fuligule morillon. *Aythya fuligula.*

En 1995, l'espèce a été observée sur les sites suivants : Chevrières, Saint-Félix, Verberie, Verneuil-en-Halatte, Moru-Pontpoint, Longueil-Sainte-Marie, étang de Wallu, Angy, étang du Désert (Ermenonville), Neaufles-Saint-Martin (27), Pimprez, Vauciennes, Saint-Vaast-les-Mello, Mareuil sur Ourcq et Beaurepaire.

Les plus gros effectifs hivernants sont notés sur les sites de :

Verberie : 67 le 23/12 (RB, PM)

Moru-Pontpoint : 65 le 09/12 (JPF)
Plus de 60 les 09 et 29/12 (AR)

Verneuil-en-Halatte : 59 le 31/12 (JPB)

En ce qui concerne la nidification, le Fuligule morillon n'a été noté nicheur que sur une seule localité : Neaufles-Saint-Martin (27) (DD). La nidification a eu lieu sur un étang mis en réserve (6 jeunes à l'envol). Ces derniers se sont dispersés début septembre et les adultes sont restés sur le site jusqu'en octobre.

Fuligule milouinan. *Aythya marila.*

Onze observations dans l'Oise en 1995. Toutes sur le site de Moru-Pontpoint :

1 femelle le 07/01 (RF)	1 femelle le 12/04 (PMS)
1 femelle / Imm. le 19/01 (AR)	1 femelle le 22/04 (RB, PM)
1 femelle le 23/01 (AR)	1 femelle le 30/04 (DD)
1 femelle le 28/01 (RB, PM, PMS)	1 femelle le 17/12 (HdL)
1 femelle le 25/03 (RB, PM)	1 femelle le 29/12 (P Mai)
1 femelle le 09/04 (DD)	

Cette espèce peut s'observer dans l'Oise de mi-novembre à début avril.

Macreuse brune. *Melanitta fusca.*

Deux données dans l'Oise en 1995 :

1 femelle le 08/12/1995 à Moru-Pontpoint (RB, PM)
1 le 09/12/1995 à Moru-Pontpoint (DD, G et F Bêteille)

Garrot à oeil d'or. *Bucephala clangula.*

61 observations en 1995 sur les sites suivants : Chevrières, Moru-Pontpoint, Verneuil-en-Halatte, Pimprez et Morlincourt.

Fin hivernage 94/95 :	1 femelle le 18/03 à Pimprez (PMS)
	1 femelle le 01/04 à Morlincourt (PMS)
Début hivernage 95/96 :	1 mâle le 25/11 à Moru-Pontpoint (RB, PM)
	1 femelle le 26/11 à Moru Pontpoint (DD)

Garrot à oeil d'or (suite).


Les plus gros effectifs en hivernage sont notés sur le site de Moru-Pontpoint :

6 femelles + 4 mâles le 11/02 (PMS) 10 le 18/02 (PMS)
7 femelles + 3 mâles le 12/02 (L Denis) 8 le 30/12 (RB, PM)

Harle piette. *Mergus albellus*.

Seulement deux observations dans l'Oise en 1995 :

- 2 femelles le 29/12/1995 à Moru-Pontpoint (AR, P Ma)
- 3 femelles le 30/12/1995 à Verberie (RB, PM)



Harle piette
Régis Legros

Harle huppé. *Mergus serrator*.

Une seule observation dans l'Oise en 1995 :

- 3 mâles le 22/04/1995 à Chevières (PM)

Il s'agit de la troisième donnée départementale avec Saint-Leu-d'Esserent en novembre 1988 et Moru-Pontpoint en novembre 1990.

Harle bièvre. *Mergus merganser*.

Seulement deux observations dans l'Oise en 1995 :

- 1 femelle les 28 et 30/12/1995 à Moru-Pontpoint (PMS)

Bondrée apivore. *Pernis apivorus*.

Nicheur et migrateur.

Premières: 1 le 01/04 à Erquery (YL)
 1 le 05/04 à Thury sous Clermont (YL)
 1 couple parade le 14/05 en F de Hez (YL)
 1 le 17/05 à Moru (PMS)
 3 le 20/05 Forêt d'Halatte (HdeL)

Bondrée apivore (suite)

Dernières 1 femelle le 02/09 en FdC (PM-DS)
 1 le 03/09 en FdC (PM-RB)
 1 le 12/09 en FdC (PM-RB)
 1 blessée le 19/10 à Cires les Mello (YL)

1 nicheur certain en FdC le 16/08 : 1 jeune + couvain sous le nid (DM).

Milan noir. *Milvus migrans.*

Migrateur rare. Observé surtout pendant les périodes de migration.

La majorité des observations a lieu en avril et mai.

1 le 23/04 à Chevières
 1 le 30/04 à Boran/Oise (PM)
 1 le 13/05 à Moru (PMS)
 1 le 14/05 à Chevières
 1 le 23/05 à Chevières (JBM-MCJ)
 1 en 06 au marais de Bourneville (JPB)
 1 le 18/06 au bois de Tillet (LC)
 1 le 22/06 à Crépy en Valois (LC)

Milan royal. *Milvus milvus.*

Migrateur rare dans l'Oise.

En règle générale, cette espèce est surtout notée pendant les migrations soit mars, avril, mai pour la migration prénuptiale et octobre, novembre pour la migration postnuptiale. Les données en périodes de nidification et en hivernage sont beaucoup plus rares.

1 le 26/03 en FdC (DM)
 1 le 11/04 à Champlieu (PMS)
 1 le 01/10 à Morienvall (PMS)
 1 le 15/10 au Mont St Hélène (DD)
 1 le 24/10 à Brassoïr (PMS)
 1 juv le 10/11 à Brassoïr (PMS)

Année remarquable : 1988 avec
 13 Milans observés.

Pygargue à queue blanche. *Haliaeetus albicilla.*

Migrateur et hivernant très rare dans l'Oise. Pas d'observation pour 1995.

Ce rapace n'a été vu dans l'Oise qu'à deux occasions :

Un cas d'hivernage avec un séjour du 06/12/84 au 02/02/85 à Mortefontaine.

Une observation ponctuelle : 1 le 08/03/86 à Vauciennes.

Busard des roseaux. *Circus aeruginosus.*

Migrateur et nicheur rare, hivernant occasionnel.

Le Busard des roseaux est présent sur les grands marais et les plans d'eau bien connus des ornithologues mais aussi, à défaut, au sein des cultures céréalières et des friches.

Busard des roseaux (suite)

Premières observations:	2 mâles le 09/04 à Sacy le Grand (DD) 1 femelle le 15/04 à Chevrières (PM) 1 femelle le 16/04 à Chevrières (DL) 1 im le 22/04 à Chevrières (PM) 1 femelle le 23/04 à Chevrières (AR) 1 femelle le 23/04 à Vauciennes (PMS)
Nicheur Probable:	1 mâle et 1 femelle le 25/05 à Sacy le Grand (AR) 1 couple le 12/05 à Marest-Dampcourt (RF) 1 couple (1mâle imm + 1femelle imm) le 21/06 à Huleux
Dernières observations:	2 le 07/10 en FdC (PM) 2 le 25/10 au Plessis-Belleville (JPF) 1 femelle le 29/10 à Moru (JBM-MCJ) 1 le 01/11 à Chevrières (PM-RB)

Busard Saint Martin. *Circus cyaneus.*

Migrateur et hivernant.

Les quelques sédentaires sont rejoints en hiver par des oiseaux plus nordiques. Nicheur possible un peu partout dans l'Oise, il est noté nicheur probable et nicheur certain en FdC où Pierre et Marc Sengez ont suivi un dortoir et plus tard, la couvaison de deux couples.

Quelques notes du suivi en FdC :

dortoirs:

8 (7 femelle et 1 mâle) le 01/02
8 (2 mâles / 6 femelles) le 03/02
4 femelles le 12/02
5 (1 mâle im et 4 femelles) le 04/03(DD-JO)
5 femelles le 16/03
6 (3m / 3f) le 12/12

nidification:

Parade le 21/03	Nicheur probable
1 couple le 01/04	Nicheur probable
Passage de proie le 03/04	Nicheur certain
5 dont 2 mâles, le 10/04	Nicheur probable
Parade le 11/04	Nicheur probable
1mâle le 21/04 construction du nid	Nicheur certain
Nidification le 21/05	Nicheur certain
1 jeune volant le 29/07	Nicheur probable

Quelques autres sites de dortoirs ou de nidification:

4 (1 couple + 2 juv) les 24 et 25/06 à Néry avec passage de proie (JPF) nicheur certain
5 (2 couples + 1 femelle) à Baudeduit (PG)
1 nicheur probable à Wariville/Bulles : 1mâle transporte de la nourriture le 10/06, 1 couple le 14/07, 2 juv en vol le 05/08 et le 21/08 (YL).

Busard cendré. *Circus pygargus*.

Nicheur et migrateur rare dans le département. Trois oiseaux ont été notés nicheurs probables.

- 1 mâle le 01/05 à Bouillancy (LC)
- 1 femelle le 12/05 à Manicamps (RF)
- 1 mâle le 09/06 à Rocquemont (PMS), nicheur probable.
- 1 femelle ou im le 17/07 à Lataule (FS), nicheur probable.
- 1 juv le 29/08 à Huleux (PMS)
- 1 mâle le 08/09 à Montépilloy (FS)

Autour des palombes. *Accipiter gentilis*.

Sédentaire nicheur et migrateur rare.

Visible toute l'année, l'Autour des palombes, comme d'ordinaire, a été très peu noté cette année.

Nicheur possible en FdC, aucune preuve de nidification probable ou certaine n'a été apportée.

- 1 femelle le 13/01 et 1 mâle le 08/02 F de Hez Froidmont (YL)
- 1 mâle le 27/02 à Sacy le Grand (DD)
- 1 femelle ou imm le 01/03 en FdC aux Beaux monts (RF)
- 1 femelle le 01/03 FdC au Cfr d'Epernon (RF)
- 1 le 16/07 aux étangs de Lavilletterre (FGB)
- 1 le 09/09 à Moru (PM-DS)
- 1 juv le 02/09 à Chevières (AR)

Epervier d'Europe. *Accipiter nisus*.

Sédentaire, migrateur.

Observé toute l'année un peu partout, dans les zones boisées et les cultures.

Cette espèce n'a été notée Nicheuse Probable que sur une seule localité. Ses effectifs nicheurs sont très certainement sous estimés.

- 1 mâle, 1 juv à Cuvelly le 28/06 (FS)

Buse variable. *Buteo buteo*.

Espèce sédentaire, relativement commune en Europe de l'ouest, les oiseaux nordiques et orientaux hivernent dans notre département d'octobre à avril.

Maxi:

- 10 le 03/09 à Huleux (PMS)
- 9 le 30/09 en FdC (PM)
- 8 le 27/08 à Huleux (PMS) dont 1 blanche
- 7 (3 couples + 1) F de Malmifait (PG)
- 6 en 04 ou en 05 à Cempuis (PG)
- 6 le 03/09 à Pondron (JPB)
- 6 le 03/10 à Brassoir (PMS)

Quelques nicheurs notés:

- Nicheur probable : 1 accouplement le 19/03 à l'étang de Monceaux (DD)
- Nicheur certain : 2 le 04/06 au bois du Roi (LC)
- Nicheur certain: 1 nid occupé le 30/04 en FdC (DD)

Aigle botté. *Hieraaetus pennatus*.

Aucune mention de ce rapace très rare dans notre département. Rappelons les quatre données des années antérieures :

2 le 30/06/84 à Ourscamp

1 possible le 18/03/89 au Bois du Roi (NL-LC)

1 en phase sombre le 03/03/90 vers Brétigny (AS)

1 en chasse le 14/04/91 au bois de Porquericourt (à proximité de Noyon) (AR)

Cette espèce est surtout notée au passage prénuptial.

Balbuzard pêcheur. *Pandion haliaetus*.

Migrateur régulier mais peu abondant.

Les passages prénuptiaux sont étalés sur mars et avril

1 le 17/04 à Chevrières

1 le 22/04 aux étangs de Touthoie (DD-JO-JW-GA)

1 le 09/05 à Moru (PMS)

1 le 14/05 à Moru et 1 à Sacy (PMS)

Les passages postnuptiaux sont enregistrés dès la mi juillet avec un pic en septembre.

1 à la mi 07 à Neaufles St Martin (27) (DD) 2 le 08/09 à Moru (PMS)

1 le 31/07 à Mareuil sur Ourcq (JMG) 1 le 09/09 à Chevrières (PM-DS)

1 le 01/08 à Moru (PMS) 1 le 14/09 à Moru (PMS)

1 le 26/08 à Sacy le Grand (PMS) 1 le 16/09 à Chevrières (PM-RB-DS)

3 le 27/08 à Neaufles St Martin (27) (DD) 1 le 17/09 à Chevrières (PM-RB)

1 le 01/09 à Neaufles St Martin (27) (DD) 1 le 23/09 à Sacy le Grand (PMS)

1 le 02/09 à Bulles (YL) 1 le 14/10 aux étangs de Lavilletertre (DD)

1 le 07/09 à Moru (PMS)

Faucon crécerelle. *Falco tinnunculus*.

Ce rapace relativement commun, sédentaire en Europe de l'Ouest, est observé toute l'année, un peu partout dans notre département. Les effectifs hivernaux sont "gonflés" par l'arrivée d'hivernants nordiques et orientaux.

Deux nidifications certaines :

1 transport de proie le 19/05 à Bray (JMG)

1 mâle nourrit des juv le 30/04 à Moru (DD)

Maxi : 13 le 09/12 entre Pontarmé et Roberval sur 35 km (DD) soit plus du double de l'effectif ordinaire

9 le 26/08 à Pondron (JPB)

9 le 27/08 à Huleux (PMS)

8 le 26/08 à Pondron (JPB-CG)

7 le 08/10 à Morienvall (JPB)

Jean-Paul Fagard a noté, sur un parcours régulier, l'influence de la migration sur les populations sédentaires.

Chemin parcouru. Néry - Rully - Raray.

8 le 27/09, 15 le 01/10, 13 le 03/10, 10 le 21/10, 7 le 22/10, 4 le 04/11, 6 le 07/11, 7 le 11/11.

Faucon kobez. *Falco vespertinus*.

Pas de données en 95 pour ce petit rapace qui a été observé occasionnellement au cours des années antérieures :

1 femelle du 04 au 07/05/75 à l'étang de Baillon (Kovacs et al)

1 jeune mâle le 15/05/88 à Sacy le Grand (DD)

Faucon Koberz (suite)

1 le 10/09/89 à Sacy le Grand (AS)
1 femelle les 20 (AR) et 21/05/92 (CORIF) à Sacy le Grand

Faucon émerillon. *Falco columbarius.*

Hivernant en Europe de l'Ouest et rare dans l'Oise. (Maxi pour l'Oise : 11 en 1988)

1 mâle le 25/02 à Blérancourt (RF)
1 le 21/03 à Morienvall (PMS)
1 le 17/04 en FdC près de La Croix St Ouen (PM)
1 les 08 et 24/10 et 1 les 06 et 10/11 à Brassoir (PMS)
1 femelle le 11/12 à Roye/Matz (RF)
1 femelle le 24/12 à Verneuil en Halatte
1 mâle le 26/12 à Belloy (FS)

Faucon hobereau. *Falco subbuteo.*

Noté nicheur probable dans quatre sites ou localités

2 le 04/05 en parade à Lieuvilliers (FS)
1 le 12/05 à Varesnes-Babeuf (RF)
1 le 12/05 à Manicamp (RF)
1 le 07/07 à Huleux au bois du Mt Cornon (PMS)

Arrivées :	1 le 15/04 à Néry (JPF)	L'arrivée la plus précoce dans l'Oise a été notée le 07/04/90 à Wavignies
	1 le 22/04 à Chevrières (PM)	
	1 le 01/05 à Sacy (DD)	
	1 le 11/05 à Sacy (JLB)	

Départs :	1 le 03/09 en FdC (PM)	Observation la plus tardive dans l'Oise : le 24/10/980 à Chevrières
	1 le 14/09 à Estrées St Denis (CL)	
	1 le 16/09 à Chevrières (AR)	
	1 mâle le 17/09 à Rémérangles (YL)	

Faucon pèlerin. *Falco peregrinus.*

Hivernant et migrateur rare, bien noté cette année : 5 données.
Il faut remonter à 1990 pour avoir un total de 4 oiseaux dans l'Oise.
1 le 03/01 à Montépilloy (DD-JO)
1 le 03/10 à Morienvall (PMS)
1 le 24/11 à La Borde (PM) (FGB)
1 le 26/11 à Raray (PMS)
1 le 18/12 à Rocquemont (PMS)

Perdrix grise. *Perdix perdix.*

Peu de commentaires, un maximum de 36 individus observés à Montépilloy le 24/09 (DD).

Perdrix rouge. *Alectoris rufa*.

Peu de commentaires sinon des observations d'oiseaux lâchés à des fins cynégétiques à Erquinvillers, Neufvy sur Aronde, St Maur Lataule, Vauciennes.

Caille des blés. *Coturnix coturnix*.

1ère entendue : le 20 avril à Lataule (FS) ce qui constitue la donnée la plus précoce de l'année pour la région en 1995.

Les observations concernent les communes de : Montepilloy, Cuvilly, Lataule, Noyers St Martin, Wariville, Bucamp, Erquery, Hodenc l'Evêque, Ansacq, Airion, Champlieu, Trumilly, Rully, Morienvall.

Le recueil des données pour cette espèce n'est pas significatif en raison de la faiblesse de prospections spécifiques.

Faisan vénéré. *Symaticus reevesii*.

Observations d'oiseaux introduits.

Faisan de Colchide. *Phasianus colchicus*.

Pas de commentaires.

Râle d'eau. *Rallus aquaticus*.

Cet oiseau est nicheur certain ou probable dans deux sites:

-Marais de Sacy (DD).

-Autheuil en Valois (JPB).

Quelques données hivernales à Chevrières (FS), Marais de Sacy (DD), Sénécourt (JMG).

Marouette ponctuée. *Porzana porzana*.

Première donnée : 1 chtr le 19/03 à Pontoise les Noyon qui constitue également la donnée régionale la plus précoce en 1995 (PMS).

Deux autres données relatives à la migration postnuptiale le 13 & 15/08 à Vauciennes (PMS).

Râle des genêts. *Crex crex*.

Une seule donnée pour l'Oise qui concerne un chanteur à Varesnes(RF).

Gallinule Poule d'eau. *Gallinula chloropus*.

Sans commentaires si ce n'est une observation de 73 individus le 15/01 à Chantilly.

Foulque macroule. *Fulica atra*.

Peu de commentaires à part quelques stationnements remarquables :

-1000 oiseaux le 29/10 à Verneuil en Halatte.

-660 le 08/11 à Beaufort.

Grue cendrée. *Grus grus*.

Observation d'oiseaux de passage :

1 en vol le 10/03 à Pierrefonds (PMS), 4 le 09/07 à Pierrefonds (FS), 9 le 22/10 à Trumilly (HdeL), 7 le 22/10 à Brassoir (PMS), 1 en vol le 18/11 à Orry la Ville (FG Beteille).

Huîtrier Pie. *Haematopus ostralegus*.

Un individu:

le 19/03 à Moru-Pontpoint (JPF, PMS), le 16/06 à Chevrières (RB), le 11/06 à Moru-Pontpoint (DD), le 22/10 à Moru-Pontpoint (HdeL)

5 observations pour cet oiseau dont l'observation est accidentelle à l'intérieur des terres.

Avocette élégante. *Recurvirostra avosetta*.

1 le 27 et 28/01 à Moru-Pontpoint (HdeL),


1 le 10/04, 1 le 15/04 à Chevrières (PM),

8 le 09/05 à Moru-Pontpoint (PMS),

1 le 15/05 à Chevrières (PM) (AR).

Le passage prénuptial est le plus marqué.

le passage postnuptial ne comporte qu'une observation mais de taille: 80 oiseaux ! le 20/11 à Chevrières (AR).



Avocette élégante
Cédric LOUVET

Oedicnème criard. *Burhinus oedicnemus*.

2 données uniquement pour cet oiseau:

- Un oiseau en vallée de Bauchemont le 14/04 à Belloy/Neufvy sur Aronde qui constitue la donnée la plus précoce en 1995 pour la région (FS).

- 1 oiseau le 09/09 à Angivilliers (JBecker).



Oedicnème criard
William Mathot

Petit Gravelot. *Charadrius dubius*.

1ère observation : 4 le 18/03 à Chevrières (PM)

Dernière observation : 1 juv le 05/10 à Moru-Pontpoint (PMS)

Cette espèce est notée de façon régulière entre ces deux dates.

L'enquête "Limicoles nicheurs" donne les résultats suivants pour l'Oise :

- 2 couples nicheurs possibles aux gravières de Verberie (PM, RB).
- 11 à 14 couples de nicheurs probables répartis dans les secteurs suivants : Gravières de Verberie, Moru-Pontpoint, Chevrières, Verberie (pont TGV), Baboeuf, Pimprez et Varesnes.
- 5 couples nicheurs certains : 3 à Boran/Oise, 2 aux gravières de Verberie (PM, RB).

Grand Gravelot. *Charadrius hiaticula.*

1ère observation : 4 le 15/04 à Chevières (PM)

Dernière observation : 8 le 12/10 à Moru-Ponpoint (PMS)

Cet oiseau considéré comme relativement rare à l'intérieur des terres montre cependant un passage prénuptial bien marqué surtout en mai (Effectif cumulé $n=51$) et fait également l'objet d'un nombre relativement important d'observations, surtout en septembre, lors du passage postnuptial (Effectif cumulé $n = 45$)

Pluvier doré. *Pluvialis apricaria.*

Cet oiseau a fait l'objet de nombreuses observations, surtout lors de la migration d'automne. Quelques données remarquables réalisées pour la plus grande partie en plaine.

Observations hivernales:

600 le 22/02 (DD) au petit Seran

300 le 03/12 (PMS) entre Néry et Raray

Observations de migration prénuptiale :

Pas de donnée remarquable

Observations estivales:

Un oiseau observé le 20/08 à Vauciennes

Observations de migration postnuptiale :

287 le 11/11 à Blincourt-Estrées,

150 le 18/11 à Raray (PMS),

140 le 19/11 à Touzly,

200 le 24/11 à Raray (PMS), 900 le 25/11 à Raray (PMS),

230 le 25/11 à Béthisy Saint Martin (JPF).

Pluvier argenté. *Pluvialis squatarola.*

Cet oiseau principalement littoral a fait l'objet de 3 observations dans l'Oise:

2 le 11/05 à Chevières (AR),

1 le 27/05 à Chevière (PM, RB),

1 le 28/05 à Chevières (AR).

Vanneau huppé. *Vanellus vanellus.*

De nombreuses observations surtout lors de la migration postnuptiale et lors des stationnements hivernaux.

Quelques effectifs remarquables :

Migration postnuptiale :

550 le 03/10 à Saint Clair.

1000 le 21/10 à Rully.

1730 le 22/10 à Senlis.

600 le 27/10 entre Senlis et Crépy en Valois.

700 le 11/11 à Blincourt.

700 le 12/11 à Boran.

600 le 24/11 à Wavignies.

Stationnements hivernaux :

entre 800 et 900 à Auteuil en Valois le 21/01.

Vanneau huppé (suite)

L'enquête "limicoles nicheurs" donne les résultats suivants :

Nicheurs probables :

7 à 8 couples à Le Lys dans une prairie humide (JBM).

1 couple à Boran sur Oise (PM).

1 à 2 couples dans une prairie à Pimprez sud-est (FS).

2 à 3 couples à Bailly (FS).

1 couple à Pimprez (FS).

1 couple sur la zone industrielle de Noyon (RF).

1 à 3 couples à Baboeuf (RF).

Nicheurs certains :

3 couples aux gravières de Chevières (PM);

1 couple à La Croix Saint Ouen (PM)

1 couple à Boran sur Oise (PM).

2 couples à La Chapelle en Serval (PM).

1 couple aux gravières de Pimprez (RF).

1 couple à Baboeuf (RF).

2 couples à Morlincourt (RF).

en conclusion : 14 à 19 couples nicheurs probables et 11 couples nicheurs certains..

Bécasseau maubèche. *Calidris canutus*.

2 observations pour cette espèce principalement littorale et peu fréquente à l'intérieur des terres:

1 le 14/05 à Moru Pontpoint (PMS),

2 le 31/05 à Moru Pontpoint (PMS).

Bécasseau Sanderling. *Calidris alba*.

4 observations pour cette espèce peu fréquente à l'intérieur des terres :

1 le 30/04 à Moru Pontpoint (DD),

1 le 18/05 à Moru Pontpoint (PMS),

4 le 24/05 à Moru-Pontpoint (PMS),

2 le 20/05 à Moru- Pontpoint (PM, RB).

Bécasseau minute. *Calidris minuta*.

Première observation : 1 le 10/06 à Chevières (RB).

Dernière observation : 2 le 22/10 à Chevières (HdeL).

Ces oiseaux sont observés toujours en petits nombres, le maximum d'observation concerne le mois de septembre (11 observations sur 21 au total) qui semble donc être le meilleur mois pour l'observation de cette espèce.

Maximum observé: 5 le 04/10 à Moru Pontpoint (PMS).

Bécasseau de Temminck. *Calidris temminckii*.

Deux données pour cet oiseau rarement observé dans l'Oise : 1 juv le 06/09 à Chevières (AR) revu le 09/9.

Bécasseau cocorli. *Calidris ferruginea*.

Noté en petit nombre surtout au passage postnuptial:

1 le 14/05 à Chevrières (FS.comm. pers.)

1 le 25/07 à Chevrières (FS),

1 le 30/07 à Chevrières (PM),

1 juv le 27/06 à Vauciennes (AR),

1 + 4 juv le 12/09 à Moru-Pontpoint (PMS),


10 juv le 16/09 à Chevrières (AR),

11 le 16/09 à Chevrières (PM, RB, TS), 11 le 17/09 à Chevrières (PM)

Bécasseau variable. *Calidris alpina*.

Observé presque toute l'année avec quelques données hivernales. Le passage prénuptial débute le 30/03 : 2 à Moru-Pontpoint (JPF). Le passage postnuptial débute le 02/08 : 1 à Moru-Pontpoint (JPF).


Effectifs maximaux par décades :

**Combattant varié. *Philomachus pugnax*.**

Des observations sont réalisées tous les mois de l'année avec des effectifs variables. 3 sites d'observation: Moru-Pontpoint, Chevrières, Vauciennes. A noter un nombre important de données hivernales.


Nombre maximum d'oiseaux observés: 38 le 22/04 à Chevrières (PM, RB, TS).

Effectifs maximaux par décades :



Bécassine des marais. *Gallinago gallinago*.

Des observations réparties plus ou moins régulièrement sur toute l'année, hormis en juin. L'essentiel des données concerne une période qui s'étend de la première décade d'août à la première décade de décembre. Effectifs maximaux par décades :

**Bécasse des bois. *Scolopax rusticola*.**

Les données sont réparties sur tous les mois de l'année sauf juillet, août et septembre.

Plusieurs sites de nidification probables suite à l'observation de croûles :

Hainvillers, Boulogne la grasse, Pontoise les noyon, Forêt Domaniale de Compiègne, Bois du Roy, Bois du Lieutenant, Bois de Brais, Forêt Domaniale d'Ermenonville.

Barge à queue noire. *Limosa limosa*.

Cinq données relatives à cet oiseau pour l'Oise :

1 le 15/04 à Morlincourt (PMS).

1 le 15/04 à Chevrières (PM).

2 le 16/04 à Chevrières (D. Laurent).

7 le 26/07 à Bresles (S. Canals).

1 le 23/10 à Chevrières (AR).

Courlis cendré. *Numenius arquata*.

On pourra remarquer pour cette espèce des données hivernales relativement nombreuses.

1 le 16/01 à Moru-Pontpoint (PM RB).

12 le 06/01 à Chevrières (PM, RB).

1 le 15/01 à Chevrières (D. Laurent).

1 le 18/02 à Chevrières (AR).

1 le 26/02 à Chevrières (D. Laurent, PM).

1 le 04/11 à Moru-Pontpoint (FG. Beteille).

1 troupe le 23/12 à Fresnoy la rivière (JPB).

2 le 24/12 à Grandvilliers (PG).

1 le 28/12 à Grandvilliers (PG).

1 le 29/12 à Grandvilliers (PG).

15 le 24/12 à Moru-Pontpoint (Bawedin, 1997).

1 le 30/12 à Halloy (Bawedin, 1997)

Chevalier arlequin. *Tringa erythropus*.

Plusieurs observations (n=6) du 15/04 au 11/05 qui correspondent à la migration prénuptiale. La migration postnuptiale paraît plus marquée (n=11) et s'étale du 26/07 au 23/10.


Chevalier gambette. *Tringa totanus*.

Première observation : 1 vol le 26/02 à Chevrières(HdeL).

Dernière observation : 3 le 8/09 à Chevrières(HdeL).

L'essentiel des observations correspond à une période qui s'étale de la deuxième décennie de mars à la deuxième décennie de juin. Un nombre maximal de 40 oiseaux est observé le 11/05 à Chevrières(AR).

Effectifs maximaux par décades :



Chevalier aboyeur. *Tringa nebularia*.

Première observation : 2 le 15/04 à Chevrières(PM).


Dernières observations : 1 les 11 et 20/11 à Chevrières(PM, AR).

Migration prénuptiale du 15/04 au 28/05.

Migration postnuptiale du 01/07 à Octobre.

On notera les dernières données très tardives en 1995.

Effectifs maximaux par décades :



Goéland brun. *Larus fuscus*.

Hivernant régulier en petit nombre dans l'Oise.

- 1 le 03/01 à Moru (DD)
- 2 (1 ad+ 1 imm) le 21/01 à Dangu (DD)
- 2 le 23/01 à Moru (AR)
- 1 le 23/01 à Moru (JBM-MCJ)
- 2 le 18/09 à Moru (PMS)
- 4 (2 ad graellsii+ 2 1er hiver) le 30/10 à Moru (AR)
- 1 le 26/11 à Moru (DD)
- 14 (11 1er hiver) le 21/11 à Moru (AR)
- 16 le 24/11 à Moru (AR)
- 3 (2 ad graellsii+ 1 3ème hiver) le 30/11 à Moru (PMS)
- 1 im le 08/12 à Moru (PM)
- 10 le 12/11 à Moru (JPF)
- 1 ad+ 1 1er hiver les 21 et 29/12 à Moru (AR)

Goéland argenté. *Larus argentatus*.

Nicheur et hivernant régulier en petit nombre dans l'Oise.

- Maxi : 168 le 22/02 sur une décharge à Lavillettertre (DD)
- 32 le 22/10 à Moru (JPB-CG)
- 25 le 01/11 à Moru (JPF)
- 16 le 21/12 à Moru (AR)
- 16 le 29/12 à Moru (AR)
- 13 le 20/11 à Moru (PMS)
- 13 le 23/12 à Moru (AR)
- 12 le 25/10 au Plessis Belleville (JPF)
- 10 le 07/01 à Moru (RF)

Goeland leucophée. *Larus cachinnans*.

Hivernant occasionnel. Il a cependant été observé tous les mois de l'année dans l'Oise depuis 1988.

- Maxi/mois : 1 imm le 22/02 à Gisors (DD)
- 1 2ème hiver le 27/02 à Moru
- 6 le 10/06 à Moru (PM)
- 3 juvéniles le 14/07 à Moru (AR)
- 1 le 26/08 à Moru (PM)
- 3 les 21 et 24/11 à Moru (AR)
- 6 le 21/12 à Moru (AR)

Moru est le premier site d'observation du Goéland leucophée dans l'Oise qui a également été vu aux gravières de Gisors, de Verberie et aux bassins de décantation de Chevières.

Mouette tridactyle. *Rissa tridactyla*.

Hivernante sur le littoral, rare à l'intérieur.

Il s'agit de la première observation dans l'Oise.

- 1 le 23/01 à Moru (AR). Il s'agissait d'un oiseau fortement mazouté.

Sterne Caspienne. *Sterna caspia.*

C'est encore une première observation dans l'Oise pour cet oiseau en migration.
1 le 30/04 à Moru (DD)

Sterne pierregarin. *Sterna hirundo.*

Migrateur, Nicheur à Moru où la nidification a été relativement bien suivie.

Premières : 1 le 15/04 (PM)
3 le 22/04 (PM)
7 le 26/04 (JPF)
14 le 30/04 (PM-RB)
Nidification: 14 le 09/05. Plusieurs paracent (PMS)
19 le 28/05 dont 12 couvent (JBM/MCJ)
Premiers juv : 7 couples + poussins le 10/06 (PM)
12 adultes + 4 juv le 11/06 (DD)
6 juv le 12/06 (PMS)
15 adultes + 6 juv dont 2 volants le 25/06 (DD)
11 juv le 24/06 (PM)
Dernières : 3 le 22/07 à Verberie (PM)
16 le 23/07 à Moru (JPF)
A signaler aussi la présence d'un couple avec 1 juv à Verberie le 01/07 (PM)

Sterne naine. *Sterna albifrons.*

Pas d'observation pour cette espèce cette année.
A été notée dans l'Oise en 1986, 1987 et 1992 sur les sites de Moru et Verberie.

Guifette moustac. *Chlidonias hybridus.*

Migrateur toujours aussi rare dans l'Oise ; un total de 19 oiseaux depuis 1984.
1 seule observation cette année : 1 le 30/04 à Moru (DD) (PM)

Guifette noire. *Chlidonias niger.*

Ce migrateur est observé surtout en mai au passage prénuptial.

Premières : 4 le 30/04 à Moru (DD) (PM)
2 le 01/05 à Moru (DD)
1 à Moru et 4 à Chevrières le 04/05 (PM)
20 début mai à Neaufles St Martin (CJ) (27)
11 le 13/05 à Longueil Ste Marie (PMS)
Dernières : 1 juv le 26/08 à Chevrières (AR)
3 juv le 01/08 à Moru (PMS)
2 le 07/07 à Moru (PMS)
1 en septembre (CJ)

Guifette leucoptère. *Chlidonias leucopterus.*

Cette espèce migratrice rare dans l'Oise, n'a été observé qu'en 1986, 89 et 90 à Moru, Vauciennes et Pimprez.

Pigeon colombin. *Columba oenas*.

Nicheur et migrateur.

Maxi : 100 le 29/10 à Rouvillers (H de L)
80 le 02/09 à Chevrières (PM-DS)
75 le 08/12 à Chevrières (PM-RB)
50 le 11/11 à Blincourt (H de L)
30 le 16/07 à Chevrières (TSM)
20 le 02/12 à Chevrières (PM-RB)

Nous n'avons pas de données de dortoir pour cette espèce.

Pigeon ramier. *Columba palumbus*.

Hivernant, nicheur et migrateur.

Maxi : 2000 le 21/02 en FdHez (YL)
1500 le 27/02 à Avrigny (YL)
1350 le 26/11 à Wallu (JPB-CG)
1000 le 19/11 à Morienvall (JPB-CG)
500 le 18/03 à Lavilleteurtre (DD-JO)

Tourterelle turque. *Streptopelia decaocto*.

Nicheur et migrateur.

Cette espèce est présente dans tous les villages de l'Oise.

1 dortoir de 38 à Grandvilliers le 21/10.

1 transport de matériaux le 25/10 à La Chapelle en Serval. (JBM-MCJ)

Tourterelle des bois. *Streptopelia turtur*.

Nicheur et migrateur.

Premières : 5 le 30/04 à Sacy (PM)
Dernières : 7 le 17/09 à Chevrières (PM)
Maxi : 27 le 09/09 à Chevrières (PM-DS)
15 le 16/09 à Chevrières (PM-DS)
10 le 26/05 à Luzarches (JMG)

Les effectifs nicheurs sont en très forte diminution à l'échelon national.

Coucou gris. *Cuculus canorus*.

Migrateur et nicheur un peu partout dans l'Oise.

Premier chanteur le 04/04 en FdC (PMS)

Effraie des clochers. *Tyto alba*.

Sédentaire

Noté nicheur certain à Braisnes où Jean Becker a suivi, chez lui, l'installation d'un couple en janvier jusqu'à la naissance et l'envol de 3 juv, lesquels ont séjourné jusqu'à fin novembre près du nichoir.

Egalement nicheur certain à Lieuvilliers le 20/03 (FS)

Chevêche d'Athéna. *Athene noctua*.

Espèce sédentaire en régression dans le département comme partout en France.

Notée dans les communes suivantes : La Landelle, Handivillers, St Sulpice Luzarches, Quierzy, Rully, Ons en Bray, Liancourt St Pierre, Mérard, Les Andelains, Montagny Ste Félicité, Parnes et en FdC.



Chevêche d'Athéna
Cédric Louvet

Chouette hulotte. *Strix aluco*.

Espèce sédentaire présente un peu partout dans l'Oise.

Hibou moyen duc. *Asio otus*.

Sédentaire et migrateur.

1 couple+jeunes le 19/07 à Morcourt (vallée de l'Automne) (JV) Nicheur certain

1 couple avec vol nuptial du mâle le 04/04 à Champlieu (PMS) Nicheur probable

Un dortoir de 4, dans un pin, le 07/10 à Dampierre (RF)

Le Hibou moyen duc, comme beaucoup de rapaces nocturnes, paie un lourd tribut à la circulation routière.

Yves Leconte a retrouvé 5 oiseaux écrasés.

1 le 02/04 à Agnetz, 1 le 12/07 à Crépy en Valois, 1 le 27/07 à Breuil le Sec, 1 le 05/07 et le 22/07 à Erquy.

Hibou des marais. *Asio flammeus*.

2 le 04/03 à Moru (JPF-YL)

1 le 07/07 à Montiers (FS)

2 le 29/11 à Montiers (FS)

C'est une année relativement remarquable, la meilleure avec 1985 où cinq oiseaux avaient également été vus. Il faut savoir que depuis 1985 seulement 18 données ont été répertoriées.

Rappelons aussi le seul cas de nidification certaine dans les marais de Bresles, noté en 1982 par G Lesaffre. Un nid occupé par des poussins fut découvert. C'est le seul cas connu dans l'Oise.

Engoulevent d'Europe. *Caprimulgus europaeus*.

Nicheur localisé

Noté uniquement en Forêt d'Ermenonville avec 2 chtr le 11/05 Cr Borest, > 3 chtr le 11/06 p 131-141-142.

Martinet noir. *Apus apus*.

Migrateur et nicheur

Première observation de l'espèce : 46 le 16/04 à Chevières


Dernier : 1 le 17/09 à Chevières.

Martin-pêcheur d'Europe. *Alcedo atthis.*

Nicheur, sédentaire

Noté sur 14 sites tous les mois de l'année :

Moru-Pontpoint, Etangs de St-Pierre en FdC, Etangs de Pierrefonds, le Berval, Etang de Toutevoie, Chevières, Etang de St Félix, Orrouy- (Etang du Vivier), Bourneville, Sacy, Etang de Lavilletterre, Chantilly, Duvy, Verneuil en Halatte.



Martin-pêcheur d'Europe
William Mathot

Huppe fasciée. *Upupa epops.*

Migrateur rare

Un seul oiseau vu en migration prénuptiale le 21/04 en FdC, p 323-324 (PMS).

Torcol fourmilier. *Jynx torquilla.*

Migrateur, nicheur localisé

Premier chtr le 06/04, dernier le 15/06, maximum de 6 individus chtr dans la même parcelle (617) le 26/04 en FdC (PMS).

En FdC les parcelles suivantes ont hébergé 1 ou 2 chtr : 148, 149, 243, 323, 505, 617, 624, 628, 743, 826 entre avril et juin.

17 chtr notés après repasse sans précision de date ni de lieu en FdC également (PM,RB).

Noté aussi en Forêt de Retz : 2 chtr le 23/04, 1 chtr le 28/05 Bois de Tillet XVI-11, et en Forêt de Hez : 2 chtr le 28/05 p 13, 1 chtr le 05/06 au "Magasin".

Pic cendré. *Picus canus.*

Nicheur rare

1 entendu le 08/02 en FdC, Rosoir-Princesses-Champlieu (PMS), ni vu ni réentendu par la suite.

1 mâle nourrit 1 juv. volant le 12/07 à Chaumontel, Les Brûlis (JMG).

Pic vert. *Picus viridis.*

Sédentaire commun

Pas de données significatives.

Pic noir. *Dryocopus martius.*

Commun dans les grands massifs forestiers

Noté en FdC dans au moins 40 parcelles toute l'année.

Il est très probablement plus répandu dans les autres forêts domaniales que ne le laissent apparaître les mentions effectives:

Il a ainsi été noté :

- en Forêt d'Ermenonville (3 mentions),
- au Bois du Lieutenant (3 mentions)
- en Forêt de Laigue (1 mention)
- en Forêt de Retz (4 mentions, dont une famille)
- en Forêt de Hez (4 mentions)
- en Forêt d'Halatte (1 mention)

Pic noir (suite)

En dehors des grands massifs forestiers, il a été également signalé :
à Cires lès Mello, lieu-dit Le Tillet
en Vallée de l'Automne, lieu-dit Lieu Restauré
au Bois de Belloy, lieu-dit Aux Marais.

Pic épeiche. *Dendrocopos major*.

Commun

Pas de données significatives.

Pic mar. *Dendrocopos medius*.

Localement commun

Il est observé toute l'année en FdC dans au moins 37 parcelles.

Les chtr sont entendus de mars à juin.

Ailleurs : 2 sites en Forêt de Laigue, 2 en Forêt de Chantilly,
1 en Forêt d'Halatte.

Pic épeichette. *Dendrocopos minor*.

Sédentaire

FdC : parcelles 55, 60, 136, 156, Etang du Carandeu

Bois du Roi, Etangs de Commelles, Hermes, Breuil le Vert, Auneuil,
Pont Ste Maxence, Chevrières, La Chapelle en Serval, Forêt de Hez,
Etang de St Félix, Agnetz, Cires lès Mello.

Cochevis huppé. *Galerida cristata*.

Localisé aux milieux urbains

Montataire, Creil, Nogent sur Oise, Clermont, Breuil-le-Vert, Fitz-James,
Breteuil, Néry, Crépy, Breteuil, Noroy, Villers St Sépulcre sont les localités
où il a été observé.

Les cas de nidification probable sont : Montataire, Crépy, Clermont.

Alouette lulu. *Lullula arborea*.

Migrateur

L'espèce a été observée uniquement en migration postnuptiale, d'octobre à novembre :

Chevrières : 1 le 21/10 (PM,RB), 1 le 22/10 (CORIF), 1 le 23/10 (AR)


Morienvil, Brassoire : 1 le 08/10 (JPB,CG), 1 le 15/10, 2 le 17/10 (PMS)

Moru : 1 le 19/10 (PMS), 9 le 01/11 (PM,RB)

Gouvieux : 4 le 13/10 (SB)

FdC, Mont St Marc : 1 le 03/11 (PMS)

Verberie : 3 le 12/11 (CORIF).



Pic mar
William Mathot

Alouette des champs. *Alauda arvensis*.

Sédentaire et migrateur

Le suivi de la migration postnuptiale à Morienvall, Brassoir a mis en évidence l'importance du flux migratoire de cette espèce :

6400 oiseaux y ont été comptés du 08/10 au 19/11, avec un maximum de 3781 oiseaux le 22/10 .

Des troupes d'une centaine d'oiseaux ont été observées en halte migratoire à Rosières le 14/10, et à Moru les 01/11 et 14/11.

Hirondelle de rivage. *Riparia riparia*.

Migrateur et nicheur

Premières observations : 2 le 18/03 à Neaufles St-Martin (27), 2 le 23/03 à Chevrières

Reproduction :

Des colonies ont été signalées à : Orrouy, La Vallouise, Boran sur Oise, Chevrières, Elincourt Ste Marguerite, Verneuil en Halatte.

Les derniers oiseaux ont été notés le 05/10 à Moru.

Hirondelle rustique. *Hirundo rustica*.

Migrateur et nicheur

Premières : 2 le 18/03 à Chevrières, 11 le 20/03 à l'Etang St Félix

Migration postnuptiale :

A Morienvall, Brassoir ont été notés 71 oiseaux le 24/09, 27 le 01/10, 3 le 08/10.

A noter, un passage plus important le 03/10 à Morienvall, Ferme de l'Essart l'Abbesse : 300 en 2h30.

La dernière migratrice a été notée le 15/10 à Morienvall, Brassoir.

Hirondelle de fenêtre. *Delichon urbica*.

Migrateur et nicheur

Premières : 10 le 07/04 à Cires lès Mello-Le Tillet

Nidification : peu notée, 40 nids à Chelles le 23/06 dans une étable

Derniers individus observés : 13 le 07/10 à Mareil en France (95).

Pipit rousseline. *Anthus campestris*.

Migrateur

Migration pré-nuptiale : 1 le 29/04 à Chevrières (PM)

Migration postnuptiale : 2 le 20/08, 3 le 12/09 à Mareil en France (PM,RB)

1 posé le 18/09 à Cires lès Mello-Le Tillet (JLB).

Pipit des arbres. *Anthus trivialis.*

Migrateur et nicheur

Premier : 1 le 21/03 en FdC

Nidification commune non notée par les observateurs

Dernier : 1 migrateur le 13/10 à Gouvieux.

Pipit farlouse. *Anthus pratensis.*

Migrateur et nicheur

Noté en stationnement hivernal en janvier, février à Montépilloy, FdC.

En période de nidification, des chtr sont signalés à Moru, Verberie, Lataule-coteaux calcaires.

La migration postnuptiale est observée à Morienvall, Brassoir du 24/09 au 19/11 avec des effectifs maximaux de 467 le 08/10, et 637 le 15/10.

En décembre, des groupes de 10 à 20 individus sont notés à Néry-Ferme de la Borde, Morienvall-Cabaret, Verneuill en Halatte.

Pipit à gorge rousse. *Anthus cervinus.*

Migrateur rare

Le cri caractéristique de cette espèce permet de détecter son passage lors de séances d'observation de la migration :

2 individus ont été contactés le 22/10 à Mareil en France (95) (CORIF-PM,RB).

Pipit spioncelle. *Anthus spinoletta.*

Migrateur et hivernant

Il a été noté principalement aux abords des plans d'eau à Moru, Chevrières, Longueil Ste Marie, Verberie, Berneuill sur Aisne, mais aussi en migration à Morienvall, Brassoir.

Les effectifs augmentent avec l'apport de migrants : les maximums sont relevés en février et mars (15 le 18/02 à Chevrières, 19 le 18/03, 25 le 25/03 à Moru) lors de la migration prénuptiale.

A l'automne, le passage est plus étalé de fin septembre à décembre avec un pic fin novembre (25 le 20/11 à Chevrières).

Bergeronnette printanière. *Motacilla flava.*

Migrateur et nicheur

Premières : le 25/03, 1 à Chevrières et 1 à Moru.

Nidification commune en plaine notée par exemple à Montépilloy, Morienvall...

Des troupes de quelque dizaines d'oiseaux sont notées en halte migratoire.

Entre autres : le 10/08 à Feigneux, les 22/08 et 29/09 à Moru.

Les derniers oiseaux sont notés le 26/10 : 1 à Orrouy et le 05/11 : 1 à Cuvilly.

Bergeronnette flavéole. *Motacilla flava flavissima*.

Migrateur

Deux mentions lors de la migration prénuptiale :

1 le 22/04 à Moru (PM,RB ;DS)

1 le 25/06 à Moru (DD).

Une seule observation en migration postnuptiale :

1 le 02/09 à Chevières (AR).

Bergeronnette à tête grise. *Motacilla flava thunbergi*.

Migrateur

Une seule observation de cette sous-espèce nordique :

1 le 11/05 à Moru (AR).

Bergeronnette des ruisseaux. *Motacilla cinerea*.

Nicheur et hivernant

Notée tous les mois de l'année sur de nombreux sites :

FdC, Etang de Lavilletertre, Berneuil sur Aisne, Vez, Coye la Forêt, Etang de St Félix, Mongrésin, Chevières, Villemétrie, Bourneville, Vineuil St Firmin, Mareuil sur Ourcq, Morierval, Sacy, Wallu, Forêt d'Ermenonville, Etangs de Commelles, Duvy, Verberie.

Des indices de nidification ont été notés à Lavilletertre, Mongrésin, Etg de St Félix.

Bergeronnette grise. *Motacilla alba alba*.

Nicheur et hivernant

Seule nidification certaine à St Félix : 2 couples dont 1 nourrit le 10/05, 1 couple + 4 juv le 19/06.

Le reste des observations récoltées concerne les passages ou rassemblements pré et post nuptiaux :

Moru-Pontpoint : 30 le 14/08, 60 le 17/10, 20 le 06/10, 35 le 28/10.

Morierval, Brassoir : 103 le 8/10, 383 le 15/10, 43 le 22/10

Chevières : 30 le 20/10, 20 le 24/11.

Quelques mentions hivernales sont intéressantes :

Moru-Pontpoint : 1 les 09/01 et 23/02

Montataire : 1 le 13/01

Chevières : 40 le 18/02, 4 le 30/1

Rocquemont : 1 le 10/12.

Bergeronnette de Yarrell. *Motacilla alba yarrellii*.

Migrateur

Espèce vue principalement lors des passages migratoires, mais qui pourrait bien hiverner en faible nombre dans notre département comme le montrent ces observations réalisées sur le seul site de Chevières :

1 femelle le 28/01 (PM,RB), 1 mâle + 2 femelles le 18/02 (AR), 1 femelle le 18/03, 2 femelles le 25/03 (PM,RB), 1 mâle + 2 juv le 20/11 (AR), 1 le 24/11 (AR).

Troglodyte mignon. *Troglodytes troglodytes.*

Nicheur commun sédentaire

Pas de données significatives.

Accenteur mouchet. *Prunella modularis.*

Nicheur commun sédentaire

Pas de données significatives.

Rougegorge familier. *Erithacus rubecula.*

Nicheur commun sédentaire

Pas de données significatives.

Rossignol philomèle. *Luscinia megarhynchos.*

Migrateur et nicheur

Premier contact le 07/04 en Forêt d'Ermenonville, Basse Pommeraie p37-43, puis 1 chtr le 10/04 en FdC p 839.

Gorgebleue à miroir. *Luscinia svecica.*

Migrateur et nicheur

Nidification présumée sur le seul site de Chevrières :
1 chtr les 10/04 et 23/04, 2 les 28/05 et 11/06, puis 2 juv les 8/07,
23/07 et 06/08
Dernier contact le 16/09 (AR,PM,RB).

Rougequeue noir. *Phoenicurus ochruros.*

Migrateur et nicheur

Premier le 18/03 en FdC, MF Pépinière,
derniers : 2 le 24/10 à Morienvall, Brassoir.

Rougequeue à front blanc. *Phoenicurus phoenicurus.*

Migrateur et nicheur

Premier : 1 mâle le 09/04 à Orrouy, Champlieu.
Principalement noté chtr en FdC dans plus de 20 parcelles d'avril à juin, également en Forêt de Retz, Bois du Tillet ; en Forêt d'Ermenonville, en Forêt d'Halatte + Chantilly, Lamorlaye-Le Lys, Crépy en Valois.
Les seules preuves de nidification se situent en FdC : 1 couple avec jeunes volants p 224 le 08/06 et à Gouvieux où 1 couple nourrit le 30/05.
Derniers vus : 2 le 17/09 à Moru-Pontpoint.



Gorgebleue à miroir
William Mathot

Tarier des prés. *Saxicola rubetra*.

Migrateur et nicheur

Premier contact le 11/04 en FdC p 743 puis le 04/05 p 53, et le 14/05 p 141

1 femelle a été vue les 16/05 et 22/05 à Orrouy, Champlieu

A Lataule, sur les larris : 2 femelles le 06/05, 1 femelle le 10/06

Derniers migrants contactés : 13 le 17/09 à Moru-Pontpoint.

Tarier pâtre. *Saxicola torquata*.

Migrateur, nicheur, hivernant

L'espèce est notée en hivernage : 1 mâle les 07/01 et 04/02, 2 le 31/12 à Verneuil en Halatte

De nombreuses mentions concernent ensuite les massifs forestiers et leurs clairières, mais d'autres sites se révèlent propices tels que les pâtures et franges des parcelles cultivées (Cuvilly/La Neuville sur Ressons, Labruyère, Boulogne la Grasse, Ramecourt, Noroy, Bulles, St Aubin sous Erquy, Gouvieux...)

Traquet motteux. *Oenanthe oenanthe*.


Migrateur

Noté en migration pré-nuptiale uniquement :

de 1 à 2 individus à Cuvilly, Morienvall, Orrouy, FdC, Moru-Pontpoint, Lévignen, Chevrières et au sud de la Forêt de Thelle du 24/03 au 03/05.

Puis en migration post-nuptiale :

de 1 à 2 individus du 15/08 au 25/10 à Pondron, Feigneux, Orrouy, Moru-Pontpoint, Morienvall, FdC, Lieuvillers et Feigneux. A noter : 7 ensemble le 14/09 à Orrouy, Champlieu.



Tarier pâtre
Jean Marie Gernet

Merle à plastron. *Turdus torquatus*.

Migrateur

3 données pour l'année toutes situées au printemps dont 1 précoce : 1 mâle le 18/03 avec des Grives mauvis à Orrouy (PMS), puis 1 mâle + 1 femelle le 05/04 en FdC, p 742 et 1 mâle le 21/04 en FdC p 323 (PMS).

Merle noir. *Turdus merula*.

Sédentaire commun

Pas de données significatives.

Grive litorne. *Turdus pilaris*.

Migrateur

Passage pré-nuptial : 50 le 05/02 à Sacy le Grand, 200 le 18/03 à Sempigny, 59 le 15/04 à Moru-Pontpoint

Cette espèce en expansion pourrait laisser présager des cas de nidification dans l'Oise : 1 individu alarme le 11/04 en FdC, p 838 et 1 autre individu observé en vol le 12/06 à Moru-Pontpoint.

Passage post-nuptial et hivernage : du 06/10 à Moru-Pontpoint (1 individu) au 23/12 (70 oiseaux à Verberie).

A noter également : 76 migrants le 05/11 à Morienvall, Brassoit.

Grive musicienne. *Turdus philomelos*.

Sédentaire commun

Pas de données significatives.

Grive mauvis. *Turdus iliacus*.

Migrateur, hivernant

L'espèce est surtout vue dans les massifs forestiers (FdC, Forêt de Retz, Forêt de Hez, Forêt de Malmifait), mais également à Moru, Sacy, Morlincourt, Cires lès Mello, Morienvall.

Des troupes de 10 à 200 individus sont observées de janvier à mars avec un maximum en mars correspondant au passage migratoire.

Les derniers oiseaux sont notés le 1er avril.

A l'automne, la première observation date du 30/09, le passage est ensuite concentré sur la dernière décade d'octobre et la 1ère quinzaine de novembre.

Grive draine. *Turdus viscivorus*.

Sédentaire

Peu de données significatives.

Des chtr sont notés en FdC en février, en Forêt de Retz en mars.

Bouscarle de Cetti. *Cettia cetti*.

Sédentaire localisé

Le bastion de l'espèce dans notre région est localisé dans les marais de Sacy où des chtr sont notés du 05/02 au 25/06 avec un maximum de 3 le 25/05.

Ailleurs, un chtr est noté à Vez le 29/06.

Un migrateur est observé le 17/09 à Chevrières.

Locustelle tachetée. *Locustella naevia*.

Migrateur et nicheur

Observée dans les massifs forestiers où elle fréquente les coupes :

Des chtr ont été contactés en FdC, Forêt d'Halatte, Forêt de Hez, Forêt de Retz, Bois du Lieutenant, Bresles, Cires lès Mello d'avril à juillet.

Première le 05/04 en FdC .

Dernière le 01/08 à Genancourt.

Locustelle lusciniöide. *Locustella luscinioides*.

Migrateur et nicheur localisé

Cette espèce n'a été observée que dans les marais de Sacy : maximum de 5 chtr le 30/04, puis de 1 à 2 chtr jusqu'au 13/06.

Phragmite des joncs. *Acrocephalus schoenobaenus*.

Sédentaire

Noté à Chevrières, Longueil Ste Marie, Verberie, Sacy, Etang d'Angy, Etang de St Félix, Etang de Toutedoie.

Premier chtr le 12/04.

Dernière observation le 02/09.

Rousserolle verderolle. *Acrocephalus palustris*.

Migrateur et nicheur

Notée à :

Sacy avec 3 chtr le 27/05

Chevrières : 2 chtr le 23/05, 6 chtr le 11/06, 1 adulte et 1 juvénile volant le 23/04

Béthancourt : 1 le 12/08.

Rousserolle effarvatte. *Acrocephalus scirpaceus*.

Migrateur et nicheur

Notée à Sacy, Chevrières, Moru, canaux de Chantilly, FdC- Etangs de St-Pierre d'avril à septembre.

L'effectif maximum est relevé à Chevrières avec 30 chtr le 28/05.

Premières : 15 chtr le 23/04 à Chevrières.

Dernière : 1 le 24/09 à Chevrières.

Rousserolle turdoïde . *Acrocephalus arundinaceus*.

Migrateur et nicheur localisé

Aucune donnée cette année pour l'espèce.

Hypolaïs icterine. *Hippolais icterina*.

Migrateur rare

Aucune donnée cette année pour l'espèce.

Hypolaïs polyglotte. *Hippolais polyglotta*.

Migrateur et nicheur

Première donnée : 1 chtr le 02/05 en FdC

Pas de donnée de nidification pour cette espèce commune

Dernier chtr noté le 19/07.

Fauvette grisette. *Sylvia communis*.

Migrateur et nicheur commun

Le premier chtr est contacté le 15/04 à Moru.

Une arrivée plus importante est ensuite constatée le 23/04 : nombreuses en Forêt de Retz, Bois du Tillet, 30 chtr à Chevrières.

Cette espèce commune n'est ensuite plus notée par les observateurs.

Fauvette babillarde. *Sylvia curruca*.

Migrateur et nicheur

Première : 1 chtr le 20/04 à l'étang de St Felix.

Des chtr sont ensuite notés à :

Lataule, Vez, Sacy, Forêt de Hez (p 11-10, 11-30), FdC (p 53), Pontpoint, Bresles, Etang de St Felix, Montreuil/Brèche, Tillard.

Les 2 derniers chtr sont notés le 28/07 à Breil le sec

Fauvette des jardins. *Sylvia borin*.

Migrateur et nicheur commun

Le premier chtr est noté le 22/04 à Moru.

Pas de donnée ensuite pour cette espèce commune.

Fauvette à tête noire. *Sylvia atricapilla*.

Migrateur et nicheur commun

Le premier chtr est noté le 25/03 à Chevières.

Le dernier individu est observé le 02/11 en FdC, Mont St Marc.

Aucune donnée de nidification pour cette espèce très commune.

Pouillot de Bonelli. *Phylloscopus bonelli*.

Migrateur et nicheur localisé

Les premières observations concernent probablement des migrants :

FdC : 1 chtr le 20/04, au Four d'en Haut, 2 le 24/04 à Valon (PMS)

Les données suivantes peuvent être considérées comme des indices de nidification probable :

FdC : 1 chtr le 11/06 p 115 (PMS), 1 couple en 95 (PM,RB) (sans date ni lieu)

Forêt de Retz : 1 chtr le 28/05 Bois de Tillet, XVI-17 (DD)

Forêt d'Ermenonville : + de 3 chtr le 11/06 p 117-118-123 (DD)

Haute Pommeraie : 3 chtr le 30/04 (PM,RB).

Pouillot siffleur. *Phylloscopus sibilatrix*.

Migrateur et nicheur

Premiers : 2 chtr le 09/04 au Bois du Roi

Des chtr sont ensuite notés principalement dans les grands massifs forestiers :

FdC, Forêt de Retz, Forêt d'Ermenonville, Forêt de Hez, Forêt d'Halatte, Bois des Brais, Cires lès Mello d'avril à juin.

Pouillot véloce. *Phylloscopus collybita*.

Migrateur et nicheur

Hivernage de quelques individus : 3 le 14/01 à Moru

Les premiers migrants sont notés à partir de la deuxième quinzaine de février avec une arrivée plus conséquente début mars.

Aucun indice de nidification n'a été noté pour cette espèce nicheuse très commune.

Quelques oiseaux sont encore signalés en novembre.

Des hivernants isolés sont notés en décembre à Moru, Verberie, Longueil Ste Marie et Chevières.

Pouillot fitis. *Phylloscopus trochilus*.

Migrateur et nicheur

Première observation le 01/04 : 1 chtr à Cires lès Mello-le Tillet.

Dernière : 1 chtr le 24/09 à Chevrières.

Roitelet huppé. *Regulus regulus*.

Sédentaire

Peu de données significatives pour cette espèce commune dans les milieux boisés de conifères.

Roitelet triple-bandeau. *Regulus ignicapillus*.

Sédentaire

Espèce observée principalement dans les massifs forestiers en période de reproduction :

FdC : chtr de mars à mai, Forêt de Hez, Haute Pommeraie, Creil

En novembre des individus isolés sont notés à Creil, Moru, aux Etangs de Commelles.

Gobemouche gris. *Muscicapa striata*.

Migrateur et nicheur

La première donnée du printemps est du 21/04 en FdC.

Cette espèce commune est ensuite peu notée (Verberie en mai, Forêt de Hez en juin, Genancourt en août).

Gobemouche noir. *Ficedula hypoleuca*.

Migrateur et nicheur

Première observation : 1 chtr le 11/04 en FdC

Des chtr sont notés en FdC dans au moins 24 parcelles (3-8-112-113-121-125-144-148-152-153-154-156-158-218-227-228-337-338-339-617-625-808-901-Beaux Monts), pour la plupart en mai.

1 femelle est encore observée le 20/08 à Vineuil St Firmin.

Panure à moustaches. *Panurus biarmicus*.

Migrateur

Peu fréquente dans le département, une troupe est observée à Chevrières du 11/02 au 18/03 (maximum de 9 le 26/02) (PM,RB).

Un mâle est ensuite revu sur le même site le 08/07 (PM,RB) .

Mésange à longue queue. *Aegithalos caudatus*.

Sédentaire commun

Pas de données significatives.

Mésange nonnette. *Parus palustris*.

Sédentaire commun

Pas de données significatives.

Mésange boréale. *Parus montanus*.

Sédentaire

2 chtr sont notés en février en FdC.

Observée ensuite en mars et avril à Chevrières, Basse Pommeraie, Etang de St Félix.

A l'automne, cette espèce est surtout observée près de plans d'eau de septembre à novembre :
à Chevrières, Verberie, Etang de St Félix.

Mésange huppée. *Parus cristatus*.

Sédentaire commun

Pas de données significatives.

Mésange noire. *Parus ater*.

Sédentaire commun

Notée en FdC, Forêt de Laigue, Noailles.

Mésange bleue. *Parus caeruleus*.

Sédentaire commun

Pas de données significatives.

Mésange charbonnière. *Parus major*.

Sédentaire commun

Pas de données significatives.

Sittelle torchepot. *Sitta europaea*.

Sédentaire commun

Pas de données significatives.

Grimpereau des bois. *Certhia familiaris*.

Nicheur localisé

Cette espèce est bien présente en FdC, d'autres forêts du département pourraient également l'abriter.

En FdC, 23 chtr sont notés dans 18 parcelles par DM, RF, PMS
(parcelles 62-113-120-121-123-143-144-152-156-167-219-221-223-327-329-337-607-702).

PM signale 9 nouveaux sites en 95, alors qu'il en avait répertorié 19 en 94 ; ces sites peuvent être inclus dans ceux mentionnés ci-dessus, les localisations précises n'ayant pas été fournies.

En Forêt de Laigue, 2 individus sont notés le 10/03, p 132-137 par RF.

Grimpereau des jardins. *Certhia brachydactyla*.

Sédentaire commun

Pas de données significatives.

Loriot d'Europe. *Oriolus oriolus*.

Migrateur et nicheur

Le premier chtr est noté le 23/04 en Forêt d'Halatte.

Ensuite, des individus sont notés d'avril à juillet à :

Apremont, Moru, Orrouy, Rocquemont, Sacy, Lataule, FdC, Forêt de Retz, Forêt d'Halatte, Breuil le Vert, Rosoy, St Sulpice, Etang de St Félix, Villers St Sépulcre, Chevières.

Pie-grièche écorcheur. *Lanius collurio*.

Migrateur et nicheur

5 à 6 couples sont localisés en FdC, p 617, " Les Vineux ", et " Rossignol " par RF, PM, PMS en mai et juin. En Forêt de Retz, Bois du Tillet des observations en juin et juillet par PMS et JPB peuvent laisser présumer une nidification probable.

De même au Bois du Roi, avec 1 individu le 04/06 (LC) et à Cinqueux avec 1 mâle le 21/06 (JMG).

Pie-grièche grise. *Lanius excubitor*.

Migrateur, nicheur et hivernant

Migration et hivernage : des individus isolés sont observés :

à Sacy le 05/02 et 19/08,

en Forêt de Retz, p XVI-39 le 13/02,

en FdC, p 211 le 28/01, p 218 le 10/02, p 323 du 19/02 au 26/03 et le 31/12, p 742 le 21/12, p 625 le 23/12

Un couple est observé le 23/04 en Forêt de Retz, Bois du Tillet.

Geai des chênes. *Garrulus glandarius*.

Sédentaire

Pas de données significatives.

Pie bavarde. *Pica pica*.

Sédentaire

Pas de données significatives.

Choucas des tours. *Corvus monedula*.

Migrateur, nicheur et hivernant

A l'automne, des troupes importantes sont notées à Montépilloy : 100 le 26/10 et à Morienvall, Brassoir : 111 le 22/10.

Pas de données sur les colonies en période de nidification.

En période hivernale : 3 le 15/01 à Chantilly, 3 le 12/02 à Bailleval, quelques dizaines dans un dortoir à Orrouy le 01/12.

Corbeau freux. *Corvus frugileus*.

Sédentaire

Les troupes les plus importantes notées en période hivernale l'ont été à :

Morienvall, Brassoir : 208 migrateurs le 22/10

Orrouy : 500 le 01/12 en dortoir

Montépilloy : 200 le 26/10, 500 le 16/12.

Corneille noire. *Corvus corone corone*.

Sédentaire

Pas de données significatives.

Etourneau sansonnet. *Sturnus vulgaris*.

Sédentaire

Un dortoir de plusieurs milliers d'oiseaux est noté le 18/11 à Arsy, près du péage de l'autoroute.

Moineau domestique. *Passer domesticus*.

Sédentaire

Pas de données significatives.

Moineau friquet. *Passer montanus*.

Sédentaire

Peu de données significatives, noté nombreux le 18/10 à Moru.

Pinson des arbres. *Fringilla coelebs*.

Sédentaire

Peu de données significatives, un dortoir de quelques centaines d'oiseaux est noté le 09/11 en FdC, p 523.

Pinson du Nord. *Fringilla montifringilla*.

Migrateur et hivernant

Le premier migrateur de l'automne est observé le 18/10 à Mareil en France (95).

On l'observe de janvier à mars en FdC, Forêt de Hez, Longueil Ste Marie puis d'octobre à décembre en Forêt de Hez, FdC, Gouvieux, Montépilloy, Etangs de Commelle, Vauciennes.

Les effectifs les plus importants sont relevés :

à Vauciennes : 100 le 25/12

en FdC : 100 le 13/02 à Vaudrampont, 50 le 28/03 p 327.

Des individus isolés sont encore notés début avril :

1 le 03/04 en FdC p 312

1 mâle en plumage nuptial le 09/04 au Bois du Roi.

Serin cini. *Serinus serinus*.

Sédentaire

Peu de données significatives, 30 le 04/03 à Montépilloy, 30 le 12/08 à Béthancourt.

Verdier d'Europe. *Carduelis chloris*.

Sédentaire

Peu de données significatives, hormis des troupes de quelques centaines d'individus le 14/10 à Baron, le 19/10 à Orrouy, Champlieu, et le 03/11 à Moru.

Chardonneret élégant. *Carduelis carduelis*.

Sédentaire

Peu de données significatives, quelques regroupements notés en FdC : 40 le 06/03.

Tarin des aulnes. *Carduelis spinus*.

Migrateur et hivernant

Noté de janvier à mars en Forêt de Chantilly, Forêt de Laigue, Sacy, Moru, Sénécourt, Cires lès Mello, Etang de St Félix, FdC.

En avril, les données se raréfient : 15 le 01/04 à Cires lès Mello, présent le 05/04 en FdC p 702, le dernier oiseau est observé le 22/04 au Bois du Roi.

Les premiers migrants de l'automne sont notés le 21/09 en Forêt d'Ermenonville, puis la migration postnuptiale est observée d'octobre à novembre en Forêt d'Ermenonville, Forêt de Hez, Moru, Cires lès Mello, Etangs de Commelles, FdC.

Linotte mélodieuse. *Carduelis cannabina*.

Migrateur, nicheur et hivernant

Des troupes importantes sont notées en automne :

100 le 30/09 à Cires lès Mello

494 le 08/10, 936 le 15/10, 208 le 22/10 à Morienvall, Brassoir

En décembre, quelques hivernants :

1 le 16/12 à Moru

2 le 23/12 à Néry, Ferme de la Borde

26 le 23/12 à Verberie, Remises d'Herneuse.

Sizerin flammé. *Carduelis flammea*.

Migrateur

En FdC, p 515 un individu est observé le 07/02 (RF,DM).

Forêt d'Ermenonville : 15 le 24/12 (JLB).

Bec-croisé des sapins. *Loxia curvirostra*.

Migrateur irrégulier

Un chtr est entendu le 04/02 en FdC, p 702 (PMS).

Bouvreuil pivoine. *Pyrrhula pyrrhula*.

Sédentaire

Peu de données significatives, une troupe de 20 mâles le 15/02 en FdC.

Grosbec-casse-noyaux. *Coccothraustes coccothraustes*.

Sédentaire

D'observation courante toute l'année dans les forêts domaniales : FdC, Forêt de Laigue, Forêt de Chantilly, Forêt de Hez, il est également noté sur d'autres sites : Cires lès Mello, Saintines, Lataule.

Bruant jaune. *Emberiza citrinella*.

Sédentaire

Pas de données significatives.

Bruant zizi. *Emberiza cirrus*.

Sédentaire localisé

Des chtr isolés sont notés :

le 22/02 à Dangu (27) (DD), le 10/03 en FdC p 743 (PMS), en mai à Baboeuf (RF), le 31/05 à Noailles (YL), le 04/06 à Labruyère (RF), le 25/06 à Longavène/Boutavent (YL), le 15/10 au Mont Ste Hélène (DD).

Enfin 3 mâles sont observés le 10/12 à Parnes (DD).

Bruant ortolan. *Emberiza hortulana*.

Migrateur rare

Une seule donnée tardive : 1 le 07/11 à Orrouy, Champlieu (JPF).

Bruant des roseaux. *Emberiza schoeniclus*.

Sédentaire

Pas de données significatives.

Bruant proyer. *Miliaria calandra*.

Sédentaire

Pas de données significatives.

ERRATUM

PIC MAR n° 4

Première observation d'un VANNEAU SOCIABLE dans l'Oise en 1998

Statut :

" Depuis sa création (1981), et jusqu'en 1996, le CHN a enregistré 31 données dont 12 au printemps. Celles-ci sont concentrées sur le mois de mars et la 1ère décade d'avril avec ~~un très net pic lors de la seconde décade d'avril~~. Ceci s'accorde parfaitement avec ce qui est connu du calendrier migratoire de cette espèce."

Il fallait donc lire : avec un très net pic lors de la seconde décade de mars.

Toutes nos excuses pour cette erreur. Mais à cet égard, le graphique était très explicite.

Observation de la migration post-nuptiale 1995 à Morienvall (60)

Date	24/09	01/10	08/10	15/10	17/10	19/10	22/10	24/10	26/10	28/10	04/11	05/11	06/11	10/11	11/11	12/11	19/11	Total
Durée de l'observation	6h40-10h00 soit 3h20	8h20-10h15 soit 1h55	7h40-11h40 soit 4h00	7h15-12h00+16h10-18h00 soit 6h35	7h30-10h30 soit 3h00	8h00-10h30 soit 2h30	7h40-12h10 soit 4h30	7h45-9h50 soit 2h05	7h40-11h00 soit 3h20	10h00-12h00 soit 2h00	7h20-9h00+10h25-11h40 soit 2h55	7h50-12h00 soit 4h10	8h00-11h00 soit 3h00	7h40-9h50 soit 2h10	8h10-9h10 soit 1h00	8h20-10h20 soit 2h00	8h20-10h40 soit 2h20	50h50
Météo	Var	Var		Beau	Brouillé	Couvert	Beau	Beau	Var	Var	Beau	Beau	Beau	Couvert	Beau	Beau	Couvert	
Température maxi				10							4	4	6	5	10	8	0	
Température mini							0					-2	-3					
Vent	SE	SE		S	S	S	Nul	SO	S	NE	N	NE	Nul	SO	S	SE	NO	
Force	faible	faible		mod	mod			fort	mod	faible	faible	mod		mod	faible	faible	faible	
Oie cendrée											46	45						91
Cigogne blanche *			6															6
Grue cendrée							7											7
Milan Royal														1				1
Busc variable										1	1							2
Busard des roseaux													1					1
Busard St Martin				1														1
Epervier d'Europe										1	1							2
Faucon crécerelle			2					1										3
Faucon émerillon			1					1					1	1				4
Grand cormoran				3						5	36							44
Héron cendré							1					1		1				3
Vanneau huppé			360	300		301	1506		96	107	1158	1804	507	18		21		6178
Pluvier doré			1				2					4	2		3		66	78
Goéland argenté										2								2
Mouette rieuse					5		4	3					10	8				31
Pigeon ramier			7				788	50	31		81	71	505				1000	2533
Pigeon colombin				1			2											3
Alouette des champs			124	564	261	158	3781	544	307	104	33	73	168	24	43	164	57	6405
Alouette lulu			1	1	2		3											7
Hirondelle rustique	71	27	3	1														102
Pipit farlouse	6	5	467	637	211	333	55	23	45		1	7	7	4	5	11	1	1818
Pipit spioncelle	4						2		2	1							2	11
Pipit sp	1																	1
Bergeronnette printanière							6											6
Bergeronnette grise	3	13	103	383	62	42	43	12	12	9	18	2	2	5				709
Rougequeue noir				1				2										3
Grive musicienne				2		2	1	1					2			4		12
Grive mauvis											8	9			6			23
Grive draine							34	3										37
Grive litorne							1	1				76						78
Grive sp					5						50	76	38					169
Pouillot véloce					7													7
Corbeau freux	5		1			8	208	138	497	145	14	123	223	43		78		1481
Corneille noire									26	1				22				49
Choucas des tours							111	5	8							1		125
Elouneau sansonnet	19		245	247	16	56	606	186	139	138		32	138	195	30		53	2100
Pinson des arbres			7	2		7	1	6	14	16	41	42	7	25	19	10	67	264
Pinson du Nord																	22	22
Verdier d'Europe					5	53	38	54	6									156
Chardonneret élégant			21	5		9	2	2	9	2					2			52
Tarin des aulnes								5	13									18
Linotte mélodieuse	13		494	836	127	184	208	134	159	10	38			12	14	18	13	2370
Bouvreuil pivoine			3	3	4			3	9									22
Grosbec casse-noyaux														1				1
Moineau friquet										14								14
Bruant jaune			2	8	3		28	1	4			1		3	8	1	4	63
Bruant des roseaux			4	18	6		33	2	1									64
Bruant sp													10					10
Passereaux non identifiés	8	5	8			20	3	29	75			6						154
Total	130	50	1860	3113	744	1183	7474	1204	1453	557	1526	2372	1621	363	130	308	1285	25343
Moyenne horaire	39	26	465	473	238	473	1661	578	436	279	523	569	540	168	130	154	551	499

* Cigogne blanche : observation lointaine mais probable.

Observateurs : J P BONNEL, C GUYOT, M et P SENGEZ