



NUMÉRO SPÉCIAL
DE L'AVOCETTE

Le Pic mar

Revue ornithologique de la Section Oise de Picardie Nature



SOMMAIRE

numéro 9

Synthèse 2000 des observations ornithologiques dans l'Oise

JUILLET 2005

- des plongeurs aux rapaces diurnes

Henry de Lestanville & Frédéric Bouchinet

- de la Perdrix grise aux coucou gris


William Mathot

- des rapaces nocturnes à l'Engoulevent

Henry de Lestanville & Frédéric Bouchinet

- Les passereaux

Frédéric Bouchinet



Le Pic Mar, numéro spécial de l'Avocette,
est une publication de la Section Oise de Picardie Nature

Association loi 1901

Section Oise

241, rue Principale - Bourmont - 60490 - RESSONS-SUR-MATZ
Tél : 03 44 42 61 42

Picardie Nature

14, place Vogel – BP 835 – 80000 AMIENS
www.picardie-nature.org contact@picardie-nature.org

Directeur de la publication : Christophe Hosten

Rédacteur en chef : William Mathot

Illustrations : Voir les annotations Couverture : Alban Larousse

Photographies : Pierre Sengez

Conception : Anne et Cédric Louvet

Mise en page : William Mathot

Tirage : 60 exemplaires; - **Prix d'un numéro :** 6 €

Dépôt légal : Préfecture de la Somme – FR ISSN 0181-0782

Liste des rédacteurs :

Des plongeurs aux rapaces diurnes :	Henry de Lestanville et Frédéric Bouchinet
De la perdrix grise au coucou gris :	William Mathot
Des rapaces nocturnes à l'Engoulevent d'Europe :	Henry de Lestanville et Frédéric Bouchinet
Les passereaux :	Frédéric Bouchinet

Coordonnées des rédacteurs :

Henry de Lestanville : Résidence Ste Agathe, Appt 15, Bât D. 60800- CREPY-EN-VALOIS
Frédéric Bouchinet : 27, impasse de la Laiterie, 60840 - BREUIL-LE-SEC
William Mathot : 241, rue principale, hameau de Bourmont, 60490 - RESSONS-SUR-MATZ

Relecture : Cédric Louvet.

Liste des observateurs et initiales utilisées dans le texte :

Rémy Baradez	RB	Patrick Lefur	PLF
Jean-Luc Barailler	JLB	Henry de Lestanville	HdeL
Yves Bas	YB	Cédric Louvet	CL
Jean-Philippe Bonnel	JPB	Pascal Malignat	PMal
Frédéric Bouchinet	FB	Jean-Bernard Marque	JBM
Jean-Pierre Charlier	JPC	William Mathot	WM
Jean-Paul Fagard	JPF	M Richard	MR
Laurent Gavory	LG	Alain Rouge	AR
Jean-Marie Gernet	JMG	Didier Sénécal	DS
Philippe Giovanni	GP	Pierre et Marc Sengez	PMS
Claude Guyot	CG	Franck Spinelli	FS
Marie-Christine Jukowski	MCJ	Jérôme Votte	JV
Denis Laurent	DL	Martial Votte	MV
Yves Leconte	YLe		

Introduction.

A une année au millésime remarquable, il fallait un bilan ornithologique remarquable ; ce fut le cas.
En 2000 notre département a servi de halte migratoire à quelques raretés nationales.

Ce fut tout d'abord le Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* et le Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* au mois de mai, la Marouette poussin *Porzana parva* et la Marouette ponctuée *Porzana porzana* au mois d'août et pour finir le Vanneau sociable *Chettusia gregaria* au mois de novembre.

D'autres espèces, moins rares sur le plan national, mais tout aussi remarquables dans notre département ont été observées. Citons entre-autres : le Bihoreau gris, le Héron pourpré, la Cigogne noire, la Barge rousse, le Courlis corlieu, la Mouette tridactyle et bien d'autres encore.

Nous n'oublierons pas d'évoquer le Hibou petit-duc présent depuis juin 1999 en forêt d'Ermenonville.

Nous avons également noté :

Un important effectif de Cigognes blanches en migration postnuptiale.

La présence régulière, en période estivale, du Grèbe à cou noir qui nous laisse présumer une nidification possible de l'espèce en 2000.

L'observation, aux passages migratoires, de l'Aigrette garzette avec, cette année, un effectif de 6 individus. Depuis 1986 nous n'avions jamais égalé pareil effectif, hormis en 1995 où 9 individus avaient été notés.

Malheureusement l'actualité n'est pas faite que de bons événements et nous devons aussi déplorer la raréfaction des données pour des espèces comme le Blongios nain et l'Oedicnème criard dont la rareté des observations confirme la chute de leurs effectifs nicheurs constatée au niveau national. Toutefois, pour rester sur une note optimiste, nous pouvons dire que dans l'ensemble le bilan est qualitativement remarquable et que, au regard des années passées, il le restera.

Méthodologie.

Hormis pour les enquêtes IW de la mi-janvier, pour l'enquête rapaces nicheurs de France (2000-2002) et pour l'enquête ZNIEFF, la prospection s'est faite sans aucun protocole. Les observations mentionnées dans cette synthèse sont le fruit ; d'un suivi plus ou moins régulier des zones humides, de prospections aléatoires des massifs forestiers et des milieux connus pour leur fréquentation régulière par les espèces d'intérêt patrimonial.


Quelques chiffres : 27 observateurs ont enregistré 11315 mentions qui ont permis de dénombrer 225 espèces différentes.

Remerciements.

Nous tenons à remercier :

- Le Centre Départemental Météo-France de l'Oise et tout particulièrement M. Beldjilali Abdelkader qui nous a gracieusement transmis les bilans météorologiques du département.
- Alban Larousse pour ses dessins et croquis de terrain,
- Martial Votte pour ses dessins réalisés spécialement pour documenter ce Pic Mar,
- Pierre Sengez pour ses photographies,
- Cédric Louvet pour avoir relu et corrigé avec pertinence ce document,
- Tous les observateurs qui ont contribué à la collecte des données et grâce à qui la réalisation de cette synthèse a été possible.

Synthèse climatologique de l'année 2000



Le bilan annuel montre :

- 34 jours de gel qui se répartissent ainsi :

janvier : 11 jours, février : 6 jours, mars : 7 jours, avril : 4 jours et décembre : 6 jours.


Le mois de janvier est le plus froid de l'année avec 11 jours de gel. C'est au cours de ce mois que l'on enregistre la température la plus basse de l'année : -10.7°C.

- 29 jours « chauds » (>25°C) répartis sur les mois de :

mai : 4 jours, juin : 7 jours, juillet : 4 jours, août : 12 jours et septembre : 2 jours.

C'est le mois d'août le plus chaud avec 12 jours supérieurs ou égaux à 25°C. La température maxi est atteinte en juin : 31.8°C.

Les températures moyennes mensuelles sont toutes supérieures aux normales saisonnières.



Total des précipitations pour l'année 2000 : 900.4 mm.

L'année commence par un mois de janvier particulièrement sec avec 26.6 mm soit moins de la moitié de la normale.


La migration prénuptiale en avril est bien arrosée avec 100.8 mm. (plus de deux fois la normale)

En juillet les pluies sont particulièrement abondantes puisqu'on enregistre 135.8 mm d'eau, ce qui peut avoir une influence néfaste sur les nichées.

La fin de la migration postnuptiale est également fortement arrosée avec 151.8 mm en octobre (c'est le mois le plus humide de l'année : 2.5 fois la normale) et 103.4 mm en novembre (plus de deux fois la normale).

La hauteur maximale des précipitations quotidiennes est enregistrée en octobre avec 27.2 mm

Il y a eu deux jours de neige ; un en janvier et un autre en décembre.



Les vitesses moyennes des vents sont inférieures à 20 Km/h sauf le 30 octobre où l'on enregistre des rafales venant du Sud-Ouest à 100.8 Km/h.



dessin : Alban Larousse

Plongeurs

Aucune observation n'a été enregistrée en 2000. Les dernières données remontent à 1995 pour le Plongeur catmarin *Gavia stellata* et 1998 pour les Plongeur arctique *Gavia arctica* et Plongeur imbrin *Gavia immer*.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

Ce grèbe est répandu sur beaucoup d'étangs et de gravières de l'Oise, de même que sur certaines rivières. Fin d'hivernage 1999/2000 : l'espèce est notée sur de nombreux sites mais avec des effectifs en général faibles, de même qu'en février et mars, lors du passage prénuptial. Au cours de ce premier trimestre, le Grèbe castagneux est noté sur les sites suivants (effectifs maxi pour chaque site au cours de cette période entre parenthèses) : Verneuil-en-Halatte (6), Litz (3), Forêt de Compiègne " Etangs de Saint-Pierre " (1), Breuil-le-Sec (1), Saint-Félix (6), Verberie (10), Saint-Maximin (1), Moru-Pontpoint (14), Longueil-Sainte-Marie (2), Houdancourt (8), Gouvieux (3), Chantilly (5), Forêt de Chantilly " Etangs de Commelles " (2), Chevières (2), Pimprez (1), Beauvais (3), Villers-Saint-Sépulcre (2), Bresles (5), Compiègne " gravières du Pont de Berne " (2). Ces effectifs ne permettent pas de déceler un net passage migratoire.

En avril et mai se notent quelques groupes plus importants : 17 le 04/04 à Verberie, 15 le 06/04 à Bresles (Bassins de décantation), 16 le 21/05 à Chevières (Bassins de décantation).

Sa nidification a été notée en Forêt de Compiègne parcelle 9341 (1 couple), à Bresles (3 couples), Chevières (2 couples), Litz (1 couple), Moru-Pontpoint (1 couple) et Verberie (1 couple). Nidification probable à Salency " Les Prés Saint-Denis " avec 3 couples en parade, avec 1 chanteur à Breuil-le-Sec, et en Forêt de Compiègne avec 1 couple chanteur à l'étang du Louveteau. Soit un total de **14 couples nicheurs probables à certains**.

A partir de la mi-juillet, les premiers rassemblements postnuptiaux sont observés, puis de septembre à novembre quelques groupes d'oiseaux en halte migratoire sont notés, sur les sites de :

- Moru-Pontpoint : 13 le 15/07, 10 le 31/07, 31 le 08/08, 39 le 21/08, 41 le 11/09, 56 le 19/09, 37 le 02/10, 39 le 11/10, 26 le 24/10, 23 le 31/10, 32 le 08/11
- Chevières : 20 le 16/07, 20 le 11/08
- Bresles : 15 le 18/07, 14 le 02/08
- Verberie : 52 le 14/08
- Litz : 12 le 18/09
- Houdancourt : 12 le 23/09
- Longueil-Sainte-Marie : 11 le 27/10

A partir de la mi-novembre et jusqu'à la fin de l'année, les hivernants sont installés sur les sites. Maximums observés sur chaque site au cours de cette période : Moru-Pontpoint (28), Saint-Félix (8), Longueil-Sainte-Marie (9), Houdancourt (3), Beauvais (4), Breuil-le-Sec (1), Forêt de Compiègne " Etangs de Saint-Pierre " (2), Gouvieux (5), Longueil-Annel (1), Forêt de Chantilly " Etangs de Commelles " (1).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

En janvier, la fin de l'hivernage 1999/2000 permet d'observer cette espèce sur les sites suivants avec des effectifs d'au moins une dizaine d'individus (entre parenthèses, effectifs les plus importants recensés par site) : Verneuil-en-Halatte (67), Moru-Pontpoint (35), Forêt de Chantilly " Etangs de Commelles " (11), Bailleul-sur-Thérain (26), Gouvieux (12), Longueil-Sainte-Marie (15), Chantilly (12), Pimprez (16).

Au cours des mois de février et mars, la migration prénuptiale est sensible, avec une baisse des effectifs sur certains sites (départ des hivernants), et une fluctuation sur d'autres (individus en halte). Ainsi à Moru-Pontpoint, on ne note plus que 16 oiseaux le 11/02, 12 le 02/03 et 11 le 07/03. A Beauvais, 28 individus sont présents le 03/03, 25 le 09/03, 10 le 12/03, 16 le 18/03, 13 le 29/03.

En période de reproduction, **31 couples nicheurs certains** sont repérés.

- Etangs du sud de l'Oise : Chantilly (1 couple), Forêt de Chantilly " Etangs de Commelles " (2 couples).
- Vallée du Thérain : Saint-Vaast-les-Mello (1 couple), Mello (1 couple), Saint-Félix (2 couples), Bailleul-sur-Thérain (4 couples), Therdonne (1 couple), Allonne (1 couple), Troissereux (2 couples).

- Vallée de l'Oise : Boran-sur-Oise (1 couple), Verneuil-en-Halatte (4 couples), Moru-Pontpoint (2 couples), Chevières (2 couples), Longueil-Sainte-Marie (1 couple), Houdancourt (2 couples), Verberie (1 couple), Morlincourt (2 couples).

- Marais de Sacy-le-Grand : 1 couple.

En août, rassemblements postnuptiaux sur le site de Moru-Pontpoint : 26 le 08 et 32 le 21.

A partir de septembre, les effectifs croissent sensiblement sur ce même site, jusqu'en novembre avec l'installation des hivernants : 48 le 19/09, 32 le 02/10, 40 le 11/10, 73 le 24/10, 82 le 08/11, 79 le 10/11, 85 le 15/11, 73 le 24/11, 64 le 08/12, 68 les 19 et 31/12. On remarque le pic de passage classique de la mi-novembre.

Sur les autres sites, au cours de cette période, les effectifs dénombrés sont faibles, ne dépassant pas 15 oiseaux, et souvent moins de 10.

Grèbe jougris *Podiceps grisegena* (CHD)

Migrateur et hivernant rare.

Une seule donnée a été enregistrée cette année. Elle provient de Moru-Pontpoint où 1 juvénile a été vu les 08 et 09/11 (FB, PMS, JPF)

Grèbe esclavon *Podiceps auritus* (CHD)

Migrateur et hivernant rare, peu courant à l'intérieur des terres, visible lors des passages migratoires.

Migration prénuptiale : un individu noté les 09 et 10/03 à Beauvais (FB).

Migration postnuptiale : il est observé essentiellement sur les gravières de Moru-Pontpoint : 1 juvénile le 11/09 (FB), 1 le 08/11 (AR, WM), 1 le 19/11 (AR, JBM, MCJ), 1 les 04 et 05/12 (PMS).

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

Migrateur rare et nicheur exceptionnel en Picardie.

L'espèce, dont les effectifs nicheurs et hivernants sont en augmentation en France (Rocamora & al. 1999) totalise 36 mentions entre le 31 mars et le 25 novembre.

Le Grèbe à cou noir a été observé, dans l'Oise, sur six sites différents cette année :

Bresles : 1 adulte stationne le 02/07 dans les bassins de la sucrerie (FB).

Chevières : 4 individus le 18/05 (AR) et 6 le 21/05 (DL), 1 juvénile observé le 16/07 (AR).

Houdancourt : Comme en 1999 où l'espèce n'avait, semble-t-il, pas niché sur ce site favorable, il n'y a pas de nidification confirmée malgré la présence de 2 à 4 individus du 31/03 au 30/06 (WM-AR), et d'un juvénile le 30/07 (AR). La proximité avec les bassins de décantation de Chevières peut laisser supposer que des nidifications ont pu y avoir lieu, les oiseaux se déplaçant d'un site à l'autre.

Moru-Pontpoint :

Dispersion postnuptiale : 1 les 14 et 15/07 (FB).

Migration postnuptiale : 1 individu du 15 au 25/11, maximum de 2 le 08/11 (FB).

Vauciennes :

Ce site rassemble le plus grand nombre de grèbes à cou noir du département, mais aucune preuve de nidification n'a pu être apportée.

Mai : 2 individus les 14, 18 et 20 (PMS, AR).

Juin : 4 en plumage nuptial les 10, 11 et 25, notés non nicheurs.


Juillet : 2 à 4 individus les 08, 09, 16, 23 et 30 (Hdel-PMS).

Août : 4 dont 1 adulte et 1 juvénile le 05 (AR).

Septembre : 2 le 17 et 1 le 24 (AR-MV).

Octobre : 1 le 1er (PMS).

Verneuil-en-Halatte : 1 le 27/07 (Hdel).



Dessin : M. Votte

Grand cormoran *Phalacrocorax carbo*

Cette espèce observée tout au long de l'année, sauf en juin, sera-t-elle bientôt nicheuse dans l'Oise ?

Passage prénuptial en mars :

Vallée du Thérain : 29 le 19/03 et 24 le 23/03 posés à Villers-Saint-Sépulcre (FB).

Vallée de l'Oise : 23 le 01/03 en vol est à Baboeuf (MR), 24 le 09/03 en vol nord à Moru-Pontpoint (JPF), 71, en vol, le 12/03 à Verneuil-en-Halatte (HdeL) et 28 le 12/03 à Compiègne (AR).

Passage postnuptial de fin septembre à mi-novembre :

Vallée du Thérain : 29, en vol, le 29/09 à Cires-lès-Mello (JLB).

Vallée de l'Oise : 30 le 17/09 à Compiègne (YL), 20 le 23/09 à Creil (YL), 100 le 23/09 à Longueuil-Sainte-Marie (PMS), 38 le 24/09 à Verneuil-en-Halatte (YB), 80 le 24/09 à Moru-Pontpoint (YB), 199, en 3 vols, le 03/10 à Gouvieux (JMG), 92 le 13/10 à Houdancourt (WM), 58, en 2 vols, le 17/10 à Gouvieux (JMG), 24 le 31/10 à Moru-Pontpoint (WM), 7, en vol sud, le 08/11 à Saint Maximin (JMG).

Morienvall " Brassoir " : 52 le 26/09, 43 le 06/10, 39 le 22/10, 180 le 03/11, 36 le 05/11 (PMS, MV, JPB, CG) en migration active.

70 prenant une ascendance le 23/09 à Méry-la-Bataille (HdeL).

Les dortoirs sont à rechercher en hiver.

Quelques effectifs maximaux au dortoir :

280 le 29/11 et 240 le 06/12 à Pont-Sainte-Maxence (ALK).

209 le 01/12 à Moru-Pontpoint "M15" (JPF).

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

Nicheur très rare. Il reste autour d'une cinquantaine de mâles chanteurs en Picardie (Rocamora *et al.* 1999) Les données proviennent du marais de Sacy-le-Grand, seul site de nidification connu dans l'Oise :

- Avril : 1 chanteur le 08 (PMS) et 1 chanteur le 14 (JPF).

- Mai : 1 chanteur les 07 (JLB) et 08 (PMS), 5 chanteurs le 13 (PMS), 1 chanteur le 19 (WM).

- Juin: 1 le 04 (JLB).

Blongios nain *Ixobrychus minutus*

Migrateur rare et nicheur très rare et localisé. Comme pour l'espèce précédente, les effectifs nicheurs régionaux sont estimés à environ 50 couples (Gavory, 1995).

Curieusement, peu de données nous sont parvenues cette année du marais de Sacy-le-Grand, site primordial pour l'espèce dans l'Oise : 1 le 04/06 (JLB).

Un individu a également été observé à l'étang du Louveteau en Forêt de Compiègne les 01 et 02/08 (PMS), donnée relative à la dispersion postnuptiale.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* (CHD)

Migrateur rare.

Un juvénile est noté lors de la migration postnuptiale le 02/10 à Moru-Pontpoint (FB).

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

Migratrice rare.

Des observations se font de plus en plus régulièrement pour ce héron dont les effectifs nicheurs nationaux sont en expansion : 10000 couples en 1994, 12000 en 1998 (Dubois *et al.* 2000).

Migration pré-nuptiale :

- 1 migrateur en vol le 04/06 à Vauciennes (PMS).

Migration post-nuptiale :

- 1 le 30/07 à Houdancourt (FB).
- 1 individu les 14/08, 12/09, 17/09 et 23/09 à Longueil-Sainte-Marie (JPF, PMS, FB).

Grande Aigrette *Ardea alba*

Migrateur et hivernant rare.

Un nouveau site d'observation est trouvé dans l'Oise : 1 le 16/09 à Houdancourt (PMal, RB, DS), traduisant le passage post-nuptial.

Héron cendré *Ardea cinerea*

De nombreuses données tout au long de l'année, dans plusieurs localités, cependant aucun groupe important n'est noté.

Bilan par site :

(Entre parenthèses, effectif maximum relevé sur chaque site au cours de l'année.). Présentation par vallées, grands sites ou régions naturelles.

- Vallée de l'Oise et alentours : Boran-sur-Oise (2), Gouvieux (5), Saint-Maximin (1) Verneuil-en-Halatte (5), Pont-Sainte-Maxence (2), Marais de Sacy-le-Grand (1), Saint-Martin-Longueau (1), Pontpoint (6), Moru-Pontpoint (11), Houdancourt (6), Chevières (12), Longueil-Sainte-Marie (10), Verberie (8), Pimprez (4), Morlincourt (1), Varesnes (3), Baboeuf (1)

- Vallée du Thérain : Mello (1), Angy (1), Saint-Félix (3), Villers-Saint-Sépulcre (3), Bresles (2), Bailleul-sur-Thérain (2), Montreuil-sur-Thérain (1), Therdonne (1), Allonne (2), Beauvais (2).

- Clermontois : La-Rue-Saint-Pierre (1), Berthecourt (1).

- Vallée de la Brèche : Monchy-Saint-Eloi (8), Laigneville (5), Cauffry (2), Rantigny (2), Bailleval (2), Breuil-le-Vert (2), Breuil-le-Sec (6), Fitz-James (1), Etouy (1), Litz (1), Bulles (2)

- Vallée de l'Arré : Airion (1)

- Vallée de l'Automne : Béthisy-Saint-Martin (5), Vez " Etang de Wallu " (2), Vauciennes (5)

- Valois : Morienvall (12), secteur Néry, Vêrines, Rocquemont (3)

- Pays de Bray : Saint-Germer-de-Fly (9), Villers-sur-Auchy (6)

- Pays de Thelle : Hardivilliers-en-Vexin (4)

- Vallée de l'Aisne : Trosly-Breuil " Ecluse d'Hérant " (1), Couloisy (9)

- Plateau Picard : Grandvilliers (1), Baugy (1)

- Noyonnais : Margny-sur-Matz (4)


- Forêt de Compiègne : Etang du Carandeu (1)

- Vallée de la Nonnette et de la Thève : Chantilly (7), Forêt de Chantilly " Etangs de Commelles " (1), Montlognon (1)

En migration active, à Morienvall " Brassoir ", 4 individus sont vus le 25/09 et 1 le 05/11.

Aucune colonie de reproduction n'est notée cette année.

On remarque que si l'espèce semble bien répandue dans l'Oise, elle n'est jamais abondante, y compris dans les vallées riches en plans d'eau, ce qui contredit largement les allégations fantaisistes de certains lobbys, osant parler d'invasion pour cet oiseau !



Dessin : W. Mathot

Héron pourpré *Ardea purpurea* (CHD)

Migrateur rare

Passage postnuptial : 1 juvénile le 25/07 à Houdancourt (PMS, FB).

C'est la huitième donnée départementale enregistrée pour ce migrateur nocturne.

Cigogne noire *Ciconia nigra* (CHD)

Migrateur rare.

D'observation plus régulière au passage postnuptial et particulièrement vers la mi-août.

- 2 en vol, photographiées le 10/08 à Vineuil-Saint-Firmin (JMG)

- 1 posée à Sacy-le-Grand le 15/08 (PMal)

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*

Année record pour cette espèce migratrice, avec 179 oiseaux observés.

Passage prénuptial :

- 1 posée le 21/03 à Agnetz, hameau de Ronquerolles (YL)

- 1 le 02/04 à Resson-sur-Matz (WM)

- 1 le 24/04 à Senlis (PM, RB, DS)

Passage postnuptial :

On remarque un pic des effectifs dans la 3ème décade d'août dans l'est du département :

- 1 le 08/08 à Choisy-au-Bac (MV)

- 8 posées à Margny-lès-Compiègne les 14 et 15/08 (Journal " Oise Hebdo ")

- 15 le 14/08 à Trosly-Breuil (MV)

- 13 en vol le 20/08 à Trosly-Breuil (MV)

- 132 en vol le 22/08 vers 12h 05 à Morienvall " Brassoir " (HdeL) : Observation exceptionnelle probablement due aux 187 individus observés en stationnement le 21/08 dans la moyenne vallée de l'Oise à Pierremande dans l'Aisne (Nelly Boutinot *et al.*, messages obspicardie).

- 5 en vol le 24/08 à Thourotte (MV)

- 17 en vol bas le 15/09 à Compiègne (JPF)

- 17 (probablement les mêmes) en vol sud ouest le 16/09 à Raray (PMS)

- 2 posées le 21/09 à Betz (Viviane Grandmougin).

- 1 le 25/09 à Trosly-Breuil (MV)

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

Les groupes les plus importants sont notés en hivernage, de même qu'en période estivale lors des rassemblements de mue. Un passage migratoire se fait sentir en octobre-novembre.

Le plan d'eau du Canada à Beauvais, est occupé toute l'année par une quinzaine d'oiseaux au minimum.

Reproduction

Un total de **15 couples nicheurs** est comptabilisé ; les effectifs sont en progression.

- Vallée de la Brèche : 1 couple à Breuil-le-Sec.

- Vallée du Thérain : 1 couple à Villers-Saint Sépulcre, 1 couple à Bailleul-sur-Thérain, 1 couple à Beauvais.

- Vallée de l'Oise : 1 couple à Boran-sur-Oise, 1 couple à Verneuil-en-Halatte, 3 couples à Moru-Pontpoint, 1 couple à Houdancourt, 1 couple à Chevrières, 1 couple à Longueil-Sainte-Marie, 1 couple à Verberie.

- Vallée de la Nonnette et de la Thève : 1 couple à Chantilly, 1 couple aux Etangs de Commelles (Forêt de Chantilly)

Effectifs maxima mensuels du Cygne tuberculé dans l'Oise en 2000 (reproducteurs en période nuptiale et pulli exclus).

Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Bailleval	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Breuil-le-Sec	2	2	2	1	1	-	-	-	-	5	-	-
Saint-Félix	2	-	2	2	2	5	18	-	8	1	-	-
Bailleul-sur-Thérain	4	-	2	-	-	10	-	-	1	-	-	-
Bresles	-	-	15	14	13	1	8	5	-	-	-	-
Allonne	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beauvais	-	36	24	19	17	-	-	31	21	21	20	19
Troissereux	-	-	-	6	-	-	4	-	-	-	-	-
Crillon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Chantilly	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Forêt de Chantilly " Etangs de Commelles "	1	-	-	3	-	-	-	-	-	5	2	-
Boran-sur-Oise	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gouvieux	10	11	-	-	-	-	-	-	-	18	20	9
Saint-Leu d'Esserent	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verneuil-en-Halatte	22	4	-	8	-	6	-	25	6	-	-	2
Marais de Sacy	-	2	-	-	-	-	13	-	-	2	-	-
Moru-Pontpoint	17	9	7	2	21	-	28	28	26	27	15	13
Houdancourt	6	3	3	2	-	13	-	7	14	14	21	-
Chevrières	11	-	4	1	5	4	-	-	-	-	-	-
Longueil-Sainte-Marie	-	3	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Verberie	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Morlincourt	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Couloisy	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trosly-Breuil	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cygne noir *Cygnus atratus*

Espèce férale en Europe à surveiller.

- Un individu est observé à Saint-Félix les 27/03, 01/05, 22/05 et 18/07 (FB)
- 2 à Bresles le 05/05 (FB)
- 1 à Verneuil-en-Halatte le 27/08 (FB)

Tous ces oiseaux étaient parfaitement volants.

Oie rieuse *Anser albifrons* (CHD)

Migrateur rare.

Une donnée exceptionnelle pour cette espèce lors de la migration postnuptiale : 36 en migration le 18/10 à Morienvall " Brassoir " (JPF).

Oie cendrée *Anser anser*

Espèce fréquente aux deux passages migratoires.

Passage prénuptial :

En vol :

Février : 1019 le 10 à Grandvilliers et Sommereux (GP), 104 le 13 à Moru-Pontpoint (YL), 450, en 6 vols, le 15 à Mureaumont, Le Crocq et Fouilloy (HdeL), 112, en 2 vols, le 20 à Saint-Pierre-ès-Champs et en forêt de Thelle (HdeL).

Mars : 1 vol le 11 en forêt de Compiègne (JLB), 40 le 19 à Cuvilly (FS).

Stationnement :

40 posées le 13/02 à Moru-Pontpoint (YL).
38 posées dans les champs à Chevières le 15/02 (JPF).
6 le 17/03 à Houdancourt (WM).
4 les 19 et 23/03 à Bresles (FB).

Passage postnuptial :

En vol :

Septembre : 5 le 02 à Ressons-sur-Matz (WM), 28 le 13 à Grandvilliers (GP).
Octobre : 1 vol entendu le 21 en forêt d'Halatte (JLB).
Novembre : 17 le 17 à Pierrefonds (MV), 110 le 18 à Saint-Martin-le-Nœud (PLF), 67 le 24 à Cuvilly (FS).
Décembre : 83 le 03 à Gouvieux (JMG), 220 le 03 à Cuvilly (FS), 150 le 16 à Ressons-sur-Matz (WM), 30 le 16 à Crépy-en-Valois (HdeL), 2 le 22, accompagnant un vol de grues cendrées, à Chamant (HdeL), 25 le 23 en Forêt de Compiègne (JPF), 7 le 24 à Brassoir (JPB, CG).

Stationnement :

2 les 08 et 09/11 à l'étang de Toutedoie à Gouvieux (JMG).

Bernache du Canada *Branta canadensis*

Espèce férale avec des effectifs en progression dans le Nord de la France.

Vallée de la Nonette :

- 2 le 22/02 à Prény-sur-Oise (YB).
- 4 en vol le 08/03 en forêt de Chantilly (JLB).
- 2 le 12/06 à Chantilly (JMG).

Vallée du Thérain :

- 1 du 14 au 25/03 (FB), puis 2 le 21/04 à Angy (PMal).

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca* (CHD)

Espèce férale en Europe.

- 6 le 21/08 à Vauciennes (PMS). Cette donnée est probablement le fait d'individus en dispersion postnuptiale.

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* (CHD)

- 1 le 04/04 à Chevières (AR, FB, PMS)
- 2 du 26/07 au 05/09 à Houdancourt (FB, PMS, JPF, YB)

Il est assez difficile de déterminer l'origine de ces oiseaux : échappés de captivité, ou sauvage. Néanmoins une origine férale ou captive est plus que probable sous nos latitudes.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

Bilan par sites et commentaires.

Vallée de l'Oise.

Verneuil-en-Halatte : une mention de 13 individus, lors du passage postnuptial, le 22/12 (HdeL).

Moru-Pontpoint : 1 le 09/01, 2 le 04/04, puis 8 le 09/12 et 5 le 16/12 (YB, WM, JPF). La donnée du 04/04 peut correspondre aussi bien à des oiseaux en halte migratoire qu'à des individus stationnant sur les bassins d'Houdancourt et de Chevières tout proches. Les données de décembre sont attribuables à la migration postnuptiale.

Chevières : 4 le 30/01, 4 le 27/03, 5 le 04/04 et le 02/06 (DL, AR, FB). Pas d'indice de reproduction sur ce site favorable, malgré la présence d'oiseaux de fin mars à début juin.

Houdancourt : l'espèce est notée régulièrement sur les bassins de décantation du 02/03 au 09/09 avec des effectifs de 1 à 7 individus (FB, WM, JPF, PMS, PMal, RB, DS). 1 juvénile est observé le 28/05 (WM), la reproduction y est donc possible.

Longueil-Sainte-Marie : 4 les 14/03 et 09/04, 3 le 29/04, 2 le 09/05 (JPF). Ces oiseaux peuvent être les mêmes que ceux stationnant sur les autres sites de la vallée.

Vallée du Thérain.

- Bresles : 1 le 29/03, 3 le 30/03, 1 le 06/04, 1 le 29/06, 3 le 02/07 (FB). Les prospections sur ce site sont difficiles, mais ce dernier présente un potentiel intéressant pour la reproduction.

- Bailleul-sur-Thérain " Mont César " : 1 femelle est vue posée sur cette pelouse sèche, riche en terriers de lapins le 29/05 (FB). Il s'agit probablement d'un des oiseaux de Bresles, site proche de quelques centaines de mètres.

Vallée de l'Automne.

- Vauciennes : des effectifs compris entre 1 et 7 individus sont notés du 20/02 au 02/12. Le maximum de 7 oiseaux est noté le 15/03 (HdeL), lors du passage prénuptial. La mention du 02/12 (JPB, CG) avec 3 oiseaux est attribuable au passage postnuptial. 1 juvénile est noté le 20/08 (PMS, FB), mais il est difficile d'affirmer qu'il soit issu d'une reproduction locale.

- Vez " Etang de Wallu " : 1 le 08/02 (JPF), 1 couple le 20/02 (WM), 2 le 15/03 (FS). Ces oiseaux sont ceux fréquentant les bassins de Vauciennes. Le site de Wallu sert fréquemment de refuge quand Vauciennes subit des dérangements.

Canard siffleur *Anas penelope*

Migration prénuptiale du Canard siffleur dans l'Oise en 2000

Décades	Janvier.1	Janvier.2	Janvier.3	Février.1	Février.2	Février.3	Mars.1	Mars.2	Mars.3	Avril.1	Avril.2	Avril.3
Verneuil-en-Halatte	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moru-Pontpoint	-	-	-	-	-	-	2	25	-	-	-	-
Verberie	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Bailleul-sur-Thérain	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
Bresles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Beauvais	-	-	-	-	-	-	12	60	1	-	-	-

Le premier individu est noté dans la dernière décade de janvier (le 29/01 à Verneuil-en-Halatte). Il n'y a pas de mention cette année en février, les oiseaux étant probablement passés inaperçus. On remarque le pic de passage dans la deuxième décade de mars avec un effectif remarquable de 60 individus (le 18/03) à Beauvais. Dernier individu classiquement noté dans la première décade d'avril.

Pas de donnée de la seconde décade d'avril jusqu'au mois d'août.

Migration postnuptiale et début d'hivernage du Canard siffleur dans l'Oise en 2000 (effectifs maximums par décades)

Décades	Septembre.1	Septembre.2	Septembre.3	Octobre.1	Octobre.2	Octobre.3	Novembre.1	Novembre.2	Novembre.3	Décembre.1	Décembre.2	Décembre.3
Moru-Pontpoint	-	-	-	-	-	-	17	6	-	17	6	7
Verberie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
Houdancourt	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
Vauciennes	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Breuil-le-Sec	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Bailleul-sur-Thérain	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Le passage postnuptial débute dans la première décade de septembre, demeure discret en octobre, puis semble s'accroître dans la première décade de novembre jusqu'à fin décembre. Les données de fin décembre sont peut-être aussi le fait d'oiseaux fuyant une vague de froid en Belgique ou aux Pays-Bas.

Canard chipeau *Anas strepera*

Hivernage et passage prénuptial du Canard chipeau dans l'Oise en 2000 (effectifs maximums par décades)

Décades	Janvier. 1	Janvier. 2	Janvier. 3	Février. 1	Février. 2	Février. 3	Mars. 1	Mars. 2	Mars. 3	Avril. 1	Avril. 2	Avril. 3
Verneuil-en-Halatte	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Moru-Pontpoint	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Houdancourt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chevrières	-	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-	-
Longueil-Sainte-Marie	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
Verberie	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Mello	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Villers-Saint-Sépulcre	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Bailleul-sur-Thérain	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
Bresles	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-
Beauvais	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

On note quelques hivernants isolés en janvier sur les sites de Verneuil-en-Halatte et Moru-Pontpoint. Le début du passage prénuptial est noté timidement cette année dans la seconde décade de février, puis semble s'accroître vers la mi-mars et se poursuit jusqu'à fin avril. Les effectifs sont cependant faibles et ne concernent que de petits groupes d'oiseaux, ce qui est classique pour l'espèce dans l'Oise.

Passage postnuptial et début d'hivernage du Canard chipeau dans l'Oise en 2000 (effectifs maximums par décades)

Décades	Aout. 1	Aout. 2	Aout. 3	Septembre. 1	Septembre. 2	Septembre. 3	Octobre. 1	Octobre. 2	Octobre. 3	Novembre. 1	Novembre. 2	Novembre. 3	Décembre. 1	Décembre. 2	Décembre. 3
Verneuil-en-Halatte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Moru-Pontpoint	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	12	7	17
Houdancourt	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verberie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	5
Saint-Félix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Bailleul-sur-Thérain	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Premier migrateur noté vers la mi-août, aucune autre donnée ensuite pendant plus d'un mois. Étrangement, aucune donnée non plus en octobre. Le passage postnuptial du Canard chipeau est, il est vrai, très discret.

On note, à partir de la seconde décade de novembre, un nouveau passage et ce, jusqu'à la fin de l'année. Certains oiseaux semblent stationner longtemps sur le site de Moru-Pontpoint, y débutant probablement leur hivernage.


L'espèce ne semble toujours pas nicher dans l'Oise.

Fin d'hivernage et migration prénuptiale de la Sarcelle d'hiver dans l'Oise en 2000 (Maximum par décade)

Décades	Janvier. 1	Janvier. 2	Janvier. 3	Février. 1	Février. 2	Février. 3	Mars. 1	Mars. 2	Mars. 3	Avril. 1	Avril. 2	Avril. 3
La Neuville-en-Hez	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Félix	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Bailleul-sur-Thérain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Bresles	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Vauciennes	-	-	-	-	-	-	25	27	2	-	15	-
Vez "Wallu "	-	-	-	80	49	-	-	11	-	-	-	-
Pierrefonds	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forêt de Chantilly " Etangs de Commelles "	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moru-Pontpoint	-	-	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-
Houdancourt	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
Chevrières	-	-	3	-	-	-	-	28	7	2	-	-
Longueil-Sainte-Marie	-	-	-	-	-	-	-	11	6	2	2	-

On note un petit hivernage très dispersé. Les données sur les sites mitoyens de Vauciennes et Wallu permettent de constater l'érosion des effectifs en février, les départs se poursuivant jusqu'en mars. Sur les autres sites, le passage est net dans la deuxième décade de mars, et se poursuit en avril.

Estivage : On note, en juin, la présence de quelques individus sur le secteur de Vauciennes et Vez " Etang de Wallu " avec un maximum de 8 oiseaux le 10/06 à La Neuville-en-Hez.



Dessin : M. Votte

Migration postnuptiale et début d'hivernage de la Sarcelle d'hiver (décade)

Décades	Juillet. 1	Juillet. 2	Juillet. 3	Aout. 1	Aout. 2	Aout. 3	Septembre. 1	Septembre. 2	Septembre. 3	Octobre. 1	Octobre. 2	Octobre. 3	Novembre. 1	Novembre. 2	Novembre. 3	Décembre. 1	Décembre. 2	Décembre. 3
Verneuil-en-Halatte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Houdancourt	-	2	1	5	-	34	90	140	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Moru-Pontpoint	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	1
Longueil-Sainte-Marie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-
Chevrières	-	1	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vauciennes	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	30	110	-	-	95	-	-
FD Ch " Etangs de Commelles "	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Félix	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bresles	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les premiers mouvements de retour sont notés dans la seconde décade de juillet (première donnée le 15 à Houdancourt). Les mouvements s'accroissent classiquement dans la seconde décade d'août. La première vague migratoire est nettement perceptible sur le site d'Houdancourt. Une deuxième vague débute dans la deuxième décade d'octobre, avec l'arrivée des hivernants sur le site de Vauciennes.

On note quelques données hivernales sur les sites de Verneuil-en-Halatte et Moru-Pontpoint.

Reproduction : à nouveau, aucun indice cette année dans notre département.

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

Effectifs maximums mensuels (au moins 10 individus) du Canard colvert en 2000 (couples reproducteurs et pulli exclus)

Mois	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
Breuil-le-Sec	98	16	13	-	-	-	-	-	101	113	19	22
Litz	15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bulles	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forêt de Hez " Etang de la Garde "	36	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
La Neuville-en-Hez	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Just-en-Chaussée	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint-Félix	28	-	-	-	-	-	-	-	235	21	-	18
Bailleul-sur-Thérain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bresles	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-
Beauvais	-	-	-	12	-	-	-	-	67	89	-	-
Grandvilliers	-	50	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-
Couvieux	-	10	-	-	-	-	-	-	-	16	43	20
Saint-Leu-d'Esserent	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verneuil-en-Halatte	64	11	-	-	-	18	-	-	24	-	-	40
Moru-Pontpoint	25	-	10	-	-	-	-	-	12	10	-	19
Houdancourt	32	12	18	-	25	52	100	25	16	-	-	-
Chevrières	92	-	-	10	18	66	12	176	-	-	-	-
Longueil-Sainte-Marie	-	25	-	-	-	-	-	-	27	52	73	-
Pimprez	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marais de Sacy-le-Grand	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forêt de Chantilly « Etangs de Commelles »	108	-	-	28	-	-	-	-	-	55	17	20
Chantilly	151	14	10	-	-	49	-	48	-	-	42	-
Choisy-au-Bac	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forêt de Laigue " Vivier du Grès "	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rethondes	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attichy	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forêt de Compiègne " Etang du Carandeu "	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forêt de Compiègne " Etangs de Saint-Pierre "	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pierrefonds	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vauciennes	-	-	-	-	10	-	-	20	-	40	140	239

La lecture du tableau montre des effectifs plus importants en janvier sur plusieurs sites (données du recensement IW). La baisse des effectifs en février sur plusieurs sites montre bien le départ de nombreux hivernants à cette période (voir entre autres les chiffres pour Chantilly).

Les regroupements estivaux s'observent à partir de juillet. Les hivernants arrivent progressivement à partir d'octobre jusqu'en décembre (voir chiffres de Vauciennes).

Cette espèce se note sur toutes les zones humides du département. Cependant, comme chaque année, il est très difficile de faire la part entre les oiseaux d'origine sauvage, dont beaucoup sont des migrateurs, utilisant notre département comme zone d'hivernage ou comme halte migratoire, et ceux issus de lâchers ou des populations urbaines (dont certains sont de vrais colverts sauvages, sédentarisés par la nourriture facile et la tranquillité relative qu'ils trouvent sur les zones humides. Notons que ces zones humides peuvent être aussi bien des plans d'eau que des rivières). La population nicheuse est, quant à elle, difficile à évaluer, les observateurs ne notant malheureusement pas systématiquement dans leurs carnets, les couples et nichées qu'ils peuvent observer sur le terrain. De même, de nombreux couples reproducteurs passent inaperçus quand ils s'installent sur les zones humides de petite taille, souvent non couvertes par les observateurs.

Néanmoins sont repérés (nicheurs certains) :

- Vallée de l'Oise : 1 couple à Saint-Maximin, 1 couple à Verneuil-en-Halatte, 4 couples à Chevières, 1 couple à Houdancourt, 1 couple à Longueil-Sainte-Marie.
- Vallée du Thérain : 1 couple à Angy, 2 couples à Saint-Félix, 3 couples à Bailleul-sur-Thérain, 2 couples à Bresles, 1 couple à Allonne, 1 couple à Beauvais.
- Vallée de la Brèche : 1 couple à Bailleval, 2 couples à Breuil-le-Sec.
- Vallée de l'Automne : 1 couple à Vauciennes, 3 couples à Vez " Etang de Wallu ".
- Vallée de la Nonnette : 3 couples à Chantilly, au moins 2 couples à Courteuil.

Canard pilet *Anas acuta*

Migration prénuptiale du Canard pilet dans l'Oise en 2000

Décades	Janvier.1	Janvier.2	Janvier.3	Février.1	Février.2	Février.3	Mars.1	Mars.2	Mars.3	Avril.1	Avril.2	Avril.3
Moru-Pontpoint	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Houdancourt	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Chevières	-	-	-	-	-	-	-	12	4	2	-	-
Verberie	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Vauciennes	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
Bresles	-	-	-	-	-	-	-	29	14	11	-	-


L'espèce est toujours un hivernant très rare dans l'Oise. La donnée de la troisième décennie de janvier (le 25/01 à Moru-Pontpoint) peut d'ailleurs éventuellement concerner un individu précurseur, en halte migratoire, le passage commençant en février chez cette espèce. Etrangement cette année, aucune donnée en février, le pic de passage est noté à partir de la seconde décennie de mars, pour se poursuivre dans la première décennie d'avril. Cette année encore les effectifs ne sont pas très importants.

Migration postnuptiale et données hivernales du Canard pilet dans l'Oise en 2000

Décades	Septembre. 1	Septembre. 2	Septembre. 3	Octobre. 1	Octobre. 2	Octobre. 3	Novembre. 1	Novembre. 2	Novembre. 3	Décembre. 1	Décembre. 2	Décembre. 3
Moru-Pontpoint	-	2	-	-	-	-	7	-	-	-	-	5
Houdancourt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verberie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Vauciennes	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Beauvais	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-

Le passage postnuptial débute dans la deuxième décennie de septembre et se poursuit jusqu'en novembre, mais avec des effectifs très faibles, ce qui est classique pour l'espèce à cette période dans notre département.

On remarquera quelques données en décembre, qui peuvent traduire des mouvements de fuite devant une vague de froid dans le nord de l'Europe, ou un début d'hivernage.



Dessin : W. Mathot

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

Migration prénuptiale.

Première le 18/03 à Bailleul-sur-Thérain.

Il faut attendre ensuite avril pour trouver de nouvelles données avec 4 le 04/04 à Chevrières, puis le 8 le 24/04 à Verberie. A Houdancourt, 1 le 02/06, 6 le 03/06 et 2 le 13/06, dernière date pour le passage prénuptial.

Premier retour le 18/07 avec 1 à Houdancourt et 2 à Bresles.

Le site d'Houdancourt est par la suite fréquenté jusqu'au 16/09 (dernière mention annuelle pour l'Oise)
Le maximum sur ce site est de 6 oiseaux le 05/08. L'effectif cumulé du 18/07 au 16/09 y est de 45 individus, néanmoins ce nombre est à retenir avec précautions, beaucoup d'oiseaux pouvant stationner plusieurs jours sur le site, de même, d'autres peuvent y passer inaperçus.

On note, au cours du passage postnuptial également, 4 individus à Bresles le 02/08, 2 le 13/08 à Chevrières et 1 le 03/09 à Vauciennes.

Pas d'indice de reproduction cette année.

Sarcelle mouchetée *Anas flavirostris*

Espèce sud-américaine utilisée comme appelant par les chasseurs de gibiers d'eau et relâchée par ceux-ci dans la nature suite à l'interdiction de son utilisation.

- 3 le 08/09 à Houdancourt (PMS)
- 2 le 09/09 à Longueil-Sainte-Marie (PMS)

Canard souchet *Anas clypeata*

Migration prénuptiale et présence estivale du Canard souchet dans l'Oise en 2000 (Effectifs maximums par décades d'observation)

Décades	Janvier. 1	Janvier. 2	Janvier. 3	Février. 1	février 2	février 3	Mars 1	Mars 2	Mars 3	Avril 1	Avril 2	Mai 2	Mai 3	Juin 1	Juin 2	Juin 3
Verneuil-en-Halatte	-	-	-	-	4	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-
Houdancourt	-	-	-	-	-	7	11	-	26	27	-	1	1	1	1	2
Moru-Pontpoint	-	-	-	-	-	15	-	15	11	-	-	-	-	-	-	-
Chevrières	-	-	-	-	-	-	-	-	40	15	-	-	-	-	-	-
Longueil-Sainte-Marie	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Verberie	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8	-	-	-	-	-	-
Marais de Sacy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
Vauciennes	-	-	-	-	-	-	5	4	5	-	-	-	-	-	2	-
Saint-Félix	-	-	-	-	-	-	-	19	1	-	-	-	-	-	-	-
Villers-Saint-Sépulcre	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
Bailleul-sur-Thérain	-	-	-	-	-	-	-	50	-	16	-	-	-	-	-	-
Bresles	-	-	-	-	-	-	-	11	9	-	-	-	-	-	-	-
Beauvais	-	-	-	-	-	-	1	2	-	22	-	-	-	-	-	-

On remarquera l'absence de données de janvier. Le passage prénuptial commence, cette année encore, en février : 4 le 15 à Verneuil-en-Halatte. Le pic de passage est atteint classiquement dans la seconde décade de mars et jusqu'à la première décade d'avril. Ainsi le 19/03, 102 individus sont dénombrés en vallée du Thérain (Saint-Félix, Villers-Saint-Sépulcre, Bailleul-sur-Thérain et Bresles), effectif particulièrement intéressant pour notre département.

Le passage se tarit ensuite nettement, les données de mai et juin concernent probablement des estivant : non-nicheurs.

Pas d'indice de reproduction cette année, mais nous y sommes malheureusement habitués.

Passage postnuptial du Canard souchet dans l'Oise en 2000 (Effectifs maximums par décades d'observation)

Décades	Juillet. 1	Juillet. 2	Juillet. 3	Aout. 1	Aout. 2	Aout. 3	Septembre. 1	Septembre. 2	Septembre. 3	Octobre. 1	Octobre. 2	Octobre. 3	Novembre. 1	Novembre. 2	Novembre. 3	Décembre. 1	Décembre. 2	Décembre. 3
Moru-Pontpoint	-	-	-	-	-	5	-	10	-	-	-	-	67	9	4	3	-	4
Houdancourt	-	2	20	11	-	7	3	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Chevrières	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longueil-Sainte-Marie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14	18	12	-	-	-
Morlincourt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bresles	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
Beauvais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Herchies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Grandvilliers	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les premiers retours sont notés dans la seconde décade de juillet, le 13 exactement, avec une présence régulière sur le site d'Houdancourt. Une seconde vague de passage est notée de début novembre à début décembre. Les données de fin décembre sont attribuables à des oiseaux en fuite devant une vague de froid dans le nord de l'Europe. Notons que la vallée de l'Oise semble être un site apprécié par l'espèce au cours du passage postnuptial.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

Hivernage et migration prénuptiale du Fuligule milouin dans l'Oise en 2000 (maximums par décades)

Décades	Janvier. 1	Janvier. 2	Janvier. 3	Février. 1	Février. 2	Février. 3	Mars 1	Mars 2	Mars 3	Avril. 1	Avril. 2	Avril. 3	Mai. 1	Mai. 2	Mai. 3	Juin. 1	Juin. 2	Juin. 3
Breuil-le-Sec	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Litz	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Saint-Félix	-	2	1	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bresles	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bailleul-sur-Thérain	-	-	4	7	-	-	86	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F de Hez " Etg de la Garde "	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boran-sur-Oise	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gouvieux	-	1	-	-	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verneuil-en-Halatte	17	-	186	-	-	49	-	13	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-
Moru-Pontpoint	901	440	490	290	150	24	1	-	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-
Chevrières	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Houdancourt	-	2	-	33	-	243	-	10	6	4	2	2	-	4	6	7	8	-
Longueil-Sainte-Marie	-	35	3	205	153	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verberie	-	-	-	-	-	-	38	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varesnes	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morlincourt	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marais de Sacy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	-	-
Pierrefonds	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vauciennes	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Comme chaque année, la zone de Moru-Pontpoint représente le principal site d'hivernage de l'espèce dans notre département. Les plans d'eau alentour (Longueil-Sainte-Marie, Houdancourt...) reçoivent aussi ces oiseaux au gré des dérangements (chasse, pêche, promeneurs...).

A partir de la première décade de février, le passage prénuptial est sensible. On note ainsi une baisse importante des effectifs sur le secteur Moru-Pontpoint, Houdancourt, Longueil-Sainte-Marie, et l'apparition d'oiseaux sur d'autres sites tels Saint-Félix ou Gouvieux par exemple. Le passage se poursuit en mars et très faiblement en avril. Quelques individus sont encore présents en mai et juin. Il peut s'agir de retardataires ou encore d'individus non nicheurs. Des oiseaux sont aussi notés en mai et juin aux marais de Sacy-le-Grand, où l'espèce niche assez régulièrement, mais à priori sans suite cette année.

Estivage, migration prénuptiale et début d'hivernage du Fuligule milouin dans l'Oise en 2000 (maximums par décades)

Décades	Juillet. 1	Juillet. 2	Juillet. 3	Août. 1	Août. 2	Août. 3	Septembre. 1	Septembre. 2	Septembre. 3	Octobre. 1	Octobre. 2	Octobre. 3	Novembre. 1	Novembre. 2	Novembre. 3	Décembre. 1	Décembre. 2	Décembre. 3
Boran-sur-Oise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	7	-	-
Gouvieux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Verneuil-en-Halatte	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Moru-Pontpoint	-	20	-	13	-	26	-	7	-	87	156	105	420	720	533	492	330	600
Houdancourt	-	4	3	-	-	5	5	23	130	60	29	2	5	-	-	-	-	-
Chevrières	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longueil-Sainte-Marie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382	434	-	360	-	-	-
Morlincourt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	68	-	-
Saint-Félix	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	43	36	-	-	-	-	-	-
Bailleul-sur-Thérain	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-
Beauvais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Herchies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	61	-	5
Haucourt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	3
Vauciennes	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-

En juillet et août, présence de quelques oiseaux, ici et là. Ces données sont attribuables pour la plupart à la dispersion postnuptiale. Plusieurs individus effectuent aussi leur mue. La migration postnuptiale proprement dite semble débiter dans la troisième décade de septembre, des groupes d'individus parfois importants sont vus ensuite un peu partout. On remarque encore l'importance primordiale des gravières de la vallée de l'Oise pour les haltes migratoires et l'hivernage de l'espèce dans notre département.

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* (CHD)

Toujours rare, à rechercher parmi les bandes de Fuligules milouins et morillons.

Hivernage :

- 1 mâle et 1 femelle le 02/01 à Moru-Pontpoint (YB).
- 1 à 2 individus du 17/11 au 23/12 (PMS, FB, JPF, YB) à Moru-Pontpoint.

Migration postnuptiale :

- 1 en halte le 20/10 à Saint-Félix (FB, YL).

Fuligule morillon *Aythya fuligula*

Les sites de la vallée de l'Oise représentent le principal secteur d'hivernage de l'espèce dans l'Oise avec un maximum de 237 individus à Moru-Pontpoint dans la première décade de janvier.

La migration prénuptiale débute en février, on note ainsi une fluctuation des effectifs à Moru-Pontpoint au cours de ce mois, et l'apparition d'oiseaux sur des plans d'eau où l'espèce n'est pas notée en hivernage.

Le passage semble net jusque dans la dernière décade d'avril. Les mois de mai et juin permettent d'enregistrer quelques données, probablement d'individus attardés ou d'estivants non nicheurs.

La nidification est notée à Chevrières, sur les bassins de décantation avec 1 femelle et 8 pulli le 16/07 (AR).

L'observation d'oiseaux en mai et juin sur d'autres bassins de décantation (Houdancourt et Bresles), peut correspondre à des tentatives de cantonnement. Ces sites sont en effet très intéressants pour l'espèce, car riches en nourriture, donc pratiques pour l'élevage des jeunes, et très peu dérangés à cette époque de l'année.

Hivernage, migration prénuptiale et présence estivale du Fuligule morillon en 2000 dans l'Oise.

Décades	Janvier. 1	Janvier. 2	Janvier. 3	Février. 1	Février. 2	Février. 3	Mars. 1	Mars. 2	Mars. 3	Avril. 1	Avril. 2	Avril. 3	Mai. 1	Mai. 2	Mai. 3	Juin. 1	Juin. 2	Juin. 3
Gouvieux	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verneuil-en-Halatte	4	-	14	-	-	6	-	6	-	11	-	-	-	-	-	-	2	-
Moru-Pontpoint	237	91	95	70	96	88	60	41	9	-	-	-	3	4	2	-	-	-
Houdancourt	-	-	-	16	-	28	12	24	35	24	11	4	-	-	-	2	5	-
Chevrières	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
Longueil-Sainte-Marie	-	8	4	-	37	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verberie	-	-	-	-	2	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Baboeuf	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attichy	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vauciennes	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	10	3	3	1	-
Bailleul-sur-Thérain	-	-	-	3	-	-	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Bresles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Beauvais	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Quelques oiseaux poursuivent leur estivage en juillet, le début du passage postnuptial semble se dessiner dans la première décade d'août, pour s'intensifier nettement en octobre. On remarquera la belle stabilité des effectifs à Moru-Pontpoint, respectivement au cours des mois d'octobre et de novembre.

Estivage, migration postnuptiale et hivernage du Fuligule morillon dans l'Oise en 2000

Décades	Juillet. 1	Juillet. 2	Juillet. 3	Août. 1	Août. 2	Août. 3	Septembre. 2	Septembre. 3	Octobre. 1	Octobre. 2	Octobre. 3	Novembre. 1	Novembre. 2	Novembre. 3	Décembre. 1	Décembre. 2	Décembre. 3
Gouvieux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Verneuil-en-Halatte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Moru-Pontpoint	-	6	-	24	-	38	61	39	106	101	112	166	160	167	151	68	103
Houdancourt	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Chevrières	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longueil-Sainte-Marie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	48	-	41	-	-	-
Verberie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Morlincourt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
Vauciennes	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bailleul-sur-Thérain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-
Bresles	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beauvais	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haucourt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Fuligule milouinan *Aythya marila* (CHD)

Espèce littorale rare à l'intérieur des terres

Deux observations cette année, une à chaque passage.

Migration prénuptiale :

- 2 le 12/02 à Varesnes (LG).*

Migration postnuptiale :

- 1 femelle ou immature les 08 et 16/11 à Moru-Pontpoint (AR, WM, PMS).

Eider à duvet *Somateria mollissima*

Espèce littorale rare à l'intérieur des terres

1 mâle immature est observé du 02/01 au 16/05 puis du 14/07 au 31/12 à Moru-Pontpoint sur le bassin "M5". Cet oiseau y stationne depuis le 22/12/98. Il effectue ses mues successives sur place.

Macreuse noire *Melanitta nigra* (CHD)

Espèce littorale rare à l'intérieur des terres

Il y a peu d'observations dans les terres pour ce canard marin :

- 1 le 09/01 à Moru-Pontpoint (CW), probablement arrivée suite à la tempête hivernale du 26/12/99

Macreuse brune *Melanitta fusca* (CHD)

2 femelles ont stationné du 09/01 au 03/03 à Moru-Pontpoint (PMS, WM, FB, AR, JPF). Comme pour l'espèce précédente, cette rare observation est probablement due à la tempête de décembre 1999.

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*

Hivernant rare

Le site de Moru-Pontpoint est un site régulier d'hivernage pour l'espèce. Elle y est notée du 08/01 au 26/02 avec un maximum de 8 individus le 08/02 (WM). Par la suite, elle est notée à nouveau du 28 au 31/12 avec un maximum de 3 individus.

Hors Moru-Pontpoint : 1 le 26/02 à Verneuil-en-Halatte (YB), probablement un oiseau en halte migratoire.
Pas d'autre donnée ailleurs.

Harle piette *Mergellus albellus*

Hivernant occasionnel dont la présence est à lier avec des vagues de froid importantes.

Deux données cette année sur le site de Moru-Pontpoint :

- En hivernage : 1 femelle le 02/01 (YB).
- En migration : 1 femelle le 09/03 (JPF).

Harle bièvre *Mergus merganser*

Hivernant occasionnel dont la présence est également à lier avec des vagues de froid importantes.

Deux données hivernales à Moru-Pontpoint :

- Hiver 1999/2000 : 1 femelle le 02/01 (YB).
- Hiver 2000/2001 : 1 mâle et 1 femelle le 30/12 (JPF).

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

Migrateur et nicheur peu commun

Le passage prénuptial est noté majoritairement en mai :

Premières :

- 1 le 30/04 à Breuil-le-Sec (YL).
- 1 le 03/05 à Noailles (YL).
- 1 le 06/05 à Morvillers (GP).
- 1 le 07/05 à Sacy-le-Grand (JLB)
- 1 le 09/05 à Senlis (PMal, RB, DS)
- 4 le 12/05 à Orrouy (PMS)
- 18 en migration en 1h30 le 12/05 en forêt de Compiègne " La Fortelle " (PMS).
- 3 le 13/05 au bois du Roi à Péroy-les-Gombries (PM, RB, DS).

Par la suite, les parades et les couples sont observés dans les principaux massifs forestiers de la mi-mai à juillet :

- Forêt de Chantilly : 1 le 01/06 parcelle 227 (JLB), 1 le 03/07 à Gouvieux (YB), 1 couple + 1 juv le 07/07 (YB), 1 le 15/08 parcelle 134 (JLB).
- forêt de Compiègne :

mai : parcelles 9341, 9012, 412, 531, 3472 et carrefour de la Pépinière.

Juin : parcelles 9012, 412, 510, 531, 3472, 1482, 7412, 9111 et à Saint-Sauveur : 1 mâle parade + 1 subadulte le 12 parcelle 1152 (AR)

Juillet : parcelle 8371, 9332, 2072, 1 cpl avec parade le 22 parcelle 7011 (AR). 2 le 23 et 2 le 26 à Orrouy (PMS)

- forêt d'Ermenonville : 1 couple le 01/07 bois de Perthes (HdeL)

1 mâle le 01/07 parcelle 242 (HdeL)

1 le 23/07 parcelle 76 (JLB)

- forêt d'Halatte : 1 le 13/06 parcelle 307 (PM, RB, DS), 1 le 14/06 à Senlis (PM, RB, DS), 1 les 18 et 25/06 au Mont Alta (YB), 1 couple parade au Mont Pagnotte le 21/07 (HdeL), 3 le 30/07 parcelles 142 et 19-63 (JLB)

- forêt de Retz : 1 le 02/07 parcelle 15-I, 1 mâle parade au Buisson de Queue d'Ham le 19/07 (HdeL).

- forêt de Thelle : 1 mâle festonne parcelle 16 le 20/05 (HdeL)

En dehors des grands massifs :

- Lachapelle-aux-Pots "Bois de Lhuyère" : 1 couple parade le 20/05 (HdeL)

- Bresles : 1 les 02/07 "Bois du Quesnoy" et 18/07 " BDD " (FB)

- Breuil-le-Vert "Bois des Côtes" : 2 observations par mois, d'un individu, de mai à juillet (YL)

- Dieudonné : 1 le 28/05 (YB)

- Houdancourt : 2 le 29/07 (FB) et 2 le 30/07 (AR)

- Lataule : 2 le 29/07 (FS)

- Morienval : 1 le 18/07 (HdeL) et 1 le 23/07 (PMS)

- Moru-Pontpoint : 2 le 14/07 (FB) et 1 le 15/07 (PMS)

- Sacy-le-Grand : 1 le 26/07 (FS)

- Saint-Germer-de-Fly : 1 le 27/07 (HdeL)

La migration postnuptiale est notée à partir du 26/07, le dernier individu est observé le 25/09 à Gournay-sur-Aronde (FS). Le total cumulé d'individus observés sur cette période et de 32 oiseaux.

Dernières : 3 le 24/09 à Cuvilly (FS), 1 posée le 25/09 à Gournay-sur-Aronde (FS)

Milan noir *Milvus migrans*

Migrateur rare.

Noté cette année uniquement au printemps.

En avril :

- 1 le 16 au Frestoy-Vaux (FS, WM)

- 1 le 18 à Grandvilliers (GP)

- 1 le 23 à Autréches (JMV)

et mai :

- 1 le 08 à Senlis (PM, RB, DS)

- 2 le 16 et 1 le 19 à Houdancourt (FB)

- 1 le 20 Forêt de Compiègne parcelle 412 (PM, RB, DS)

- 1 le 23 à Houdancourt (FB)

- 1 le 26 à Moru-Pontpoint (FB)

Milan royal *Milvus milvus*

Migrateur rare.

Uniquement observé au passage postnuptial cette année.

Le premier est observé le 30/07 à Attichy (CL)

Le site de migration de Morienval « Brassoir » rassemble ensuite pratiquement toutes les données : 7 individus du 11/09 au 11/11. Egalement 1 le 06/11 à Breuil-le-Vert (YL)

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

Migrateur et nicheur assez rare en Picardie.

Premiers :

- 1 le 11/03 en Forêt de Compiègne (JLB)
- 1 mâle le 27/03 en Forêt de Compiègne carrefour Valon (PMS)

La nidification est probable aux Marais de Sacy-le-Grand avec 1 couple présent du 08/04 au 04/06 (PMS, WM, JLB, PMal, RB, DS)

L'espèce est observée aussi en plaine :

- 1 femelle le 16/04 à Saint-Etienne Roilaye (JMV)
- 1 femelle le 08/05 à Bouillancy (HdeL)
- 1 femelle le 04/06 et 1 immature le 14/07 à Feuquières (GP)
- 1 mâle le 20/08 au nord de Pierrefonds (MV)

et sur les bassins de Vauciennes : 1 le 14/05 (PMS)

La migration postnuptiale est notée de mi août à novembre pour un total de 52 oiseaux observés

Derniers :

4 le 03/11 à Brassoir et 1 le 05/11 à Vauciennes (PMS)

Pas de donnée hivernale cette année.

Busard Saint Martin *Circus cyaneus*

Migrateur et nicheur assez rare en Picardie

Nidification : Peu d'indices cette année, il ne semble pas y avoir eu de suivi des couples nicheurs

Clermontois : 1 couple le 21/05 à Foulanges (JLB)

Pays de Thelle : 1 femelle et 1 mâle avec proie le 06/07 à Sérifontaine (HdeL)

Plateau Picard : 1 couple le 04/06 à Feuquières (GP), 1 couple le 19/07 puis 1 femelle et 2 immatures les 15 et 17/08 à Grandvilliers (GP)

Migration postnuptiale à Morienvall " Brassoir " : passage cumulé de 18 individus du 07/09 au 11/11.

Egalement noté au cours de l'année sur les sites suivants.

Pays de Bray : Saint-Pierre-ès-Champs.

Pays de Thelle : Ercuis, Flavacourt, Le Coudray Saint-Germer, Montherlant, Neuilly-en-Thelle.

Vexin : Chavençon, Tourly.

Région d'Estrées : Montiers, Saint-Martin-Longueau

Plateau Picard : Angivillers, Avrechy, Bulles, Cuignères, Essuiles, Etouy, Fitz-James, Gannes, Gourchelles, Gournay-sur-Aronde, Grez, Hétomesnil, Laneuvilleroy, La Rue-Saint-Pierre Le Mesnil-sur-Bulles, Le Mont Saint-Adrien, Le Plessier-sur-Saint-Just, Plainville, Ravenel, Rémérangles, Romescamps, Saint-Aubin-sous-Erquery, Sommereux, Valescourt, Villers-Vicomte, Welles-Pérennes.

Clermontois : Allonne, Bresles, Catenoy, Cires-les-Mello, Forêt Domaniale de Hez-Froidmont, Mouy.

Valois : Béthisy-Saint-Martin, Borest, Duvy, Feigneux, Forêt Domaniale d'Ermenonville, Fresnoy-le-Luat, Mont-l'Evêque, Moru-Pontpoint, Néry, Orrouy, Rocquemont, Trumilly, Verberie.

Multien : Brégy, Chêveville.

Noyonnais : Antheuil-Portes, Roye-sur-Matz.

Soissonnais : Autréches, Berneuil-sur-Aisne, Pierrefonds, Saint-Etienne-Roilaye.



Busard cendré *Circus pygargus*

Migrateur et nicheur rare.

Premiers :

1 mâle le 04/04 à Trumilly (JPF), 1 mâle le 18/04 à Grandvilliers (GP), 1 mâle le 01/05 à Milly-sur-Thérain (JBM-MCJ), 1 mâle le 12/05 à Orrouy (PMS), 1 mâle de 2ème été le 12/05 à Morienvall (PMS).

En période de nidification il a été noté sur les secteurs suivants :

Plaine du Valois (secteur de Borest et Raray)

1 mâle de 2ème été le 24/06, (est-ce le même que celui du 12/05 ?), 2 femelles le 28/06 (HdeL).

Plaine autour de Grandvilliers (secteur Grandvilliers, Sarcus, Grez, Sommereux)

1 mâle le 03/06 (GP), 1 femelle les 12, 14 et 18/07 (GP), 1 mâle et 1 immature le 09/08 (GP),

1 femelle et 1 immature ensemble le 17/08 (GP), 1 le 25/08 et 1 mâle le 27/08 (GP)

Plaine autour de Feuquières

1 couple le 02/06, un couple parade le 04/06 (GP)

- Dernier : 1 femelle le 23/09 à Grandvilliers (GP)

C'est globalement peu, même s'il est vrai que le suivi des couples reproducteurs n'a, à priori, pas été effectué cette année. Des projections seraient nécessaires dans les zones de cultures du Pays de Thelle, du Vexin français, du Pays de Bray, du Clermontois, du Noyonnais et de la région d'Estrées et pourraient produire de précieuses données.

Autour des palombes *Accipiter gentilis* (CHD)

Nicheur, migrateur et hivernant rare.

Il est noté dans les grands massifs forestiers ou à leur proximité immédiate :

- 1 femelle le 20/02 en forêt de Compiègne (Anne et Cédric Louvet)
- 1 mâle les 01 et 02/04 en forêt d'Halatte au Mont Alta (YB)
- 1 les 11/09, 16/09, 11/10 et 09/11 à Morienvall " Brassoir " (PMS)*

Les données sont toujours rares pour cette espèce dans l'Oise, qui de plus est très discrète.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

La multiplication des données montre des effectifs en progression

En période de reproduction, plusieurs mentions de l'espèce :

Clermontois : 1 couple parade le 15/03 à Breuil-le-Sec (FB)

Valois : 1 couple parade le 16/04 en forêt d'Halatte parcelle 18 (HdeL)

1 couple le 08/05 à Senlis (PM, RB, DS)

Cris de jeunes en forêt de Chantilly parcelle 138 le 05/08 (JMG)

Soissonnais : cris de jeunes en forêt de Compiègne parcelle 3330 le 22/07 (AR)

Cris de jeune en forêt de Compiègne parcelle 1422 le 30/07 (AR)

Pays de Thelle : 1 femelle + 1 juvénile le 20/08 à Ercuis (YB)

L'Epervier d'Europe est souvent observé chassant dans les villes et villages :

Clermontois : 1 les 20 et 26/01 dans les jardins de Breuil-le-Sec (FB)

Noyonnais : 1 le 12/02 dans Noyon (MR)

Valois : 1 femelle le 04/03 à Senlis (JMG)

1F le 29/03 à Béthisy-Saint-Martin (JPF)

Soissonnais : 1 femelle immature le 12/03 à Compiègne (AR)

Données de prédation :

Valois : 1 s'envole avec une Tourterelle turque décapitée à Vaucelles (JPF), 1 femelle attrape un Pic noir chanteur le 30/09 en Forêt d'Ermenonville (JLB) !

Pays de Bray : 1 chasse le moineau le 09/06 à Saint-Martin-le-Nœud (YLa)

Des données proviennent également des localités et sites suivants :

Plateau Picard : Beauvais, Grandvilliers, Herchies, Le Mont-Saint-Adrien.

Pays de Thelle : Dieudonné, Neuilly-en-Thelle.

Clermontois : Angy, Bresles, Cauffry, Cires-les-Mello, Forêt Domaniale de Hez-Froidmont, Marais de Sacy-le-Grand, Mouy, Sacy-le-Grand, Saint-Félix.

Région d'Estrées : Chevières, Epineuse.

Valois : Apremont, Béthisy-Saint-Martin, Chantilly, Forêt Domaniale d'Ermenonville, Forêt Domaniale de Pontarmé, Fresnoy-la-Rivière, Gouvieux, Moru-Pontpoint, Orrouy, Rocquemont, Russy-Bémont, Vauciennes, Verberie, Villeneuve-sur-Verberie, Vineuil-Saint-Firmin.

Multien : Bouillancy

Noyonnais : Baboeuf, Cuvilly, Morlincourt, Pimprez, Varesnes.

Soissonnais : Compiègne, Houdancourt, Longueil-Sainte-Marie.

Buse variable *Buteo buteo*

La nidification est notée de manière certaine dans le Pays de Thelle à Belle-Eglise et à Sérifontaine, dans le Valois en forêt de Retz, et dans le Soissonnais en forêt de Compiègne.

Migration active à Morienvall " Brassoir " : passage de 19 individus du 01/10 au 09/11.

Ailleurs l'espèce est notée au cours de l'année sur les sites suivants :

Pays de Thelle : Bornel, Dieudonné, Ercuis, Neuilly-en-Thelle.

Plateau Picard : Āvrechy, Baugy, Beauvais, Cressonsacq, Fitz-James, Forêt Domaniale de Malmifait, Froissy, Hétomesnil, Lataule, Le Frestoy-Vaux, Le Mesnil-sur-Bulles, Litz, Morvillers, Nourard-le-Franc, Ravenel, Saint-Just-en-Chaussée, Sarcus.

Clermontois : Ansacq, Bailleul-sur-Thérain, Bailleval, Bresles, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Bury, Cambronne-les-Clermont, Catenoy, Cires-les-Mello, Forêt Domaniale de Hez-Froidmont, Foulanges, Hondainville, Marais de Sacy-le-Grand, Mouy, Sacy-le-Grand, Saint-Leu d'Esserent.

Noyonnais : Appilly, Baboeuf, Boulogne-la-Grasse, Canny-sur-Matz, Gury, Mareuil-la-Motte, Margny-sur-Matz, Morlincourt, Ressons-sur-Matz, Ricquebourg, Varesnes.

Soissonnais : Berneuil-sur-Aisne, Bitry, Forêt Domaniale de Compiègne, Forêt Domaniale de Laigue, Pierrefonds, Saint-Etienne-Roillay, Trosly-Breuil.

Région d'Estrées : Chevières, Houdancourt, Le Meux, Longueil-Sainte-Marie.

Valois : Apremont, Forêt Domaniale de Chantilly, Forêt Domaniale d'Ermenonville, Forêt Domaniale d'Halatte, Forêt Domaniale de Pontarmé, Fleurines, Gouvieux, Montlognon, Moru-Pontpoint, Néry, Rocquemont, Senlis, Vauciennes, Verberie Verneuil-en-Halatte, Vineuil-Saint-Firmin.

Pays de France : Lamorlaye, Thiers-sur-Thève.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

Cette année, le peu de données mentionnées concerne uniquement le passage postnuptial pour ce migrateur rare :

- 1 le 15/07 en vallée du Thérain à Crillon (GP)
- 1 le 28/08 aux Marais de Sacy-le-Grand (YB)

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

Espèce bien notée tout au long de l'année

Nicheur certain dans les communes et sites suivants :

Valois : Morienvall.

Plateau Picard : Cuignières.

Pays de Thelle : Dieudonné, Ercuis, Neuilly-en-Thelle.

Pays de Bray : Lalandelle, Ons-en-Bray, Saint-Aubin-en-Bray.

Clermontois : Villers-Saint-Sépulcre.

Soissonnais : Forêt Domaniale de Compiègne.

Egalement noté au cours de l'année dans bon nombre de localités et sites.

Pays de Thelle : Belle-Eglise, Boran-sur-Oise, Bornel, Dieudonné, Ercuis, Fresnoy-en-Thelle, Précý-sur-Oise, Ullý-Saint-Georges.

Plateau Picard : Airion, Angivillers, Avrechy, Beaudéduit, Beauvais, Bonvillers, Broys, Bucamps, Bulles, Catillon-Fumechon, Erquery, Etouy, Essuiles, Feuquières, Fontaine-Lavaganne, Fouilleuse, Fournival, Gannes, Grez, Lataule, Laversines, Légantiers, Le Plessier-sur-Saint-Just, Lieuvillers, Litz, Maignelay-Montigny, Maimbeville, Méry-la-Bataille, Milly-sur-Thérain, Morvillers, Mory-Montcrux, Nivillers, Nourard-le-Franc, Plainval, Ravenel, Rémécourt, Saint-Aubin-sous-Erquery, Saint-Rémy-en-l'Eau, Sarcus, Sommereux, Therdonne, Tillé, Valescourt.

Clermontois : Agnetz, Angy, Ansacq, Bailleul-sur-Thérain, Berthecourt, Bresles, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Catenoy, Cires-les-Mello, Clermont, Forêt Domaniale de Hez-Froidmont, Hermes, Hondainville, Laigneville, La Rue Saint-Pierre, Marais de Sacy-le-Grand, Mouy, Neuilly-sous-Clermont, Nogent-sur-Oise, Nointel, Ponchon, Rantigny, Rochy-Condé, Saint-Félix, Saint-Martin-Longueau, Thury-sous-Clermont.

Pays de France : Lamorlaye, Thiers-sur-Thève.

Noyonnais : Boulogne-la-Grasse, Ricquebourg, Roye-sur-Matz.

Région d'Estrées : Lachelle, Bazicourt, Chevrières, Houdancourt, Jaux, Jonquières, Longueil-Sainte-Marie,

Soissonnais : Attichy, Berneuil-sur-Aisne, Chelles, Compiègne, Courtieux, Croutoy, Pierrefonds, Rethondes, Saint-Etienne-Roilaye.

Valois : Apremont, Chantilly, Creil, Forêt Domaniale de Chantilly, Forêt Domaniale d'Ermenonville, Fresnoy-la-Rivière, Gouvieux, Montlognon, Moru-Pontpoint, Néry, Pontpoint, Rocquemont, Saint-Maximin, Vauciennes, Verberie, Verneuil-en-Halatte.

Faucon émerillon *Falco columbarius*

Migrateur et hivernant.

Hiver 1999/2000 :

- 1 femelle le 09/01 à Blaincourt (YB)
- 1 le 15/01 à Boran-sur-Oise (YB)
- 1 le 13/02 à Morienvall " Brassoïr " (JMV)
- 1 le 22/02 attrape un passereau à Dieudonné (YB)

Migration postnuptiale :

- 1 les 12/10 (PMS) et 22/10 (JPB, CG, MV) à Morienvall " Brassoïr "
- 1 le 25/10 à Pronleroy (HdeL)
- 1 mâle le 01/11 à Vauciennes (YB)
- 3 migrent ensemble le 05/11 à Morienvall " Brassoïr " (JPB, CG)

Hiver 2000/2001 :

- 1 mâle le 30/12 à Fresnoy-le-Luat (HdeL)

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

Espèce mieux notée que d'habitude grâce à l'enquête rapaces diurnes nicheurs :

Région d'Estrées : 1 les 02/06, 24/07, 05/08, 17/08, 24/08 et 01/09 à Houdancourt (FB, JPF)

Pays de Bray :

- 1 le 06/05 à Villembray (HdeL), 1 le 20/05 à Savignies (HdeL), 2 adultes + 2 juvéniles le 15/08 à Abbécourt, 1 le 11/07 à Milly-sur-Thérain (GP)

Plateau picard :

- 1 le 06/05 à Hétomesnil (GP), 1 le 06/05 à Morvillers (GP), 1 le 06/05 à Sarcus (GP), 1 le 12/07 et 2 le 14/07 à Sommereux (GP)

Noyonnais :

- 1 le 17/06 à Varesnes (Geor), 1 le 24/06 à Appilly (PMS)

Clermontois :

- 1 les 18/07 et 02/08 à Bresles (FB), 2 le 21/07 au Bois des Côtes à Nointel (FB), 1 adulte les 19/05 (WM), 01/06 (AR) 16/09 (PM, RB, DS) à Sacy-le-Grand.

Pays de Thelle :

- 1 juv le 20/07 à Cauvigny (YB)

Valois :

- 1 en chasse le 28/06 à Barbery (HdeL), 1 juvénile le 16/08 à Béthisy-Saint-Martin (JPF)
- 1 le 27/08 à Bonneuil-en-Valois lieu dit Le Berval (PMS)

Forêt de Chantilly :

- 1 couple nicheur suivi du 01/06 au 03/09 (JLB)
- 1 juvénile le 28/06 à Boran-sur-Oise (YB)

Forêt de Compiègne :

- 1 le 28/05 carrefour du sanglier (AR)
- 1 couple cantonné les 03/06 et 07/06 (AR)
- 1 le 24/06 à Compiègne (JPF)
- 1 juvénile le 15/07 à Verberie (PMS, FB)
- 1 le 04/08 à Choisy-au-Bac (AR)
- 1 le 18/08 parcelle 9103

Forêt d'Ermenonville :

- 1 couple cantonné et nicheur les 30/04 et 23/07 au même endroit qu'en 1999 (JLB)
- 1 parade le 18/06 parcelle 134 (JLB)

Forêt d'Halatte :

- 1 le 30/07 (JLB),
- 3 le 14/05, 1 le 15/07 à Moru-Pontpoint (FB)
- 1 juvénile 31/07 (PMS)
- 1 immature le 15/08, 1 le 26/08 à Senlis (PM, RB, DS)
- 1 le 21/08 (FB)

Forêt de Hez :

- 1 le 25/07 Parcelle 219 (FB)

Forêt de Retz :

- 2 les 08/05, 12/08 et 15/08 route du Faîte (PMS)
- 1 le 05/09, 1 adulte + 2 juvéniles le 07/09, 2 le 10/09 (PMS)
- 1 le 20/08 transporte une hirondelle au nid (HdeL)


migrateur de mi septembre à début octobre

Dernier 1 le 10/10 à Brassoir (PMS)

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (CHD)

Hivernant et migrateur rare, il n'est noté qu'au passage postnuptial cette année :

- 1 les 06 et 08/09 à Houdancourt (PMS, FB)
 - 1 les 05/10 et 09/11 en migration à Morienval
- « Brassoir » (PMS)*
- 1 le 16/11 à Trosly-Breuil (MV)*



Dessin : M Votte

Perdrix rouge *Alectoris rufa*

Une seule observation a été faite cette année et dans un milieu plutôt inhabituel pour cette espèce introduite à des fins cynégétiques : 2 le 04/03 en forêt de Chantilly, parcelle 144, dans une coupe de régénération. (JLB)

Perdrix grise *Perdix perdix*

Peu d'observations pour cette espèce commune dont une grande partie des effectifs provient de lâchers cynégétiques. Les observations font, majoritairement, état d'individus regroupés par deux. Quelques rares compagnies sont notées avec des effectifs fluctuant entre 10 et 13 individus.

Nidification probable sur les communes de : Balagny-sur-Thérain (1 couple), Dieudonné (1 couple et 1 chanteur), Etouy (1 chanteur), Fresnoy-en-Thelle (1 couple et 1 chanteur), Maignelay-Montigny (1 couple et 2 chanteurs) et Puisieux-le-Hauberger (1 couple).

Quelques maxi -

2 données en janvier : 10 le 16/01 à Nointel, 12 le 27/01 à Houdancourt (FB)

2 données en décembre : 13 le 18/12 à Tillé (FB) et 10 le 24/12 à Morienvall (JPB-CG)

Caille des blés *Coturnix coturnix*

Les différentes observations mentionnent essentiellement des chanteurs. L'espèce étant, en effet, difficilement observable, tout recensement autre que par le chant n'est guère possible.

Les chanteurs sont notés sur les communes de :

Angivillers, Belle-Eglise, Borest, Bouillancy, Campagne, Chèvreville, Cires-lès-Mello, Foulanges, Grandvilliers, Gury, Laversines, La Chaussée, Lachelle, Lieuvillers, Nanteuil-le-Haudouin, Néry, Orrouy, Rocquemont et Valescourt.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

A l'instar de la Perdrix grise, le Faisan de Colchide fait partie des oiseaux gérés par des plans de chasse.

Des chanteurs sont notés à :

Apremont, Bailleul-sur-Thérain, Belle-Eglise, Bornel, Bresles, Breuil-le-Vert, Bulles, Chantilly, Fitz-James, Morlincourt, Moru-pontpoint, Sacy-le-Grand, Saint-Félix, Thiers-sur-Thève, Vauciennes, Verneuil-en-Halatte, Vineuil-St-Firmin ainsi qu'en forêt de Hez.

Deux cas de nidification certaine ont été notés : le 01/05 à Bornel dans le bois de Grainval avec la découverte d'un nid vide avec coquilles d'œufs et le 18/07 à Bailleul-sur-Thérain où 3 pullis sont vus en présence d'une femelle.

Maximum : 12 le 01/05 à Bornel (YB)

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

Le Râle d'eau a été noté dans le département, tout au long de l'année sauf en avril, bien qu'à cette époque la pression d'observation soit importante. Le phénomène peut s'expliquer par la discrétion dont fait preuve l'espèce en période de nidification.

Le Râle d'eau a été contacté sur les communes de :

Beauvais, Breuil-le-Vert, Sacy-le-Grand, Saint-Félix, Saint-Rémy-en-l'Eau, Vauciennes ainsi que sur les plans d'eau des forêts de Chantilly et de Compiègne.

Marouette ponctuée *Porzana porzana* (CHD)

Cette espèce, nicheuse en France, considérée comme en danger en France, est en déclin dans toute l'Europe (Recorbet B. Marouette ponctuée *Porzana porzana* - in : Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D. 1999)

Il s'agit là des douzième et treizième mentions, depuis 1979, pour cette espèce occasionnelle qui a été observée, dans le département, au cours des années 1979, 1980, 1987, 1988, 1989, 1991, 1995 et 1998.

En 2000, les observations ont toutes été faites au cours de la migration postnuptiale.

- Un juvénile est découvert sur les bassins de décantation de la sucrerie de Vauciennes le 24/08 par Pierre et Marc Sengez.

- Un adulte est trouvé le 26/08 au même endroit (PMS-FB-PR). Les deux individus seront revus jusqu'au 24/09 mais de façon isolée chaque fois :

- 1 ad les 27 et 28/08 (PMS)

- 1 juv le 30/08 (AR)

- 1 le 30/08 (CL)

- 1 ad les 07, 10, 17 et 24/09 (PMS)

- A Houdancourt c'est un juvénile qui sera découvert le 05/09 par Pierre et Marc Sengez. Il sera revu sur le site jusqu'au 19/09 (PMS, FB, JPF, WM, PMal, RB, DS, PLF)

Marouette poussin *Porzana parva* (CHN)

Sa population française, réduite à quelques rares noyaux isolés, est estimée à moins de 50 couples nicheurs. (François J. Marouette poussin *Porzana parva* in : Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D. 1999). Cet effectif serait probablement en diminution depuis les années 70. Cependant, son extrême discrétion nous autorise à penser que cette estimation est peut-être inférieure à la réalité.

Pour l'Oise, c'est la première fois que l'espèce est notée. Il s'agit d'un juvénile découvert par Pierre et Marc Sengez sur les bassins de décantation de Vauciennes.

Récapitulatif des observations :

- 20/08 (PMS FB AR)

- 21/08 (PMS)(JPF)

- 22/08 (PMS)

- 26/08 (PR)

Râle des genêts *Crex crex*

En 2000, Varesnes est le seul site d'accueil pour le Râle des genêts.

Un contact en mai : 1 chanteur en milieu de journée le 07/05 (WM).

Tous les autres contacts ont lieu en juin : 2 le 10/06 et 4 le 17/06 (WM), 2 le 24/06 (PMS)

C'est, avec l'année 89 où 4 oiseaux étaient notés, le meilleur effectif depuis 1978.

Brétigny, Baboeuf et Ourscamps sont les seules localités de l'Oise où l'espèce a été entendue à plusieurs reprises. A ces sites "réguliers", il faut ajouter Cuvilly où un individu erratique a séjourné du 15/07/97 au 28/07/97 (FS-WM) dans une jachère qui jouxte les habitations. Depuis 1989 les sites de Brétigny et d'Ourscamps semblent délaissés par le Râle des genêts. S'agit-il d'une désaffection du site ou d'une baisse des effectifs nicheurs dans le département ?

Sur le site de Varesnes, géré depuis quelques temps déjà par le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie qui mène spécifiquement une politique en faveur du RDC, nous constatons que les efforts de réhabilitation du milieu commencent à porter leurs fruits, démontrant ainsi l'intérêt de la conservation des milieux pour la préservation de l'espèce et l'importance du travail mené par le CSNP.

Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus*

La Gallinule poule d'eau est une espèce commune dans le département et à ce titre elle ne fait pas l'objet d'un suivi rigoureux de la part des observateurs. Les faibles effectifs et le peu de mentions ne reflètent pas la réalité, l'espèce étant présente dans la majorité des milieux humides même les plus petits. Seuls les effectifs du recensement IW de la mi-janvier peuvent être retenus comme valeur estimative de sa population hivernante.

Effectif IW 2000 pour le département de l'Oise : 432.

La Gallinule a été notée nicheuse certaine sur les communes de : Bresles (5 pulli), Breuil-le-Sec (1 couple+4 pulli), Breuil-le-Vert (3 pulli), Chantilly (plusieurs juvéniles), Chevières (quelques juvéniles),

Clermont (1 pullus), Coye-la-Forêt (plusieurs poussins), Houdancourt (2 familles avec 6 pulli), Longueil-Sainte-Marie (3 pulli), Sénécourt (1 juvénile), Vauciennes (2 poussins) et Villers-St-Sépulcre (2 pulli).

Quelques petits regroupements de fin d'été sont mentionnés :


13 le 08/09 à Houdancourt (FB), 11 le 19/09 à Moru-Pontpoint (FB), 20 le 03/10 aux étangs de Commelles ((FB), 13 le 31/10 sur le plan d'eau du Canada (FB), 38 le 06/11 sur les canaux du parc de Chantilly (YB).

Foulque macroule *Fulica atra*

L'espèce est mieux notée que la Gallinule poule d'eau probablement parce qu'elle est moins discrète. Grégaire, elle est présente en groupe d'importance fluctuante sur les différents plans d'eau et rivières du département.

Effectif maxi cumulé pour l'ensemble du département : 1204 le 02 janvier sur les sites de Verneuil-en-Halatte et Moru-Pontpoint.

Effectif IW 2000 pour le département de l'Oise : 4722.



Grue cendrée *Grus grus*

Les observations de la Grue cendrée, lors de ses déplacements migratoires dans le département, sont aléatoires car ce dernier est situé en dehors du couloir de migration qui s'oriente plus à l'est suivant un axe Luxembourg-Champagne-Berry-Landes.

Une seule observation lors du passage prénuptial :

- 1 le 21/05 en pause migratoire sur les BDD de Bresles (PLF).

Le passage postnuptial est par contre, mieux marqué avec 4 observations :

- 4 en vol le 22/11 à Buy (D.Leleu)
- 46 en vol le 22/12 à Gouvieux (JBM-MCJ)
- 56 en vol le 22/12 à Chamant (HdeL)
- 4 en vol le 22/12 à Auger-Saint-Vincent (HdeL)

Échasse blanche *Himantopus himantopus*

La nidification de l'Échasse blanche en France est surtout liée au littoral.

En 2000 l'Échasse blanche a été notée nicheuse pour la deuxième fois dans le département de l'Oise.

C'est à Houdancourt qu'a eu lieu la nidification. Un couple a élevé quatre jeunes jusqu'à l'envol du 12/05 au 21/08. (MATHOT 2001)

L'Échasse blanche est observée également à Vauciennes lors du passage prénuptial où 3 individus sont notés le 14/05 (PMS) ainsi qu'à Chevières où 2 ad et 4 juv sont vus le 16/08 (AR). Pour cette dernière observation, la proximité des sites, les dates et la répartition de l'effectif laissent penser qu'il s'agit probablement des individus qui ont niché à Houdancourt.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

Cette espèce, nicheuse exceptionnelle en Picardie, est migratrice dans notre département. Toutes les observations ont été faites au cours du passage prénuptial :

- 1 les 09 et 10/03 sur le plan d'eau du Canada à Beauvais (FB)
- 1 le 29/03 au même endroit (FB)
- 6 le 09/04 à Longueil-Sainte-Marie (JPF)
- 3 le 23/05 sur les bassins de décantation de la sucrerie de Chevières à Houdancourt (FB)

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

Une seule observation en 2000 : 1 le 06/05 à Grandvilliers (GP)

Les recensements nationaux mentionnent des effectifs en baisse probable de 25 à 50% depuis les années 70 (Malvaud, F. in Rocamora, G. & Yeatman-Berthelot, D. (1999) *Oiseaux menacés et à surveiller en France*). En 2000, dans le département, les prospections pour repérer l'oedicnème criard n'ont pas été suffisantes. A l'avenir, il sera nécessaire de suivre de façon plus méthodique, en prospectant aux bonnes périodes, non seulement les sites connus, mais également les milieux potentiellement favorables.

Petit gravelot *Charadrius dubius*

Les premiers migrants arrivent à la mi-mars :

- 2 le 10/03 sur les rives du plan d'eau du Canada à Beauvais (FB)
- 3 le 12/03 sur les bassins de décantation de Chevrières (DL)
- 4 le 14/03 et 8 le 18/03 à Longueil-Sainte-Marie (JPF)
- 14 le 27/03 à Houdancourt (PMS)

Nidification



Premiers indices de nidification :

- 2 nicheurs le 28/04 à Trosly-Breuil (JMV)
- Puis :
- 2 couples le 17/05 à Moru-Pontpoint (PMS)
- 1 couve le 18/05 à Vauciennes (PMS)
- 4 dont 3 paracent le 21/05 à Houdancourt (FB)
- 1 mâle alarme le 31/05 à Morlincourt (MR)
- 2 paracent le 02/06 à Houdancourt (FB)
- 1 couple est cantonné le 06/06 aux gravières de Boran-sur-Oise (YB)
- 1 couve le 16/08 à Moru-Pontpoint (FB)


Les premiers juvéniles sont vus à partir du 23/05 :

- 2 adultes et 1 juv le 23/05 à Houdancourt (FB)
- 3 pullis le 11/06 à Vauciennes (PMS)
- 1 juv le 30/06, le 15/07 et le 20/07 à Houdancourt (WM) (FB)
- 3 juv le 26/07 et le 30/07 à Houdancourt (FB)
- 6 juv le 31/07 à Houdancourt (FB)
- 3 juv le 05/08 à Houdancourt (FB)
- 3 immatures le 11/08 sur les BDS de Chevrières (DL)
- 3 juv le 21/08 à Houdancourt (FB)

Deux observations sont faites hors des milieux humides :

- 1 le 14/05 à Silly-le-Long près d'un dépôt de sable et de gravier (HdL)
- 1 couve sur une plate-forme de gaz à Lataule (PMS)

Bien qu'inhabituel, ce milieu n'est pas trop surprenant car ce site, composé d'une étendue dégagée, recouverte de gravillons, ressemble aux plages de cailloux fréquentées par l'espèce, de plus le périmètre est clos par un grillage qui en interdit l'accès au public. Les petits gravelots bénéficient donc d'une totale tranquillité.



Les concentrations sont maximums à Houdancourt :

- 18 le 19/05 (WM)
- 12 le 06/07 (WM)
- 16 le 27/07 (PMS)
- 10 les 17 et 29/08 (FB) (JPF)
- 15 le 04/09 (PMS)
- 13 le 08/09 et 15 le 15/09 (WM)


Les derniers sont encore présents dans la dernière décade de septembre :

- 2 le 23/09 au lieu dit le Barrage à Longueil-Sainte-Marie (FB) (PMS)
- 2 le 24/09 et 2 le 30/09 aux BDD de Vauciennes (PMS).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

Migrateur dans notre département, le Grand Gravelot est essentiellement observé sur les bassins de décantation des sucreries.

Houdancourt et Vauciennes en sont les bastions cette année. En dehors de ces milieux artificiels hautement anthropiques, seul le plan d'eau situé au lieu dit "le Barrage" sur la commune de Longueil-Sainte-Marie (ancienne gravière vaguement réaménagée) a reçu la visite des Grands Gravelots.



Les premiers migrateurs sont notés dès le 14/05 et jusqu'au 04/06 avec des effectifs maxima de :

- 10 le 18/05 à Vauciennes (PMS)
- 13 le 19/05 à Houdancourt (FB)
- 19 le 22/05 à Vauciennes (AR)
- 12 le 26/05 à Houdancourt (FB)

La migration postnuptiale commence le 15/07 à Houdancourt.

Des oiseaux seront vus jusqu'au 01/10 avec des effectifs moins importants que lors du passage prénuptial (maxi : 11 le 15/09 à Houdancourt (FB)) mais sur une plus grande période (9 décades contre seulement 3 décades pour la migration prénuptiale).

Des juvéniles sont présents à trois reprises :

- 1 le 15/07 à Houdancourt (FB)
- 2 le 17/09 à Vauciennes (AR)
- 1 le 22/09 à Houdancourt (PLF)

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

L'année commence par la présence des hivernants de la saison 1999/2000 avec un effectif moyen de 171 individus jusqu'à la dernière décade de janvier et un maxi de 870 le 23/01 à Boran-sur-Oise (HdeL).

Un premier regroupement prénuptial est constaté le 01/02 avec 1200 Pluviers dorés à Troissereux (HdeL). Un deuxième regroupement plus important le 15/02 avec 3700 individus à Luchy (HdeL) semble marquer le départ de la migration, 590 le 15/02 à Le Crocq, 170 le 15/02 à Feuquières, 800 le 19/02 à Lattainville, 650 le 19/02 à Boran-sur-Oise, 2400 le 26/02 à Morienvall, 600 le 03/03 à Saint-Etienne-Roilaye, qui s'achèvera le 05/03 par l'observation de 750 individus à Saint-Etienne-Roilaye (JMV)

Les premiers signes de la migration postnuptiale 2000/2001 sont notés le 24/09 avec un "éclairateur" en vol migratoire à Morienvall-Brassoir (PMS) puis 21 individus le 19/10 à Séry-Magneval (HdeL). D'importants effectifs sont mentionnés à Trumilly : 800 le 22/11 (JPF), Sarnois : 2030 le 11/12 (HdeL), Hadancourt-le-Haut-Clocher : 1200 le 17/12 (HdeL), Le Crocq : 1046 le 19/12 (HdeL), Laversines : 1470 le 22/12 (HdeL), Tillé : 1500 le 24/12 (HdeL), Nivillers : 1190 le 24/12 (HdeL)

Les effectifs 2000 sont comparables à ceux des années précédentes.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

La migration prénuptiale se concrétise par la présence d'oiseaux les 19, 20, 21 et 23/05 sur les bassins de sucrerie d'Houdancourt et de Vauciennes. Le 23/05, 2 pluviers sont vus ensemble. Le reste du temps il s'agit d'individus isolés.(FB-PMS-AR)

Deux données de migration postnuptiale sont collectées sur 2 jours : 1 le 25 à Rouvilliers et 3 le 26/10 à Barbey (HdeL)


A noter également la présence tardive d'un individu le 11/12 à Maignelay-Montigny (HdeL)

Vanneau sociable *Vanellus gregarius* (CHN)

1 H1 est noté à Romescamps avec 4000 vanneaux huppés et 800 pluviers dorés, du 24/11 au 26/11 (HdeL-PMS). Cette donnée a été homologuée par le CHN.

C'est la deuxième mention départementale pour ce migrateur oriental. En 1998 l'espèce a séjourné du 23/05 au 01/06 sur les bassins de décantation de la sucrerie de Vauciennes.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*



L'année commence par la présence hivernale, des Vanneaux sur l'ensemble des plateaux de culture (Plateau Picard, Valois...) du département ainsi que sur la quasi totalité des grands points d'eau.

Les effectifs continuent de croître jusqu'à la deuxième décade de février (arrivée de migrateurs pré-nuptiaux ?), pour atteindre un maxi de 4460 individus le 19/02 (HdeL)

Une baisse des effectifs, lors de la troisième décade de février semble annoncer le début de la migration pré-nuptiale. Un gros passage le 05/03 fait remonter ces effectifs à 1800 individus.

Le premier indice de nidification est noté le 19/03; un couple parade en plaine, près des bassins de décantation de Vauciennes (HdeL). C'est encore sur ce même site que sont aperçus 2 adultes avec 4 poussins le 18/05 (PMS) qui seront revus les 20 et 22/05 (AR-FB)

Autres indices de nidification dans le département :

- 3 couvent le 19/05, 6 couvent le 06/06 à Houdancourt (WM),
- 2 couples le 06/06 aux gravières de Boran (YB)

Pendant la deuxième décade de juillet, des regroupements annoncent les prémices de la migration postnuptiale : 284 le 18/07 à Houdancourt (WM), 300 le 23/07 à Vauciennes (PS). Ces effectifs progressent régulièrement jusqu'à la première décade d'octobre où les 1000 individus (effectif cumulé) sont atteints le 01/10 sur les sites de Vauciennes (30), Morienval « Brassoir » (574) et Courtieux (400)

Le maxi sur un seul site est atteint le 29/11 avec 6000 individus à Maignelay-Montigny (HdeL)

La migration postnuptiale est suivie régulièrement à Brassoir, sur la commune de Morienval :

658 le 24/09, 574 le 01/10, 735 le 02/10, 337 le 22/10, 230 le 05/11, 1297 le 09/11, 54 le 11/11.


Le maxi pour le département, le même jour sur plusieurs sites non contigus, (chiffage retenu pour le graphe) est quand à lui de 10250 le 11/12 (HdeL)

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

C'est au cours de la migration postnuptiale qu'un juvénile a séjourné du 04/09 au 09/09 sur les bassins de décantation d'Houdancourt (CL-PMS-FB-JPF-PM-RB-DS)

Un examen des observations des années antérieures nous permet de constater que le passage pré-nuptial, (3 mentions) se concentre sur les mois d'avril (1) et mai (2). Le passage postnuptial un peu mieux marqué (5 mentions) est étalé sur trois mois : août (2), septembre (2) et octobre (1)

Bécasseau minute *Calidris minuta*



Le passage pré-nuptial débute le 12/05 par la présence de deux individus sur les bassins d'Houdancourt (FB). Ce passage est peu marqué car seules deux autres observations seront effectuées par la suite :

1 le 14/05 à Vauciennes (PMS) et 5 le 30/05 à Houdancourt (WM)

Le passage postnuptial est lui, par contre, bien fourni en données. L'espèce est principalement observée à Houdancourt et, dans une moindre mesure à Vauciennes.

C'est à Houdancourt que le 25/07 sont notés les premiers migrateurs : 2 individus seront présents jusqu'au 03/08, puis 2 juvéniles du 26 au 30/08. Enfin l'espèce sera notée régulièrement sur le site jusqu'au 24/09 (JPF) avec un petit afflux du 04 au 09/09 dont un maxi de 5 le 04/09 (CL)

A Vauciennes quelques données éparses témoignent du passage postnuptial. C'est sur ce site que le maximum des effectifs est atteint : 10 le 30/07 (PMS)

Bécasseau de Temminck *Calidris Temminckii* (CHD)

Migrateur occasionnel dans le département, le Bécasseau de Temminck a été noté lors des deux passages migatoires.

-Au printemps : 1 le 14/05 à Vauciennes (PMS) et 1 le 19/05 à Houdancourt (WM)

-En été : 1 le 29/07 (PMS-FB) et 1 le 08/09 à Houdancourt (WM)

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* (CHN)

Cette espèce, originaire d'Amérique du nord et de Sibérie centrale, est occasionnelle dans notre département.

1 individu est vu tout d'abord à Vauciennes par Frédéric Bouchinet le 21/05. La présence d'un adulte est notée du 24 au 28/07 à Houdancourt (FB-PMS-AR-CL) et le 02/08 à Vauciennes (PMS). (Toutes ces données ont été homologuées par le CHN). Si l'on tient compte du caractère occasionnel de l'espèce, il est possible que l'oiseau présent du 24 au 28/07 à Houdancourt soit le même que celui vu 5 jours plus tard à Vauciennes mais cela n'est pas prouvé.


Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

La migration n'est perçue que pendant la migration postnuptiale. Aucune observation de l'espèce n'est réalisée au printemps. Les premiers migrateurs postnuptiaux sont vus à Vauciennes : 2 individus sont présents du 28 au 30/07 (PMS)

Par la suite, les bécasseaux cocorlis sont observés à Houdancourt : 1 le 06/08 (MV), 1 du 27/08 au 01/09 (PMS-FB-JPF-CL-YB), 10 le 04/09 (PMS-CL) 2 le 05/09 (PMS), 1 juvénile les 08 et 09/09 (FB-PMS-PMal-RB-DS)

Le dernier est noté à Vauciennes : 1 le 24/09 (PMS)

Bécasseau variable *Calidris alpina*



La migration prénuptiale est constatée dès la première décade de mars par l'observation de 2 individus le 09/03 à Beauvais sur le plan d'eau du Canada (FB). L'espèce sera revue sur les lieux jusqu'au 01/04 avec un maximum de 4 le 29/03 et le 01/04 (FB).

Puis : 1 le 04/04 à Chevières (AR), 1 le 19/05 à Houdancourt (WM) et 1 le 21/05 à Vauciennes (FB)

Les premiers migrateurs postnuptiaux sont notés le 09/07 à Vauciennes (PMS) puis 1 à 2 Bécasseaux variables seront vus sur les sites de Houdancourt, Longueil-Sainte-Marie et Grandvilliers.

Des juvéniles sont notés : 2 le 17/08 à Houdancourt (FB), 1 du 21/08 au 27/08 à Houdancourt (FB-PMS). La migration postnuptiale se termine le 22/09 à Houdancourt (PLF).


Quelques observations tardives sont faites en plaine :

2 le 11/12 à Sarnois, 1 le 11/12 au Plessier-Saint-Just et 1 le 19/12 à Luchy (HdeL)

Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* (CHN)


Il s'agit de la première mention départementale pour cette espèce occasionnelle.

2 du 18/05 au 20/05 sur les Bassins de décantation de Vauciennes (PMS-AR et aussi JY Frémont, A Larousse, E Gfeller) (Sengez P. & M 2000)



Bécasseau falcinelle juvénile
le 20 5 2000 à 13H30
Bassin de décantation
de Vauciennes de l'aire

Combattant varié *Philomachus pugnax*




- La migration prénuptiale est timide : 4 données pour 6 oiseaux. Premiers migrateurs : 2 le 12/03 à Chevières (DL), 1 le 19/03 à Vauciennes (HdeL), 2 mâles le 27/03 et 1 le 04/04 à Chevières (AR).
- Un couple est vu pendant la période estivale le 30/06 à Houdancourt (WM).
- La migration postnuptiale est beaucoup plus marquée : 50 données pour 157 oiseaux. Premiers migrateurs : 4 le 08/07 (HdeL), 1 le 09/07 (PMS) à Vauciennes, 8 le 15/07 (FB), 10 le 18/07 (WM) à Houdancourt.
- Derniers : 1 dans un champ le 24/11 à Romescamp (HdeL), 1 le 29/11 sur une flaque d'eau dans un champ à Maignelay-Montigny (HdeL).
- Maxi : 10 le 18/07 à Houdancourt (WM), 13 le 11/08 à Chevières (DL), 13 le 26/08 à Houdancourt (FB)

Bécassine sourde *Lymnocyrtus minimus* (CHD)

1 les 01, 02 et 03/12, 1 le 17/12 à Moru-Pontpoint (PMS-FB-CL)

Toujours très discrète, cette espèce n'est que très peu mentionnée dans les carnets des observateurs. La Bécassine sourde n'a été notée dans l'Oise qu'en 1985 et 1993

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*



L'espèce est vue sur les sites de Chevières, Grandvilliers, Houdancourt, Longueil-Sainte-Marie, Moru-Pontpoint, Romescamps, Saint-Félix, Sacy-le-Grand, Vauciennes ainsi qu'en forêt de Compiègne. Les effectifs sont faibles et aléatoires en début d'année, en hausse à la première décennie d'août, atteignent un maxi cumulé de 81 individus le 16/09 à Houdancourt (80) (PM-RB-DS) et Sacy-le-Grand (1) (PM-RB-DS), redescendent à 20 individus à la première décennie d'octobre et redeviennent faibles et aléatoires jusqu'à la fin de l'année. La concentration constatée de la troisième décennie de juillet à la première décennie d'octobre marque bien le passage postnuptial.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

20 mentions pour 37 oiseaux.

L'espèce est présente toute l'année dans les grands massifs forestiers mais c'est surtout au mois de mars en période de coule que les données sont les plus nombreuses.


La bécasse des bois est notée en janvier (2), février (2), mars (9), mai (2), juin (1), septembre (1) et décembre (3) (entre parenthèse le nombre de mentions) dans la Forêt de Compiègne parcelles 825, 833, 834, 837, 838, 840, 853, 854, 855, 3082, 3092, 3232, 5432, 6122, 7222, 7311, 8331, 9103 ainsi qu'au carrefour de Flore.

Forêt de Chantilly parcelles 175, 191, 213.

Forêt d'Ermenonville parcelle 55.

Forêt de Hez "les Croisettes".

et dans quelques bois à : Mareuil-la-Motte "bois de la Chaudière", Nointel "bois des Côtes", Béthisy-Saint-Martin "Berlette".



Dessin : M. Votte

Barge à queue noire *Limosa limosa*

Migratrice dans l'Oise.

Migration prénuptiale :

- 3 les 08 et 09/03 à Moru-Pontpoint (JPF),
- 7 le 12/03 à Chevières (DL)
- 2 le 19/03 à Bresles sur les anciens bassins de sucrerie (FB),
- 2 le 27/03 et 1 le 04/04 à Chevières (AR)
- 1 le 28/05 à Vauciennes (PM-RB-DS)
- 7 le 28/05 à Houdancourt (WM)

Migration postnuptiale :

- 1 le 13/08 à Houdancourt (PMS-AR)

Barge rousse *Limosa lapponica* (CHD)

1 le 02/08 à Vauciennes (PMS)

Cette migratrice rare dans l'Oise fréquente principalement les zones côtières.

Courli corlieu *Numenius phaeopus* (CHD)

Migrateur et hivernant dans les marais littoraux de l'ouest de la France.

Migrateur rare dans l'Oise : 1 le 18/07 à Houdancourt (WM).

Une observation des effectifs des années antérieures montre une concentration des passages en avril pour la migration prénuptiale et en août pour la migration postnuptiale.

Courlis cendré *Numenius arquata*

Peu d'observations cette année.

Passage prénuptial : 1 le 03/08 à Moru-Pontpoint (PMS), 1 le 04/08 à Houdancourt (PMS)


Passage postnuptial : 1 le 01/10 à Morienvall "Brassoir" (PMS), plusieurs en passage nocturne le 19/10 à Pierrefonds (FS-RF-Ecothème), 4 le 30/12 à Moru-Pontpoint (AR).

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*


L'espèce n'est notée que lors de la migration postnuptiale qui s'étend sur une période de 48 jours du 03/08 au 24/09 sur les sites de Houdancourt, Longueil-Sainte-Marie, Moru-Pontpoint et Vauciennes,

Un maxi de 8 individus est noté le 31/08 à Houdancourt (YB)

Une donnée tardive : 1 le 08/11 à Moru-Pontpoint (PMS)




Chevalier gambette *Tringa totanus*



Le premier migrateur est vu à Beauvais sur le plan d'eau de la base nautique du Canada le 03/03 (FB)
Un maxi cumulé de 18 oiseaux, sur les sites de Beauvais (13) et Chevrières (5), est constaté le 12/03 (DL-FB) Les premiers rassemblements annonciateurs de la migration postnuptiale sont notés le 06/06 avec un total cumulé de 16 individus sur les sites de Houdancourt (15) et Grandvilliers (1). Les derniers migrateurs sont notés le 22/09 à Houdancourt (PLF)

Le Chevalier gambette a été noté sur les sites de : Beauvais (Canada), Chevrières, Etavigny, Grandvilliers, Houdancourt, Longueil-Sainte-Marie, Moru-Pontpoint et Vauciennes.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*



La migration prénuptiale, de faible ampleur, 15 mentions pour 46 oiseaux, s'étend du 16/04 au 30/05. Premiers migrateurs : 1 le 16/04 à Vauciennes, 3 le 22/04 à Verberie, 6 le 22/04 à Houdancourt (PMS), 1 le 28/04 à Houdancourt (WM), 2 le 29/04 à Longueil-Sainte-Marie.

Un maxi cumulé de 9 est noté le 22/04 à Verberie aux Remises d'Herneuse (3) et à Houdancourt (6) (PMS)

La migration postnuptiale beaucoup plus marquée, 68 mentions pour 285 oiseaux, s'étend du 02/07 au 01/10.


Premiers migrateurs : 3 le 02/07 à Bresles (FB), 2 le 13/07 à Houdancourt (WM), 1 le 14/07 à Moru-Pontpoint (FB), 1 le 15/07 à Moru-Pontpoint (PMS), 1 le 15/07 à Houdancourt (FB)

Derniers : 5 le 23/09 à Houdancourt (WM), 1 le 24/09 à Vauciennes (PMS), 1 le 24/09 à Houdancourt (JPF), 1 le 27/09 à Houdancourt (WM), 1 le 01/10 à Vauciennes (FB-PMS)

Maxi cumulés : 33 le 25/08 à Houdancourt et Grandvilliers (PMS-GP)

Sites visités : Bresles, Grandvilliers, Houdancourt, Longueil-Sainte-Marie, Morienvall, Moru-Pontpoint, Saint-Germer-de-Fly, Vauciennes et Verberie.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*




L'espèce est notée pendant tous les mois de l'année sauf en mai. La migration prénuptiale dans l'Oise est notée entre le 7 mars et le 16 avril. Les effectifs sont plus importants pour la migration postnuptiale qui est notée du 4 juin à la dernière décade de septembre. Deux pics sont atteints le 18/07 avec un effectif cumulé de 28 individus sur les sites de Saint-Crépin-Ibouwillers (1) (JBM-MCJ), Houdancourt (20) (WM) et Bresles (7) (FB), et le 11/08 avec un effectif cumulé de 29 individus sur les sites de Chevrières (22) (DL) et Vauciennes (7) (HdeL). Des hivernants sont notés en janvier, février, novembre et décembre avec des petits effectifs maxi cumulés de 7 le 15 janvier à Verberie et Chevrières (FB-CL), 5 le 30 janvier à Chevrières (DL) et 5 le premier novembre à Vauciennes (YB)

Chevalier sylvain *Tringa glareola*


La migration prénuptiale est minime, 2 données pour 2 oiseaux :

1 le 21/03 à Longueil-Sainte-Marie (JPF), 1 le 14/05 à Vauciennes (PMS).

La migration postnuptiale, beaucoup mieux représentée, débute par la présence d'un individu le 08/07 sur les BDD de Vauciennes (HdeL). Un afflux d'oiseaux au mois d'août se concrétise par un pic de 28 oiseaux cumulés sur les sites de Vauciennes (20) et Houdancourt (8) le 17/08 (PMS-FB). Les derniers seront vus à Houdancourt : 2 le 20/09 (MV)



Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*



La migration postnuptiale (98 mentions pour 479 oiseaux sur 11 décades) est mieux fournie en effectifs et d'une durée plus longue que la migration prénuptiale (41 mentions pour 114 oiseaux sur 9 décades). La saison commence par la présence d'un possible hivernant, à moins qu'il ne s'agisse d'un migrateur précoce, le 04/02 sur le plan d'eau du Canada à Beauvais (FB).

Le passage prénuptial débute réellement le 09/03 et va durer jusqu'au 26/05. Un maxi de 16 sera noté le 03/05 à Breuil-le-Sec (FB).

Les premiers regroupements postnuptiaux sont effectifs dès le 06/07. Un effectif cumulé maxi de 65 individus sur deux sites, Vauciennes (50) et Houdancourt (15) sera noté le 30/07 (PMS-AR).

Les derniers sont notés en octobre : 1 le 06/10 à Houdancourt (WM), 1 le 08/10 à Beauvais (FB) et 1 le 24/10 à Longueil-Sainte-Marie (JPF).

Le Chevalier guignette a été noté à : Bailleul-sur-Thérain, Beauvais (plan d'eau du Canada), Boran-sur-Oise, Bresles, Breuil-le-Sec, Campagne, Chevrières, Grandvilliers, Houdancourt, Longueil-Sainte-Marie, Morlincourt, Moru-Pontpoint, Saint-Félix, Trosly-Breuil, Varesnes, Vauciennes et Verberie.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* (CHR)

1 H1 le 11/10 à Moru-Pontpoint (FB)

Classée comme nicheuse et hivernante rare en France cette espèce, principalement pélagique en hiver, n'est observée dans le département que depuis les années 90.

Mouette pygmée *Larus minutus*

Cette migratrice peu commune est observée régulièrement dans l'Oise aux passages migratoires avec des effectifs toujours modestes.


Une observation hivernale probablement due à la tempête du 26/12/999 mentionne 2 individus le 02/01 à Moru-Pontpoint (YB), Migration prénuptiale : 3 dont 1 H1 le 10/03 sur les BDD de la sucrerie de Chevrières à Houdancourt (WM), 1 H1 le 04/04 à Houdancourt (AR)

Passage postnuptial : 1 juv le 19/08 à Houdancourt (PMS), 1 juv les 19 et 21/08 à Moru-Pontpoint (PMS-FB), 2 juv les 22 et 23/08 à Houdancourt (PMS)

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

L'espèce est présente toute l'année, mais c'est durant l'hiver que ses effectifs atteignent leur maximum.

De remarquables concentrations ont eu lieu en janvier et février, principalement sur le site de Moru-Pontpoint. C'est d'ailleurs sur ce site que le maximum est atteint le 15 février avec un total de 4900 Mouettes rieuses (WM). Il semble que l'espèce utilise le secteur de Moru-Pontpoint et principalement le bassin n°5 comme dortoir. (Des comptages ont eu lieu jusqu'à la tombée de la nuit et l'espèce continuait d'affluer dans l'obscurité.) Par ordre d'importance, Moru-Pontpoint, Bailleul-sur-Thérain et Houdancourt sont les trois plans



d'eau de l'Oise où les effectifs de Mouettes rieuses ont atteint un minimum de 1000 individus.

Effectifs maxi (>100) par sites principaux :

Moru-Pontpoint 4900 le 15/02, Bailleul-sur-Thérain : 1000 le 21/01, Houdancourt 1500 le 01/02, Les étangs de Commelles 119 le 16/01, parc du château de Chantilly 237 le 16/01, Bresles 300 le 02/07, Grand-Vivier 240 le 05/11, Vierville 152 le 17/12, Hadancourt-le-Haut-Clocher le 17/12, Gouvieux 180 le 29/12.

Les indices de nidification sont notés du 28/04 au 18/07 sur les communes de : Bresles, Chevières, Etavigny, Houdancourt et Sacy-le-Grand.

Goéland cendré *Larus canus*

Contrairement à la Mouette rieuse, le Goéland cendré n'est présent qu'en petite quantité sur notre département. Hormis les 14 individus du 30/12 à Moru-Pontpoint (AR) et les 12 individus du 14 août à Longueil-Sainte-Marie (JPF), tous les effectifs sont inférieurs à la dizaine d'unité. La fréquentation est régulière en janvier, février et mars et au cours de la troisième décennie de décembre. C'est sur les gravières de Moru-Pontpoint que le stationnement de Goéland cendré est le plus remarquable.

Récapitulatif des observations par site :

- Moru-Pontpoint : 2 (1 ad+1 H1) le 02/01 (YB), 1 ad le 20/01 (FB), 4 (1 ad+3 H1) le 31/01 (AR), 1 ad le 27/03 (AR), 1 H1 le 23/12 (YB), 14 (5 ad) le 30/12 (AR)
- Houdancourt : 2 le 23/02 (1 H1) (YB), 1 le 22/08 (PMS)
- Beauvais "Plan d'eau du Canada" : 2 H2 le 10/03 (FB)
- Longueil-Sainte-Marie : 12 le 14/08 (JPF)
- Gravières de Boran : 2 H1 le 26/08 (YB)


Goéland brun *Larus fuscus*

Cette espèce fréquente volontiers les plans d'eau de l'intérieur qu'elle utilise comme dortoir. C'est à partir de la troisième décennie de juin et jusqu'à la troisième décennie d'octobre que les effectifs sont les plus importants. Cette période correspond à celle de l'émancipation des jeunes et cet afflux est peut-être dû à un erratisme des juvéniles ou des adultes non-reproducteurs.

C'est sur les gravières de Moru-Pontpoint que l'espèce atteint ses effectifs maximaux : 52 le 22/08, 186 le 11/09, 56 le 13/09, 47 le 20/09, 86 le 25/10.


Ailleurs les effectifs atteignent des maxi sur les sites de Bresles : 86 le 29/06, 56 le 02/07, 47 le 18/07, 98 le 02/08 et de Morienval : 44 le 17/11 sur le site de migration de Brassoir.

Le Goéland brun est noté à : Bailleul-sur-Thérain, Barbery, Boran-sur-Oise, Bresles, Compiègne, Duvy, Houdancourt, Huleux, La Chaussée, La Rue-Saint-Pierre, Longueil-Sainte-Marie, Brassoir, Moru-Pontpoint, Néry, Raray, Verberie, Villeneuve-sur-Verberie.



Goéland argenté *Larus argentatus*

La présence du Goéland argenté est régulière tout au long de l'année avec des effectifs fluctuants. Ces effectifs sont faibles du début de l'année à la troisième décennie de juin, exception faite pour la troisième décennie de janvier : 88 à Bailleul-sur-Thérain (FB). Puis ils remontent progressivement pour culminer à 200 individus le 02 septembre à Cires-lès-Mello (JLB). Un nouveau pic est enregistré le 5 novembre avec 171 Goélands argentés entre Crépy-en-Valois et Duvy (MV). Bizarrement les mois de décembre et janvier ne fournissent que peu de données concernant l'espèce.



Goéland leucophaea *Larus michahellis* (CHD)

La présence du Goéland leucophaea dans l'Oise semble se normaliser de plus en plus. Visible tous les ans depuis 1991 ses effectifs progressent régulièrement. En 2000, le Goéland leucophaea est visible de la troisième décennie de mai à la troisième décennie d'octobre. Une mention hivernale est faite le 15/01 à Boran-sur-Oise (YB). C'est au cours du mois d'août que l'espèce est la plus fréquente : 7 (4 ad+2 E2+1 juv) le 22/08 à Moru-Pontpoint (FB), 1 E3 le 23/08, 89 le 26/08 aux gravières de Boran-sur-oise (YB), 45 le 29/08 sur la décharge d'Yvilliers (YB) et 90 le 29/08 à Moru-Pontpoint (YB). La dernière observation est faite le 01/11 à Duvy (YB).

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* (CHD)

Une observation inhabituelle est faite de cette espèce pélagique dont la présence dans le département est souvent due à de gros coups de vent d'ouest qui égarent les oiseaux dans l'intérieur des terres.

L'unique mention est faite le 18/01 à Moru-Pontpoint (WM), plus de 8 jours après la tempête qui a sévit sur tout le front atlantique.

Par le passé, seules trois mentions témoignent de la présence de l'espèce dans notre département : 1 en 1995 et 2 en 1998.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

Les premières sont notées à Moru-Pontpoint :

1 le 26/03 (PMS), 1 le 02/04 (PMS), 3 le 04/04 (WM),

à partir de cette date, la Sterne pierregarin semble installée sur le site puisqu'elle est vue régulièrement avec un effectif variant de 2 à 8 individus jusqu'à la première décade de mai. C'est à cette époque que sont notés les premiers indices de nidification :

- 8 dont quelques uns semblent couvrir le 02/05 sur M15 (WM)

- 16 individus dont 8 nids le 16/05 sur M17 (FB)

- 2 dont 1 couve le 17/05 sur M15 (PMS)

- 16 dont 7 couvent le 17/05 sur M17 (PMS)



Dessin : W. Mathot

Puis la nidification s'arrête là. Les nids sont abandonnés, aucun juvénile n'est signalé. Il s'agit sans doute du résultat des nombreux dérangements de tout genre (véliplanchistes, chiens errants, baigneurs etc) dont malheureusement sont victimes les couvées de Sternes pierregarin.

Dernières mentions : 1 le 08/08 à Houdancourt (FB), 1 le 08/08 à Moru-Pontpoint (FB), quelques-unes le 11/08 à Chevières (DL), 2 le 13/08 à Houdancourt (AR), 3 le 17/09 au plan d'eau du Canada de Beauvais (FB)

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* (CHD)

Une seule observation de cette espèce migratrice : 3 le 04/04 à Houdancourt (AR)

La Guifette moustac est occasionnelle dans le département. On ne totalise que 11 mentions pour 26 individus de 1984 à 2000. Les observations sont majoritaires en mai (8 mentions-21 individus) et avril (2 mentions et 4 individus). Une seule mention est faite en juillet.

Un accouplement a déjà été noté sans suite le 09/05/98 aux marais de Sacy-le-Grand (ALK). Il n'est pas impossible, dans le futur, de la voir nicher dans l'Oise à condition qu'elle trouve des milieux propices.

Guifette noire *Chlidonias niger*

La Guifette noire est classée comme espèce en déclin en Europe et vulnérable en France.

Cette migratrice régulière dans l'Oise, est observée avec des effectifs modestes et une période d'égale durée lors des deux passages migratoires. Le passage prénuptial, concentré sur le mois de mai, dure 27 jours :

- 1 le 01/05 à Bailleul-sur-Thérain (FB)
- 1 le 07/05 à Moru-Pontpoint (PMS)
- 3 le 08/05 sur le plan d'eau du Canada à Beauvais (FB)
- 3 le 12/05 à Houdancourt (FB)
- 1 le 16/05 à Moru-Pontpoint (FB)
- 1 le 26/05 à Houdancourt (WM)

le passage postnuptial, en août et septembre, s'étale sur 28 jours

- 1 juv le 21/08 à Moru-Pontpoint (FB)
- 2 juv le 28/08 à Houdancourt (FB)
- 1 le 17/09 à Houdancourt (PLF)
- 1 imm le 17/09 à Grandvilliers (GP)
- 10 le 17/09 sur le plan d'eau du Canada à Beauvais (FB)

Cette dernière mention est remarquable par la quantité de ses effectifs.

Pigeon biset *Columba livia*

Pas de donnée particulière pour cette espèce anthropophile.

Pigeon colombin *Columba oenas*

La fin de l'hiver 1999/2000 ne produit qu'une donnée : 1 chanteur le 16/01 à Chantilly (JMG).

Le passage prénuptial est bien discret, pas de groupe observé, seulement quelques individus en février et mars hors des massifs forestiers : 2 le 23/02 à Houdancourt (YB), 1 à Verberie " Remises d'Herneuse " et 2 à Longueil-Sainte-Marie " le Bois Harlé " le 05/03 (FB), 2 à Verberie " Remises d'Herneuse " le 07/03 (WM) et au moins 10 à Chevières " bassins de décantation " (AR) le 27/03.

La nidification est suspectée sur les sites suivants :

- Forêt de Compiègne : 9 chanteurs et 1 couple repérés (AR, JLB, YB, JPC, PMS).
- Breuil-le-Sec " Etangs communaux " : 1 chanteur (FB).
- Breuil-le-Sec " Bois des Côtes " : 1 chanteur (FB).
- Forêt d'Ermenonville : 7 chanteurs (JLB).
- Forêt de Hez-Froidmont : 2 chanteurs (FB, YL).
- Forêt de Chantilly : 1 chanteur et 2 couples (JLB).
- Houdancourt " bassins de décantation " : 1 explore les tuyaux d'arrivée d'eau le 27/03 (FB).
- Chevières " bassins de décantation " : des chanteurs notés parmi 20 individus le 16/07 (AR).
- Chantilly " Parc du Château et Canaux " : 3 chanteurs (JMG).
- Noailles : 1 chanteur (YL).
- Neuilly-sous-Clermont : 1 chanteur (YL).

En mai et juin, l'espèce s'observe sur d'autres sites sans qu'il soit possible d'y prouver un comportement reproducteur : 2 le 07/05 et 1 le 04/06 aux marais de Sacy-le-Grand (JLB), 1 le 19/05 (AR) et 5 le 20/05 (PMS) à Vauciennes " bassins de décantation ", 5 le 12/06 aux gravières de Saint-Maximin (YB), 1 le 28/06 à Puisieux-le-Hauberger (YB), 5 le 29/06 à Gouvieux (YB) et 4 le 30/06 à Lamorlaye " Marais du Lys " (YB).

La migration postnuptiale s'observe dès août et jusqu'à début novembre avec 20 le 13/08 à Chevières " bassins de décantation " (AR), 9 aux gravières de Boran-sur-Oise et 3 à l'aérodrome de Creil le 23/08 (YB), 1 le 29/08 à Senlis (YB), 1 le 30/08 à Vauciennes " bassins de décantation " (AR), 1 le 30/08 à Saint-Félix (YL), 3 le 09/09 à Berneuil-sur-Aisne (MV), 1 le 02/10 à Moru-Pontpoint (FB) et 2 le 08/10 aux gravières de Boran-sur-Oise (YB).

Le site de migration de Morienvall " Brassoir " voit le passage de 133 individus entre le 10/09 et le 04/11 (MV, PMS, JPB, CG) avec 123 le 22/10 (MV, JPB, CG).

Seulement deux données de début d'hivernage 2000/2001 avec 68 à Varesnes le 10/12 (MR) et 1 dans le secteur Néry, Vérines, Rocquemont le 17/12 (AR).

Pigeon ramier *Columba palumbus*

La fin de l'hivernage 1999/2000 et la migration prénuptiale en février-mars permettent d'observer quelques groupes mais rien de bien spectaculaire cette année : 500 le 02/01 en Forêt de Hez-Froidmont (FB), 150 le 09/01 en Forêt de Chantilly (JLB), 250 le 30/01 en Forêt de Hez-Froidmont (FB), 130 le 04/02 en Forêt de Chantilly (JLB), 300 le 12/02 en Forêt de Compiègne (JLB), 185 le 18/02 aux gravières de Boran-sur-Oise (YB), 150 le 20/02 à Moru-Pontpoint (FB), 100 le 20/02 en Forêt de Chantilly (JLB), 200 le 01/03 en Forêt de Hez-Froidmont (FB), 227 le 16/03 à Mouy (YB) et encore 90 le 26/03 à Dieudonné (YB).

La reproduction est trop peu suivie ce qui ne témoigne aucunement de la situation réelle dans l'Oise pour cette espèce avec notamment un seul indice certain de nidification relevé à Breuil-le-Sec (FB).

La migration postnuptiale est notée en octobre et novembre et présente des effectifs plus fournis : sur le site de migration de Morienvall " Brassoir ", un total de 7481 individus est noté entre le 14/10 et le 26/11 dont 7000 ce dernier jour (MV, JPB, CG). D'autres groupes sont notés d'octobre à décembre : 200 le 21/10 à Berneuil-sur-Aisne (MV), 150 le 29/10 en Forêt de Compiègne (MV), 400 le 05/11 à

Saint-Etienne-Roilaye (MV), 300 le 08/11 à Moru-Pontpoint (FB), 800 le 10/11 à Moulin-sous-Touvent (HdeL), 120 le 26/11 en Forêt d'Ermenonville (YB), 310 le 02/12 à Vauciennes (JPB, CG), 200 le 09/12 à Moru-Pontpoint (Geor 60) et 1500 le 17/12 à Amblainville (HdeL).

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

Quelques rassemblements sont notés en fin d'été, en automne et en hiver, toujours près des zones habitées : 31 le 15/01 à Boran-sur-Oise (YB), 36 le 20/08 à Crépy-en-Valois (HdeL), 17 le 09/09 à Néry (PMS), 13 le 17/09 à Bailleval (FB), 37 le 27/09 à Gournay-sur-Aronde (FB), 14 le 15/11 à Breuil-le-Vert (FB), 73 le 16/12 à Cuisse-la-Motte (MV) et 18 le 20/12 à Vineuil-Saint-Firmin (JMG).

L'espèce est notée nicheuse certaine à Lamécourt et Breuil-le-Sec (FB).

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

Première : 1 le 20/04 à Saint-Félix (FB, YL).

Une donnée de migration prénuptiale : 3 en vol N-NE à Villembray le 06/05 (HdeL).

Des chanteurs ou couples sont notés par la suite à Apremont, Boran-sur-Oise, Chevrières, Cires-les-Mello, Dieudonné, Gouvieux, Morlincourt, Mouy, aux Marais de Sacy-le-Grand, Saint-Maximin, en forêt de Compiègne et d'Ermenonville (JLB, JMG, YB, AR, MR).

Les premiers rassemblements postnuptiaux sont notés dès le 03/08 avec 50 individus à Orrouy " Champlieu " (PMS), 18 le 08/08 sur le même site (PMS), 25 le 08/08 à Morienvall (PMS), 26 le 13/08 à Moru-Pontpoint (PMS), 27 le 19/08 à Moru-Pontpoint et 20 ce même jour à Chevrières (PMS), 17 le 21/08 à Moru-Pontpoint (FB), 21 le 12/09 à Moru-Pontpoint (PMS).

Dernières : 3 le 19/09 à Moru-Pontpoint (FB).

Coucou gris *Cuculus canorus*

Premier : 1 chanteur le 04/04 à Breuil-le-Vert " Marais de Giencourt " (FB).

L'espèce est notée nicheuse certaine à Orrouy : 1 juvénile volant nourri par un Accenteur mouchet le 12/07 (PMS). Des chanteurs sont également notés à Angy, Appilly, Apremont, Boran-sur-Oise, Chantilly, Courteuil, aux marais de Sacy-le-Grand, à Saint-Maximin, Vineuil-Saint-Firmin, en forêt de Compiègne, d'Ermenonville et de Chantilly.

A noter une femelle de forme rousse à Bresles " Le Grand Marais " le 24/04 (FB).

Dernier : 1 le 01/09 à Lamorlaye (YB).

Effraie des clochers *Tyto alba*

Nicheuse à Braisnes ou Jean Becker signale 3 jeunes au nichoir cette année. Cela fait maintenant 18 ans que que les nichées s'y succèdent.

Ailleurs, l'espèce est contacté à Carlepont, Gouvieux, Margny-sur-Matz, Monchy-Saint-Eloi, Morienvall, Orrouy et Sérifontaine.

1 individu est trouvé mort en bord de route le 01/09 à Marseille-en-Beauvaisis.

Petit-duc scops *Otus scops*

Un renouveau pour ce petit nocturne qui semble vouloir se réinstaller dans notre région, en Forêt Domaniale d'Ermenonville. L'espèce se maintiendra-t-elle à l'avenir ?

Nous n'avons jusqu'à présent que des contacts sonores :

- 1 chanteur le 20/05 (JLB)
- 1 chanteur le 18/06 sur le même site prospecté qu'en 1999 (JLB)

Chevêche d'Athéna *Athene noctua*

Un effort de prospection s'est engagé pour plusieurs années afin de mieux connaître sa répartition dans le département, effectué notamment par Henry de Lestanville.

Pays de Bray (HdeL) :

- Blacourt : 1 alarme le 07/04
- Cuigy-en-Bray : 3 chanteurs le 22/03
- Lachapelle-aux-Pots : 2 individus sur 2 sites le 22/03
- Ons-en-Bray : 3 couples et 3 chanteurs le 22/03
- Saint-Aubin-en-Bray : 2 chanteurs le 22/03
- Lhéraule : 1 individu vu le 07/04
- Saint-Germer-de-Fly : 1 chanteur le 08/04
- Saint-Pierre-ès-Champs : 3 chanteurs le 08/04
- Lalandelle : 2 chanteurs le 08/04
- Villers-Saint-Barthélémy : 1 chanteur le 22/03

Plateau Picard :

- La Neuville-Vault : 4 chanteurs le 07/04 (HdeL)
- Pierrefitte-en-Beauvaisis : 2 couples et 3 chanteurs le 07/04 (HdeL)
- Blicourt : 1 chanteur timide le 23/09 (HdeL)
- Lihus : 1 couple et 1 chanteur le 10/04 (HdeL)
- Le Hamel : 1 chanteur le 10/04 (HdeL)
- Prévillers : 1 chanteur le 10/04 (HdeL)
- Rotangy : 1 couple et 1 chanteur le 10/04 (HdeL)
- Sarcus : 1 individu posé sur un pommier le 30/08 (HdeL)
- Coivrel : 1 individu le 24/07 (FS)

Noyonnais :

- Béhéricourt : 1 individu entendu le 01/02 (MR)
- Margny-sur-Matz : 1 couple à Bourmont le 05/07 (WM)

Thelle :

- Le Coudray-Saint-Germer : 2 chanteurs le 08/04 (HdeL)
- Puiseux-en-Bray : 2 chanteurs le 08/04 (HdeL)
- Ivry le Temple 1 individu le 19/08 (JBM, MCJ)

Vexin Français :

- Chavençon : 1 poussin sorti du nid en mai, élevé au centre de soins de l'Envol (Eric -Désesquelles)

Soit un total de 8 couples 33 chanteurs et 9 individus représentant 58 oiseaux.


Chouette hulotte *Strix aluco*

Sédentaire

Il y a des chanteurs un peu partout dans l'Oise, mais peu de données de nidification certaine. Néanmoins, la présence de ces chanteurs indique une nidification possible.

Forêt de Hez :

- 1 chanteur le 27/02 parcelle 158 (FB)
- 1 couple le 30/04 maison forestière du Lieutenant (FB)
- 1 chanteur le 06/05 parcelle 91 (FB)
- 1 chanteur parcelle 61 le 01/06 (FB)



Dessin : M. Votte

Bois des Côtes :

- 3 chanteurs le 13/02 à Breuil-le-Sec (FB)
- 1 chanteur le 21/04 (FB)
- 1 chanteur le 01/06 à Breuil-le-Sec (FB)
- 1 autre chanteur le 11/06 à Bailleval (FB)

Ailleurs :

- Angy : 1 chanteur le 21/04 (PM)
- Ansacq : 1 chanteur le 29/04 (FB)
- Bailleval : 1 chanteur le 21/03 (FB)
- Cambronne-les-Clermont : 1 chanteur le 17/05 (FB)
- Mareuil-la-Motte : 1 le 26/04 (WM)
- Moru-Pontpoint : 1 chanteur le 01/02 (WM)
- Nourard-le-Franc : 1 chanteur le 14/05 (FB)
- Ressons-sur-Matz : 1 le 26/04 (WM)

Une donnée de nidification :

- Cris de jeunes le 20/06 à Vineuil-Saint-Firmin (JMG)

A noter : 1 individu trouvé mort le 20/05 à Erquery (FB)

Hibou moyen-duc *Asio otus*

Quelques dortoirs sont repérés :

2 à 4 individus du 18/03 au 30/04 et du 21/11 au 23/12 à Moru-Pontpoint (PMS, FB, AR),

6 individus parcelle 853 le 11/03 en forêt de Compiègne (JLB).

En période de reproduction le Hibou moyen-duc est observé à Coudun, Fournival, La Neuville-Vault, Pierrefitte-en-Beauvaisis (1 couple) et Saint-Just-en-Chaussée

Nidification certaine :

- 1 couple à Cires-lès-Mello et Foulanges (JLB)
- 1 couple en forêt d'Ermenonville (PMS)

Hibou des marais *Asio flammeus* (CHD)

Toujours rare dans l'Oise, une seule donnée cette année : 1 le 27/02 à Baron (JMG).

Une prospection plus rigoureuse des milieux favorables à l'espèce, en particulier en période internuptiale (marais, friches, jachères...), pourrait nous révéler bien des surprises.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

Les données proviennent toutes cette année de la forêt d'Ermenonville :

- 2 à 3 chanteurs le 20/05 carrefour de la grande Fourchette (JLB)
- 2 chanteurs le 17/06 parcelle 58 (AR)
- 4 le 23/06 parcelles 58 et 81 (PMS)

La repasse a été négative en forêt de Retz le 8/06, où le biotope semble pourtant favorable (sable de Beauchamps et lande à callunes) (HdeL).

Martinet noir *Apus apus*

Premiers : 5 le 23/04 à Gouvieux (YB).

La nidification est notée à Trosly-Breuil sur l'ancienne gare (JMV) et à Vineuil-Saint-Firmin (JMG).

Pas de grand rassemblement estival, à noter seulement 200 en chasse à Borest le 01/07 (HdeL) et 96 le 17/07 à Gouvieux (YB).

Derniers : 3 le 07/09 à Vauciennes (PMS)

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

L'espèce se note toute l'année, toujours entre 1 et 4 individus dans les vallées et sites suivants :

- Vallée de l'Oise : Boran-sur-Oise, Gouvieux (Etang de Toutedoie), Saint-Maximin, Verneuil-en-Halatte, Moru-Pontpoint, Chevières, Houdancourt, Longueil-Sainte-Marie, Verberie
- Vallée du Thérain : Bailleul-sur-Thérain, Bresles, Beauvais, Fouquénies, Milly-sur-Thérain, Troissereux, Saint-Félix, Saint-Vaast-les-Mello, Villers-Saint-Sépulcre
- Vallée de la Brèche : Bailleval, Breuil-le-Sec, Fitz-James, Litz
- Vallée de l'Arré : Avrechy, Saint-Just-en-Chaussée
- Vallée de la Nonnette : Chantilly
- Vallée de la Thève : Etangs de Commelle
- Vallée de l'Aisne : Couloisy, Rethondes, Trosly-Breuil
- Vallée de la Divette : Passel
- Forêt de Compiègne : Etangs de Saint-Pierre, Etang de Vertefeuilles, Etang du Louveteau, Etang de l'Etôt, Pierrefonds, parcelles 9032-9042-9341-0512-0541 sur des mares ou ruisseaux.
- Egalement observé à Berthecourt et aux Marais de Sacy-le-Grand.

Quelques indices de nidification : 1 individu transporte des proies deux fois dans la même direction le 20/04 à Saint-Félix (FB, YL), 1 juvénile est nourri à Boran-sur-Oise le 17/07 (YB) et 2 juvéniles quémangent le 09/09 à Longueil-Sainte-Marie " Le Barrage " (PMS).

Huppe fasciée *Upupa epops*

Une seule donnée cette année lors du passage postnuptial : 1 individu en halte migratoire, se nourrit sur les parties desséchées des vasières des bassins de décantation d'Houdancourt le 20/07 (FB).

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

Toujours aussi localisé. Le premier est noté en forêt de Compiègne " Mont Saint-Marc " le 09/04 (PMS). Des chanteurs sont par la suite entendus jusqu'au 27/06.

Bilan par site :

- Forêt de Compiègne : 10 chanteurs parcelles 4221-4153-4154-2241-2242-9102-8260-826-212
- Forêt de Hez-Froidmont : 2 chanteurs " Carrefour du Magasin " (FB).

Par la suite quelques données de migrants en halte sont obtenues : 1 le 18/08 à Orrouy dans un jardin (PMS), 2 le 20/08 en Forêt d'Halatte " Mont Pagnotte " (YB), 1 le 22/08 à Vauciennes " Bassins de décantation " (PMS), qui constitue également la dernière mention annuelle.

Pic vert *Picus viridis*

Présent un peu partout mais dont les effectifs nationaux sont considérés comme étant à surveiller (Rocamora & al. 1999)

Noté nicheur certain à Bresles " Le Grand Marais " : 4 juvéniles ensemble le 26/06 (FB).

Des chanteurs également notés à Angy, Bailleul-sur-Thérain, Bailleval, Beauvais, Breuil-le-Sec, Chevières, Clermont, Fitz-James, Montreuil-sur-Thérain, Moru-Pontpoint, La Neuville-en-Hez, Saint-Félix, Verberie, Verneuil-en-Halatte, Villers-Saint-Sépulcre, en Forêt de Hez-Froidmont et de Chantilly ainsi qu'aux marais de Sacy-le-Grand.

Pic noir *Dryocopus martius*

Noté aussi bien dans les grandes forêts domaniales que dans des zones boisées de taille beaucoup plus modeste.

Bilan par site :

- Forêt d'Ermenonville : 22 données du 02/01 au 14/10. En période nuptiale, chants et tambours notés dans 10 parcelles.
- Forêt de Hez-Froidmont : 10 données du 09/01 au 25/12. 1 chanteur en période de reproduction.
- Forêt de Chantilly : 12 données du 04/02 au 03/09. Chants notés dans 10 parcelles.
- Forêt de Compiègne : 21 données du 12/02 au 31/12. En période nuptiale, chants notés dans 7 parcelles. La nidification certaine est prouvée parcelle 8202 par la découverte d'une loge avec un adulte nourrissant le 27/05 (AR). Un juvénile est également observé parcelle 242 le 07/06 (AR).
- Forêt de Pontarmé : 3 données entre le 02 et le 25/04. Chants et tambours dans 2 parcelles.
- Forêt d'Halatte : 11 données du 05/03 au 24/12. En période nuptiale, 2 chanteurs sont entendus, tandis qu'une cavité vide est découverte dans le Bois du Lieutenant le 25/04 (JMG, YL).
- Forêt de Thelle : 1 donnée pour 1 individu.
- Bois du Roi : 2 individus différents observés.
- Bois des Côtes : 2 individus différents sont notés.

En dehors des grands massifs, noté également aux Ageux (ALK), Cuvilly " Bois de Cuvilly " avec un chanteur (FS), Dieudonné avec 1 chanteur pour deux individus (YB), Gouvieux " Etang de Toutedoie " (JMG), Lalandelle (HdeL), Mérard " Vallée Monnet " et en vol en plaine (FB), Cambronne-les-Clermont " Fond de Berneuil " avec 1 chanteur, site adjacent à celui de Mérard (YL), à Thury-sous-Clermont avec 1 chanteur (YL), ainsi qu'à Rocquemont en vol en plaine (PMS).

Pic épeiche *Dendrocopos major*

Toujours bien présent dans le département.

Noté nicheur certain avec la découverte de loges occupées ou l'observation de juvéniles à Bailleva " Bois des Côtes ", Gouvieux " Bois des Bouleaux ", Nointel " Bois de Nointel ", en Forêts d'Ermenonville, d'Halatte et de Hez-Froidmont

Tambourinage noté également en Forêt de Chantilly (JLB).

Pic mar *Dendrocopos medius*

Noté surtout en forêts domaniales et quelques bois du Valois. Des prospections dans d'autres massifs, y compris dans ceux de taille relativement modestes, seraient nécessaires.

Bilan par site.

- Forêt de Chantilly : 19 données du 09/01 au 31/12. 1 loge parcelle 184 le 01/06 (JLB). Chanteurs en période nuptiale dans 10 parcelles (JLB, YB)
- Forêt de Compiègne : 11 données du 03/01 au 29/10. 1 adulte nourrit le 25/05 parcelle 8181 (AR). Des chanteurs au printemps dans 10 parcelles (JLB, PMal, RB, DS, JLB, PMS)
- Forêt d'Ermenonville : 4 données entre le 27/02 et le 26/11 (JLB, YB). 1 chanteur en période nuptiale (JLB)
- Forêt d'Halatte : 11 données du 05/03 au 24/12 (PMal, RB, DS, YB, JLB, JMG), 1 chanteur en période de reproduction (YB)
- Forêt du Lys : 4 données du 16/02 au 07/06 (YB)
- Forêt de Hez-Froidmont : 2 données (FB). 1 chanteur en période de reproduction (YL)
- Bois des Côtes : 4 données du 22/02 au 21/12. 1 chanteur en période nuptiale (FB)
- Saint-Maximin " Bois de La Coharde " : 4 individus dans 3 parcelles (YB)
- Gouvieux " Bois de la Cave " : 1 donnée pour 1 individu (YB)
- Gouvieux " Bois des Bouleaux " : 1 donnée pour 2 individus (YB)
- Chantilly " Lycée Jean Rostand " : 1 individu (YB)

Pic épeichette *Dendrocops minor*

Noté de janvier à août, rien en automne. Une donnée en décembre.

Des chanteurs et couples en période nuptiale notés sur les sites suivants : Bailleul-sur-Thérain " Bois Balette " (FB), Breuil-le-Sec " Etangs communaux " et " Bois des Côtes " (FB), Gouvieux " Le Champ d'Alouettes " (YB), Saint-Félix " Etangs " (FB), Forêt de Compiègne (AR), Forêt d'Halatte (JLB), Forêt de Hez-Froidmont (FB)

Egalement observé cette année à Bailleul-sur-Thérain " Etangs " (FB), Blaincourt " Vallée de la Sangle " (YB), Breteuil (YL), Litz " Etang " (FB), Canny-sur-Matz dans un verger (WM), Chantilly " Canaux " (JMG), Chevières " Bassins de décantation " (AR), Gouvieux dans un jardin (YB) Moru-Pontpoint (FB), Nointel " Bois des Côtes " (FB), Noyon (MR), Saint-André-Farivillers (YL fide Sylvain Thiéry), Saint-Aubin-sous-Erquery " Bois Plisson " (FB) et en Forêt d'Ermenonville (JLB)

Cochevis huppé *Galerida cristata*

Noté tous les mois de l'année.

Bilan chronologique par localité :

- Breuil-le-Sec " Etangs de l'Aubier " : 1 à 6 individus entre le 14/01 et le 09/10, dont 1 chanteur le 22/03 et le 15/05 (FB, YL). Egalement 1 au stade le 23/02 (FB).
- Bonneuil-les-Eaux " La Folie de Bonneuil " : 1 le 05/02 (HdeL).
- Grandvilliers : 2 le 06/03, 2 chanteurs les 18 et 19/04, 1 le 04/06 et 18/08 (GP).
- Saint-Maximin " Centre commercial " : 1 le 16/03 (JBM, MCJ).
- Montataire " Gournay " : 1 le 02/05 (YL).
- Morvillers " Le Champ Saint-Vaast " : 1 couple le 06/05 (GP).
- Pont-Sainte-Maxence " Zone industrielle " : 1 chanteur le 07/05 (JLB).
- Rantigny : 1 chanteur le 13/05 (FB).
- Agnetz " Ramécourt " : 2 couples en lutte territoriale le 23/05 (YL).
- Creil " Ecole Paul Eluard " : 1 le 02/06 (YL)
- Feuquières : 1 le 02/06 (GP).
- Fitz-James " La Croix Rouge " : 1 le 06/05 (YL), 3 couples le 13/06 (YL), 1 chanteur le 25/06 (FB).
- Breuil-le-Vert " Cannettecourt " : 1 le 13/07 sur un rond-point routier (FB).
- Ercuis : 5 le 11/11 (YB).
- Dury : 1 le 10/12 à la gare de péage de l'A 29 (PMS).

Alouette lulu *Lullula arborea*

Uniquement notée en période migratoire.

- Migration prénuptiale : en Forêt de Compiègne, 1 en vol au Mont Saint-Marc le 26/02 (PMS), 2 en vol parcelle 1402 le 12/03 (AR). Egalement 11 en migration le 12/03 à Chelles (JMV)
- Migration postnuptiale : Total de 27 individus en migration active à Morienvall " Brassoir " entre le 26/09 et le 04/11 (PMS, JPB, CG) dont 13 le 06/10 (PMS). 1 le 14/10 et 1 autre 1 le 28/10 à Berneuil-sur-Aisne (MV). 1 le 23/10 en migration active en Forêt de Compiègne " Route de la Fortelle " (PMS), 1 le 18/11 à Moru-Pontpoint (PMS)

Alouette des champs *Alauda arvensis*

Migration prénuptiale : 1 groupe de 53 individus le 26/02 à Moru-Pontpoint (YB)

Par la suite des chanteurs sont notés un peu partout.

La migration postnuptiale est suivie à Morienvall " Brassoir " avec le passage cumulé de 12 112 individus entre le 04/10 et le 26/11 (JPB, CG, PMS, MV) dont 3 231 le 03/11 (PMS)

Quelques groupes en halte migratoire : 70 le 27/10 à Montataire " Les Champarts " (JMG), 320 le 11/11 à Berneuil-sur-Aisne (MV)

Peu de groupes notés pour l'hivernage : 33 le 19/12 à Moru-Pontpoint (FB), 71 le 24/12 à Morienvall " Brassoir " (JPB, CG), 65 le 29/12 à Saint-Leu d'Esserent " La Brossette " (YB)

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

- Premières : 3 le 02/03 à Houdancourt (FB)

Quelques groupes d'individus migrateurs ou nicheurs, sont vus au printemps : 100 le 31/03 à Houdancourt (WM), 100 à Moru-Pontpoint (WM), 100 à Chevrières et 200 à Houdancourt (AR) le 04/04, 200 le 07/04 à Houdancourt (WM), 100 le 18/05 à Chevrières (AR), 700 le 19/05 à Houdancourt (WM), 400 le 12/06 à Saint-Maximin (YB)

- Nidification notée à : Moru-Pontpoint pour 1 colonie (PMS), Angy avec 71 trous (FB, YL), Verberie " Remises d'Herneuse avec au moins 300 trous (WM) et Saint-Maximin " gravières " avec 900 trous (YB)

Migration postnuptiale, quelques groupes notés : 100 le 20/08 et 100 le 17/09 à Vauciennes (AR)

- Dernières : 5 le 13/10 à Houdancourt (WM)

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*


- Premières : 15 à Mello et 2 à Beauvais " Base Nautique du Canada " le 14/03 (FB).

Quelques groupes prénuptiaux relevés : 100 le 04/04 à Moru-Pontpoint (WM), 100 le 06/04 à Gouvieux " Etang de Toutedoie " (YB), 200 le 07/04 à Houdancourt (WM), 400 le 19/05 à Houdancourt (WM).

- Nidification notée à Therdonne, Rantigny, Laigneville (FB) et Mélicocq (AR). Une attention particulière doit être portée à la reproduction de cette espèce en déclin.

- Passage postnuptial : quelques groupes notés : 200 le 12/08 à Margny-sur-Matz " Bourmont " (WM), 100 le 17/09 à Vauciennes (AR), passage de 1 282 individus entre le 24/09 et le 13/10 à Morienvall " Brassoir " (PMS).

- Dernière : 1 le 14/11 à Lacroix-Saint-Ouen (JPF).



Dessin : M. Votte

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum*

- Première : 1 le 30/03 à Saint-Félix (FB).

- Nidification notée avec 3 nids à Bailleul-sur-Thérain, 7 nids à Breuil-le-Sec, 4 nids à Breuil-le-Vert, 5 nids à Cambronne-les-Clermont, 27 nids à Cauffry, 14 nids à Chevrières, 8 nids à Fitz-James, 11 nids à Nogent-sur-Oise, 2 nids à Grandvilliers (GP), 2 nids à Laigneville, 3 nids à Mélicocq (AR). 12 nids à Neuilly-sous-Clermont (FB), 6 nids à Nointel, 6 nids à Rantigny, nicheuse également à Chantilly (JMG). Ces données sont loin d'être exhaustives, il est donc important de suivre d'avantage la période de reproduction de cette espèce dont les effectifs s'effondrent.

- Migration postnuptiale : 100, posées sur des fils téléphoniques, le 12/08 à Margny-sur-Matz " Bourmont " (WM), 100 le 23/09 à Rethondes (MV).

A Morienvall " Brassoir ", en migration active : 75 le 06/10 et 10 le 13/10 (PMS) qui constitue aussi la dernière donnée annuelle.

Pipit rousseline *Anthus campestris* CHD

Toujours aussi rare dans l'Oise, deux données cette année, uniquement sur le site de Morienvall " Brassoir ", concernant la migration postnuptiale : 1 en halte migratoire le 19/08 et 2 en migration active le 27/09 (PMS).

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

- Premier : 1 le 02/04 en Forêt d'Ermenonville (JLB).

- Nidification certaine notée à Bailleval " Bois des Côtes " (FB) et Rethondes (JMV).

Des chanteurs sont recensés sur les sites suivants avec respectivement (chiffres non exhaustifs pour certains sites) : 16 chanteurs en forêt d'Ermenonville, 11 chanteurs en forêt de Hez-Froidmont, 7 chanteurs à Bresles, 6 chanteurs en forêt de Compiègne, 4 chanteurs à Bailleul-sur-Thérain, 3 chanteurs à Saint-Félix et Dieudonné, 2 chanteurs en forêt de Chantilly, à Bornel et Bulles, 1 chanteur à Cuignères, Cambronne-les-Clermont, Vineuil-Saint-Firmin, Fournival et en forêt d'Halatte. Noté également en période de reproduction à Margny-sur-Matz, Varesnes et en forêt de Laigue (JLB, PMS, YB, FB, JMG, WM, JMV)

- Migration : 1 à Vauciennes le 30/08 (AR) et 8 en migration active du 26/09 au 01/10 à Morienvall " Brassoir " (PMS). Cette dernière date constitue l'ultime mention annuelle.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

- Hivernage noté sporadiquement en janvier et début février puis en décembre pour les effectifs maximum suivants : 11 en forêt de Hez-Froidmont, 41 à Beauvais, 11 à Boran-sur-Oise, 15 à Cires-les-Mello, 9 à Maignelay-Montigny, 6 à Morienvall, 4 à Morlincourt, 17 à Moru-Pontpoint, 2 à Néry, 5 à Noyon, 3 à Saint-Aubin-sous-Erquerey, 9 à Vauciennes et 1 à Saint-Leu-d'Esserent (YB, JLB, JPB, FB, CG, HdeL, MR, AR)

- La migration prénuptiale permet d'observer quelques groupes : 28 le 03/03 (JPF) et 26 le 07/03 (WM) à Moru-Pontpoint, 20 le 05/03 à Cires-les-Mello (JLB).

- Nidification : l'espèce semble assez localisée dans l'Oise : à Moru-Pontpoint, parades dès le 15/02 (PMS), 1 transport de nourriture le 16/05 (FB), maximum de 2 couples notés (PMS, FB). Egalement 2 chanteurs à Boran-sur-Oise " gravières " (YB), 4 individus avec parades à Morlincourt " gravières " (MR), 1 chanteur à Maignelay-Montigny " Chante-Pie " (FB), plusieurs chanteurs à Varesnes " Les Cailleux ", " La Fosse Cochue ".

- Migration postnuptiale notée pour quelques groupes en halte : 220 le 07/10 à Saint-Etienne-Roilaie (MV), 80 le 21/10 à Berneuil-sur-Aisne (MV). A Morienvall " Brassoir ", passage de 5 478 individus du 24/09 au 26/11 (JPB, CG, PMS, MV)

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*

- La fin d'hivernage 1999/2000 et la migration prénuptiale produisent des données entre le 02/01 et le 17/04 sur plusieurs sites pour les effectifs suivants : 4 à Boran-sur-Oise " gravières ", 10 à Breuil-le-Vert " La Grande Pièce ", 6 à Moru-Pontpoint, 26 à Sacy-le-Grand " Prés Saint-Jean ", 2 à Saint-Félix " Etangs ", à Beauvais " Base nautique du Canada " et à Vauciennes " Bassins de décantation ", 3 à Houdancourt et 1 à Verneuil-en-Halatte et Chevrières " bassins de décantation " (PMS, YB, FB, AR, YL)

- Premier retour le 27/10 avec 25 individus à Vauciennes (CL) puis noté jusqu'au 19/12 avec comme maximum par site d'observation : 6 à Boran-sur-Oise " gravières ", 3 à Moru-Pontpoint, 2 à Villers-sur-Auchy " L'Herbage du Cat " et 1 Saint-Germer de Fly, Beauvais " Base nautique du Canada " et Verberie " Remises d'Herneuse " (PMS, JPB, CG, YB, FB, HdeL, AR)

- Migration active : 1 le 09/11 à Morienvall " Brassoir " (PMS)

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

- Première : 1 le 16/03 à Dieudonné (YB).

- Nidification certaine notée à Dieudonné " Cadet Magnard ", Boran-sur-Oise " gravières " (YB), Neuilly-sous-Clermont " Les Lavasses " (YL) et Lieuvillers " Le Champ de l'Abbaye " (FB). Nicheuse probable à Chavençon, Chevrières, Fresnoy-en-Thelle, Belle-Eglise et Cires-les-Mello (JPC, AR, YB, JLB)

- Passage postnuptial noté entre autres à Orrouy " Champlieu " avec 150 le 15/09 (PMS) et 250 le 25/09 à Lataule (FS)

A Morienvall " Brassoir ", passage de 11 individus du 26/09 au 02/10 (PMS).

- Dernières : 18 le 23/10 à Breuil-le-Vert (YL).

Bergeronnette flavéole *Motacilla flava flavissima* (CHD)

3 données cette année : 1 le 06/05 à Sarcus " La Cavée d'Hayon "** (GP), 1 mâle cantonné à Montagny-Sainte-Félicité " Le Merisier Noir " (HdeL) et 1 femelle avec la becquée et alarmant le 14/07 à Sommereux* (GP).

Ce taxon semble localement bien représenté dans l'ouest du département.

Bergeronnette à tête grise *Motacilla flava thunbergi* (CHD)

2 données de migration postnuptiale sur le site de Morienvall " Brassoir " : 1 le 08/10 et 2 le 14/10 (JPB, CG)*. Ce taxon est à rechercher dans les troupes de bergeronnettes en halte migratoire.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

Notée tous les mois de l'année.

Bilan par secteurs :

Vallée de la Noye : Breteuil " station d'épuration "

Vallée de la Brèche et environs : Litz " Etang ", Breuil-le-Sec " La Brèche ", "Etangs communaux " et " Bois des Côtes ", Breuil-le-Vert " Station d'épuration ", " La Brèche " et " parking LEP Roberval ", Villers-S int-Paul " Station d'épuration ".

Vallée du Thérain et environs : Beauvais " Base Nautique du Canada " et " Le Thérain ", Saint-Félix " Etang " Mouy " Janville " Thury-sous-Clermont " Le Vieux Moutier ".

Vallée de l'Oise : Longueil-Sainte-Marie " Bois de la Mineuse " sur un rond point routier, Houdancourt " Bassins de décantation " et " Station d'épuration ".

Sud de l'Oise : Gouvieux " Station d'épuration ", " La Nonnette ", " Etang de Toutedoie " et " Chaumont ", Chantilly "Canaux ", Forêt de Chantilly " Etangs de Commelle ".

Forêt de Compiègne : " Naïades ", " Etangs de Saint-Pierre " et parcelle 5111.

On remarquera les multiples observations réalisées sur des stations d'épuration.

Nidification : 1 mâle nourrit le 31/05 à Saint-Félix (YL), 1 couple et 2 juvéniles à Breuil-le-Sec " Etangs de l'Aubier " le 20/08 (YL)

Migration postnuptiale : 1 le 30/09 à Morienvall " Brassoir " en migration active (PMS)

Bergeronnette grise *Motacilla alba alba*

Notée en fin d'hiver 1999/2000 de mi-janvier à mi-février avec 14 à Chevières, 6 à Breuil-le-Sec, 2 à Gouvieux et 1 à Moru-Pontpoint, Noyon et Breuil-le-Vert (AR, FB, CL, MR, PMS, YB).

Nidification certaine à Chevières " bassins de décantation ", Fitz-James " Zone commerciale de la Croix Rouge " et Boran-sur-Oise " gravières " (DL, YL, YB)

Rassemblement postnuptiaux dès le 30/07, sur des bassins de décantation, à Houdancourt avec 30 individus, puis 30 le 13/08, 20 le 20/08 et 30 le 28/08 à Chevières (AR)

Quelques groupes de migrants postnuptiaux en halte, parfois importants, sont notés par la suite : 27 le 20/09 à Houdancourt (MV), 320 le 07/10 à Saint-Etienne-Roilaye (MV), 37 le 09/10 à Breuil-le-Sec (FB), 180 le 19/10 à Croutoy (MV)

Migration active à Morienvall " Brassoir " : 1 182 individus du 01/10 au 11/11 (JPB, CG, PMS, MV).

Début d'hivernage 2000/2001 en décembre avec 7 à Moru-Pontpoint, 2 à Noyon et 1 à Vauciennes (PMS, MR, JPB, CG)

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* (CHD)

2 données, concernant la migration pré-nuptiale : 6 le 21/02 à Creil " centre commercial " (AR)* et 1 le 16/04 à Moru-Pontpoint (JPF).

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*.

Peu de choses à signaler ; nicheur certain à Gouvieux "Bois des Bouleaux" et en forêt d'Ermenonville (YB)

Accenteur mouchet *Prunella modularis*

Hormis un premier chant le 31/01 à Breuil-le-Vert (YL), rien à signaler.

Rougegorge familial *Erithacus rubecula*

Nicheur certain à Gouvieux "Bois des Bouleaux " et en forêt d'Ermenonville (YB)

Quelques effectifs plus importants qu'à l'ordinaire, notés au cours de la migration post-nuptiale : 23 le 03/10 en forêt de Chantilly " Etangs de Commelle " et 10 le 24/10 à Moru-Pontpoint (FB)

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*

Premier : 1 le 18/03 à Rethondes (JMV).

Par la suite, des chanteurs sont notés à Angy, Boran-sur-Oise, Bornel, Breuil-le-Sec, Chantilly, Chevières, Gouvieux, Houdancourt, Morlincourt, Varesnes, Verneuil-en-Halatte, Vineuil-Saint-Firmin ainsi qu'en Forêt de Compiègne, d'Halatte, de Hez-Froidmont et de Chantilly (FB, YL, AR, MR, HdL, JMG, YB, PMal, PMS)

Derniers notés : 2 le 30/07 à Houdancourt (AR)

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

Première : 1 le 12/03 à Verneuil-en-Halatte (HdL).

Bilan des chanteurs localisés :

- Marais de Sacy-le-Grand : 5 chanteurs (WM)
- Moru-Pontpoint : 1 chanteur (PMS, FB)
- Chevières " Bassins de décantation " : 1 chanteur (AR)
- Varesnes " Fossé des Bédants " : 1 chanteur (PMS)
- Appilly " Le Passage de Brétigny " : 1 chanteur (PMS)
- Morlincourt : 1 chanteur (MR)

L'ensemble des données provient donc uniquement de la Vallée de l'Oise et de ses environs.

Migration : 1 le 13/08 à Longueil-Sainte-Marie (bassin L 3) (PMS).

Dernière : 1 le 07/09 à Vauciennes " Bassins de décantation " (AR)

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

Fin d'hivernage 1999/2000 : 1 mâle à Compiègne " Ecluse de Venette " le 12/01 (AR)

Premier retour : 1 le 12/03 à Cires-les-Mello (JLB)

L'espèce est notée nicheuse certaine à Boran-sur-Oise (YB), Saint-Martin-aux-Bois et Clermont (YL)

Des chanteurs et des couples sont également notés à Allonne, Bailleval, Balagny-sur-Thérain, Beauvais, Boulogne-la-Grasse, Bresles, Breteuil, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Cambronne-les-Clermont, Cauffry, Compiègne, Creil, Cuignères, Fitz-James, Fouquénies, Hondainville, Montataire, Mouy, Neuilly-en-

Thelle, Neuilly-sous-Clermont, La Neuville-en-Hez, Nogent-sur-Oise, Pontpoint, Rantigny, Saint-Félix, Saint-Martin-longueau, Saint-Sulpice, Silly-Tillard, Thury-sous-Clermont, Verneuil-en-Halatte, Villers-Saint-Sépulcre (FB, YB, AR, WM, YL)

Migrateurs notés à partir de fin septembre avec l'observation d'individus en halte : 3 le 26/09 et le 14/10 à Morienvall "Brassoir" (PMS, JPB, CG) et jusqu'au 19/11 : 1 à Raray (PMS)

Début d'hivernage 2000/2001 avec 1 le 25/11 à Romescamps (PMS) et 1 le 27/11 à Glaignes (PMS) mais surtout 1 le 10/12 à Cires-les-Mello (JLB) et 1 le 17/12 à Verberie "Remises d'Herneuse" (AR)

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

Premier : 1 mâle le 25/03 en Forêt de Compiègne "Mont Saint-Marc" (PMS).

Noté en période de reproduction sur les sites suivants :

- Forêt de Compiègne : 7 chanteurs (PMal, RB, DS, PMS, JLB, AR)
- Forêt d'Ermenonville : 9 chanteurs (JLB, PMal, DS, RB)
- Forêt de Hez-Froidmont : 4 chanteurs (FB, YL)
- Breuille-Vert : 1 mâle le 21/06 (YL)
- Forêt du Lys : 2 chanteurs (YB)
- Forêt de Chantilly : 1 chanteur (JLB)
- Gouvieux : 1 chanteur (YB)
- Forêt de Thelle : 1 mâle avec un juvénile (HdeL)
- Saint-Martin-le-Noeud : 1 couple nicheur en nichoir dans un jardin (YL)
- Egalement noté sur cette période au Bois du Roi (PMal, RB, DS)

Migration postnuptiale notée à partir du 18/08 avec comme effectifs maximum par site d'observation, 1 à Orrouy (PMS) et 5 en Forêt de Compiègne (PMS)

A Morienvall, effectif cumulé de 5 individus en halte du 05/09 au 26/09 (PMS)

Dernier : 1 le 03/10 en Forêt de Compiègne (PMS)

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

Premier : 1 le 01/03 à Baboeuf (MR).

La migration prénuptiale, hors Moyenne Vallée de l'Oise, est notée sur quelques sites pour des oiseaux en halte, du 16/04 au 07/05 avec 4 individus à Rocquemont (PMS) et 1 individu respectivement à Morienvall "Brassoir" (PMS), Bouillancy (HdeL), Nourard-le-Franc (FB), et Moru-Pontpoint (PMS)

Noté en période de reproduction dans les de l'Oise avec comme effectifs principaux :

Cochue" (WM) et 6 le 24/06 à Appilly

La migration postnuptiale est notée à

Puis repérée sur les sites suivants

(PMS), 3 à Cires-les-Mello (JLB), 2

respectivement à Moru-Pontpoint

Vauciennes (PMS), Cormeilles

(PMS)

sites classiques de la Moyenne Vallée

8 le 07/05 à Varesnes "La Fosse

"Les Echelles Inférieures" (PMS).


partir du 14/08 : 1 à Foulanges (JLB).

avec comme effectifs maximums : 11 à Orrouy

à Longueil-Sainte-Marie (PMS) et 1

(JPF), Berneuil-sur-Aisne (MV),

(HdeL) et en Forêt de Compiègne



Dessin : W. Mathot

Total cumulé des oiseaux en halte à Morienvall : 32 individus du 26/08 au 03/10 (PMS)

Cette dernière date constitue aussi la dernière mention annuelle

Tarier pâtre *Saxicola torquatus*

Premier : 1 le 27/02 en Forêt de Hez-Froidmont (FB)

La nidification est notée certaine en Forêt de Hez-Froidmont (FB) et à Bornel (YB)

Noté également en période de reproduction à Avrechy, Bresles, Canny-sur-Matz, Fitz-James, Fournival, Moru-Pontpoint, Puisieux-le-Hauberger, Rochy-Condé, Roye-sur-Matz, Saint-Félix, Saint-Léger-en-Bray, Senantes, Vineuil-Saint-Firmin, en Forêt de Compiègne et d'Ermenonville

Migration postnuptiale à partir du 25/08 avec 2 individus à Noailles (YB) jusqu'au 15/11 avec 2 oiseaux en Forêt de Compiègne (PMS). Noté également sur cette période avec comme effectifs maximums, 2 à Dieudonné (YB), 2 à Cires-les-Mello (JLB), 5 à Vauciennes (PMS), 2 à Moulin-sous-Touvent (HdeL), 1 à Boran-sur-Oise (YB), 1 à Berneuil-sur-Aisne (MV) et 1 à Fréniches (HdeL)

En halte à Morienvall : 7 individus différents du 05/09 au 04/10 (PMS)

Hivernage : 1 à 2 individus à Moru-Pontpoint du 31/10 au 19/12 (WM, FB, JPF, PMS)

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

Premier : 1 le 27/03 en Forêt de Compiègne (PMS)

Puis des migrateurs en halte sont notés en plusieurs localités avec comme effectifs les plus importants par site : 5 à Morienvall (PMS, CL), 4 à Attichy (JMV), 2 à Moru-Pontpoint (PMS) et à Berneuil-sur-Aisne (JMV), 1 à Breuil-le-Sec (FB), Orrouy (PMS) et Vauciennes (PMS)

Toujours aucun indice de nidification certaine pour notre département.

Passage postnuptial à partir du 26/08 avec 1 individu à Orrouy (PMS) puis noté jusqu'au 08/10 (dernière mention annuelle) avec comme effectifs les plus importants pour chaque site : 5 à Orrouy (PMS), 3 à Rocquemont (JPF), 2 à Grandvillers (GP), à Raray (PMS) et Cires-les-Mello (JLB) et 1 à Saint-Etienne-Roilaye, Berneuil-sur-Aisne (MV), Auchy-la-Montagne (HdeL), Lataule (FB) et en Forêt de Compiègne (PMS)

Effectif cumulé en halte migratoire à Morienvall " Brassoir " de 28 individus entre le 05/09 et le 04/10 (PMS).

Merle à plastron *Turdus torquatus*

Bien noté cette année aux deux passages.

Migration pré-nuptiale :

Forêt de Compiègne : 3 le 09/04 et 2 le 16/04 au Mont Saint-Marc (PMS)

Morienvall " Brassoir " : 3 le 17/04 (CL), 1 mâle et 1 femelle le 18/04 (CL, WM), 1 femelle le 20/04 (CL)

Cuignères " Le Fond de Talmotte " : 1 mâle le 25/04, harcelé par 2 mâles de Merles noirs (FB)

Migration postnuptiale :

Orrouy : 2 le 04/11 (PMS)

Morienvall "Brassoir", en migration : 2 le 04/11 et 1 le 09/11 (PMS)

Moru-Pontpoint : 2 le 15/11 (PMS), 1 le 16/11 (PMS), 2 du 17 au 19/11 (PMS, JPF)

Merle noir *Turdus merula*

Noté nicheur certain à Breuil-le-Sec (transport de matériaux dès le 22/02) (FB), Nogent-sur-Oise (FB), Beauvais (FB), Vineuil-Saint-Firmin (JMG), Maignelay-Montigny (FB) et Breuil-le-Vert (YL)

Quelques regroupements hivernaux : 10 le 02/12 à Vauciennes (JPB, CG), 11 le 06/12 Noyon (MR), 1 le 18/12 à Beauvais " Base nautique du Canada " (FB), 12 le 24/12 à Morienvall (JPB, CG).


Dessin : W. Mathot

Grive litorne *Turdus pilaris*

Peu de données en janvier avec des effectifs très faibles : 11 en

Forêt de Hez-Froidmont, 12 à Bulles, 2 à Moru-Pontpoint et à Saint-Félix (FB)

Des effectifs beaucoup plus conséquents sont notés à partir du 01/02 jusqu'au 27/02, ce qui correspond au début du passage pré-nuptial : 700 le 01/02 à Fouilloy (HdeL), 240 le 13/02 à Morienvall (JMV), 220 le 15/02 à Fouilloy (HdeL), 35 le 18/02 à Boran-sur-Oise (YB), 50 le 26/02 à Morienvall (PMS) et 150 le 27/02 à Baron (JMG).



En mars, des effectifs moins importants sont repérés : 32 à Dieudonné, 28 à Neuilly-en-Thelle, 15 à Cires-les-Mello, 6 à Laversines, 1 à Mouy, Saint-Félix et en Forêt de Compiègne.
Dernière : 5 le 09/04 à Chavençon (JPC)

Retour : 30 en migration en Forêt de Compiègne le 04/11 (PMS)
Puis notée sur les sites suivants jusque fin décembre avec comme effectifs maximums : 260 à Baron (HdeL), 12 à Beauvais (FB), 5 à Moru-Pontpoint (FB) et Lierville (HdeL) et 3 à Ménantissard (HdeL)
Migration à Morienvall " Brassoir " : 4 le 09/11, 34 le 26/11 (PMS, JPB, CG)

Grive musicienne *Turdus philomelos*

Le premier chanteur est noté le 02/02 à Breuil-le-Vert (YL)
La migration pré-nuptiale est classiquement notée en février avec un groupe de 70 individus le 13/02 à Morienvall (JMV)
Nidification certaine notée à Fitz-James (YL)
Migration post-nuptiale à Morienvall " Brassoir " : 120 migrants notés du 24/09 au 05/11 (PMS, JPB, CG, MV)

Grive mauvis *Turdus iliacus*

En janvier, quelques données sont obtenues : 24 individus en Forêt de Chantilly " Etangs de Commelle ", 12 à Breuil-le-Sec, 6 à Saint-Félix, 24 à Bailleul-sur-Thérain, 4 à Boran-sur-Oise, 11 à Gouvieux, 16 à Etouy, 10 en Forêt de Compiègne et 50 à Cires-les-Mello (YB, FB, AR, JLB).
Les effectifs croissent dès le début février avec le passage pré-nuptial, jusqu'au début de la troisième décennie de mars. Notons entre autres : 29 à Fouillois, 56 à Saint-Aubin-en-Bray, 50 en Forêt de Compiègne, 101 à Mouy, 40 à Angy, 95 à Breuil-le-Sec.
Dernières : 3 le 02/04 en Forêt d'Ermenonville (JLB).
Retour : 1 le 08/10 à Boran-sur-Oise (YB).
L'espèce est notée ensuite tout au long de l'automne et de l'hiver avec comme effectifs maximums par site (au moins 10 individus) : 100 en Forêt de Chantilly, 80 à Saint-Germer-de-Fly, 50 à Molliens, 30 à Gouvieux, 25 à Moru-Pontpoint, 23 à Ménantissard, 20 en Forêt d'Halatte, 13 à Cuignères, 10 à Nointel et Cauffry.
Migration active à Morienvall " Brassoir " : 2 le 29/10, 4 le 04/11, 35 le 11/11 (PMS, JPB, CG)

Grive draine *Turdus viscivorus*

Cantonnements toujours précoces : 1 chanteur le 26/01 à Noyon " Les Prés de Joie " (MR)
Par la suite d'autres chanteurs sont notés : 1 à Béhéricourt (MR), 2 à Gouvieux " Etang de Touthoie " (YB), 1 à Beauvais " Base nautique du Canada " (FB), 1 à Breuil-le-Sec " Bois des Côtes " (FB), 1 à Breuil-le-Vert " village " (YL)
Notons que si cette espèce est bien répandue dans l'Oise, elle n'est cependant jamais présente en densité importante en période de reproduction.
Migration pré-nuptiale toujours sensible dès février avec un rassemblement de 30 individus le 13/02 à Morienvall (JMV)
Migration post-nuptiale à Morienvall " Brassoir " : 6 le 24/09, 9 le 06/10 (PMS), 2 le 05/11 (JPB, CG)

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (CHD)

Toujours localisée à quelques sites.
Marais de Sacy-le-Grand : 1 à 6 chanteurs du 23/02 au 04/06 (FB, JLB, PMS, WM, AR)
Vez " Etang de Wallu " : 1 chanteur le 19/03 et le 10/06 (HdeL)
Vauciennes " Bassins de décantation " : 1 chanteur du 21/08 au 08/10 (PMS, AR, MV, FB). 2 le 29/10 (PMS)

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

Première : 1 le 09/04 en Forêt de Compiègne (PMS).

Bilan des chanteurs repérés par site :

Soissonnais :

- Forêt de Compiègne : 14 chanteurs (PMS, CL, WM, HdeL, JLB, AR).
- Rethondes : 1 chanteur (JMV)

Clermontois :

- Forêt de Hez-Froidmont : 12 chanteurs (FB, YL)
- Marais de Sacy-le-Grand : 1 chanteur au minimum (JPF)
- Bailleval " Bois des Côtes " : 2 chanteurs (FB)
- Breuil-le-Sec " La Brèche " : 1 chanteur (FB)

Valois :

- Forêt d'Ermenonville : 1 chanteur (YL)
- Forêt d'Halatte " Bois du Lieutenant " : 1 chanteur (JMG)
- Montlognon " Marais de Montlognon " : 1 chanteur (HdeL)

Noyonnais :

- Varesnes " La Fosse Cochue ", " Les Cailleux " : 4 chanteurs (PMS, WM)
- Morlincourt " Gravières " : 1 chanteur (MR)
- Margny-sur-Matz " Mont-Bellot " : 1 chanteur (WM)

Région d'Estrées :

- Houdancourt : 1 chanteur (PMS, WM)

Dernière donnée : 1 le 12/07 en Forêt de Hez-Froidmont (FB). Date non significative.

Locustelle lusciniöide *Locustella luscinioides* (CHD)

Uniquement localisée aux Marais de Sacy-le-Grand :

1 chanteur le 07/05 puis 2 du 13/05 au 04/06 (JLB, PMS, AR)

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

Premiers : 2 le 29/04 à Moru-Pontpoint (PMS)

Bilan des chanteurs repérés par site.

Clermontois :

Marais de Sacy-le-Grand : 11 chanteurs au minimum (JLB, AR, FB)

Valois :

Moru-Pontpoint : 2 chanteurs (PMS, FB)

Pays de France :

Thiers-sur-Thève " Le Plat d'Eau " : 1 chanteur (YB)

Pays de Bray :

Saint-Sulpice " Château de Crécy " : 1 chanteur (YL)

1 à 2 juvéniles sont notés sur la station d'épuration d'Houdancourt du 25/07 au 25/08. Il est difficile de dire s'il s'agit d'une reproduction locale ou de migrateurs (PMS, FB). Egalement 1 individu le 30/07 à Houdancourt mais sur les bassins de décantation (AR) et enfin 1 dernier individu le 17/09 à Vauciennes " Bassins de décantation ".

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*

Premières : 2 chanteurs en halte dans une parcelle en régénération à Bailleval " Bois des Côtes " le 27/04 (FB).

Bilan en période nuptiale.

Clermontois :

Bresles " Bassins de décantation " : 2 chanteurs (FB)

Marais de Sacy-le-Grand : 1 chanteur (AR)

Breuil-le-Vert " Marais de Giencourt " : 1 chanteur (FB)

Soissonnais :

Forêt de Compiègne " Etang du Louveteau " : 2 chanteurs (AR, PMS)

Valois :

Vauciennes " Bassins de décantation " : 3 chanteurs et 1 couple (AR, PMS)

Saint-Maximin " gravières " : 1 chanteur (YB)

Noyonnais :

Morlincourt " gravières " : 2 chanteurs. 1 couple nourrit le 08/07 (AR)

Varesnes " La Fosse Cochue " : 1 chanteur (PMS)

Verneuil-en-Halatte " gravières " : 1 chanteur (YB)

Pays de Thelle :

Boran-sur-Oise " gravières " : 1 chanteur (YB)

Pays de France :

Lamorlaye " Marais du Lys " : 1 chanteur (YB)

Thiers-sur-Thève " Le Plat d'Eau " : 1 chanteur et 2 juvéniles (YB)

Région d'Estrées :

Chevrières, à proximité des bassins de décantation : 2 chanteurs (AR)

Dernière : 1 le 28/08 à Chevrières (YB)

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus*

Première : 1 le 02/05 à Moru-Pontpoint (WM)

Bilan en période nuptiale.

Valois :

Vauciennes " Bassins de décantation " : 20 chanteurs. Nombreux nourrissages notés le 25/06 (PMS).

Saint-Maximin " Gravières " : 1 chanteur (YB)

Verneuil-en-Halatte " Gravières " : 3 chanteurs (FB)

Montlognon " Marais de Montlognon " : 2 chanteurs (HdeL)

Forêt de Chantilly " Etangs de Commelle " : 3 chanteurs (YB)

Moru-Pontpoint : 9 chanteurs (FB).

Clermontois :

Bresles " Bassins de décantation " : 2 chanteurs (FB), " Le Grand Marais " : 1 chanteur (FB)

Marais de Sacy-le-Grand : 7 chanteurs (JLB) au minimum.

Montreuil-sur-Thérain " Etangs " : 1 chanteur (FB)

Baillevall " Etangs de Sénécourt " : 3 chanteurs (FB)

Breuil-le-Vert " Marais de Giencourt " : 1 chanteur (FB)

Breuil-le-Sec " Etangs communaux " : 1 chanteur (FB)

Villers-Saint-Sépulcre " Etang " : 1 chanteur (FB)

Noyonnais :

Ressons-sur-Matz " Bois Planté " : 1 chanteur (WM)

Morlincourt " Gravières " : 1 chanteur (MR)

Beauvais " Base nautique du Canada " : 1 chanteur (FB)

Région d'Estrées :

Chevrières " Bassins de décantation " : 20 chanteurs (AR)

Houdancourt " Bassins de décantation " : 2 chanteurs (WM), " Station d'épuration " : 2 chanteurs (FB).

Soissonnais :

Forêt de Compiègne " Etang du Louveteau " : 1 chanteur (AR), " Etangs de Saint-Pierre " : 8 chanteurs (JMV), " Mare de Beauval " : 1 chanteur (PMS)

Pays de Thelle :

Boran-sur-Oise " Gravières " : 2 chanteurs (YB)

Plateau Picard

Troissereux " Etang " : 1 chanteur (FB)

Pays de France :

Lamorlaye " Marais du Lys " : 2 chanteurs (YB)

Thiers-sur-Thève " Le Plat d'Eau " : 1 chanteur (YB)

Dernières notées le 01/10 à Vauciennes (PMS)

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

Aucune donnée malheureusement cette année, ce qui confirme le statut précaire de l'espèce dans le nord de la France. Dans notre département, cette espèce n'a été notée que sur 7 sites différents depuis 1986 : aux Marais de Sacy-le-Grand, à Borest, Vauciennes, Moru-Pontpoint, Chevrières, Varesnes et sur l'étang du Louveteau en Forêt de Compiègne. Son maintien chez nous ne sera assuré que par la conservation des grandes phragmitaies, et à ce titre, le rôle des Marais de Sacy-le Grand est essentiel.

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta*

Premières : 3 le 24/04 à Gury (WM).

En période de nidification, sont recensés : 4 chanteurs en Forêt de Hez-Froimont, au moins 3 chanteurs en Forêt de Compiègne, 2 chanteurs et 2 juvéniles à Bornel, 2 chanteurs à Saint-Félix, Bresles, Précly-sur-Oise, Le Mesnil-sur-Bulles, Breuil-le-Vert, Avrechy, Dieudonné, Cambronne-les-Clermont, Nointel et Breuil-le-Sec, 1 chanteur et 1 couple à Fitz-James, 1 chanteur à Bailleval, Litz, Vauciennes, Chiry-Ourscamps, Bailleul-sur-Thérain, Lamorlaye, Angivillers, Fournival, Moru-Pontpoint, Boran sur-Oise, Orry-la-Ville ainsi qu'en Forêt d'Halatte et du Lys.

Dernière : 1 le 17/09 à Vauciennes (MV)

Fauvette babillarde *Sylvia curruca*

Seulement 4 données cette année !

Senlis : 1 chanteur le 24/04, réentendu plusieurs fois en juin, quartier Bon Secours (PMal)

Avrechy " La Jatte " : 1 chanteur le 04/06 (FB)

Monchy-Saint-Eloi : 1 le 12/06 (PMal, RB, DS)

Boran-sur-Oise " Les Culots " : 1 juvénile le 01/09 (YB)

Fauvette grisette *Sylvia communis*

Première : 1 chanteur le 04/04 à Breuil-le-Vert " Marais de Giencourt " (FB)

Notée nicheuse certaine à Angy (FB), Dieudonné (YB), Forêt de Compiègne (JLB), Forêt de Hez-Froidmont (FB) et Thiers-sur-Thève (YB)

Effectif remarquable d'au moins 30 individus le 20/05 à Vauciennes " Bassins de décantation " (AR).

Dernière mention : 1 le 20/08 à Ercuis (YB)

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

Premières : 2 le 06/04 à Cambronne-les-Clermont (YL)

Notée nicheuse certaine à Bresles " Le Petit Marais " (FB)

Dernière notée le 10/09 à Vauciennes (PMS)

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

Premières : 2 chanteurs le 21/03 à Breuil-le-Sec (FB) et 3 à la même date à Saint-Félix (YL)

Nidification certaine notée à Gouvieux (YB)

Dernière migratrice : 1 le 08/10 en Forêt d'Ermenonville (JLB)

Début d'hivernage : 1 du 18 au 25/11 puis 2 le 09/12 à Fresnoy-la-Rivière " Pondron " (JPB)

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* (CHD)

Toujours aussi localisé.

Forêt de Compiègne : 1 chanteur parcelles 9101-9102 du 08 au 16/05 (PMS) , 1 chanteur parcelles 1151-1152 du 21/05 au 12/06 (PMal, RB, DS, AR). 1 le 02/06 parcelle 1462 (DG).

Béthisy-Saint-Pierre " Vallée Saint-Fiacre " : 1 le 20/05 (PMal, RB, DS).

Forêt de Pontarmé : 1 le 13/06 et le 08/07 " Butte aux Gendarmes " (PMal, RB, DS).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*

Premiers : plusieurs chanteurs le 20/04 en Forêt de Compiègne (CL).

Bilan en période de nidification (loin d'être significatif, à rechercher par conséquent) :

- Forêt d'Ermenonville : 5 chanteurs (YB, JLB, PMal, RB, DS, AR).

- Forêt de Compiègne : 24 chanteurs

- Forêt de la Haute-Pomméraie : 3 chanteurs (PMal, RB, DS)

- Forêt de Hez-Froidmont : 6 chanteurs (FB).

- Forêt de Thelle : 4 chanteurs et 1 couple (HdeL).

- Bois du Roi : 1 chanteur (PMal, RB, DS).

- Bois des Côtes : 3 chanteurs (FB).

- Forêt d'Halatte : 2 chanteurs (PMal, RB, DS, YL).

- Béthisy-Saint-Pierre : 3 chanteurs (PMal, RB, DS).

Dernière mention : 1 en halte migratoire à Morienvall " Cabaret " le 20/08 (HdeL).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

Plusieurs données de fin d'hiver 1999/2000 : 1 le 09/01 à Blaincourt (YB), 1 le 15/01 à Boran-sur-Oise (YB), 2 le 15/01 à Chevières (FB,CL), 1 le 16/01 à Fitz-James (FB), 1 le 25/01 à Noyon (MR). Avec l'arrivée des migrateurs, l'espèce est notée régulièrement à partir de la troisième décennie de février.

Nidification certaine notée à Nointel " Le Gibet " (FB).

Migration postnuptiale, quelques effectifs remarquables : 30 le 17/09 à Vauciennes (AR) et 10 le 14/10 à Morienvall (JPB, CG).

Plusieurs données d'hivernage en décembre : 1 les 01 et 05/12 à Orrouy (PMS), 1 à 3 du 01 au 23/12 à Moru-Pontpoint (PMS, FB, YB), 1 à Vauciennes le 02/12 (JPB, CG), 2 le 03/12 à Boran-sur-Oise (YB), 4 le 11/12 à Breuil-le-Vert (FB), 1 le 11/12 à Breuil-le-Sec (FB), 2 le 17/12 à Verberie (AR), 1 le 18/12 à Beauvais (FB), 1 le 20/12 à Bailleul-sur-Thérain (FB).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

Premiers : 2 chanteurs le 26/03 à Moru-Pontpoint (PMS).

Par la suite des chanteurs sont notés aux Marais de Sacy-le-Grand, à Houdancourt, Verberie, Noyon, Vineuil-Saint-Firmin, Neuilly-en-Thelle, Morlincourt, Saint-Maximin, Saint-Félix, en Forêt d'Halatte, d'Ermenonville, de Compiègne, de Chantilly, et de Pontarmé.

Dernier : 1 en halte avec chant le 24/09 à Morienvall " Brassoire " (PMS).

Roitelet huppé *Regulus regulus*

En période de reproduction, des chanteurs sont notés à Saint-Félix, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Cambronne-les-Clermont, Gouvieux, Noailles, en Forêt de Hez-Froidmont, d'Ermenonville, d'Halatte, de Compiègne et du Lys.

En automne, un groupe de 25 individus est noté le 14/10 à Morienvall " Brassoire " (JPB, CG).

Il est difficile de dire s'il s'agit de migrateurs ou d'un groupe local.

Roitelet à triple-bandeau *Regulus ignicapilla*

En période nuptiale, des chanteurs sont notés à Ansacq, Bailleul-sur-Thérain, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Gouvieux, Heilles, Houdancourt, Le Mesnil-sur-Bulles, Noailles, Saint-Félix, aux Marais de Sacy-le-Grand, en Forêt d'Halatte, d'Ermenonville, de Compiègne et de Hez-Froidmont.

Gobemouche gris *Muscicapa striata*

Premier : 1 le 01/06 à Breuil-le-Sec " Bois des Côtes " (FB).

Assez peu de données par la suite. Noté à Appilly " Le Passage de Brétigny ", Beauvais, Breuil-le-Vert " Marais de Giencourt ", Chantilly " La Canardière ", Cuise-la-Motte, Cuvilly, Gouvieux, Montreuil-sur-Thérain " Etangs ", Saint-Félix, en Forêt de Compiègne, d'Ermenonville, d'Halatte, de Hez-Froidmont et de Chantilly.

Noté en halte migratoire à Morienvall " Brassoir " : 1 le 05/09, 2 le 17/09, 1 le 24/09 (PMS)

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

Noté à partir du 20/04 en Forêt de Compiègne (CL). Au moins 25 individus, la plupart chanteurs, sont recensés dans ce massif jusqu'au 08/06. A rechercher dans les autres massifs.

Migration : 1 le 18/08, 1 le 24/08 et 1 le 12/09, dernière donnée annuelle, à Orrouy (PMS)

Panure à moustaches *Panurus biarmicus* CHD

Migratrice très rare dans l'Oise, 2 sont observées le 23/08 à Boran-sur-Oise " Gravières " (YB), donnée liée à la dispersion postnuptiale.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

Quelques bandes notées en automne et en hiver aux gravières de Boran-sur-Oise : 19 le 15/01, 20 le 08/10, 40 le 03/12 (YB), ainsi qu'à Saint-Leu-d'Esserent : 16 le 29/12 (YB)

Notée nicheuse certaine à Courteuil, Gouvieux (YB), Saint-Félix et Cambronne-les-Clermont (YL)

A noter, 1 sans queue le 02/04 en Forêt de Pontarmé (YB)



Mésange nonnette *Parus palustris*

Des chanteurs notés à partir du 03/01 en Forêt de Chantilly " Etangs de Commelle " (YB), puis à Gouvieux, Uilly-Saint-Georges, à Saint-Maximin " Bois de la Coharde ", en Forêt d'Ermenonville, du Lys, de Compiègne et d'Halatte (YB)

Mésange boréale *Parus montanus*

Cette espèce discrète, semble assez localisée dans l'Oise et n'est jamais abondante.

Notée en Forêt de Compiègne (chanteur parcelle 808 et 2161), Gouvieux " Bois des Bouleaux ", Verneuil-en-Halatte " Gravières " (chanteur), Noailles " Bois de Mouchy ", Saint-Félix " Etangs ", Breuil-le-Vert " Marais de Giencourt ", Breuil-le-Sec " Bois de la Sablonnière ", Nointel " Le Gibet ", Salency " Les Prés Saint-Denis ", Noyon " Tarlefesse " (chanteur), Morlincourt " Gravières ", Vauciennes " Bassins de décantation " (YB, FB, JLB, AR, MR)

Mésange huppée *Parus cristatus*

Peu de données significatives, notée nicheuse certaine à Gouvieux " Bois des Bouleaux " (YB)

Mésange noire *Parus ater*

Notée surtout dans les grands massifs.

Forêt de Hez-Froidmont : 1 le 09/01 (FB), 2 le 02/04 (YL)

Forêt d'Ermenonville : 1 chanteur parcelles 45-56 le 15/02 (YB), 1 chanteur parcelle 84 le 27/02 (YB), 5 chanteurs " Domaine de Chaâlis " le 01/04 (YB), 3 chanteurs le 24/04 (YB), 2 le 07/05 (YL) 2 chanteurs le 14/05 (JLB), 2 adultes nourrissent 3 juvéniles volants parcelle 1213 le 27/05 (HdeL), 2 le 14/07 parcelle 81 (YB), 1 chanteur parcelle 141 le 23/07 (JLB)

Forêt de Compiègne : 10 individus (5 chanteurs et 1 nid occupé parcelle 3391) le 12/03 (YB), 1 chanteur parcelle 858 le 08/05 (JLB)

Forêt de Chantilly : notée le 05/08 parcelle 217 (JMG)

Forêt de Pontarmé : 4 dont 2 chanteurs le 24/09 (YB)

Forêt d'Halatte : 2 le 10/03 parcelle 178 (YL), 2 le 20/03 parcelle 110 (YL) 1 chanteur parcelle 303 le 01/04 (YB), 1 chanteur parcelle 147 le 08/05 (YB)

Canny-sur-Matz : 1 le 12/03 (WM)

Mésange bleue *Parus caeruleus*

Notée nicheuse certaine en Forêt de Hez-Froidmont, d'Ermenonville, de Pontarmé, à Bailleul-sur-Thérain, Chantilly, Lamorlaye, Courteuil et Gouvieux (FB, YB, JMG)

Maximum de 22 individus le 29/12 à Saint-Leu d'Esserent " La Brossette " (YB)

Mésange charbonnière *Parus major*

Notée nicheuse certaine à Beauvais, Courteuil, Gouvieux, Saint-Félix, Vineuil-Saint-Firmin et en Forêt d'Ermenonville.

Bandes les plus importantes notées en période internuptiale : 20 le 06/02 à Mareuil-la-Motte (WM), 20 le 14/10 à Morienvall (JPB, CG)

Sittelle torchepot *Sitta europaea*

Des chanteurs en période de reproduction notés en Forêt de Compiègne, d'Halatte, d'Ermenonville, de Chantilly, à Saint-Maximin " Bois de la Coharde " et à Dieudonné.

Maximum de 10 individus le 06/02 à Mareuil-la-Motte (WM), 25 dont 15 chanteurs en Forêt de Compiègne " La Muette " le 12/03 (YB), 14 le 20/08 en Forêt d'Halatte " Mont Pagnotte " (YB), 10 le 03/10 en Forêt de Chantilly " Etangs de Commelle " (FB)

Grimpereau des bois *Certhia familiaris*

Toujours aussi localisé, 3 données seulement.

Forêt de Compiègne : 1 chanteur parcelle 1141 le 01/05 (PMS).

Gouvieux " Bois des Bouleaux " : 1 chanteur et 2 juvéniles le 13/06 (YB).

Forêt d'Halatte : 3 dont 1 chanteur au Mont Pagnotte le 20/08 (YB).

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*

Noté chanteur dès le 16/01 en Forêt de Chantilly (YB). Rien d'autre à signaler.



Dessin : W. Mathot

Rémiz penduline *Remiz pendulinus* CHD

Rares données dans l'Oise. 2 le 30/09 et le 01/10 (PMS, FB), le 08/10 (PMS) à Vauciennes " Bassins de décantation ", en halte migratoire.

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*

Premier : 1 chanteur le 27/04 à Bailleval " Bois des Côtes " (FB)

Bilan des oiseaux repérés en période nuptiale :

4 chanteurs respectivement en Forêt de Chantilly et à Varesnes

3 chanteurs aux Marais de Sacy-le-Grand et à Bailleul-sur-Thérain.

2 chanteurs en Forêt de Hez-Froidmont, à Bresles et à Bailleval.

1 chanteur et 1 couple à Houdancourt.

1 chanteur à Vineuil-Saint-Firmin, Breuil-le-Sec, Cires-les-Mello, Trosly-Breuil, Carlepoint, Breuil-le-Vert, Pontpoint, Saint-Félix, Chiry-Ourscamp, Ermenonville, Bulles, Moru-Pontpoint, en Forêt d'Ermenonville et de Compiègne.

1 couple à Nointel et à Chevrières.

Noté aussi sur cette période à Gury et en Forêt de Thelle.

Dernier : 1 le 30/08 à Houdancourt (FB)

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

Premières : 1 couple en Forêt de Compiègne le 21/05 (AR)

Total des oiseaux repérés ;

Forêt de Compiègne : 1 couple parcelle 2440, 1 couple et 1 mâle parcelle 2241, 1 mâle parcelle 2080, 1 couple et 4 juvéniles volants parcelle 0531 (AR, PMS)

Varesnes " Les Cailleux " : au moins 2 couples, 1 mâle nourrit 1 jeune le 12/06 (PMS)

Varesnes " La Fosse Cochue " : 1 mâle (WM)

Pas de dernière date significative.

Pie-grièche grise *Lanius excubitor*

Pas de reproduction notée cette année.

Les individus notés cette année le sont tous en période internuptiale.

Forêt de Hez-Froidmont : 1 individu dans le secteur du Carrefour du Magasin du 18/01 au 10/04 (FB, YL, JLB) puis du 04 au 17/12 (FB)

Forêt de Compiègne : 1 en parcelle 8260 le 25/02 (PMS)

Geai des chênes *Garrulus glandarius*

Effectifs les plus importants : 14 le 30/01 en Forêt de Compiègne " La Faisanderie " (JMV), 11 le 12/03 à Canny-sur-Matz (WM)

Noté nicheur certain à Chantilly " Canaux " et probable à Salency " Les Prés Saint-Denis ".

Migration : 5 en vol nord le 19/04 à Vineuil-Saint-Firmin (HdeL)

Pie bavarde *Pica pica*

Quelques groupes dépassant les 10 individus sont notés, surtout en période internuptiale : 12 le 13/03 à Vineuil-Saint-Firmin (JMG), 12 à 18 individus à Moru-Pontpoint du 02/10 au 23/12 (FB), 18 à Gouvieux " Etang de Toutedoie " le 23/12 (JMG)

Notée nicheuse certaine à Bailleul-sur-Thérain " Mont César " (FB)

Une donnée originale : 1 le 02/04 en Forêt d'Ermenonville, loin de toute zone habitée (JLB)

Choucas des tours *Corvus monedula*

Fin d'hivernage 1999/2000, effectifs maximum par site : 200 le 15/01 à Saint-Maximin " Gravières " (YB), 54 le 15/01 à Boran-sur-Oise " Gravières " (YB), 6 le 16/01 à Chantilly " Parc du Château ", 9 le 28/01 à Saint-Félix " Etangs (FB), 1 le 28/01 à Moru-Pontpoint (FB), 20 le 01/02 à Breuil-le-Sec " Etangs de l'Aubier " (FB), 66 le 15/02 à Monceaux (JPF)

Nidification : 2 adultes transportent des matériaux le 04/04 à Breuil-le-Sec (FB), 2 couples avec transports de matériaux sur l'église de Cambronnes-les-Clermont le 06/04 (YL) 2 adultes et 1 juvénile volant le 23/04 en Forêt de Hez-Froidmont (FB), 8 couples nicheurs avec nourrissage de jeunes sur l'abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois le 18/06 (YL)

Quelques groupes en automne : 37 le 27/10 à Taillefontaine (MV), 15 le 31/10 à Morcourt (JPF), 25 le 07/11 à Orrouy (JPF)

Migration active à Morienvall " Brassoir " : 114 individus du 07/09 au 11/11 (PMS, MV, JPB, CG).

Début d'hivernage 2000/2001 : 110 le 28/11 à Saint-Félix, 2 le 18/12 à Beauvais, 1 le 20/12 à Breuil-le-Sec (FB)

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

Nidification : l'enquête nationale de recensement des corbeautières permet le dénombrement de 50 colonies de reproduction pour un total de 1 432 nids comptés pour notre département (Commecy 2001).

Migration active à Morienvall " Brassoir " : 989 individus du 22/10 au 11/11 (MV, JPB, CG, PMS)

Quelques groupes en automne et début d'hiver : 120 le 17/11 à Auger-Saint-Vincent (MV), 150 le 27/11 à Saint-Etienne Roilaye (MV), 360 le 23/12 à Pierrefonds (MV)

Corneille noire *Corvus corone*

Nidification certaine notée à Saint-Félix (YL)

Anomalie pigmentaire :

1 leucistique le 25/03 à Boran-sur-Oise " Gravières " (YB), 1 leucistique (tête et rémiges primaires blanches) le 29/11 à Montreuil-sur-Brèche (HdeL)

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

Nidification certaine à Breuil-le-Sec, Moru-Pontpoint, Montreuil-sur-Thérain et en Forêt d'Halatte.

Dortoir en hiver et en automne : 1500 le 20/02 à Laigneville (YL) et 2500 le 19/10 à Clermont (YL).

Regroupements postnuptiaux : 500 à Vauciennes " Bassins de décantation " le 28/07 (PMS), 300 le 28/07 à Grandvilliers (GP), 300 le 31/08 à Houdancourt (YB)

Migration postnuptiale à Morienvall " Brassoir " : passage de 3857 individus du 14/10 au 11/11.

Martin triste *Acridotheres tristis* (CHN)

Origine férale ou strictement échappé de captivité : 2 le 27/07 à Breuil-le-Sec, sur un talus routier (FB)

Moineau domestique *Passer domesticus*

Peu de choses à signaler. Noté seulement nicheur certain à Vineuil-Saint-Firmin, Breuil-le-Sec, Chantilly et Apremont. Cette espèce, bien qu'encore très présente dans tous les endroits peuplés par l'homme, semble montrer des signes inquiétants de déclin, au moins en Europe Occidentale. Ainsi, certaines villes de Grande-Bretagne sont presque désertées par le Moineau domestique. Nous devons donc nous montrer vigilants quant à ses effectifs. A ce titre, le programme STOC-EPS du Muséum National d'Histoire Naturelle devrait permettre de dégager les premières tendances d'évolution.

Moineau friquet *Passer montanus*

En fort déclin et à surveiller.

Noté sur les sites suivants.

Boran-sur-Oise " Gravières " : 7 le 15/01, 25 le 18/02, 23 le 25/03 (YB).

Saint-Léger-en-Bray : 2 le 14/05 (YL)

Morlincourt : 2 au nid le 31/05 (MR)

Canny-sur-Matz : 1 le 25/06 (WM)

Longueuil-Sainte-Marie " Le Barrage " : de 1 à 20 individus du 25/07 au 08/09 (PMS, FB), 15 le 09/09 (PMS).

Berneuil-sur-Aisne : 1 le 19/11 (MV)

Saint-Félix : 10 le 20/07 (YL), 26 le 26/07 (YL), 1 le 28/11 (FB)

Secteur Néry, Vêrines, Rocquement : 20 le 17/12 (AR)

Moru-Pontpoint : 2 le 19/12 (FB)

Migration active à Morierval " Brassoir " : 3 le 22/10 (JPB, CG)

C'est globalement peu, et ce n'est guère rassurant pour l'espèce.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

Peu de données significatives, hormis le suivi de la migration postnuptiale à Morierval " Brassoir " : 271 migrants du 14/10 au 11/11.

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

Fin d'hivernage 1999/2000 et migration prénuptiale, des données de début janvier à fin avril. Maximum relevé par sites : 153 en Forêt de Hez-Froidmont (FB), 100 en Forêt de Chantilly " Etangs de Commelle " (YB), 6 à Boran-sur-Oise (YB), 20 à Houdancourt (FB), 7 en Forêt de Pontarmé (YB), 80 en Forêt de Compiègne (JLB), 1 en Forêt du Lys (YB), 3 à Neuilly-en-Thelle (YB), 3 en Forêt d'Ermenonville (YB), 10 à Verneuil-en-Halatte (HdeL), 53 à Dieudonné (YB), 60 en Forêt d'Halatte (YL)

Dernier : 1 mâle en plumage nuptial le 23/04 en Forêt de Hez-Froidmont (FB)

Retour : 1 le 07/10 à Morierval " Brassoir " en migration . Egalement 2 migrants le 03/11 et 1 autre le 09/11 sur ce même site (PMS)

Très peu noté en fin d'année : groupes maximums de 5 en Forêt d'Halatte (JLB), 5 en Forêt de Compiègne (JLB), 34 en Forêt de Hez-Froidmont (YL) et 3 en Forêt de Chantilly (JLB).

Serin cini *Serinus serinus*

Pas d'hivernant cette année.

Des chanteurs ou couples sont notés à Breuil-le-Sec, Clermont, Bailleul-sur-Thérain, Verberie, Creil, Lieuvillers, La Neuville-en-Hez, Breuil-le-Vert, Angy, Saint-Félix, Rantigny, Etouy, Cambronne-les-Clermont, Vauciennes, Béthisy-Saint-Pierre, Saint-Martin-Longueau, Sacy-le-Grand, Chantilly, Gouvieux, Bresles, Bulles, Milly-sur-Thérain, Saint-Sulpice.


Regroupements en fin d'été à Vauciennes : 11 le 26/08, 10 le 30/08 et le 17/09 (PMS, AR).

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*

Les groupes les plus importants sont notés en automne et en hiver.

Fin d'hiver 1999/2000 : 95 le 05/02 à Montiers (HdeL), 30 le 18/02 à Boran-sur-Oise (YB).

Automne et début d'hiver 2000/2001 : 350 le 19/09 à Moru-Pontpoint (FB), 70 le 17/11 à Rully (MV), 200 le 19/11 en Forêt de Compiègne (AR), 250 le 26/11 en Forêt d'Ermenonville (YB), 90 le 27/11 à Morierval (MV), 260 le 16/12 à Berneuil-sur-Aisne (MV).



Dessin : M. Votte

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

Quelques groupes au début du printemps, probablement de migrateurs en halte : 25 le 02/04 en Forêt d'Ermenonville (JLB), 54 le 12/04 en Forêt de Compiègne, recherchant un dortoir (PMS).

Par la suite la nidification certaine n'est notée qu'à Chantilly " La Canardière " (JMG).

Migration postnuptiale notée dès fin août : 50 le 26/08 à Boran-sur-Oise (YB), 30 le 17/09 à Vauciennes (AR), 40 le 24/09 à Houdancourt (YB), 200 le 24/10 à Orrouy (JPF), 50 le 25/10 à Verberie (WM).

Migration à Morienvall " Brassoir " : 100 en halte le 24/09 (PMS), 6 migrateurs le 22/10 et 2 autres le 05/11 (JPB, CG).

Début d'hivernage 2000/2001, un seul groupe noté : 23 le 20/12 à Bailleul-sur-Thérain (FB).

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

Fin d'hiver 1999/2000, observé sur les sites suivants jusque mi-avril avec comme effectifs maximums relevés : 50 en Forêt de Hez-Froidmont, 15 en Forêt de Chantilly, 12 à Breuil-le-Sec et à Moru-Pontpoint, 120 à Litz, 28 à Bailleul-sur-Thérain, 10 en Forêt d'Halatte et à Houdancourt, 20 à Breuil-le-Vert, 80 en Forêt de Compiègne, 30 à Nointel, 35 à Montreuil-sur-Thérain, 23 en Forêt de Pontarmé, 45 à Mello. Moins de 10 individus à Chantilly, Vineuil-Saint-Firmin, Cambronne-les-Clermont et Baillevall. Derniers : 8 le 16/04 en Forêt d'Ermenonville (JLB).

Retour : 1 le 04/10 à Morienvall " Brassoir ". Egalement 1 migrateur le 06/10 et 2 autres le 09/11 sur ce même site (PMS).

Noté ensuite jusque fin décembre, avec comme groupes maximums : 10 individus en Forêt d'Halatte, 150 à Saint-Félix, 22 à Chantilly, 30 à Moru-Pontpoint, 11 à Bailleul-sur-Thérain. Moins de 10 oiseaux en Forêt d'Ermenonville, Forêt de Compiègne, Forêt de Chantilly, Forêt de Hez-Froidmont, à Litz, Beauvais, Cires-les-Mello et Breuil-le-Sec.

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

Quelques groupes notés pendant le passage prénuptial : 27 le 26/02 à Moru-Pontpoint (YB), 26 le 26/03 à Neuilly-en-Thelle (YB), 20 le 09/04 à Verberie (JPF).

Notée nicheuse certaine à Litz " Wariville " (FB) et Neuilly-en-Thelle " Les Vignes " (YB).

Migration postnuptiale à Morienvall " Brassoir " : passage de 793 individus du 06/10 au 11/11 (PMS, JPB, CG, MV).

Plusieurs groupes sont notés sur cette période : 80 le 29/09 à Cires-les-Mello (JLB), 75 le 11/11 à Saint-Etienne Roilaye (MV), 40 le 19/11 à Berneuil-sur-Aisne (MV), 65 le 26/11 en Forêt d'Ermenonville (YB).

Hivernage : entre autres 240 le 16/12 à Berneuil-sur-Aisne (MV) et 150 le 24/12 à Morienvall (JPB, CG).

Sizerin flammé *Carduelis flammea*

1 donnée d'hivernage : 2 le 03/01 en Forêt de Chantilly " Etangs de Commelle " (YB).

Par la suite, des données pendant le passage prénuptial : 1 le 14/02 en Forêt de Pontarmé (YB), 12 le 28/02 en Forêt de Chantilly (JLB), 1 le 16/04 en Forêt d'Ermenonville (PMal, RB, DS) et 8 le 25/04 en Forêt de Pontarmé " Butte aux Gendarmes " (PMal, RB, DS).

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra*

Pas d'afflux cette année.

Noté seulement dans trois grands massifs forestiers.

Forêt d'Ermenonville : 1 le 15/02 parcelle 44 (YB), 4 dont 1 chanteur le 02/04 parcelle 140 (JLB), 1 le 24/04 parcelles 83-84 (YB).

Forêt de Compiègne : 23 le 18/03 parcelle 9013 (AR), 2 le 08/08 parcelle 3310 (PMS).

Bois du Lieutenant : noté le 09/05 parcelle 6 (JMG).

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*

Peu de choses à signaler. Noté en période de reproduction à Saint-Maximim, Bornel , Morlincourt, Chantilly et aux Marais de Sacy-le-Grand.

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*

Des données du 02/01 au 24/12.

Noté en Forêt d'Ermenonville, d'Halatte, de Chantilly, de Compiègne, du Lys (maximum de 18 le 25/02) (YB), de Hez-Froidmont, à Breuil-le-Sec, Chantilly, Canny-sur-Matz, Gouvieux, Senlis, Cires-les-Mello, Bornel, Belle-Eglise, Trosly-Breuil, Fitz-James, Fournival et aux Marais de Sacy-le-Grand.

Migration à Morienvall " Brassoir " : 2 le 29/10 (PMS).

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

Quelques groupes en fin d'hiver : 25 le 22/02 à Neuilly-en-Thelle (YB), 40 le 25/02 en Forêt de Compiègne " Mont Saint-Marc " (PMS).

En période nuptiale, des chanteurs et des couples sont notés à Gouvieux, Houdancourt, Beauvais, Saint-Aubin-sous-Erquery, Breuil-le-Sec, Neuilly-en-Thelle, Sacy-le-Grand, Salency, Pontpoint, La Rue-Saint-Pierre, Bresles, Cuignères, Bailleval, Ansacq, Litz, Bulles, Cauffry, Lamécourt, Dieudonné, Morlincourt, Nointel, Avrechy, Heilles, Berthecourt, Angivillers, Essuilles, Bornel, Fournival, Etouy, Thiers-sur-Thève, Cambronne-les-Clermont, en Forêt d'Halatte et de Hez-Froidmont.

Puis de nouveau, quelques rassemblements en première partie d'hiver : 16 le 21/12 à Saint-Aubin-sous-Erquery " Bois Plisson (FB) et 34 le 24/12 à Morienvall " Brassoir " (JPB, CG).

Bruant zizi *Emberiza cirlus*

Toujours aussi localisé dans l'Oise.

1 chanteur le 03/05 à Silly-Tillard, près du cimetière (YL).

1 chanteur à Laigneville, en zone bien ensoleillée en bordure du village, du 20 au 27/10 (FB).

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

Hivernage toujours assez faible.

Fin d'hiver 1999/2000 :

Moru-Pontpoint : 1 le 15/01 (JMV), 2 le 26/02 (YB) ;

Boran-sur-Oise : 27 le 15/01, 15 le 18/02 (YB).

Début d'hiver 2000/2001 : 6 à Vauciennes le 02/12 (JPB, CG), 2 le 03/12 à Boran-sur-Oise (YB), 2 le 09/12 en Forêt de Compiègne (PMS).

Nidification, bilan des chanteurs et couples recensés par sites :

- Moru-Pontpoint : 6 chanteurs	- Vauciennes : 3 chanteurs
- Breuil-le-Sec : 2 chanteurs	- Saint-Maximin : 1 chanteur
- Uilly-Saint-Georges : 1 chanteur	- Verneuil-en-Halatte : 3 chanteurs
- Houdancourt : 1 couple	- Lamorlaye : 1 chanteur
- Morlincourt : 4 chanteurs	- Troissereux : 1 chanteur
- Bailleul-sur-Thérain : 2 chanteurs	- Marais de Sacy-le-Grand : 1 chanteur minimum
- Beauvais : 1 chanteur	- Varesnes : 5 chanteurs
- Bresles : 1 chanteur	- Fitz-James : 2 mâles transportent de la nourriture dans un champ de colza
- Allonne : 2 chanteurs	- Bulles : 1 chanteur dans un champ de colza
- Chevrières : 2 chanteurs	

Migration à Morienvall " Brassoir " : 87 individus du 01/10 au 26/11 (PMS, JPB, CG).

Bruant proyer *Emberiza calandra*

Pas d'effectif particulier en hivernage.

En période nuptiale, des chanteurs sont notés à Angivillers, Avrechy, Balagny-sur-Thérain, Belle-Eglise, Betz, Breuil-le-Sec, Bulles, Cambronne-les-Clermont, Cires-les-Mello, Essuilles, Etouy, Fitz-James, Fouquerolles, Gouvieux, Lamécourt, Laversines, Lieuvillers, Litz, Maignelay-Montigny, le Mesnil-sur-Bulles Mouy, Nantheuil-le-Haudoin, Nointel, Nourard-le-Franc, Pontpoint, Ravenel, Rémérangles, Sacy-le-Grand et Saint-Just-en-Chaussée.

Bibliographie

Commeccy X, Mercier E, Sueur F. – *Atlas des oiseaux nicheurs de Picardie (1983-1987)* – Picardie Nature & Centrale Ornithologique Picarde.

Picardie Nature (Gavory L.) & Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (décembre 1998) – *Listes régionales d'espèces déterminantes – oiseaux nicheurs – Listes régionales d'espèces déterminantes – Oiseaux hivernants* – in *Modernisation de l'Inventaire des ZNIEFF de Picardie – Eléments méthodologiques validés par le C.S.R.P.N. Picardie.*

Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D. (1999) *Oiseaux menacés et à surveiller en France – Listes Rouges et priorités – Population. Tendances. Menaces. Conservation.* Société Ornithologique de France/LPO. Paris

Yeatman-Berthelot D & Jarry G. *Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 1985-1989* Société Ornithologique de France.

Mathot W. (2001) Deuxième cas de nidification de l'Echasse Blanche *Himantopus himantopus* dans l'Oise. *L'AVOCETTE* 25 (1-2) : 26-29.

Sengez P & M (2001) Première observation de Bécasseaux falcinelles *Limicola falcinellus* dans l'Oise. *L'AVOCETTE* 25 (1-2) : 30-32.