

ISSN 0181 - 0782

L'AVOCETTE

Bulletin de la Centrale Ornithologique Picarde

1984 8 (3-4) 49-148

Commechy X., Rigaux T. et Sueur F. : Synthèse des observations 1982
dans la Somme. p. 49 à 122

Dupuich H. : Synthèse des observations 1981 dans l'Aisne.
p. 123 à 138

Dupuich H. : Enquête F.I.R. sur les populations de rapaces diurnes
non rupestres : la situation dans l'Aisne en 1981 et conclusions
sur les 3 années d'enquête. p. 139 à 148

Centrale Ornithologique Picarde

Salle Polyvalente de l'Ile aux Fagots

43 Chemin de Halage 80000 Amiens

Conseil d'Administration 1985

Président : Stéphane Bacrot

Trésorier : Xavier Commecy

Secrétaire : Pierre-Jean Le Morvan

Membres : Hugues Dupuich et Laurent Gavory

L'Avocette

Rédacteur en chef : Xavier Commecy

Réalisation technique : Xavier Commecy, Edith et Laurent Gavory.

Adresses des auteurs :

X. Commecy : place Godailler Decaix, Gentelles 80380 Villers-
Bretonneux

H. Dupuich : 84 rue J.B. Carpeaux 60100 Creil

T. Rigaux : Cité scolaire 80000 Amiens

F. Sueur : rue du Bosquet 80120 Rue

Illustrations : L. Gavory

L'Avocette est publiée avec le soutien financier de la station
d'Etudes en Baie de Somme par l'atelier de reprographie de l'UER
de Sciences Exactes et Naturelles d'Amiens

SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1982 DANS LA SOMME

INTRODUCTION

Voici la première synthèse C.O.P. qui prend donc la suite des synthèses G.E.P.O.P. L'arrivée de nouveaux observateurs au sein de cette association nous permet d'avoir une synthèse plus épaisse et plus complète. Un point encourageant supplémentaire; si le suivi des zones les plus intéressantes est toujours assuré, le nombre de petites études augmente - recherches sur un secteur ou une espèce

- suivi des migrations
- recherches de densités de nicheurs...

et ceci permet une amélioration de notre connaissance de l'avifaune picarde. Bien sûr, comme chaque année, quelques observations remarquables ont été enregistrées.

Puffin fuligineux : 2 observations en Octobre

Harelde de Miquelon : 1 pendant 2 semaines à Estrées- Mons

Aigle criard : 2 observations concernant 3 oiseaux fin Novembre
début Decembre sur le littoral

Pygargue à Queue Blanche : 2 Immatures ont hiverné en Baie de Somme

Grue cendrée : comme dans toute la France, passage d'automne exceptionnel; près de 1000 stationnées début Novembre

Petit chevalier à pattes jaunes : 1 au POM à la mi Juillet

Sterne de Dougall : 1 à la mi Juillet en B.S.

Mouette de Sabine : 1 en mi Mars en B.S.

Malheureusement des problèmes subsistent aussi pour la partie consacrée aux Oies, nous avons du redemander à quelques observateurs de nous renvoyer leurs données, ayant constaté la disparition des fiches concernant ces espèces après le départ de la Centrale Ornithologique Picarde de trois responsables de la synthèse. Il en est de même pour d'autres espèces, toujours pour les mêmes raisons (espèces signalées dans le texte). Admettons que cette disparition soit à mettre sur le compte de la négligence...

X. Combecy, T. Rigaux et F. Sueur

OBSERVATEURS (Réguliers ou occasionnels)

G. Becquet, P. Biet, M. Boissaye, P. Carruette, E. Chacron,
X. et A.M. Combecy, H. Copin, B. Couvreur, M. Czajkowski, H. Dansette,
F. Decaix, M. Defernand, C. et R. Devisse, A. et G. Duhamel, H. Dupuich
A. Dupuis, M. Duquef, P. Etienne, J.P. Ferre, G. Flohart, F. Fouquet,
D. Fosse, L. et P. Gavory, J.L. Granpierre, P. Grangé, O. Hernandez,
M. et V. Mennecart, E. Mercier, F. Montel, V. Monvoisin, J. Mouton,
G. Neveu, T. Rigaux, J.C. Robert, P. Royer, P. Raevel, Q. Spriet,
F., G., M. et P. Sueur, M. Sueur-Bellart, B. Tailliez, P. et J.M.
Thiéry, P. Triplet, I. Veriere, P. Yesou.

CLIMATOLOGIE 1982

quelques lignes sur le temps qui a régné sur le département en 1982,
ceci pouvant parfois expliquer quelques observations.

Températures :

Deux petits coups de froid à la mi Janvier et fin Février. Le reste
de l'année est soit plus doux soit avec des températures égales à
la normale.

Pluviométrie :

Les mois de Mai et Juin ont été particulièrement arrosés ainsi qu'
irrégulièrement la fin de l'année d'Octobre à fin Décembre.

Insolation :

L'ensoleillement a été légèrement supérieur ou égal à la moyenne,
sauf Juin.

Vents :

Quelques périodes de vents forts (toujours de W. ou SW.)
5 Janvier : 94 Km/h ; 1 Mars : 104 Km/h, période de vents forts
jusqu'à la mi-Mars ; plusieurs jours de vents forts début Avril ;
Nouvelle période de vent de la mi-Novembre à la fin Décembre avec
des maxima de 95 Km/h en Novembre et de 110 le 10 et 104 Km/h le 20.

Tiré des "Bulletin Climatologique de la Somme" Association Météoro-
logique de la Somme, année 1982.

PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica

2 au HA le 1 janvier puis 1 régulièrement observé jusqu'au 14 février,
ensuite 1 le 21 mars et 1 du 25 avril au 16 mai.

1 au Crotoy le 8 février et 1 trouvé mort en RBdS, le 15 février.

RBdS: 1 le 9 avril.

Retour précoce avec 1 trouvé mort le 17 août au Crotoy. (P. TRIPLET)

En décembre, au HA, 3 le 19 et 1 le 26.

RBdS: 3 en migration vers le Sud, le 1 et 1 le 18.

3 le 2 à Quend Plage et 2 à Cayeux-sur-mer, le 3.

PLONGEON IMBRIN Gavia immer

1 le 16 mai au HA. (A. et G. DUHAMEL)

1 en migration vers le Sud, le 1 décembre en RBdS. (M. BOISSAYE, J. MOUTON
et Q. SPRIET)

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata

Stationnements au Sud de la BdS

30 le 13 janvier, 80 le 3 février.

1 le 12 avril.

1 le 19 septembre.

2 le 6 novembre, 1 le 3 décembre (+ 50 Gavia sp.) et 4 le 30 décembre.

Tous observés en mer dans le secteur: Cayeux-sur-mer, Woignarue.

Stationnements sur le HA

2 tout le mois de janvier. 3 les 3 et 7 février puis 1 du 14 février au 21 mai.

3 le 12 avril.

Retour: 1 le 13 novembre puis pendant tout le mois de décembre.

RBdS-POM

2 le 24 février. 1 du 13 au 23 avril. 3 morts le 20 décembre. 1 aux carrières
de St-Firmin le 28 avril.

BdA

7 le 28 février.

En terres

1 du 9 janvier au 6 février à Famechon. (J.C. ROBERT)

Migrateurs observés

35 à Quend Plage le 15 février, 11 en vol vers le Sud le 27 novembre en

2 h 30. Environ 150 en mouvements le 2 décembre en 4 h 00. (Gavia sp.,
probablement à majorité catmarin) (M. BOISSAYE, J. MOUTON et Q. SPRIET)

GREBE HUPPE Podiceps cristatus

Nidification

N: nicheur certain NP: nicheur probable Np: nicheur possible

Nidification dans la vallée de la Somme (de l'amont vers l'aval)

St-Christ-Briost : 1N 2NP 2Np

Brie : 2N 1NP

Péronne : 3N

Ste-Radegonde : 15N 2NP

Cléry-sur-Somme : 5N 3-4NP

Frise : 1N

Cappy : 1N

Bray-sur-Somme : 1N 5-6NP

Etinehem : 1NP 1Np

Méricourt-sur-Somme : 1NP

Chipilly : 1NP

Sailly-le-sec : 1NP

Vaux-sur-Somme : 1N 1NP 1Np

Camon : 4N

Amiens : 2N

Longpré-les-Amiens : 1N

Argoeuvre : 3N

St-Sauveur : 10N 3NP 1Np

Ailly-sur-Somme : 1N

La Chaussée Tirancourt : 2N

Breilly : 1N

Picquigny : 1N 1NP

Belloy-sur-Somme : 3N 1Np
 Hangeest-sur-Somme : 4N
 Bourdon : 2N
 L'Etoile : 5N 2NP
 Long-le-Catelet : 5N 2Np
 Longpré-les-Corps-Saints : 5N 1Np
 Vieulaine : 2-4NP
 Fontaine-sur-Somme : 6N 2NP 3Np
 Erondelle : 1NP
 Bray-les-Mareuil : 1N 1Np
Nidification dans la plaine maritime picarde
 Rue (Etang du Gard) : 1N
 Arry : 4N
 St-Firmin : 2N
 Noyelles-sur-mer : 1Np
 Hautebut : 1Np
 HA : 4N

Nidification dans les autres vallées

Gamaches : 1N
 Boves : 8N 2NP 2Np
 Fouencamps : 3N
 Thézy-Glimont : 1N
 Tilloy-les-Conty : 1N

Conclusion sur la nidification

Soit 44 localités avec 117 couples nicheurs certains, 34 à 38 couples nicheurs probables et 22 couples nicheurs possibles. Soit 173 à 177 couples pour le département (nouveau maximum enregistré alors que toutes les localités où l'espèce nichée habituellement n'ont pas été recensées cette année: Curlu, Flamicourt ...)
 Pour 93 couples où le nombre de jeunes a été relevé, nous notons: 16 couples/1 jeune, 36 couples/2 jeunes, 22 couples/3 jeunes, 14 couples/4 jeunes et 5 couples/5 jeunes.

Stationnements et migrations sur le littoral

En mer

BdS Nord: Janvier: Pas de stationnements notables (- de 10)
Février: 40 + 335 en migration vers le Nord le 23. 25 le 25.
Avril: 60 le 26.
Mai: 45 le 21. 10 le 30.
 Encore 4 le 1 juin. Retour: 7 le 7 juillet.
 Migration notée fin octobre (1 le 25, 1 le 27 et 8 le 30)
Novembre: 9 le 11.
Décembre: 21 le 1. 100 + 140 en migration en 4 h 00 le 2. Entre 10 et 20 le reste du mois.
 BdS Sud: 40 le 14 février. 120 + 180 en migration vers le Sud le 3 décembre et 180 le 30 décembre.

HA

4 en janvier, 7 en février, 8 en septembre, 10 en octobre, 5 en novembre et 1 en décembre.

POM

2 le 2 janvier, 1 du 22 au 27 juillet et 1 du 20 au 27 décembre.

BdA

3 le 27 février et 1 le 18 juillet.

Stationnement en terres (Pulli exclus en dehors de la période de nidification)

Amiens (sur la Somme): 1 du 9 au 11 janvier et 1 le 15 septembre.

Boves: 2 en février, 3 en mars et 7 en août.

Camon: 1 le 13 mars, 5 le 21 mars et 8 le 5 avril.

Famechon: 1 en janvier, 2 le 3 février et le 6 février. (non nicheur)

Secteur Fontaine-sur-Somme et Long-le-Catelet: 1 en janvier, 14 en février et 12 en mars

HVS: 7 en janvier, 35 en février, 36 en mars. 49 le 30 août, 59 en octobre, 13 en décembre.

Gamaches: 18 le 25 février, 49 le 9 mars et 36 le 30 mars.

St Sauveur: 1 en février et 3 mars.

GREBE JOUGRIS Podiceps griseigena

1 au HA du 4 au 14 février, plus 2 ce dernier jour en mer face à ce lieu. 1 le 27 octobre au HA.

Quend-Plage: 1 le 21 février, 3 le 29 octobre et 7 novembre. 2 le 2 décembre.

POM: 2 probables du 16 au 19 décembre et 1 le 27

RBdS: 1 mort le 28 janvier et 1 vivant le 31 décembre.

Le Hourdel: 1 le 19 décembre.

GREBE ESCLAVON Podiceps auritus

1 le 24 janvier au HA puis 2 du 4 au 14 février, et 1 le 18 mars.

1 en RBdS le 2 décembre

Grèbe esclavon/Grèbe à cou noir: 25 le 2 à Quend-Plage puis 9 le 3 décembre en migration vers le Sud à Cayeux-sur-mer. (M. BOISSAYE, J. MOUTON et Q. SPRIET)

GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis

1 du 24 janvier au 14 février et 5 le 3 février au HA.

Episodiquement observé ensuite, sans preuves de nidification: 1 en plumage nuptiale le 9 avril, 1 le 20 mai et 1 le 23 juillet. (G. FLOHART et P. TRIPLET)

En terres:

1 en plumage nuptiale à St Sauveur le 7 avril et 1 en plumage nuptiale à Estrées-Mons le 10 août. (X. COMMECY)

3 adultes en plumage nuptiale le 23 avril au Marais de Rue. (J. MOUTON)

1 le 16 novembre au Crotoy et 1 le 2 décembre à Quend-Plage.

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollis

Nidification certaine

Abbeville: 1 couple/2 juv le 10 septembre

Bergicourt: 1 couple/3 juv le 19 juin, 1 couple/1 juv le 3 juillet et 4 autres nids.

Flixecourt: 1 couple/1 pullus le 19 juillet

Longpré-les-Amiens: 1 couple/2 pulli et 1 couple/1 pullus le 15 juin.

Noyelles-sur-mer: 1 couple/3 pulli le 16 juillet.

POM: 1 pullus le 5 juin, 5 le 19 juin et des pulli en juillet.

Rue: 1 couple/2 pulli le 19 juillet, 1 couple/1 pullus et 1 couple/3 pulli le 25 août.

Dunes du Marquenterre: 1 couple/4 pulli le 26 mai.

Nidification probable

Noté à la Chaussée-Tirancourt (chanteurs), Monchaux, Arry et Bernay.

Observé aussi

Amiens: La Hotoie: du 7 janvier au 5 mars puis en octobre, novembre. (4 à 5 individus)

MBdM: noté en janvier et février.

Airaines: observé en novembre.

Argoules: noté en septembre.

Arry: vu en décembre.

Boves: noté en mars et mai (2 endroits).

Belloy-sur-Somme: observé en mars.

Blangy-sous-Poix: vu en septembre.

Frise: noté en février.

Grand-Laviers: 18 le 21 octobre.

Et à Nampont, Régnière-Ecluses.

PUFFIN DES ANGLAIS Puffinus puffinus

1 en BdA le 3 septembre. (O. HERNANDEZ et T. RIGAU)

PUFFIN FULIGINEUX Puffinus griseus

1 le 9 octobre (A. et G. DUHAMEL) et 1 le 19 octobre (J. MOUTON) à Quend-Plage.

FULMAR Fulmarus glacialis

Noté au Bois de Cise (Ault) où il niche: 2 pulli le 24 juillet (J.C. ROBERT). Du 14 février à août, minimum de 12 couples cantonnés.

1 en migration vers le Sud à Quend-Plage le 9 août.

Grèbe castagneux Podiceps ruficollis

Stationnements dans les lieux régulièrement suivis (maxima mensuels)

+ pulli exclus

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Bergicourt				12		16 ⁺	20 ⁺	29	39			9
Famechon	13	2	6	2	4 ⁺	3 ⁺		6 ⁺	8 ⁺		6	9
Longpré-les-Amiens			4		4 ⁺	4 ⁺						
Tilloy-les-Conty	5	1		1							1	
Le Crotoy	20	26									11	20
Rue						31 ⁺	23 ⁺	45 ⁺	40 ⁺	20		
Noyelles-sur-mer		1	8	4		2 ⁺				11	1	10
POM	6	2	3	5	4	7 ⁺	10 ⁺	10 ⁺	17	15 12 33	27 21 20	13
HA	2	2	4	8	7	10	4	9		8	3	3
HVS	42	17	17			1	28	44		61	27	45

FOU DE BASSAN Sula bassana

5 trouvés morts en janvier, février et 1 en BdS en décembre.
1 en novembre au sommet de la falaise de Ault.

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo

Stationnements au Nord de la BdS (RBdS-POM) (maxima mensuels)

14 le 4 janvier, 4 les 4 et 13 février, 12 le 19 mars, 12 le 6 avril, 11 le 1 mai,
2 le 27 juin, 6 le 24 juillet, 23 le 6 août, 35 le 23 septembre, 25 le 17 octobre,
17 le 19 novembre et 25 les 5 et 31 décembre.

Stationnement au Sud de la BdS (HA) (maxima mensuels)

1 le 12 janvier, 1 les 7 et 25 mars, 9 le 25 avril, 11 le 19 mai (1 couple à
comportement de nicheur le 7 mai et 1 nid le 16 mai (A. et G. DUHAMEL)), 5 (dont 2
juv) le 2 juin, 4 le 26 juillet, 4 le 24 août, 3 le 1 septembre, 1 le 19 octobre,
7 le 26 novembre et 2 le 13 décembre.

Migration sur le littoral

Des mouvements migratoires sont notés en juillet: 1 le 25 et surtout en août: 27 le
25 et 6 le 30 sur le littoral. Puis reprise fin octobre: 5 le 27, 3 im le 29.

En novembre: 9 le 6, 6+14+19 le 7 et 5 le 11. 1 le 2 et 3 le 13 décembre.

Quelques mouvements de migrateurs au printemps: 7 le 14 et 1 le 30 mars, 11 (dont 1
P. c. sinensis) le 11 avril, 6 le 18, 8 le 20 et 6 le 30.

A noter aussi, 18 en migration vers le Nord le 6 janvier au HA.

Observé aussi

Entre Noyelles-sur-mer et St-Valery-sur-Somme: 8 le 19 avril, 13 le 24, 23 le 1,
2 le 18, 8 le 20 mai, 1 le 2 juin et 1 du 2 au 9 août.

En terres: mars: 1 (P. c. sinensis) le 24 à Cléry-sur-Somme.

avril: 1 le 17 à Cléry-sur-Somme et 8 le 29 à Long-le-Catelet

novembre: 1 im le 14 à Famechon

décembre: 3 le 4 à Cléry-sur-Somme

CORMORAN HUPPE Phalacrocorax aristotelis

1 ad en vol avec 23 Grands Cormorans P. carbo le 1 mai à St-Valery-sur-Somme (aisément
reconnaissable à sa petite taille J. MOUTON).

HERON CENDRE Ardea cinerea

Nidification

Boismont: 107 nids le 1 avril (adultes absents le 3 février, 30 présents le 14,
nombreux jeunes nés le 25 avril et 1 jeune emplumé le 11 mai. (X. COMMECY,
H. DUPUICH, M. SUEUR-BELLARD et F. SUEUR)

POM: 5 nids (2+3) (Installation en avril, premières éclosions le 13 mai. (Informations
P. BIET et F. SUEUR)

Péronne: 6 nids occupés le 17 février et 13 le 13 mars. (X. COMMECY et H. DUPUICH)

Cléry-sur-Somme: 19 nids occupés le 17 février et 23 le 13 mars. (X. COMMECY et
H. DUPUICH)

Stationnements au POM

18 le 7 janvier, 17 le 27 février, 15 le 17 mars, 13 le 18 avril, 15 le 13 mai,
33 le 8 juin, 40 le 4, 111 le 5, 80 le 6, 65 le 9, 54 le 18, 89 le 26 juillet,
121 le 5 août, 28 le 28 septembre, 34 le 28 octobre, 39 le 8 novembre et 23 le 6
décembre. (60 le 10 juillet à Noyelles-sur-mer, Boismont qui, la zone de nutrition

des Hérons cendrés A. cinerea nicheurs de Boismont)

Dans le reste du département, toujours le même schéma: dispersion dans toute la
Somme hors période de nidification (19 localités citées) et quelques individus
dispersés dans les vallées en période de nidification en dehors des colonies connues
(9 localités citées). Ceci peut laisser espérer d'autres installations (Boves,
La Chaussée Tirancourt par exemple).

Des passages vers le Nord Nord-Est sont notés en mars à Rue: 3 le 4, 26 le 26 et
5 le 27.

Le retour se fait dans la deuxième décade de juillet, des migrateurs sont encore
visibles ensuite: 1 le 25 octobre en BdS et 3 le 6 novembre au Hourdel.

Lieux régulièrement suivis

Tilloy-les-Conty: 5 en janvier, 3 en février, 2 en mars, 1 en avril, 2 en juillet,
3 en août, 1 en septembre, 12 en octobre, 5 en novembre et 7 en
décembre.

Famechon: 4 en janvier, 13 en février, 3 en mars, 1 en août, 5 en septembre, 2 en octobre et novembre et 1 en décembre.
A noter: 1 à Amiens(MdBm) le 18 janvier, 20 le 7 septembre à Eclusier-Vaux et 35 le 21 juillet à Rue.

HERON POURPRE Ardea purpurea

1 le 20 mai aux marais de Rue.(J. MOUTON)
1 le 21 juillet en BdS.(G. FLOHART et T. RIGAUX)
1 im à Eclusier-Vaux le 27 juillet.(X. COMMECY)

AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta

Uniquement observée au POM, essentiellement après la nidification.(maxima par décades)

1 du 1 au 6 janvier, 1 le 30 mai et 1 les 3, 21 et 23 juin.
juillet: 2 le 10 et 3 du 12 au 23.
août: 2 le 2, 5 le 6, 2 le 11 et 3 le 22.
septembre: 2 le 1 et 1 le 10.
Dernière: 1 le 4 octobre.

HERON BIHOREAU Nycticorax nycticorax

POM: 1 le 12 mai, 2 les 20 et 25 et 3 le 31.
juin: 7 du 7 au 9, 1 le 19 et 7 le 22.
1 le 3 juillet, 1 le 3 août, 1 traversant la BdS le soir du 2 novembre et 1 du 12 au 15 novembre.
Boismont: 2 stationnent le soir le 10 juillet.(J. MOUTON)
1 ad le 18 près de Noyelles-sur-mer.(T. RIGAUX)

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus

Premier: 1 le 5 mai à Boves.
Observé en période de nidification: Boves(minimum de 3 couples), Bray-sur-Somme, Dominois(1 couple/1 juv), L'Etoile, Fouencamps, La Chaussée Tirancourt(2 couples).
Dernier: 1 le 12 septembre à Dominois.

GRAND BUTOR Botaurus stellaris

Noté en hiver à Abbeville: 1 le 22 janvier, au Crotoy: 1 le 21 février, POM: 1 du 6 au 17 janvier et 1 le 27 octobre au HA.
Chanteurs entendus à: Arry Abbeville, Belloy-sur-Somme, Boves (2 lieux différents), Fouencamps (2 couples), La Chaussée Tirancourt (2), Nampont-St-Martin, Noyelles-sur-mer.(Les chants sont entendus du 20 mars au 16 juin.)
J. MOUTON note son absence au Marais de Rue-Favière où l'espèce était connue.

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia

Peu observée cette année si ce n'est une bande de 24 le 13 mai qui traversent la BdS de la pointe du Hourdel à la pointe de St-Quentin puis disparaissent vers le Nord-Est.(J. MOUTON)
Autres observations de mai: 1 du 13 au 26 au POM, 1 le 26 à Belloy-sur-Somme, 1 le 31 à Gamaches et 1 le 9 juin à Noyelles-sur-mer.
juillet: 1 les 15 et 16, 3 les 23 et 24 à Noyelles-sur-mer et St-Valery-sur-Somme.
Le stationnement continue en août: 1 du 10 au 18 (3 le 13) et encore 1 le 12 septembre.
Port-le-Grand: 1 le 16 mars et 2 le 7 novembre.

CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra

1 le 20 avril à Famechon.(J.C. ROBERT)
1 juv le 11 juin à Rue.(P. ETIENNE et J. MOUTON)

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia

Première: au POM, 1 les 28 et 29 mars et 3 le 30.
POM-RBdS: avril: 2(9) 2(18) 2(23)
mai: 1(4 et 9) 12(13) 1(24)
juin: 3(8) 1 im (21-23)
juillet: 3(9) 3(11) 2(22-31)

août: 2(6) 12(16) 19(29)
 septembre: 27(1) 10(18) 9(24 au 29)
 octobre: 2(3)
 novembre: 2(8)

HA: 7 le 15 février. (G. BECQUET) et 8 le 3 et 1 le 9 avril.


Gamaches: 1 le 6 avril

Rue: 2 le 27 juillet

St-Valery-sur-Somme: 2 le 5 décembre. (P. TRIPLET)

Noyelles-sur-mer: 1 ad en plumage nuptial à la colonie de Hérons cendrés A. cinerea
 -Boismont le 25 mars et 1 à St-Valery-sur-Somme (J. MOUTON). 1 le 29 avril,
 2 le 16 mai, 4 le 31 mai et 2 ad le soir à la colonie le 10
 juillet.

Migrateurs observés: 4 le 18 juillet à Fort-Mahon et 2 le 7 novembre à St-Valery-
 sur-Somme.



HERON CENDRE

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor

<u>Nidification</u>	
HA	: 2 couples (2)
Noyelles-sur-mer/Boismont	: 5 couples (5)
Abbeville	: 2 couples (2)
Longpré-les-Corps-Saints	: 1 couple (1)
Long-le-Catelet	: 3 couples (1)
Ailly-sur-Somme/St-Sauveur/La Chaussée-Tirancourt	: 5 couples (2)
Cléry-sur-Somme	: 1 couple (1)
Péronne	: 2 couples (2)
St-Christ-Briost	: 1 couple (1)
Prie	: 1 couple (1)
Roves	: 1 couple (1)

Au total, 24 couples (dont 18 dont la nidification a été dûment prouvée, chiffre entre parenthèses après le nombre de couples pour chaque localité) pour le département de la Somme mais aucune donnée ne nous est parvenue des vallées de l'Authie et de la Bresle, cette dernière notamment devant abriter quelques couples. L'effectif total connu est sensiblement constant: 25 couples en 1981.

Données par localités

Le Crotoy: 3 le 16 janvier

POH: 4 le 6 janvier

1 le 7 février

10 le 8 mai, 39 le 20, 19 le 21

11 le 7 juin, 19 le 14, 6 le 23

3 le 6 juillet

2 le 4 octobre, 6 les 17 et 22

5 les 7 et 16 novembre, 6 le 29

6 le 6 décembre, 2 le 13

Le Cygne tuberculé C. olor a été beaucoup plus fréquent cette année dans cette localité que les années précédentes.

HA: 20 le 6 janvier, 66 le 13, 11 le 28

14 le 3 février, 30 le 14

18 le 10 mars, 25 le 21 (38 le 7)

14 (dont 1 couple) les 6 et 11 avril, 17 (1 nid) le 25, 12 (dont 2 couples/2 nids) le 11 mai, 40 (dont 2 couples/3 pulli dont 1 blanc et 7 pulli) le 28

56 le 9 juin, 98 le 20, 78 le 9 juillet

109 le 4 août, 100 le 18

108 ad et im + 1 année, 5 jeunes de l'année le 12 septembre, 118 le 19

104 le 10 et 24 octobre, 124 le 27

80 le 7 novembre, 59 le 15

56 le 5 décembre, 25 le 13

Mers-les-Bains: 9 ad + 1 im le 27 octobre

Noyelles-sur-mer/Boismont (cette dernière localité étant parfois indiquée St-Valery-sur-Somme par les observateurs):

42 le 6 janvier, 35 le 13, 14 le 28

51 le 3 février, 35 le 14

59 le 10 mars, 61 (dont 2 couples cantonnés) les 14 et 21, 68 (dont 4 couples et 14 im) le 25

50 (dont 3 couples/nids) le 6 avril, 71 (dont 5 couples/nids) le 11, 47 le 21

23 (dont 1 couple/1 nid) le 11 mai

61 le 9 juin

2 ad/7 juv le 8 juillet, 8 le 16, 3 ad et 1 couple/7 juv le 23

4 le 9 août

5 le 19 septembre

12 ad, 1 subad, 8 juv le 21 octobre

30 le 7 novembre

Abbeville: 1 couple/4 juv et 4 ad le 21 janvier (de l'année précédente)

2 couples/1 et 3 juv le 10 septembre

2 couples/1 et 3 juv ainsi que 2 ad les 17 et 24

Mareuil-Caubert: 2 le 12 janvier, 14 le 22

25 le 2 février

18 le 26 mars

7 le 2 avril, 8 le 13

espèce notée en mai

Blangy-sur-Bresle : 1 couple/3 juv le 15 septembre

Gamaches : 5 le 25 février

7 le 2 mars, 4 du 11 au 23

3 le 6 avril

Fontaine-sur-Somme : 5 le 27 janvier

2 les 10 et 14 février

1 couple le 3 mars

L'Etoile/Condé-Folie : 1 le 29 avril

Ailly-sur-Somme/St-Sauveur/La Chaussée-Tirancourt : 2 ad le 6 janvier, 11 le 20, 7 le 24

1 le 7 février

5(dont 1 couple) le 9 mars

1 du 30 mars au 7 avril, 2 du 14

avril au 18 mai

3 couples les 1 et 7 juin dont

1 couple/6 pulli le 7, 5 couples dont 1 avec 7 pulli le 15

1 couple/6 pulli le 16 juillet

15 le 20 août, 6 le 27

1 couple/5 juv le 24 septembre

Longpré-les-Corps-Saints : 5 le 27 janvier

4 le 10 février, 8 le 17

8(1 nid ?) le 9 mars

2 couples le 7 avril

1 couple le 6 mai, 7 individus dont 3 couples le 18

1 couple/7 pulli le 19 juillet

Amiens : 2 ad 1 im(né sur place, La Hotoie) le 13 janvier, 4 ad 1 im le 14, plus que

3 le 17

5 migrateurs le 24 (Cité scolaire)

2 le 22 avril

1 couple le 2 mai (Longpré)

2 le 8 août

Camon : 1 le 13 mars

3 le 12 mai

Boves : 2 le 17 janvier

2 le 21 mars

2 ad/3 pulli le 25 juillet

Thézy-Glimont : 4 le 19 avril

Froise : 2 le 17 février

Flamicourt : 4 le 19 octobre

Cléry-sur-Somme : 4 le 20 janvier

2 le 17 février

1 le 13 mars, 2 le 24

1 couple/1 nid le 17 avril

1 couple les 23 mai et 16 juin

1 ad le 27 juillet

10 le 19 octobre

24 le 16 novembre

14 le 4 décembre, 3 le 18

Péronne/Ste-Radegonde : 9 le 20 janvier

17 le 17 février

4 (dont 1 couple/1 nid) le 13 mars, 8 le 24

1 couple/1 nid le 17 avril, 2 couples le 23 mai, 1 couple/7

pulli le 16 juin

1 couple/5 juv le 27 juillet

3 couples dont 1 avec 7 juv le 30 août

1 couple/2 juv le 19 octobre

8 individus les 16 novembre et 18 décembre

St-Christ-Briost : 15 le 20 janvier

12 le 17 février

10 le 13 mars, 6 le 24

3 le 17 avril

4 le 23 mai

8 ad 1 nid le 16 juin

1 couple le 27 juillet

3 individus le 18 décembre

Brie : 2 les 20 janvier et 17 février
2 couples le 24 mars
1 couple/1 nid le 17 avril
1 individu le 16 juin
2 ad 1 im les 4 et 18 décembre
Estrées-Mons : 10 le 13 mars
5 les 4 et 17 avril
Bergicourt : 2 le 23 décembre

CYGHNE SAUVAGE Cygnus cygnus

POM : 3 le 13 janvier, 2 du 14 au 20, 1 du 27 janvier au 2 février, 7 le 5(P. BIET et F. SUEUR)
HA : 2 le 17 janvier(F. MONTEL), 1 le 26(P. ROYER)
6 le 7 février(P. ROYER)
Noyelles-sur-mer/Boismont : 2 im le 17 janvier(F. MONTEL)

OIE DES MOISSONS Anser fabalis

POM : 1 le 3 janvier
3 les 20 et 25 janvier ainsi que le 25 février
1 le 4 mai
3 le 26 septembre (l'une s'est échappée d'un parc privé à St-Quentin-en-Tourmont)
1 A. f fabalis 3 A. f rossicus du 17 au 30 octobre(P. ETIENNE et F. SUEUR)
BdS : 22 le 21 janvier
1 le 25 février
Rue : 10 le 15 février

OIE RIEUSE Anser albifrons

POM : 50 le 5 janvier, 65 le 28
250 le 1 février, 90 le 5, 6 le 8, 3 le 10, 1 le 25
6 le 1 mars
1 les 9 mai et 11 juin
1 du 17 au 30 octobre ainsi que les 27 et 28 décembre
BdS : 52 le 21 janvier

OIE CENDRÉE Anser anser

POM : 13 le 1 janvier, 15 le 14
11 le 4 février, 12 le 15, 61 le 22
59 le 10 mars, 14 le 17, 13 le 31
13 du 5 au 18 avril, 4 les 28 avril et 9 mai, premières éclosions le 5 mai
9 en mai et le 11 juin
11 le 13 juin
6 en juillet
7 d'août à octobre
118 le 30 octobre
350 le 6 novembre, 14 le 19, 15 le 29
37 le 8 décembre
BdA : 33 en vol vers le Nord le 27 février, 26 en vol vers le Nord-Nord-Ouest le 28.
1 le 12 avril
6 le 25 octobre s'envolent vers le Sud, 14 en vol vers le Sud le 29
Rue : 14 dont 13 en vol vers le Nord-Est le 22 février, 5 le 3 avril
Quend : 26 en vol vers le Nord le 14 février
Fort-Mahon : 4 le 28 février
BdS : 5 le 21 janvier, 28 le 20 février, 7 le 25
85 dont 25 en vol vers le Sud le 26 octobre
11 en vol vers le Sud le 1 novembre, 70 le 14
295 le 5 décembre, 3 le 30
HA : 7 le 18 mars, 1 le 16 mai
Favière : 17 le 23 mars
Port-le-Grand : 2 le 1 avril
Cayeux-sur-mer(Le Hourdel) : 1 le 27 octobre
Fouencamps : 35 en vol vers le Sud-Sud-Ouest le 15 novembre

Tilloy-les-Conty : 3 le 17 janvier
80 en vol vers le Nord-Nord-Ouest le 19 février

OIE DES NEIGES Anser caerulescens
1 du 1 janvier au 19 avril au POM, le 12 février, 3 autres individus sont notés
en vol (P. BIET)
1 en vol vers le Sud le 4 décembre (A. et G. DUNAMEL)

BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis
POM : 4 du 11 au 14 janvier
1 le 4 février
Nidification d'un couple mixte (un partenaire volant, l'autre éjointé)
1 le 26 septembre
1 le 12 octobre, 2 le 24

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla
POM : 1 les 28 et 29 mars
1 du 24 mai au 11 juin
BdA : 1 les 10 et 25 avril
224 dont 44 en vol vers le Sud le 25 octobre
4 en vol vers le Nord le 27 avril et 34 en vol vers le Nord le 28 décembre à
Fort-Mahon.
BdS : 4 le 18 octobre, 21 le 30, 19 B. b bernicla les 31 octobre et 1 novembre, 13
le 11 novembre, 8 le 16
1 les 27 novembre et 13 décembre, 40 le 28 décembre
Cayeux-sur-mer (Le Hourdel) : 9 le 27 octobre



MACREUSE BAUNE

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna

BdS-POM : 2900 le 12 janvier, + 3000 le 28,
2500 les 24 et 27 février,
277 le 5 mars, 257 le 18, 292 le 30,
300 le 5 avril, 242 le 19, 580 le 25,
345 le 7 mai, 450 le 13, premières éclosions le 17, 341 le 21, 250+2 ad/25
pulli le 30,
225 le 3 juin, 455 le 18, 299 le 26,
750 ad 900 juv du 1 au 7 juillet, 1000 le 30,
300 (probablement 90 % de juv) le 6 août, min 120 le 22,
50 le 5 septembre, 450 le 30,
1580 le 18 octobre, + 800 le 31,
1055 le 1 novembre, 1100 le 14,
700 le 20 décembre, 1527 le 30,

BdA : 500 les 21 et 27 février,
80 dont 10 couples le 11 avril, 160 le 20, 30 le 21,
70 ad 65 juv le 7 juillet, 10 ad 100 juv le 17, 44 ad en vol vers le Nord
(migration de mue) le 18,
1 le 31 août,
18 le 3 septembre,
54 dont 31 en vol vers le Sud le 25 octobre,

Rue (marais) : 18 le 30 avril,
1 juv le 1 juin,
1 ad/18 juv le 20 juillet,

Le Crotoy (Bassin de chasse) : 32 le 19 février

Boismont : 2 couples le 14 mars, 3 mâles le 21, 1 couple du 23 mars au 28 avril

HA : 5 dont 1 couple le 10 mars, 6 mâles 4 femelles le 21,
2 ou 3 couples les 6 et 25 avril, 3 individus le 11 mai, 2 mâles et 1 femelle le
28,
2 couples dont 1 avec 7 pulli le 4 juin,
2 ad/6 pulli le 9 juillet,
1 le 10 octobre,

Cayeux-sur-mer : 52 en vol vers le Sud le 13 décembre (Le Hourdel)

A l'intérieur des terres :

Abbeville : 1 femelle le 12 janvier

Long-le-Catlet : 1 le 29 avril

Cléry-sur-Somme : 47 le 20 janvier,
59 le 17 février,
34 le 13 mars, 43 le 24,
5 le 17 avril,
8 le 16 novembre,
29 le 4 décembre, 33 le 18,

Péronne : 1 le 16 novembre (Ste-Radegonde)

Brie : 11 le 20 janvier

Estrées-Mons : 3 dont 1 couple le 17 février,
4 couples le 13 mars, 7 individus le 24,
5 couples le 17 avril,
7 individus le 16 juin,
3 le 18 décembre,



TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea

1 du 27 mars au 26 avril au POM (P. BIET)



2 le 3 septembre en BdA (T. RIGAU)

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos

POM : 612 le 1 janvier, 920 le 20, 615 le 26,
295 le 8 février, 354 le 16, 245 les 23 et 26,
294 le 1 mars, 53 le 15, 40 le 27,
25 le 10 avril, premières éclosions le 12 (1 femelle/6 pulli), min 9 couvées le
28,
30 le 14 mai, 90 le 21,
68 le 18 juin,
50 le 2 juillet, 300 le 19, 237 le 29,






72 le 8 août, 275 le 20, 395 le 24,
230 le 5 septembre, 287 le 11, 320 le 28,
445 le 1 octobre, 375 le 17, 400 le 28,
400 le 8 novembre, 524 le 19, 1 accouplement le 28,
540 le 6 décembre, 225 le 30,
BdA : 26 en vol vers le Sud le 25 octobre
Rue : 2 les 2 et 22 mars, 1 femelle le 20 avril,
2 femelles/im le 26 mai,
100 le 21 juillet,
Boismont/Noyelles-sur-mer : 20 le 24 mars,
5 les 3 et 19 avril, 4 le 27,
2 mâles le 5 mai, 1 mâle 1 femelle/pulli le 16,
3 ad 1 femelle/10 pulli le 1 juin,
17 ad et im 1 femelle/7 à 10 pulli le 4,
HA : 8 le 24 janvier,
4 le 14 février,
10 le 10 mars, 2 couples le 16,
5 ad et im 1 femelle/pulli le 4 juin,
8 le 4 août,
40 le 11 septembre,
11 mâles 4 femelles le 10 octobre, 1 femelle le 24,
8 le 5 décembre,
Grand-Laviers : 10 le 15 janvier
Port-le-Grand : 23 le 18 janvier
Gamaches (Vallée de la Bresle) : 1 mâle 2 femelles le 25 février,
3 mâles 2 femelles le 9 mars, 9 mâles 4 femelles le
11, 5 mâles 3 femelles le 23,
5 mâles 4 femelles le 6 avril,
Moyenne vallée de la Somme :
Belloy-sur-Somme : 3 femelles/10 pulli le 1 juin
Amiens : 55 le 13 janvier (La Hotoie)
Sailly-Laurette : 1 couple/7 à 8 pulli le 10 mai
Haute vallée de la Somme :
Cléry-sur-Somme : 100 le 20 janvier,
90 le 17 février,
50 le 13 mars,
5 le 10 août, 240 le 31,
80 le 19 octobre,
Péronne (y compris Ste-Radegonde) : 50 le 20 janvier,
30 le 17 février, 24 dont 1 à 2 couples le 13
mars,
30 couples nicheurs en avril, 3 couvées de 6, 11
et 11 pulli le 17 avril,
200 le 19 octobre,
300 le 16 novembre,
200 le 4 décembre,
Estrées-Mons : 16 le 17 février,
5 couples le 13 mars,
10 individus le 4 décembre,
Dans ce secteur, le 27 juillet soit après l'ouverture de la chasse au gibier d'eau,
les jeunes non volants sont encore nombreux : 16 à St-Christ-Briost, 6 de quelques
jours à Péronne et 30 à Cléry-sur-Somme.
Vallée des Evoissons :
Blangy-sous-Poix : 1 couple le 27 février
Tilloy-les-Conty : 50 à 60 migrateurs en 3 heures le 5 décembre.
SARCELLE D'HIVER Anas crecca
POM : 183 le 4 janvier, 100 le 20, 62 le 26,
176 le 8 février, 119 le 11, 129 le 26,
348 le 4 mars, 113 le 17, 96 le 27,
30 le 1 avril, 48 le 13, 33 le 23,
9 le 2 mai, 2 le 16, 1 le 22,
3 le 19 juin, 9 le 25,



1 le 2 juillet, 100 le 16, 6 le 24,
50 le 6 août, 180 le 20, 270 le 28,
463 le 6 septembre, 640 le 17, 486 le 28,
626 le 4 octobre, 625 le 17, 1130 le 24,
705 le 8 novembre, 883 le 19, 740 le 21,
850 le 6 décembre, 1785 le 8 (stationnement maximal observé jusqu'à ce jour en
Picardie), min 500 le 20, 360 le 22,
Rue : min 160 le 17 octobre, 140 le 28,
108 le 6 novembre,
BdA : 4 le 27 février,
15 en vol vers le Sud le 25 octobre,
Noyelles-sur-mer/Boismont : 8 le 10 mars, 1 mâle 1 femelle les 14 et 16, 6 mâles 8
femelles le 25,
12 le 6 avril, 3 les 11 et 27,
4 mâles le 4 juin,
St-Valery-sur-Somme (mollières) : 120 le 19 avril
HA : 6 le 6 janvier,
12 le 7 février,
8 le 7 mars, 13 le 21,
30 à 40 le 4 avril,
1 couple les 11 et 16 mai,
7 individus le 4 août,
1 le 12 septembre, 5 le 24,
1 le 10 octobre,
2 le 7 novembre,
11 le 5 décembre,
Abbeville : 2 mâles 1 femelle le 17 février
Long-le-Catelet : 18 le 29 avril
L'Etoile : 1 couple le 29 avril
La Chaussée-Tirancourt : 5 le 7 juin
Amiens : 3 le 16 juillet
Boves et Longueau : 1 le 18 mars, min 6 le 21,
1 le 5 avril,
Fouencamps : 4 le 7 avril
Frise : 2 le 20 janvier
Cléry-sur-Somme : 9 le 17 février,
6 le 13 mars, 10 le 24
13 le 17 avril,
min 7 le 27 juillet,
3 le 10 août,
30 le 19 octobre,
10 le 16 novembre,
112 le 4 décembre, 4 le 18,
Péronne : 12 le 20 janvier,
10 le 17 février,
5 le 30 août,
20 le 19 octobre,
5 le 16 novembre,
10 le 4 décembre, 30 le 18,
Estrées-Mons : 8 le 31 août, 11 le 30,
7 le 19 octobre,
1 le 16 novembre,
Cette espèce est toujours peu fréquente dans la vallée des Evoissons, par exemple à
Tilloy-les-Conty : 1 femelle les 24 janvier et 3 octobre,
1 mâle le 27 décembre.

CANARD CHIPEAU Anas strepera

POM : 49 le 4 janvier, 7 les 18 et 20, 9 le 28,
12 le 5 février, 10 le 11, 12 le 26,
8 le 2 mars, 2 le 15, 3 les 28 mars et 10 avril,
2 le 13 avril, 4 le 29,
3 le 9 mai, 2 le 15, 5 le 21,
1 le 4 juin,



5 le 12 juillet,
1 le 3 août,
1 le 5 septembre, 14 le 19, 21 le 27,
14 le 4 octobre, 16 les 28 et 31,
50 le 8 novembre, 37 le 19, 21 le 27,
18 le 6 décembre, 10 le 13, 8 le 31,
Noyelles-sur-mer/Boismont : 10 le 10 mars, 18 le 17, 22 le 30,
26 le 1 avril, 6 le 19, 4 le 25,
HA : 1 mâle le 10 mars, 16 le 21,
4 le 4 avril,
2 mâles le 16 mai,
5 le 4 juin, 1 femelle/7 pulli le 20 (H. DUPOUCH)
2 mâles 1 femelle le 10 octobre, 2 le 19, 3 mâles le 24,
3 mâles 6 femelles le 15 novembre,
1 mâle le 5 décembre, 3 le 19,
Port-le-Grand : 1 femelle le 18 janvier
Long-le-Catelet : 3 le 29 avril,
1 femelle le 18 mai,
La Chaussée-Tirancourt : 3 le 29 avril
Frise : 2 le 20 janvier
Cléry-sur-Somme : 8 les 20 janvier et 17 février,
10 le 13 mars, 2 le 24,
3 mâles le 16 juin,
1 mâle 2 femelles le 31 août,
2 le 19 octobre,
24 le 16 novembre,
40 le 4 décembre, 27 le 18,
Péronne : 4 le 20 janvier,
1 mâle le 16 juin,
3 le 16 novembre,
7 le 18 décembre,
Brie : 2 le 24 mars,
Estrées-Mons : 1 couple les 17 février, 13 mars et 24

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope*

BdS-POM : 98 le 1 janvier, 350 le 12, 9 le 26,
30 le 8 février, 24 le 19, 50 le 22,
16 le 1 mars, 7 le 15, 29 le 30,
10 le 3 avril, 18 le 16, 11 le 22,
3 le 2 mai, 2 le 16, 3 le 21,
3 le 5 juin,
5 le 22 juillet,
1 le 6 septembre, 3 le 17, 25 le 27,
47 le 4 octobre, 60 le 14, 55 le 28,
83 le 8 novembre, min 50 le 11, 35 le 29,
66 le 6 décembre, 81 le 13, 60 le 27,

Bda : 25 le 27 février,
1 mâle le 3 septembre,
40 en vol vers le Sud le 25 octobre,
Fort-Mahon : 7 en vol vers le Sud le 30 octobre
Roismont : 1 mâle 1 femelle les 14 et 25 mars

HA : 5 le 28 janvier,
1 le 14 février,
3 mâles 12 femelles le 21 mars,
2 couples le 11 avril,
1 mâle 1 femelle le 10 octobre, 2 le 27,
1 mâle le 5 décembre.

Long-le-Catelet : 16 le 29 avril

Boves : 1 mâle le 17 mai

Cléry-sur-Somme : 1 mâle le 20 janvier;
1 couple le 13 mars,

15 le 19 octobre,
2 le 4 décembre,

Estrées-Mons : 1 mâle le 17 avril

CAHARD PILET Anas acuta

BdS-POM : 22 le 6 janvier, 2400 le 12, + 1200 le 28,
 13 le 5 février, 100 le 13, 270 le 22,
 92 le 1 mars, 4 le 15, 35 le 28,
 16 le 6 avril, 4 le 11,
 2 les 27 mai et 3 juin, 3 le 25 juin,
 1 le 14 juillet, 3 le 21,
 3 le 5 août, 1 le 23,
 3 le 6 septembre, 13 le 18, 12 le 29,
 31 le 4 octobre, 440 le 18, 500 le 26,
 min 350 le 1 novembre, plus de 200 bagués la deuxième semaine, 130 le 16,
 min 450 le 21,
 20 le 8 décembre, 700 le 20, 1000 les 27 et 31
 BdA : 12 le 10 avril, 15 le 23, 62 en vol vers le Sud le 25 octobre,
 Quend-Plage : 12 en vol vers le Nord le 25 février
 Fort-Mahon : 16 en vol vers le Sud le 30 octobre
 Noyelles-sur-mer/Boismont : 110 le 10 mars, 50 le 14, 2 du 25 au 30,
 5 le 6 avril, 3 le 19, 2 les 21 et 25,
 2 le 12 mai,

HA : 1 mâle le 14 février,
 2 couples le 16 mars,
 10 individus le 6 avril, 4 les 11 et 25,
 1 couple le 11 mai,
 2 femelles le 5 décembre,
 Long-le-Catelet : 1 mâle le 29 avril
 La Chaussée-Tirancourt : 1 couple le 3 avril
 Camon : 2 mâles 2 femelles le 29 mars
 Boves : 1 couple le 7 avril
 Frise : 14 le 24 mars
 Feuillères : 2 le 24 mars
 Cléry-sur-Somme : 20 le 13 mars, 74 le 24,
 16 le 18 décembre,
 Péronne (Stc-Radegonde) : 8 le 19 octobre,
 1 mâle les 4 et 18 décembre,
 St-Christ-Briost : 6 le 13 mars
 Estrées-Mons : 1 mâle le 17 février,
 11 le 13 mars, 19 le 24,
 1 mâle le 17 avril,
 4 le 16 novembre,

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

Comme toujours le passage pré-nuptial (mars-avril) de la Sarcelle d'été A. querquedula est toujours très remarqué. 2 mentions précoces en février (1 mâle le 14 en BdS et 1 mâle le 24 à Cambron).

POM : 1 le 8 mars, 11 le 16, 17 le 30,
 8 le 3 avril, 6 le 17, 5 le 27,
 3 le 4 mai, 5 le 15 et premières éclosions, 1 les 21 et 27,
 4 le 5 juin, 2 le 18,
 3 le 10 juillet, 8 le 16, 20 le 24,
 25 le 8 août,

BdA : 4 mâles le 11 avril

Rue : 7 le 20 juillet

Noyelles-sur-mer/Boismont : 22 le 16 mars, 43 le 21,
 6 le 6 avril, 8 le 19, 6 les 21 et 25,
 2 femelles 4 mâles le 12 mai,
 2 mâles le 4 juin, 1 femelle le 20,
 10 le 8 juillet, 4 le 16,

HA : 2 couples le 16 mars, 17 mâles 9 femelles le 21,
 8 le 6 avril, 7 le 11, 6 le 25,
 3 le 11 mai, 5 mâles le 28,
 6 le 4 juin, 1 mâle le 20,
 2 le 4 août,

Abbeville : 1 mâle 1 femelle le 21 mars, 4 mâles 4 femelles le 26,

L'Etoile : 1 mâle le 29 avril

Belloy-sur-Somme : 5 mâles 1 femelle le 27 mars

La Chaussée-Tirancourt/St-Sauveur : 2 mâles 1 femelle le 3 avril, 1 mâle le 29,
1 le 2 mai, 2 mâles 1 femelle le 12, 1 du 17 au 25,
1 couple le 1 juin,

Amiens (Marais du Bout du Monde) : 1 mâle le 22 avril

Boves/Longueau : 1 couple le 21 mars,

1 individu le 1 mai,

Fouencamps : 2 les 5 et 7 avril

Estrées-Mons : 2 le 4 avril

Seule la migration postnuptiale est remarquée dans la vallée des Evoissons : 3 les
20 et 24 août à Famechon, 1 le 29 à Bergicourt.

CANARD SOUCHET Anas clypeata

POM : 15 le 5 janvier,

6 le 5 février, 4 le 16, 9 le 22,

17 le 3 mars, 19 le 16, 32 le 28,

40 le 1 avril, 32 le 11, 12 le 25,

3 les 1 et 9 mai, premières éclosions le 14, 4 le 16, 3 le 21,

1 le 3 juin, 8 le 18, 1 le 25,

2 le 10 juillet, 4 le 13, 9 le 29,

6 les 8 août et 12, 13 le 23,

36 le 6 septembre, 23 le 13, 52 le 28,

31 le 4 octobre, 44 le 14, 46 le 26,

30 le 8 novembre, 51 le 19, 40 le 29,

60 le 8 décembre, 2 mâles 2 femelles le 20, 30 le 24,

Rue : 6 le 30 avril,

5 le 20 juillet,

Noyelles-sur-mer : 30 le 10 mars, 23 le 14, 34 le 30,

40 le 1 avril, 13 le 19, 3 mâles 2 femelles le 27,

7 mâles 3 femelles le 12 mai,

1 mâle le 20 juin,

2 le 8 juillet,

HA : 3 le 11 janvier,

1 le 7 février,

2 mâles le 10 mars, 18 le 16, 88 le 21,

106 le 1 avril, 46 le 11, 19 le 25,

15 mâles le 16 mai, 3 mâles le 28,

6 le 4 juin,

2 le 4 août,

1 le 11 septembre,

1 mâle 1 femelle le 10 octobre, 1 mâle 3 femelles le 24,

2 mâles 2 femelles le 5 décembre,

Port-le-Grand : 2 le 7 avril

Long-le-Catlet : 3 le 29 avril

Belloy-sur-Somme : 1 couple le 27 mars

Picquigny : 1 couple le 3 avril

La Chaussée-Tirancourt : 5 le 29 avril

Camon : 1 mâle 2 femelles le 29 mars

Boves : 3 mâles 3 femelles le 21 mars,

1 couple les 27 mars et 7 avril,

Cléry-sur-Somme : 27 le 24 mars,

22 le 17 avril,

1 le 30 août,

1 mâle 2 femelles le 19 octobre,

2 mâles le 4 décembre, 18 le 18,

Péronne : 2 mâles 1 femelle le 24 mars,

3 mâles 1 femelle le 17 avril,




2 mâles 2 femelles le 19 octobre,

6 le 16 novembre, 7 le 4 décembre,

Brie : 3 mâles 2 femelles le 4 avril

St-Christ-Briost : 1 mâle le 17 février

Estrées-Mons : 6 mâles 3 femelles le 17 février,



49 le 13 mars, 2 mâles 1 femelle le 24,
10 mâles 7 femelles le 4 avril,
45 le 30 août,

Peu noté dans la vallée des Evoissons avec 1 mâle et 1 femelle le 4 avril à Tilloy-les-Conty.

FULIGULE MILQUIN Aythya ferina

POM : 12 le 7 janvier, 4 le 11, 6 le 28,
33 le 9 février, 36 le 16, 29 le 26,
35 le 4 mars,
5 le 17 août,
2 le 17 septembre, 1 le 28,
4 le 10 octobre, 2 le 14, 6 le 26,
10 le 8 novembre, 17 le 19, 30 le 29,
34 les 6 et 21 décembre,

Fort-Mahon : 11 en vol vers le Sud le 30 octobre

Rue : 4 le 30 avril, 9 pulli le 20,

1 femelle/immature le 4 août,

Le Crottoy : 3 mâles 3 femelles le 23 février

Boismont/Noyelles-sur-mer : 3 mâles 3 femelles le 14 février,

3 mâles 2 femelles le 16 mars,

1 femelle le 16 mai,

3 mâles le 3 juin,

HA : 35 le 6 janvier, 3 femelles le 11, plus aucune le 13 (gel du grand étang notamment),

Espèce toujours absente le 3 février, 3 mâles 1 femelle le 14,

3 mâles le 10 mars, 1 femelle le 16, 9 le 21,

9 les 1 et 9 avril, 3 mâles 2 femelles le 25,

15 le 16 mai, 6 mâles 1 femelle le 28,

5 le 4 juin, 3 mâles 1 femelle le 20,

40 le 9 juillet, 2 mâles le 15,

5 le 4 août, 4 mâles 1 femelle le 18,

6 le 12 septembre,

5 le 27 octobre,

7 le 15 novembre,

11 le 5 décembre, 14 le 13,

Gamaches : 6 mâles 3 femelles le 25 février,

12 mâles 5 femelles le 9 mars, 5 mâles 3 femelles le 11,

7 mâles 2 femelles le 18, 5 mâles 3 femelles le 24,

8 mâles 2 femelles le 6 avril,

L'Etoile : 1 femelle le 29 avril

La Chaussée-Tirancourt : 1 mâle le 29 avril

Fouencamps : 1 mâle 1 femelle le 1 février, 3 le 28,

Etinehem : 1 mâle le 10 mai

Cléry-sur-Somme : 2 le 20 janvier,

280 le 17 février,

180 le 24 mars,

20 à 25 le 17 avril,

9 le 19 octobre,

10 le 16 novembre,

80 le 18 décembre,

Péronne : 18 le 20 janvier,

183 le 17 février,

130 le 13 mars,

1 couple le 17 avril,

25 le 4 décembre, 233 le 18,

Estrées-Mons : 292 le 13 mars, 80 le 24,

9 mâles 2 femelles le 4 avril,

6 mâles le 16 juin,

5 le 10 août, 4 le 30,

3 le 16 novembre,

Bergicourt : 4 mâles le 11 novembre

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula

POM : 27 le 1 janvier, 12 le 11, 4 les 20 et 26,
 20 le 8 février, 21 le 12, 20 les 25 février et 1 mars,
 6 le 18 mars, 12 le 30,
 2 le 2 avril, 1 le 27,
 2 le 15 mai, 1 le 21,
 4 le 18 juin, 1 femelle/pulli du jour le 30,
 1 du 12 au 26 août,
 2 le 2 septembre, 4 le 11, 1 les 28 septembre et 4 octobre,
 6 le 11 octobre, 5 le 31,
 4 le 1 novembre, 6 le 16, 3 le 29,
 13 le 6 décembre, 10 le 13, 3 mâles 7 femelles le 31,
 Le Crotoy : 1 mâle le 19 février, 1 mâle 2 femelles le 22,
 3 femelles/immatures le 24 octobre,
 Moyelles-sur-mer/Boismont : 1 mâle du 10 au 17 mars, 1 mâle 2 femelles le 21,
 1 mâle les 19 avril et 12 mai,
 1 mâle 1 femelle le 9 juillet,

Grand-Laviers : 1 le 21 octobre

HA : 92 le 6 janvier, aucun le 13 (grand étang gelé), 7 les 24 et 26,
 8 le 7 février, 10 le 14,
 13 le 10 mars, 7 mâles 6 femelles le 16, 11 le 21,
 4 le 6 avril, 3 mâles 2 femelles le 11, 4 mâles 2 femelles le 25,
 1 mâle 1 femelle le 11 mai, 2 mâles 1 femelle le 28,
 4 le 4 juin, 1 mâle le 20,
 2 le 9 juillet,
 2 les 12 septembre et 24 octobre,
 9 le 13 décembre,

Abbeville : 1 mâle le 12 janvier, les 10 et 17 février,

Gamaches : 1 mâle 1 femelle le 9 mars

Long-le-Catelet : 3 mâles 2 femelles le 29 avril

La Chaussée-Tirancourt : 1 mâle les 29 avril et 2 mai

St-Sauveur : 1 mâle les 15 et 16 juillet

Dreuil-les-Amiens : 1 mâle 1 femelle le 16 janvier

Amiens : 1 femelle le 10 janvier, 5 mâles 7 femelles le 11,

10 mâles 13 femelles le 31 décembre,

Cléry-sur-Somme : 17 le 20 janvier,

2 le 17 février,

1 le 13 mars, 11 le 24,

1 mâle le 16 juin,

9 le 16 novembre,

1 femelle le 4 décembre, 1 mâle le 18,

Péronne : 24 le 20 janvier,

42 le 17 février,

10 le 13 mars,

5 mâles 4 femelles le 17 avril,

1 le 19 octobre,

8 le 16 novembre,

3 mâles 4 femelles le 4 décembre, 3 mâles 1 femelle le 18,

Estrées-Mons : 14 le 13 mars, 21 le 24,

3 mâles 2 femelles le 4 avril, 2 couples le 17,

5 le 27 juillet,

2 le 10 août,

1 femelle le 4 décembre,

FULIGULE MARILOUHAN Aythya marila

POM : 1 mâle immature le 20 janvier

1 mâle le 17 octobre

Estrées-Mons : 1 femelle le 16 novembre (X. COMMECY). Cette espèce est rarement notée
 à l'intérieur des terres dans notre département.

FIFER A DUVET Somateria mollissima

Cayeux-sur-mer : 2 mâles 20 femelles/immatures le 3 février,

1 mâle immature mazouté le 25 avril

Ault (y compris le Bois de Cise) : 3 à 4 mâles et 14 à 15 femelles/immatures le 14 février,
12 dont 2 mâles le 11 avril,
11 le 9 juillet,
1 mâle le 11 septembre,

BdS : 13 le 25 février,
1 femelle les 27 mars et 25 avril,
16 le 7 juillet,
15 le 2 août,
2 les 17 et 18 octobre, 4 le 31,
3 femelles/immatures le 13 décembre,

BdA : 1 en migration vers le Nord le 23 avril

Fort-Mahon : 9 dont 1 mâle adulte en vol vers le Sud le 30 octobre

Quend : 1 mâle 1 mâle immature 2 femelles le 17 avril

POM : 1 femelle le 31 décembre

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra*

Cayeux-sur-mer : 6 le 17 janvier,
100 le 3 février,

HA : 2 les 3 et 7 février,
1 mâle le 6 avril,

BdS : 1 mâle 1 femelle le 18 avril,
3 le 22 décembre,

Quend/Fort-Mahon : 600 à 700 le 27 février, 4 le 24,
60 le 30 mars,
1 mâle le 18 avril,
1 le 19 juillet,
20 les 24 et 25 octobre,
1 le 28 novembre,
8 le 4 décembre, 30 le 28,

BdA : 50 en vol vers le Sud le 23 février,
3500 le 25 avril (O. HERNANDEZ et T. RIGAU),
40 le 25 octobre,

MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca*

Sur le littoral :

1 mâle mazouté le 3 février au HA

1 femelle mazoutée trouvée morte le 10 mars et 1 de même le 25 avril à Cayeux-sur-mer.

A l'intérieur des terres :

1 femelle le 10 janvier à Amiens (La Hotoie) (T. RIGAU).

1 les 18 et 19 avril à Fouencamps (P. ROYER).

HARELDE DE BEQUELON *Clangula hyemalis*

Estrées-Mons : 1 femelle les 4 et 18 décembre (X COMMECY, H. DUPUICH, A. DUPUIS et E. MERCIER), absente le 21.

Donnée exceptionnelle à l'intérieur des terres d'une espèce rare sur le littoral en hivernage.

GAPROT A OEUIL D'OR *Bucephala clangula*

POM : 3 le 4 janvier, 1 les 12 et 26, 3 femelles/immatures le 28,

5 le 1 février, 3 le 11,

1 du 22 février au 3 avril,

1 femelle le 28 octobre,

2 femelles/immatures le 7 novembre,

BdS : 2 mâles le 23 février

Rue : 1 femelle/immature les 30 et 31 décembre

Le Crotoy : 1 mâle 11 femelles/immatures le 11 janvier,

2 mâles et 1 femelle/immature le 19 février, 1 femelle/immature du 21 au 26,

HA : 3 femelles/immatures le 24 janvier,

1 mâle 2 femelles le 3 février,

1 mâle 1 femelle (parades) le 21 mars,

Amiens (La Hotoie) : 1 femelle le 8 janvier

Camon : 1 femelle les 13 et 19 mars
Cléry-sur-Somme : 1 femelle les 20 janvier et 4 décembre
Péronne : 1 femelle le 17 février
Estrées-Mons : 1 femelle le 4 décembre

HARLE PIETTE Mergus albellus

POM : 6 le 8 janvier, 3 le 18, 9 le 26,
11 le 2 février, 1 le 22,
2 le 16 décembre,
BdS : 1 femelle/immature le 11 novembre
HA : 1 femelle le 3 février
Cléry-sur-Somme : 3 mâles 7 femelles le 20 janvier

HARLE HUPPE Mergus serrator

Comme toujours, la migration de cette espèce est surtout nette en avril.

POM : 8 le 1 janvier,
1 le 1 février, 3 mâles 1 femelle le 22,
1 le 27 mars,
5 le 9 avril, 1 le 27,
2 femelles le 28 octobre,
1 le 8 novembre, 5 mâles 1 femelle le 16,
4 le 5 décembre, 7 le 13, 1 mâle 2 femelles le 31,
BdS : 5 mâles 18 femelles/immatures le 11 avril, 36 en vol vers le Nord le 18, 1
femelle le 25,
1 les 8 et 13 mai,
1 mâle 1 femelle le 2 juin,
1 le 31 octobre,
5 femelles/immatures le 28 novembre,
2 femelles/immatures le 13 décembre, 1 mâle 1 femelle en vol vers le Sud le 31.
BdA : 5 mâles 4 femelles le 10 avril, 2 couples et 1 femelle/immatures le 20, 5
mâles 1 femelle le 23,
Fort-Mahon : 2 mâles 2 femelles (parades) le 24 février,
4 mâles 1 femelle/immature en vol vers le Nord le 25 avril,
Quend : 5 le 3 mars,
14 en vol vers le Nord le 18 avril,
2 en vol vers le Sud le 24 octobre,
27 le 4 décembre,
HA : 1 femelle le 3 février,
4 femelles le 12 avril;
Cayeux-sur-mer (Le Hourdel) : 1 mâle le 5 décembre
Une seule mention à l'intérieur des terres à
La Chaussée-Tirancourt : 1 femelle du 9 mars au 3 avril.

HARLE BIEVE Mergus merganser

POM : 5 le 2 janvier
HA : 1 femelle/immature le 15 novembre

AIGLE CRIARD Aquila clanga

1 forme pâle (fulvescens) au HA, le 25 novembre. (M. FOUQUET et P. YESOU)
2 les 30 novembre et 1 décembre, puis 1 le 2 décembre au Nord de la BdS. (M. BOISSAY, F. DECAIX, J. MOUTON et Q. SPRIET)
Les deux observations ont été acceptées par le Comité d'Homologation National.

BUSE VARIABLE Buteo buteo

Nombre de localités d'observations par mois:

janvier: 12 février: 12 mars: 19 avril: 21 mai: 16 juin: 6 juillet: 9 août: 17
septembre: 7 octobre: 4 novembre: 7 décembre: 8

Notons le net passage situé fin mars début avril.

Nicheuse certaine en Forêt de Crécy (8 couples selon G. FLOHART), Etrejust, Métigny (J.P. FERRE) et Régnières-Ecluses (1 couple tué par plomb le 12 mai dont 1 sur le nid dans un peuplier Populus sp. (J. MOUTON)

Nicheuse probable: Airaines, Argoules, Combos, Heucourt, Selincourt et Warlus.

La Buse variable B. buteo hiverne à Airaines, Crécy-en-Ponthieu, Epaumesnil, Métigny et Selincourt.

Observée aussi à:

janvier: Amiens, Boves (3 le 3, 6 le 30), Estée-Mons, L'Etoile, Noyelles-sur-mer, BdS, POM, Rue, Tilloy-les-Conty.

février: Allery, Avesnes, Blangy-sous-Poix, Chaussoy, HA, Quend-Plage, BdS, POM, Rue (1 en migration vers le Nord le 14), Sains-en-Amiennois.

mars: Ailly-sur-Noye, Le Crotoy, Estrée-Mons, Famechon, Fontaine-sur-Somme, Lanchères, Nampont-St-Martin, Noyelles-sur-mer, BdS, POM (2 le 4), Picquigny, Rue (1 en migration vers le Nord le 29), Sains-en-Amiennois, Vergie.

avril: Avesnes, Chaussoy, Blangy-sous-Poix, Bouttencourt, La Chaussée Tirancourt, Dromesnil, Favières, Hallivillers, Mareuil-Caubert, Noyelles-sur-mer, BdS, POM, Rue, Villers-sur-Authie.

mai: Le Bout des Crocs, HA, Luchaux, Namps-au-Val, BdS, POM, Dunes du Marquenterre, Sains-en-Amiennois, Soues.

juin: Nampont-St-Martin.

juillet: Noyelles-sur-mer

août: Bergicourt, Blangy-sous-Poix, Estrée-Mons (1 en migration vers le Sud le 30), Famechon, Fouencamps, Guizancourt, BdS, POM, Rue. A noter: 8 le 16 à Combos.

septembre: Aveluy, Blangy-sous-Poix, Gentelles, BdS, POM, St-Vast-en-Chaussée

octobre: Quend-Plage, Estrée-Mons.

novembre: Le Bout des Crocs, BdS, POM, Sains-en-Amiennois.

décembre: Estrée-Mons, Gentelles, St-Christ-Briost, St-Valery-sur-Somme (1 en migration vers le Sud le 19), BdS.

BUSE PATTUE Buteo lagopus

1 les 7 et 8 septembre à Noyelles-sur-mer (P. TRIPLET et I. VERRIERE). Cette observation n'ayant pas été envoyée au Comité d'Homologation National alors qu'elle aurait dû l'être, est à prendre avec circonspection jusqu'à nouvel avis.

EPERVIER D'EUROPE Accipiter nisus

Hivernage (janvier, février et décembre) toujours net sur le littoral Nord et dans le Marquenterre 3 à 4 individus mais aussi à Airaines (1 à 2 individus jusqu'au 3 mai avec retour le 18 octobre et 1 en BdA.

Observé aussi pendant cette période à Cléry-sur-Somme (janvier), Boves (janvier), Selincourt (janvier et décembre), La Chaussée Tirancourt (décembre), Querrieu (29 décembre).

Observation en mars-avril: Pont-Rémy: 1 mâle le 12 mars, Noyelles-sur-mer le 14, Le Hourdel le 16, Amiens: 1 femelle le 3 avril, Boismont: 1 le 19 avril

Nidifications possibles ou probables, dans les régions de:

Poix (J.C. ROBERT, informations F. SUEUR)

Etrejust, Epaumesnil (J. P. FERRE, O. HERNANDEZ et T. RIGAUX)

Régnière-Ecluses (1 mâle le 12 mai) (J. MOUTON)

Forêt de Crécy (1 femelle le 19 juillet)

Observations de septembre: 1 femelle/im le 5 à Rue, POM: 1 le 2, 2 le 11, 1 le 18, 1 le 15 à Mornay; premières traces de la migration qui continue en octobre, et maximale à la fin de ce mois et début novembre: 1 le 19 à Brie, 3 en 1 h 00 le 27 à

Quend-Plage et 5 dont 2 migrateurs le 31.

POM: (2 tout le mois d'octobre, 1 en novembre sauf 2 le 1)

Froise(octobre), Sains-en-Amiennois(novembre)et Bernay-en-Ponthieu: 1 le 27 novembre.

Des captures d'Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris(1), de Moineau domestique Passer domesticus(1), Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula(1) sont notées par J.P. FERRE à Airaines en janvier, février.

AUTOUR DES PALOMBES Accipiter gentilis

2 observations du passage de printemps: 1 femelle le 5 mars à Rue et 1 mâle le 24 en BdA. 1 le 3 septembre au POM.

MILAN ROYAL Milvus milvus

Premier: 1 le 21 mars au POM puis 1 les 10 et 15 avril. 1 le 7 mai et 1 le 6 mai à Airaines.

Retour: 1 le 3 août au POM, 1 en migration vers le Sud le 28 octobre à Quend-Plage, 1 le 7 et 2 le 11 novembre en RBdS, 1 le 6 décembre à Airaines enfin, 1 le 13 décembre en RBdS/POM.

MILAN NOIR Milvus migrans

avril: 1 les 5 et 26 au POM,

mai: 1 les 9, 12, 13, 14, 15, 17 et 2 le 30 en RBdS/POM,

juin: 1 ad le 9 au HA (G. FLOHART),

août: 2 le 3 au POM.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla

2 im ont hiverné au Nord de la RdS, l'arrivée se situe vers le 28 octobre. (Très nombreux observateurs, ces oiseaux ont été particulièrement suivis par P. ETIENNE)

BONDREE APIVORE Pernis apivorus

Première très précoce: 1 le 9 avril dans les dunes du Marquenterre (J. MOUTON)

2 le 17 mai à Sains-en-Amiennois, 1 en migration vers le Nord le 21 à Amiens.

Observée en juin: RBdS/POM, Nampont-St-Martin, Rue.

Nicheuse probable à Namps-au-Val, Forêt de Crécy (1 couple seulement contre 2 ou 3 en 1981 pour le même secteur)

Retour: 1 en migration vers le Sud le 20 août à Noyelles-sur-mer.

2 juv le 2 en RBdS, 1 à Airaines le 4 et 1 le 18 septembre au POM.

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus

4 observations de février sur le littoral: 1 le 15 au POM, 1 femelle/im en migration vers le Nord à Noyelles-sur-mer le 21, 1 femelle/im le 25 en RBdS et 1 le 28. mars: 2 observations sur le littoral.

Observations d'avril, mai dans les localités où l'espèce ne semble pas nicher:

Le Crotoy(avril, mai), Rue(1 mâle en migration vers le Nord le 5 avril, 2

femelles/im en migration vers le 11 mai), Vercourt(avril)et Coisy(mai).

Nidification certaine ou probable: Belloy-sur-Somme, La Chaussée Tirancourt, Favières(Rue), HA, Métigny, Noyelles-sur-mer, Villers-sur-Authie.

Observé aussi en juin à Fouilloy et Fouencamps. 1 im

1 im les 23 et 27 juillet au POM, 1 im le 16 juillet à St-Quentin-en-Tourmont.

Migration de retour:

RBdS/POM août: 2 2 2

septembre: 4 2 2

octobre: 1 0 1

Le 3 septembre: 1 de première année en migration vers le Sud en BdA.

1 mâle en migration vers le Sud le 12 à Vironchaux, Rue(26 août), Port-le-Grand (30 août), Contay(12 septembre)

3 observations de novembre en RBdS: 1 femelle le 7, 2 femelles/im le 11 et 1 im le 13.

BUSARD SAINT-MARTIN Circus cyaneus

Hivernage:

Sur le littoral Nord: min 4 en janvier, 2 en février, 2 en décembre.

Sur le littoral Sud: 2 en janvier et février.

2 ou 3 en BdA.

1 à 2 couples dans les bois du Sud d'Airaines.

Noté aussi en janvier, février et décembre à Tilloy-les-Conty(janvier), Pierrepont(février), Gentelles(décembre), Péronne(décembre).

Passage de printemps, observations hors lieux de nidification:

mars : 4 7 10

avril : 5 5 1

mai : 2 0 0

Nidification certaine ou probable: La Chaussée Tirancourt, Fouencamps, Métigny, Le Quesnoy, Riencourt.

Observé en août à Guizancourt.

Passage bien groupé fin octobre: 10 observations du 24 au 31 hors lieux de nidification.

novembre: BdS/POM 2 5 1 et 1 en migration vers le Sud le 28.

3 tout le mois dans le secteur d'Airaines.

1 femelle/im le 16 à Estrée-Mons, 1 mâle le 21 à Rue et 1 femelle/im le 29 à Lahoussoye.

BUSARD CENDRE Circus pygargus

Premier: 1 vers le Nord-Est le 29 mars à Froise/Rue.(J. MOUTON)

Nidification: 1 nid à Le Mesge le 29 mai.

1 nid à Airaines: éclosion de 4 oeufs le 16 juin(probablement détruit par l'homme, nid vide le 27).

1 couple à Montagne-Fayel en juin.

2 couples cantonnés en juin à Nampont-St-Martin.

Dernier: 2 mâles ad le 25 août à Le Quesnoy.

BALBUZARD PECHEUR Pandion haliaetus

1 les 5 et 12 septembre en BdS.

FAUCON PELERIN Falco peregrinus

Uniquement observé en RBdS/POM: 1 les 7 et 25 février, 1 les 20, 21 et 30 septembre et 1 les 24 et 31 octobre.

FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo

Premier: 1 les 25 et 27 avril à Bettencourt-Rivière.

1 en migration vers le Nord le 13 mai BdS, 1 en BdA le 31 mai.

Nicheur possible ou probable:

Airaines: 1 en mai, 1 couple en juin, juillet et 1 en août.(J.P. FERRE)

La Chaussée Tirancourt: 4 le 15 juin, 1 le 17 et 3 le 30.(X. COMMECY, M. DUQUEF, L. et P. GAVORY)

septembre: 2 le 21 au POM.

octobre: 1 le 14 à Rue, 1 im le 29 à Fort-Mahon.(O. HERNANDEZ, T. RIGAUX et F. SUEUR)

FAUCON EMERILLON Falco columbarius

Toujours 1 à 2 hivernants en BdS Nord.

Puis 4 observations d'oiseaux en migration: 1 femelle le 30 mars à Pont-Rémy, 1 femelle le 6 avril au HA, 1 femelle le 17 à Noyelles-sur-mer et 1 femelle/im le 25 à Rue.

Retour fin octobre: 1 sur le littoral Nord à partir du 14 octobre, sauf 2 le 31; plus 1 en migration le 17 et 1 en BdA le 29 octobre.

FAUCON CRECERELLE Falco tinnunculus

Nombre d'observations par mois dans des localités différentes:

janvier: 24

février: 23

mars: 30

avril: 40

mai: 20

juin: 8

juillet: 10

août: 14

septembre: 8

octobre: 14

novembre: 14

décembre: 22

Remarquons le très net passage d'avril et l'installation progressive des hivernants.

Le Faucon crécerelle F. tinnunculus a été trouvé nicheur certain cette année à :
Etrejust (nourrissage début juillet), Fouencamps, Froise (Rue) (nid dans un peuplier
Populus sp. creux en mai), Dunes du Marquenterre, Noyelles-sur-mer, Quend-Plage
(Sortie du nid le 24 juillet), Rue (marais).

Migration observée: 1 le 11 avril à Quend-Plage, 1 le 2 août en BdS et 1 le 28
octobre.

Noté cette année dans 91 localités différentes.

1 sert d'épouvantail à Boismont !??

PERDRIX GRISE Perdrix perdrix

Quelques rassemblements: 15 le 17 janvier à Camon, 10 les 5 novembre et 29 décembre au HA.

Des compagnies de 9, 12 et 15 en août près d'Airaines.

CAILLE DES BLES Coturnix coturnix

5 observations du 27 mai au 24 août.

FAISAN DE COLCHIDE Phasianus colchicus

FAISAN VENERE Syrmaticus reevesii

Observé au printemps en Forêt de Crécy.

GRUE CENDREE Grus grus

Passage de printemps: 2 bandes entendues la nuit du 3 au 4 avril au Crotoy, 1 ad en vol vers le Nord-Ouest à Noyelles-sur-mer le 18 avril.
Passage d'automne exceptionnel comme dans toute la France. De forts vents, ayant fait dévier le couloir de migration habituel vers l'Ouest. Les 7, 8 et 9 de 500 à 1000 Grues cendrées, G.grus passent ou stationnent sur le littoral. Encore quelques unes le 10: 34 à Froise et le 11: 3 migratrices à Rue et 6 stationnent au POM.

RALE D'EAU Rallus aquaticus

Signalé hors période de nidification, dans 14 localités (A noter 9 à Froise(Rue) le 10 janvier) et en période de nidification(avril à juillet): 6 localités toutes dans la plaine maritime picarde: Arry(2 à 3 chanteurs), Froise(Rue)(1 chanteur), Nampont-St-Martin(4 à 5 chanteurs), Favière(10 chanteurs), Noyelles-sur-mer(2 chanteurs) et POM.

POULE D'EAU Gallinula chloropus

Nombreux couples nicheurs, premiers pulli le 6 mai et derniers le 24 août.

nombre de pulli : 01 03 04 05

nombre de familles: 13 04 04 02

1 nid avec 8 oeufs le 9 mai à Rue.

Quelques rassemblements: 90 à St-Christ-Briost le 20 janvier, (165/HVS), 35 le 17 février(65/HVS), 20 le 13 mars, 15 le 19 octobre(45/HVS), 60 le 16 novembre(85/HVS). 30 à Dreuil-les-Amiens le 16 janvier sur 1,5 de la Somme.

MBdM(Amiens): 30 le 18 janvier, 15 le 14 février et le 5 avril, 40 le 28 septembre.

Noyelles-sur-mer/Boismont: 40 les 25 mars, 8 juillet et 3 décembre.

Nampont: 50 le 27 mars et 45 le 29 décembre.

St-Firmin: 30 le 26 juillet POM: 47 le 22 octobre et 40 le 7 novembre.

FOULQUE MACROULE Fulica atra

Quelques données sur la nidification: Premiers pulli le 29 avril à Yseux et Long-le-Catelet.

nombre de pulli : 01 02 03 04 05 06 07 08 moyenne: 3,9 pulli

nombre de familles: 03 09 06 09 04 08 02 01

Dernières éclosions vers la mi-juillet(5 cas dans la HVS)

Quelques stationnements régulièrement suivis(maxima mensuels)

mois J F M A M J J A S O N D

HVS :1620 655 350 175 620 1070 825 750

Noyelles-sur-mer: 23 90 60 30 10 80 40

/Boismont

POM : 305 95 55 15 40 70 80 115 150

Seul le HA accueille quelques groupes d'importance notable d'adultes en été:

mois : J F M A M J J A S O N D

nombre:780 550 300 140 120 270 750 1100 500 270 500 095 (maxima mensuels)

Un coup de froid à la mi-janvier a considérablement fait varier les effectifs stationnant au HA (prise en glace de l'eau libre): 530 le 1, 780 le 13, 378 le 18, 82 le 21, 10 le 24, 127 le 28 et 250 le 4 février, le chiffre de 550 étant atteint le 26.

Autres grands groupes: Abbeville, 140 le 12 janvier, MBdM(Amiens): 110 le 18 novembre et 210 le 28 septembre, une cinquantaine tout le mois sur le bassin de La Hotoie à

Amiens, Boves: 70 le 9 janvier et Nampont-St-Martin: 60 le 29 décembre.

HUITRIER PIE Haematopus ostralegus

Stationnements

Suivi des effectifs en Baie de Somme (Comptages effectués en RBdS/POM auxquels sont rajoutés éventuellement les oiseaux comptés au Crotoy en dehors de la période de chasse.)

janvier : 4000 le 21
février : 4140 le 7, 3800 le 13, 4500 le 25
mars : 4275 le 1, 2230 le 29
avril : 1500 le 25
mai : 1400 le 13, 900 le 30
juin : 600 le 11, 400 le 27 au POM(min 400 en RBdS/POM)
juillet : 750 le 7, 650 le 24 au POM(min 650 en RBdS/POM)
août : 2400 le 5, 1900 le 12, min 2360 le 24
septembre : 3400 le 2, 3810 le 23(1900 le 12 au POM)
octobre : 5260 le 18, min 4500 le 31
novembre : 4500 le 1, 4020 le 11
décembre : 4800 le 3, 4700 le 29

BdA

janvier : 50 le 18
février : 100 le 28
avril : 50 le 22
mai : 50 le 31
juillet : 80 le 7, 25 le 17(quelques heures après l'ouverture de la chasse)
août : 1 le 31
septembre : 21 le 3
octobre : 95 vers le Sud en 3 h 50 le 25, 53 le 29, 33 vers le Sud le 30
décembre : 115 le 28 jusqu'à Fort-Mahon, au Sud

HA

1 le 1 janvier, 2 le 25 avril, 2 le 18 août, 1 le 1 septembre

Mouvements-Migrations

Remontée: février : nocturne vers le Nord le 1 à Rue
10 vers le Nord le 6 à Rue
nocturne (petit groupe) vers l'Est le 20 à Rue
mars : 57 vers le Nord-Est le 4 à Rue
avril : petit passage nocturne vers le Nord-Est le 4 à Rue, 3 vers le Nord le 25 à Cayeux-sur-mer, 14 vers le Nord le 26 à Fort-Mahon
mai : 1 vers le Nord-Est le 20 à Rue, 3 vers le Nord-Est le 22 à Rue
Descente: juin : 35 vers le Sud à Quend-Plage le 24 (passage où échange entre BdS et BdA)
juillet : 20 vers le Sud le 19 en 1 h 30 à Fort-Mahon
septembre : 11 vers le Sud le 3 à Fort-Mahon
octobre : 95 vers le Sud en 3 h 50 le 25 en BdA, 33 vers le Sud le 30 en 1 h 00 à Fort-Mahon

Nidification

RBdS/POM

Selon J. MOUTON, le nombre de couples cantonnés au POM varie de la façon suivante:
2 couples le 4 mars, 3 couples le 28 mars, 4 couples le 9 avril, 4 couples le 26 mai (premières éclosions le 28)
Sur le domaine public maritime, l'installation est plus tardive: 1 ou 2 couples le 26 mai, 2 couples le 23 juin(à cette date, est trouvé mort un poussin)

L'effectif maximal nicheur est de 6 couples (4 au POM, 2 en RBdS)



Rue(marais): 1 couple le 23 avril puis abandon du site.

Froise: 1 ou 2 individus stationnent sans nicher en juin.

St-Firmin: 1 couple cantonné le 21 mai puis abandon du site.

Boismont: 1 couple cantonné à Boismont le 4 mai.

Soit au total une dizaine de couples cantonnés recensés.



VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus

Après un mois de janvier relativement calme du point de vue migratoire (seulement 80 vers le Sud le 17 en RBdS tandis que des mouvements de remontée sont même notés par la suite à Rue : 14 le 18, 5 le 20, 87 le 27), et un début de février assez semblable (de 10 à 35 vers le Nord quotidiennement du 1 au 6 à Rue). La deuxième décade se caractérise par d'importants mouvements de fuite vers le Sud : le 22, 480 vers le Sud en RBdS (1° C le jour et gel nocturne) et 96 vers le Sud-Ouest à Rue, le 25 : 1050 vers le Sud à Sud-Ouest en 5 h 00 en RBdS. Début mars, on assiste à une remontée très nette : 300 à 400 vers le Nord le 4 en 0 h 30 à Abbeville (moyenne horaire : 600 à 800), 350 vers le Nord le 6 à Famechon. Ces mouvements semblent cesser dès le milieu du mois.

Nidification

Dans la Somme, le Vanneau huppé V. vanellus niche essentiellement dans la Plaine maritime picarde et sa frange orientale. 102 couples y sont recensés durant la saison de reproduction, en grande partie grâce à une importante prospection de J. MOUTON. Les couples se répartissent comme suit :

POM : mars : 5 couples cantonnés le 4,

avril : min 13 couples (7 pulli le 28) (F. SUEUR), premières éclosions le 25 selon P. BIET,

Donc, un minimum de 13 couples nicheurs probables pour le POM.

Port-le-Grand : 4 couples min le 12 mai

Froise/Rue : 6 couples cantonnés le 26 mars, installation tardive d'1 couple à partir du 5 mai

St-Quentin-en-Tourmont : 12 couples cantonnés le 4 mars

Baie d'Authie Sud : 10 couples cantonnés les 24 mars et 4 mai

St-Firmin/Le Crotoy : 5 couples cantonnés le 28 avril

Marais de Rue/Favières : 10 couples cantonnés le 23 avril et 9 mai

Noyelles-sur-mer/Boismont : 12 à 15 couples cantonnés les 25 mars et 1 mai

Canteraine/Rue : 2 couples cantonnés les 21 mars et 1 mai

Quend : 3 et 4 couples cantonnés les 24 mars et 6 avril

Dunes du Marquenterre : Nord : 1 couple cantonné les 11 avril et 15 juin

Sud : 6 couples le 6 mai

Villers-sur-Authie : 3 couples cantonnés le 3 avril

Marais de Fresno/Hampont : 3 couples cantonnés le 27 mars

HA : 4 couples cantonnés le 25 mars

Lanchères : 1 couple cantonné le 25 mars

Monchaux/Quend : 2 couples cantonnés le 16 mai

Vron : 1 couple le 12 juin

Migration post-nuptiale

Comme en 1981, cette migration, dont les précurseurs sont (encore) notés le 30 mai (35 vers le Sud en RBdS), sensible dès la mi-juin : 265 vers le Sud le 19 à Amiens, 100 vers le Sud-Ouest le 21 en RBdS, 2 vers le Sud-Ouest le 23 à Rue.

Elle se poursuit jusqu'en décembre, sans grands mouvements de fuite, cette année, d'après les données communiquées :

juillet : 6 vers le Sud-Ouest le 17 à Corbie, 3 vers l'Ouest le 22 à Rue,

octobre : 3 vers le Sud le 17 à Rue, 333 vers le Sud en 5 h 30 le 31 en RBdS,

novembre : 121 vers le Sud le 1 en RBdS-POM (migration continue pendant toute la journée le 7), 62 vers le Sud en 2 h 15 le 21 à Rue,

décembre : 115 vers le Sud le 30 et 57 vers le Sud le 31 en RBdS,

Stationnements

Ils sont relativement importants de janvier à avril puis à partir de juillet, août.

(stationnements janvier et février en dehors des zones favorables à la nidification)

janvier : 700 à 800 le 4 à Poix, 100 le 4 à Airaines, 100 à 120 du 28 au 31 à Froise/Rue, le 4 toujours, 130 à Bussy-les-Daours et 130 à Camon,

février : 200 à 250 le 7 entre Pont-de-Metz et Saveuse, 100 le 8 à Ailly-le-Haut-Clocher, 700 le 13 entre Ailly-le-Haut-Clocher et Abbeville, 200 le 15 à Noyelles-sur-mer/Boismont, le 25 : 400 dans les prés de la Maye (St-Quentin-en-Tourmont) et min 450 au Crotoy, 1000 le 27 à Amiens.

En mars, on note encore 190 ind à Lamotte-Bullecux et 100 ind à Abbeville le 1. Puis les effectifs s'effondrent et ne restent importants que dans les zones de nidification éventuelles : (par exemple 110 le 8 au POM, 80 le 26, 80 le 28).

En avril (qui sont à peu près les seuls à ne pas être déportés) : 80 le 19 à

Noyelles-sur-mer, 160 le 20 en BdA et en mai (cf nidification).

Le retour dans les zones de culture est noté en juin : 5 le 12 à Ligescourt, 50

dans les champs à Hampont, 40 le 19 et 30 le 26 à Bergicourt.

De juillet à septembre, de petites bandes ne dépassant pas 50 ind sont observées en de nombreuses localités (plus d'une vingtaine), le seuil de 50 ind étant dépassé le 10 juillet à Famechon (80 ind), et le 10 août à Estrées-Mons (450 ind).

A partir d'octobre, la taille des bandes observées reprend de l'importance. Ainsi

novembre : 65 le 21 à Lamotte-Buleux, 83 le 24 à St-Quentin-en-Tourmont,
le 27, 200 à La Chaussée-Tirancourt, 500 à Villers-sous-Ailly, 250 à Agenvillers,

le 29, 500 à Bussy-les-Baours et 250 à Aubigny,

décembre : 1200 le 4 à Camon, 300 le 28 au Crottoy.

PLUVIER DORE *Pluvialis apricaria*

Les observations sont réalisées surtout lors des deux passages.

janvier : 1 vers le Sud le 17 en RBdS, 1 à 4 ind du 19 à la fin du mois (et jusqu' au 25 février) à Froise/Rue,

février : 1 vers le Nord le 7 en RBdS, 4 le 15 à Moyelles-sur-mer, 40 le 22 à St-Quentin-en-Tourmont, 65 le 25 au Crottoy, 1 le 28 au HA,

mars : 40 le 6 à Famechon, 40 le 12 à St-Quentin-en-Tourmont, le 24 : 25 à Quend et 70 à Froise/Rue, 40 le 27 à Froise/Rue et 1 vers le Nord le 27 à Hampont,

avril : 60 vers le Nord-Est à Froise/Rue le 3, 40 posés à Froise/Rue le 4, 3 vers le Nord à Froise/Rue le 5, 20 le 12 à Moyelles-sur-mer, 70 le 20 en BdA, 35 le 24 en BdA, 1 vers le Nord le 27 à Fort-Mahon,

juillet : observé au POM le 16 (1 ind), les 23 et 26 (2 ind) et le 28 (1 ind),

août : observé au POM 4 (2 ind), le 6 (3 ind), le 8 (1 ad de la forme du Sud), le 28 (1 ind),

septembre : 1 vers le Sud le 3 en BdA, (1 le 7 et 2 le 19 au POM),

octobre : 1 le 28 en RBdS,

novembre : 1 le 5 au HA, 27 vers le Sud le 5 au Hourdel (Cayeux-sur-mer), 10 posés et 20 vers le Sud le 7 en RBdS,

décembre : 40 le 3 en RBdS, 1 le 27 en RBdS.

PLUVIER ARGENTÉ *Pluvialis squatarola*

Noté toute l'année sur le littoral avec un max mi-mai et fin octobre début novembre.

En toute saison, les effectifs recensés au POM sont faibles, ce qui montre la réticence des oiseaux de cette espèce à gagner les rencloitures à marée haute.

RBdS/POM :

janvier : 70 le 7, 40 le 17, 110 le 30,

février : 1 tué le 7, 180 le 13,

mars : 45 le 26,

avril : 5 le 9, 230 le 26,

mai : 120 le 6, 250 le 10, 400 le 13, 200 le 21, 60 le 30,

juin : 15 le 1, 7 le 11, 6 le 23,

juillet : 11 le 7, 1 le 24,

août : 80 le 22,

septembre : 135 le 2, 35 le 23,

octobre : 270 le 18, 500 le 31,

novembre : 280 le 2, 162 le 3, 50 le 7,

décembre : 190 le 20, 150 le 31,

Comme en 1980 et 1981, les effectifs sont nettement plus importants à la fin du mois de décembre qu'au mois de janvier.

BdA :

janvier : 23 le 18,

février : 19 le 23,

avril : 30 le 20, 10 les 26 et 27,

octobre : 7 le 25, 10 le 29,



HA : 1 les 20 et 28 avril, 4 le 16 mai, 1 les 5 et 13 octobre,

Migrations

Les seuls vols migratoires observés sont ceux du passage prénuptial. L'intensité est maximale mi-mai, c'est-à-dire alors que les stationnements les plus importants sont notés en RBdS/POM.

avril : 3 vers le Nord le 25 à Cayeux-sur-mer, 9 vers le Nord le 28 à Froise/Rue,

mai : une importante migration vers le Nord-Est est notée en plusieurs localités de



la Plaine maritime picarde : 3 le 2, 10 le 9, 12 le 10, 4 le 16, 16 le 21,
Le 15, 250 vers le Nord en RBdS.

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula

Cette espèce a été rencontrée en hiver : en février, 1 le 7 en RBdS, 8 le 8 au Crotoy, 1 le 14 à Cayeux-sur-mer, 1 vers le Nord le 23 à Fort-Mahon, 1 le 25 en RBdS; en décembre : 1 les 13 et 25 en RBdS.

Le passage prénuptial s'effectue de mars à mai (surtout lors de ce dernier mois) tandis que le passage postnuptial se déroule de fin juillet à septembre. Aucun indice sérieux de nidification.

Stationnements

RBdS/POM/Le Crotoy :

février : 1 le 7 et 25, 8 le 8,
mars : 20 le 12, 350 le 28,
avril : 30 le 9, 40 le 11, 90 le 26,
mai : 130 le 6, 1000 le 13, min 2000 le 26 (Le Crotoy), encore 800 le 30 (des parades nuptiales sont notées le 26),
juin : 280 le 9, 60 le 11, 30 le 23,
juillet : 30 le 7, min 30 le 19, 425 le 23,
août : 150 le 23, 270 le 5,
septembre : 900 le 2, 213 le 23, 140 le 28,
octobre : 29 le 18, 15 le 28,
novembre : 22 le 2, 1 le 15,
décembre : 1 les 13 et 25,

RBdA :

avril : 1 le 20, 9 le 22, 20 le 25,
mai : 20 le 3,
août : 25 le 31,
octobre : 2 le 29, 10 le 25, 3 le 30,
HA :
mars : 1 le 10, 2 le 25,
avril : 2 le 6, 1 le 20, 5 le 25,
mai : 2 le 6, 3 le 13, 14 le 19, 17 le 27,
juin : 7 le 2, 5 le 10,
juillet : 1 le 7,
août : 9 le 6, 4 le 15, 5 le 18,
septembre : 2 le 1,
octobre : 7 le 5,
novembre : 3 le 12,



Migrations

février : 1 vers le Nord le 23 à Fort-Mahon,
mars : 3 vers le Nord-Est le 21 à Arry, respectivement 3, 5 et 2 vers le Nord les 25, 26 et 27 à Rue,
mai : 4 vers le Nord-est le 10 à Rue, 100 s'envolent vers le Nord le 14 au crépuscule en RBdS, 15 vers le Nord le 15 à Rue,
juin : 5 vers le Nord le 2 à Quend-Plage,
octobre : 3 vers le Sud le 25 en BdA,
Quelques observations continentales également : 1 le 25 avril à Estrées-Mons, 1 le 6 mai à Argœuvre et 3 le 30 août à Estrées-Mons.

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius

Première observation le 25 mars : 1 ind au HA; dernière le 13 octobre : 1 ind tous les jours au HA.

mars : 1 les 25 et 28 au HA, 1 les 26 et 29 en RBdS,
avril : 1 couple parade les 5 et 17 à Boismont (premier couple cantonné de l'année), 1 chanteur le 13 à Brighton (Cayeux-sur-mer), 5 ind le 22 à Fancchon, 1 les 17 et 29 au POM, 1 le 24 en BdA, 4 le 30 à Rue,
HA : 5 le 9, 2 le 13, 2 le 20, 1 le 28,
mai : Noté à Boves (1 le 1), Noyelles-sur-mer (1 le 12), Boismont (1 le 16), Argœuvre (1 le 6), POM (2 les 8 et 20), HA (3 les 19 et 27) et RBdS où 1 couple parade les 9 et 26,
juin : 2 couples à St-Sauveur (le 15), 1 couple alarme au POM et un autre en RBdS les 21 et 23, 1 couple cantonné le 28 à St-Firmin/Le Crotoy, 1 couple alarme et un autre parade le 10 au Marais de Rue,



juillet : Noté sur le littoral et à l'intérieur (St-Sauveur, Famechon et Estrées-Mons) avec des maxima de 4 ind les 7 et 9 au HA, de 18 ind le 9 entre Noyelles-sur-mer et St-Valery-sur-Somme et de 32 le 11 au POM,
août : Noté au HA (2 le 6, 1 le 18), à Fouencamps (3 le 21), au POM (2 les 4 et 8, 1 le 26) et à Estrées-Mons (7 le 10, 8 le 30),
septembre : 2 le 2 au POM, 1 le 10 en RBdS, 5 le 17 au POM,
octobre : 1 le 13 au HA,

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus

Uniquement noté sur le littoral où il niche au POM, en RBdS et au HA. L'arrivée printanière s'effectue fin mars (première observation le 26 en RBdS) tandis que les derniers oiseaux observés le sont dans le courant du mois d'octobre (dernière observation le 17).

Stationnements et nidification en RBdS/POM

mars : 1 le 26, 35 le 28, 64 le 29,
avril : 30 le 9 (jour où sont notées les premières parades), 20 le 11, 42 le 26,
mai : 50 le 6, 100 le 13, 46 le 27, les premières éclosions sont notées le 17 au POM,
juin : Le 11, le nombre maximal de couples nicheurs en RBdS est estimé à 9 tandis que 15 couples alarment le 23, 1 pullus le 2 au HA et 1 pullus le 3 au POM,
juillet : min 60 le 7, min 205 le 16, 200 le 21,
août : min 140 le 6, 105 le 24,
septembre : 75 le 2, 300 le 17 (chiffre remarquable),
octobre : 7 le 17 en RBdS,

Stationnements et nidification au HA

1 le 25 avril, 1 couple les 6, 19 et 27 mai, 3 ad/1 pullus le 2 juin, 5 le 7 juillet
 Brighton/Cayeux-sur-mer : 2 couples le 13 avril

Stationnements en BdA

avril : 40 le 20, 20 le 23, 15 le 26, 10 le 27,
juillet : 17 le 7,
 Quend-Plage : 2 le 2 et 1 le 24 juin

PLUVIER GUICHARD Eudromias morinellus

2 le 31 août au POM (P. BIET)

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres

Les deux passages sont bien suivis sur le littoral.

RBdS/POM :

passage pré-nuptial

avril : 1 le 9, 35 le 26,
mai : 18 s'envolent vers le Nord-Est au crépuscule le 2, 65 le 13, 16 le 27,
juin : 4 le 9 et 1 le 11,

passage post-nuptial

juillet : 44 le 28 (16 le 23; 21 le 24),
août : 28 le 2, 13 le 20,
septembre : 3 le 5, 1 le 19, 1 le 23,

Autres localités d'observations : 2 le 23 avril en BdA, 1 le 6 août au HA.

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago

Notée toute l'année, principalement sur le littoral, avec un minimum de mai à juillet (aucune observation du 10 mai au 8 juillet). L'abondance est maximale en mars-avril et de fin août à fin octobre.

janvier : Notée à Noyelles-sur-mer, Rue, Blangy-sous-Poix, et au POM, les différentes observations concernant au max 3 ind.

février : A nouveau observée dans les localités précédentes. Retenons 3 vers le Nord-Est le 6 à Froise/Rue, 7 le 26 au POM,

mars : Les maxima par localités sont les suivants : 16 le 25 au HA, 2 le 18 au POM et le 21 à Arry, 2 le 23 à Favières, 5 le 24 en BdA, 20 le 27 à Rue, 40 le 27 à Nampont. Les chiffres les plus élevés sont, donc obtenus au voisinage du 27, date à laquelle un petit passage nocturne est d'ailleurs noté,

avril : 16 le 3 à Villers-sur-Authie, 12 le 19 à Noyelles-sur-mer, 15 le 20 en BdA, 1 ind parade le 23 à Arry,

mai : 3 le 1 à Noyelles-sur-mer, 8 le 2 à Nampont, 1 le 4 en BdA, 9 le 9 à Rue,
juillet : 1 le 9 à Noyelles-sur-mer, 7 le 21 au POM, 1 le 27 à Estrées-Mons,
août : 6 le 24 à Fouencamps, 12 le 5 au POM, 62 le 30 à Estrées-Mons,
septembre : 15 les 16 et 26 au POM, 1 le 29 au HA,
octobre : 5 le 30 à Rue, 20 le 19 à Estrées-Mons, 100 le 28 au POM, le 17, 22
 migrants sont notés en 2 h 15 à Rue,
novembre : 9 migrants en 2 h 15 le 21 à Rue, 15 le 29 au POM,
décembre : 2 le 4 à Cléry-sur-Somme, POM : 10 le 8, 13 le 16, 15 le 20,

BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola

février : 2 le 12 dans les dunes du Marquenterre,
octobre : 1 le 21 au POM,
novembre : 50 le 6 au POM,

COURLIS CENDRE Numenius arquata

Stationnements en EBds/POM

janvier : 1200 le 17, 800 les 21 et 30,
février : 870 le 7, 950 le 13, 1000 le 25,
mars : 575 le 1, 500 le 11, 900 le 27,
avril : 650 le 9, 220 le 11, 300 le 24,
mai : 185 le 9, 280 le 13, 180 le 27,
juin : 150 le 1, 160 le 16, 280 le 25,
juillet : 250 le 7, 440 le 16, 1000 le 24,
août : 750 le 24,
septembre : 800 le 2, 570 le 19, 655 le 23,
octobre : 1700 le 3, 880 le 18, 900 le 22,
novembre : 950 le 1,
décembre : 970 le 20, 1200 le 31,

Stationnements en BdA

janvier : 45 le 18,
mars : 30 le 24,
avril : 1 le 20,
mai : 4 le 4,
juillet : 3 le 7,
octobre : 1 le 25, 9 s'envolent vers le Sud le 29,
 HA : 44 le 1 janvier, 1 chanteur le 28 avril (9 ind le 25), 14 le 15 août

A l'intérieur des terres

1 ind est trouvé mort le 10 février à Fontaine-sur-Somme. Par ailleurs, 1 Courlis, probablement cendré N. arquata, est observé le 25 juin à Montagne-Fayel (J.P. FERRÉ) tandis que 3 ind sont notés le 15 novembre à Airaines.

Migrations et mouvements

Les migrants actifs sont suivis sur le littoral de mi-janvier à début mai.

Cayeux-sur-mer : 33 vers le Nord le 14 février

Rue : janvier : 30 vers le Nord-est le 21, 32 vers le Nord le 31 (auxquels s'ajoute un important passage nocturne),

février : 40 sont notés vers le Nord (et passage nocturne faible) ainsi que 15 le 5, 37 le 6, 12 le 8,

mars : 4 le 23 vers le Nord, passage nocturne le 27, 7 le 28,

avril : faible passage nocturne le 5, 12 vers le Nord-Est le 19, min 71 le 21, 28 vers le Nord-Est le 28,

mai : 12 vers le Nord-Est le 2,

Nidification



Aucune preuve de nidification n'est obtenue mais des tentatives de reproduction sont observées. Ainsi,

à Froise/Rue, 1 couple cantonné à partir de fin-mars. Le chant nuptial est entendu le 23 mars puis les 25, 27 et 28 avril. Le site est abandonné début mai peut-être, selon J. MOUTON, auteurs de ces observations, à cause d'un temps trop sec ou de travaux agricoles.

1 chanteur cantonné les 6 et 9 avril à l'endroit où un couple niche de 1973 à 1977, dans les dunes du Marquenterre. Abandon de site en mai, consécutif à une absence d'eau? (J. MOUTON).

CORLIS CORLIEU Numenius phaeopus

Totalement absent en hiver, le Courlis corlieu N. phaeopus est surtout abondant dans



la deuxième décade d'avril à la mi-mai puis en juillet-août. L'observation printanière la plus précoce a été réalisée au POM le 26 mars (contre le 25 mars en RBdS en 1981) et la dernière en RBdS le 17 octobre.

Stationnements en RBdS/POM

mars : 1 les 26 et 28,

avril : Un dortoir accueille (la nuit) les oiseaux ayant pâture le jour dans l'arrière pays. Ainsi, les 120 oiseaux en vol vers le Sud-Ouest le 27 au soir à Froise/Rue rejoignant ce dortoir de même que les 67 ind observés en vol dans la même direction le 28 en cette localité.

mai : 50 le 10, 28 le 13,

juin : 4 le 16, 3 le 27,

juillet : 20 le 7, 8 le 11, 110 le 28,

août : 61 le 23, 120 le 2,

septembre : 10 le 2, 2 le 19, 1 le 23,

octobre : 1 les 15 et 17,

Stationnements en BdA

avril : 50 le 20, 25 le 24,

mai : 38 le 4,

Migrations

La migration est notée en de multiples points du littoral. Ainsi,

Rue : avril : 2 vers le Nord-Est le 17, 8 vers le Nord le 28, 12 vers le Nord-Est le 26, 10 vers le Nord-Est le 27, 14 vers le Nord le 28,

mai : 50 vers le Nord-Est le 2, 35 vers le Nord-Est le 9, respectivement 1 et 2 vers le Nord-Est les 30 et 31 (derniers migrateurs observés),

HA : avril : 60 vers le Nord-Est le 20, 9 vers le Nord le 25,

RBdS/POM : avril : 3 vers le Nord-Est le 28, 16 vers le Nord-Est,

mai : 20 vers le Nord le 14,

Villers-sur-Authie : 12 vers le Nord-Est le 16 avril, 14 ind stationnés le 24,

Hampont : 1 vers le Nord le 2 mai

Fort-Mahon : 4 vers le Nord le 27 avril

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa

De même qu'en 1981, elle a été rarement observée en hiver (seules 3 observations hivernales : 1 le 3 janvier au POM, 1 le 22 février à St-Quentin-en-Tourmont et 2 le 30 décembre en RBdS). Le passage pré-nuptial bat son plein à la fin du mois de mars et en avril.

mars : La troisième décade est agitée : 5 le 21 en RBdS, 15 le 24 en BdA, 22 au Marais de Rue et 34 au POM le 27, 31 le 28 à Hoyelles-sur-mer/Boismont, 1 migratrice active est notée les 25 et 26 à Froise/Rue : respectivement 5 et 45 vers le Nord,

avril : Hoyelles-sur-mer/Boismont : 18 le 5, 65 le 19, 27 le 20, 18 le 29, 6 le 15 en RBdS, 5 le 23 au Marais de Rue, 2 le 3 à La Chaussée-Tirancourt et le 24 en BdA, à Froise/Rue le 4, sont observés 56 ind vers le Nord-Est,

mai : Les observations se raréfient mais le 1, 40 ind sont encore présents à Hoyelles-sur-mer/Boismont, 7 le 5 et 2 le 12 à Hoyelles-sur-mer, 1 le 13 au POM,

juin : 1 vers le Nord le 1 en RBdS (tardive), 1 le 26 au POM,

juillet : 6 le 9 et 46 le 16 à Hoyelles-sur-mer/Boismont; au POM : 1 le 5, 12 le 14, 32 le 27, et 6 le 7 en BdA,

août : consécutivement à la chasse, les observations ne concernent que RBdS/POM : 16 le 3, 18 le 16, 11 le 28,




septembre : RBdS/POM : 10 le 5, 12 le 17, 14 le 26,

octobre : RBdS/POM : 15 le 3, 5 le 18, 8 le 24,

novembre : RBdS/POM : 1 les 15 et 26,

BARGE ROUSSE Limosa lapponica

Uniquement observée sur le littoral avec un maximum classique en avril-mai, seule période de l'année où peuvent être observés des groupes réunissant plusieurs centaines d'oiseaux. En effet, le passage post-nuptial n'est pas spectaculaire tandis que l'hivernage est particulièrement faible, comme toujours, sur notre littoral. (alors que + 10000 oiseaux ont hiverné en moyenne durant la période 1978-1981, en France, Mahéo, Géroudet).



Stationnements en RBdS/POM

janvier : 47 le 30,
février : 40 le 7, 60 le 22, 40 le 25,
mars : 16 le 28, 60 le 30 entre Noyelles-sur-mer et St-Valery-sur-Somme,
avril : Les deux premières décades sont calmes et, comme en 1981, c'est aux environs du 25 que le passage atteint son point culminant.
 30 le 9, min 400 le 25, 700 le 26,
mai : 240 le 6, 200 le 13, 60 le 21,
juin : 11 le 1, 6 le 16, 1 le 23,
juillet : 4 le 7, 6 le 24, 85 le 28,
août : 180 le 5, 10 le 23,
septembre : 10 le 5, 6 le 19, 48 le 23,
octobre : 32 le 18, 1 le 31,
décembre : 1 ind blessé le 27, 10 le 30,
 Noyelles-sur-mer/Boismont : 60 le 30 mars, 70 le 1 avril,
 BdA : avril : 1 le 20, 14 le 23, 180 le 25, 120 le 27,

Migrations

L'augmentation massive des effectifs suivie en RBdS et en BdA coïncide bien avec les vols migratoires observés.

Cayeux-sur-mer : 140 vers le Nord le 25 avril

Fort-Mahon : 1 vers le Nord les 29 et 30 avril

Froise/Rue : respectivement 7 et 15 les 27 et 29 avril regagnent le dortoir situé en RBdS, en compagnie de Courlis corlieux N. phaeopus.
 260 vers le Nord-Est le 10 mai

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus

Aucune observation hivernale de ce limicole. 7 observations continentales ont été faites, lors des deux passages, et parmi elles 4 sur des bassins de décantation à Estrées-Mons.

avril : 1 vers le Nord le 16 à Rue, 18 les 17 et 19 dans les mollières de St-Valery-sur-Somme, 15 les 20 et 24 en BdA, 9 le 29 à Noyelles-sur-mer, observations continentales à Estrées-Mons (1 le 21), à Boves (2 le 22), à La Chaussée-Tirancourt (1 le 29),
mai : 1 le 1 au POM, 1 le 2 à Estrées-Mons, 1 le 12 à Noyelles-sur-mer, 3 le 13 en RBdS, 2 le 21 en RBdS, 1 le 23 au POM, 1 le 27 au HA,
juin : 1 le 16 en RBdS, 7 le 25 au POM,
juillet : POM : 1 le 7, 13 le 14, 2 le 21,
août : 4 le 5, 3 les 12 et 26 au POM; 4 le 30 et 3 le 31 à Estrées-Mons,
septembre : 5 le 7, 7 le 11 et 5 le 23 au POM; 1 le 8 à Noyelles-sur-mer, 5 le 10 en RBdS, 1 les 23 et 27 en RBdS,
octobre : 3 le 3 au POM, 1 le 18 en RBdS, 1 le 19 à Estrées-Mons, 2 le 27 et 1 le 31 en RBdS,
novembre : 1 le 1 au POM,

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus

Cette année, le pic de la migration pré-nuptiale a pu être saisi et a donné lieu à des observations spectaculaires.

Sur le littoral

RBdS/POM :

janvier : 1 le 8, 85 le 16, 60 le 30 (dont 1 tué !),
février : 37 le 7, (53 le 10) 70 le 13, 100 le 22,
mars : 31 le 11, 65 le 28,
avril : 50 le 9, 70 le 26,
mai : 40 le 6, 650 le 10, min 2600 le 13 (O. HERNANDEZ et T. RIGAUD), 500 le 30
juin : 200 le 9, 90 le 16, (30 le 23) 167 le 27,
juillet : 250 le 5, 151 le 11, 260 le 22, 320 le 24, 480 le 28, 600 le 30,
août : 350 le 5, 250 le 11, 300 le 24,
septembre : 225 le 6, 30 le 17, 21 le 23,
octobre : 66 le 16, 40 le 21,
novembre : 25 le 1, 17 le 13, 2 le 27,
décembre : 10 le 3, 24 le 13, 40 le 31,
 BdA : 60 le 24 février, 6 le 24 mars, 60 le 23 avril, 50 le 31 mai, 4 le 7 juillet,
 Noyelles-sur-mer/Boismont : 10 le 23 mars et 40 le 25, 6 le 6 avril et 45 le 17, 5 le 1 et 4 le 13 mai, 3 le 3 juillet,

HA :
mars : 2 le 14, 6 le 25,
avril : 60 le 6, 3 le 13, 50 le 25,
mai : 21 le 6, 21 le 13, 8 le 27,
juin : 8 le 2, 10 le 20,
juillet : 1 le 9,
août : 1 le 6, 6 le 15, 2 le 18,
septembre : 1 le 7,
 Quelques observations sont réalisées au Marais de Rue (6 le 23 avril, 6 les 15 et 20 mai, 2 le 10 juin, 6 le 4 juillet) à Nampont (1 le 27 mars, 1 le 14 juin), à Arry (1 le 18 avril).

A l'intérieur des terres
 Il est noté en 9 localités. Sur les 16 observations continentales, 12 sont printanières et donc attribuables au passage pré-nuptial.

passage pré-nuptial :

Estrées-Mons : 1 les 13 et 24 mars, 6 le 4 avril, 2 le 17, 20 le 21 (chiffre déjà considérable)

Boves : 1 le 22 avril

Buigny-St-Maclean : 1 le 1 mars

Famechon : 1 le 22 avril

Bergicourt : 1 le 22 avril

La Chaussée-Tirancourt : 2 le 29 avril, 2 le 2 mai,

Argoeuvres : 1 le 6 mai

Long-le-Catelet : 2 le 6 mai

passage post-nuptial :

St-Sauveur : 1 le 16 juillet

Estrées-Mons : 3 le 30 août et 6 le 31, 3 le 19 octobre

Migrations

Mise à part l'observation de 9 migrateurs le 24 octobre à St-Quentin-en-Tourmont, tous les migrateurs actifs notés l'ont été pendant la migration prénuptiale, c'est-à-dire finalement surtout en avril et mai.

mars : 4 vers le Nord le 25 à Froise/rue,

avril : 20 vers le Nord le 1 au RA, 6 vers le Nord-Est le 3 à Froise/Rue, 19 vers le Nord-Est le 5 et 3 dans la même direction le 6 à Froise/Rue,

mai : 85 vers le Nord-Est le 10 et 4 dans la même direction le 11 à Froise/Rue, 50 vers le Nord au Crotoy et 28 vers le Nord le 13 en RBds, 120 vers le Nord-Est en 1 h 00 le 14 au soir en RBds, 2 vers le Nord-Est le 29 au Bois de Cise (Ault),

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia

Une observation très précoce : 5 le 28 février en RBds. Le passage pré-nuptial ne commença véritablement qu'à partir de la mi-avril. La fin de ce passage, maximal pendant la deuxième décade de mai, est difficile à saisir car des oiseaux restent sur le littoral au plein cœur de l'été. L'augmentation des effectifs, perçue à partir de la seconde moitié du mois de juillet, permet de mettre en évidence le début du passage post-nuptial. Dernière observation le 24 octobre en RBds.

RBds/POH :

février : 5 le 28,

mars : aucune donnée

avril : 10 le 26,

mai : 20 le 8, min 30 le 13, 4 le 30,

juin : 2 le 16, 5 le 27,

juillet : 4 le 5, 10 le 18, 36 le 23,

août : 24 le 3, 22 le 12, 12 le 24,

septembre : 10 le 6, 7 le 16, 21 le 28,

octobre : 3 le 16, 5 le 21, 2 le 24,

BdA : avril : 19 le 24, mai : 3 le 4, juillet : 20 le 17,

Hoyelles-sur-mer/Boismont :

avril : 17 le 19, 9 le 29,

mai : 15 le 1, 3 le 12

juillet : 1 le 9,

Marais de Rue : avril : 2 le 23, mai : 3 le 9, juin : 3 le 10,

HA : mai : 2 le 13, juin : 1 le 4, juillet : 3 le 9, 1 le 18, octobre : 1 le 5, 2 le 18,

Migrations

avril : 3 vers le Nord le 23 et 2 vers le Nord le 25 à Froise/Rue,
mai : 14 vers le Nord-Est le 10, 1 vers le Nord-Est le 11, 2 vers le Nord-Est le 13
 1 vers le Nord le 15 à Froise/Rue; 11 vers le Nord-Est le 13 en RBdS; 6 vers
 le Nord le 14 au Crotoy.

A l'intérieur des terres, les observations ont été relativement nombreuses et se
 rapportent aux deux passages.

Estrées-Mons : 3 le 21 avril, 3 le 27 juillet, 2 le 10 août et 9 le 30, 1 le 19 oct-
obre,

La Chaussée-Tirancourt : 1 les 2 et 12 mai

Argoeuvres : 1 le 6 mai

PETIT CHEVALIER A PATTES JAUNES Tringa flavipes

1 ind les 17 et 18 juillet au marais de St-Firmin (P. RAEVEL).

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus

L'hivernage n'est observé qu'à Blangy-sous-Poix (1 le 4 janvier et le 20 février). La
 fréquence des observations est maximale en avril et en juillet-août.

mars : 1 le 27 au POM,

avril : observé en 10 localités différentes : 2 le 4 à Estrées-Mons, 1 le 17 au
 POM, 2 le 17 à Boismont, 3 le 18 à Arry, 1 les 17 et 25 à Blangy-sous-
 Poix, 1 les 22 et 30 à Bergicourt, 1 le 20 au HA, 1 le 22 à Famechon,
 1 le 26 à St-Quentin-en-Tourmont, 1 le 28 à Rue,

mai : 1 le 12 à Noyelles-sur-mer,

juin : observé à Famechon (1 le 26), au POM (1 le 21), à Rue (1 le 10, du 16 au
 23, 2 le 24, 3 le 25, 2 les 29 et 30), à Hampont (1 le 14),

juillet : au HA (1 le 3), à Famechon (1 le 10), au POM (1 le 9, 5 le 18, 3 le 27),
août : au HA (5 le 6), à Estrées-Mons (2 le 10, 5 le 30), au POM (1 les 5 et 26),
 à Rue (3 le 4),

septembre : 1 le 10 à Blangy-sous-Poix,

octobre : au POM (1 le 18), à Estrées-Mons (1 le 19),

décembre : Estrées-Mons (1 le 4, 4 le 10),

Migrations

BdS : 4 vers le Sud le 28 juillet, 2 vers le Sud le 1 août, 1 vers le Sud le 3 et 1
 vers le Sud le 4 août

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

Observé au printemps (2 le 9 mai et 1 le 10 juin à Rue, 2 le 11 juin à St-Quentin-
 en-Tourmont) mais surtout lors du passage post-nuptial et ceci, essentiellement sur
 le littoral.

juillet : 3 le 9 à Noyelles-sur-mer/Boismont, 4 le 14 au POM et 1 le 21, 1 le 23 au
 HA,

août : 1 le 6 au HA, 5 le 4 au POM, 3 les 12 et 4 le 24, 1 le 4 à Rue,
 à l'intérieur, 1 du 20 au 25 à Fouencamps,

septembre : 1 le 19 au POM,

CHEVALIER GUILLOTTE Tringa hypoleucos

Noté d'avril à décembre avec un maximum en avril-mai et juillet-août. Fréquent à
 l'intérieur des terres comme sur le littoral.

Stationnements sur le littoral

avril : 1 le 30 au POM, 2 le 23 à Rue,

mai : 4 le 9 à Rue, 11 le 15; 4 le 8 au POM, 9 le 15, 7 le 27; 10 le 13 au HA,
 3 le 1 à Noyelles-sur-mer, 4 le 12, 4 le 13 en RBdS, 2 le 21,

juin : 2 le 20 au HA, 1 le 30 à Rue,

juillet : 3 le 9 au HA, 4 le 23, 4 le 7 au POM, 15 le 14, 10 le 27; 4 le 25 à Rue,

août : 7 les 6 et 15 au HA, 16 le 2 au POM, 8 le 12, 15 le 24,

septembre : 1 le 18 au HA, 4 le 3 au POM, 4 le 12, 5 le 23,





octobre : 1 le 19 au HA, 2 le 8 au POM, 1 les 14 et 21,

décembre : 1 le 27 en RBdS,

Stationnements à l'intérieur des terres

avril : Famechon (2 le 22, 6 le 30), Bergicourt (1 le 30), Frémontiers (1 le 30),
 Amiens (1 le 22),

mai : observé en 7 localités : Longpré-les-Amiens (1 le 2), Argoenvres (3 le 6),
 Cagny (1 le 5), Boves (1 le 5), Fontaine-sur-Somme (1 le 5), Fouencamps



(2 le 10), Tilloy-les-Conty (4 le 9 et 2 le 16),
juillet : St-Sauveur (3 le 16), Ailly-sur-Somme (2 le 26), Cléry-sur-Somme (1 le 27)
 Famechon (1 le 3), Tilloy-les-Conty (1 le 3), Estrées-Mons (22 le 27),
août : Roves (4 le 2, 1 le 20, 3 le 25), Fouencamps (1 le 20, 2 le 27), Amiens
 (1 le 8), Estrées-Mons (57 le 10, 24 le 30),
octobre : 2 le 19 à Estrées-Mons,
novembre : 3 le 28 à Amiens (Marais du Bout du Monde),
décembre : 1 le 4 à Estrées-Mons,
Migrations
 Les données communiquées concernent le mois d'avril et mai.
avril : Froise/Rue : 10 vers le Nord le 13, 10 vers le Nord le 11,
mai : 1 vers le Nord-Est le 16 à Rue

BECASSEAU HAUBECHE Calidris canutus

Ce limicole est observé, lors de ses migrations le long du littoral. Le passage pré-nuptial amorcé dans les derniers jours d'avril, bat son plein au cours de la deuxième décennie de mai pour se terminer en juin, tandis que la descente, plus étalée dans le temps, commence fin juillet et se poursuit jusqu'au début du mois de novembre. L'hivernage ne concerne qu'un nombre très réduit d'individus.

RBdS/POM :

janvier : 3 le 30,
mars : 5 le 28,
avril : 1 le 23, 2 le 26,
mai : 150 le 6, min 250 le 13, 200 le 21,
juin : 230 le 9, 50 le 16, 6 le 26,
juillet : 11 le 7, 18 le 23, 34 le 30,
août : 50 le 3, 7 le 19, 50 le 22,
septembre : 90 le 2, 90 le 16, 26 le 28,
octobre : 119 le 18, 70 le 31,
novembre : 36 le 2, 1 le 26,
décembre : 7 le 3,

Migrations

20 vers le Nord le 2 mai en RBdS, une bande de 100 le 10 mai vers le Nord-Est à Froise, 2 le 19 mai au HA, 1 le 10 juin au HA,

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta

Les deux passages sont bien notés.

RBdS/POM :

mars : 1 le 29,
avril : 2 le 11,
mai : 6 le 12, 7 le 26,
juin : 17 le 16,
juillet : 3 le 19 et 5 le 31,
août : 14 le 6, 4 le 20, 10 le 23,
septembre : 31 le 2, 3 le 11, 1 le 26,
octobre : 2 le 18,
 HA : 3 le 27 mai, 7 en août et 1 le 18, 2 le 1 septembre, 3 le 13 octobre,
 Rue : 1 le 10 juin,
 Boismont : 1 le 9 août

BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii

Seulement signalé au POM.

BECASSEAU VIOLET Calidris maritima

Un seul individu est observé.



octobre : 1 les 29 et 30 en RBdS

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina

Les données significatives sont rares, surtout en hiver, car les comptages sont souvent difficiles.

RBdS/POM :

janvier : 900 le 17, 3500 le 30,
février : 400 le 7, 3500 le 13, 1700 le 25,
mars : 250 le 12, 1000 le 28,



avril : 500 le 26,
mai : 700 le 10, 500 le 13, 250 le 21,
juin : 6 le 9 dont 2 paracent, 15 le 16,
juillet : 200 le 7, 350 le 19, 750 le 21,
août : 500 le 6, 750 le 24,
septembre : 300 le 5, 950 le 23,
octobre : 4500 le 18, 3500 le 31,
novembre : 4700 le 2, min 3500 le 14,
décembre : 10000 le 30,

BdA : 160 le 18 janvier, 750 le 26 février, 160 le 26 avril, 550 le 25 octobre,
 HA :

janvier : 15 le 1, 1 le 24,
mars : 15 le 10, 14 le 18, 41 le 28,
avril : 2 le 20,
mai : 6 le 19, 1 le 27,
juillet : 1 le 7,
août : 8 le 6, 2 le 15, 1 le 29,
septembre : 3 le 7,
octobre : 9 le 9, 1 le 13, 6 le 24,
novembre : 1 le 5,

Rue : 25 stationnent le 9 mai.

Migrations

mars : 30 vers le Nord-Est le 25 au HA
octobre : 210 vers le Sud en 5 h 30 le 25 en BdA
 Noté à l'intérieur des terres en août (1 du 23 au 27 à Fouencamps) et en octobre
 (8 le 19 à Estrées-Mons).

BECASSEAU COCORLI Calidris ferruginea

Seul le passage post-nuptial a pu être suivi.

juillet : 1 le 4 à Rue, 20 le 28 en RBdS,
août : 18 le 2 en RBdS, 33 le 5; 3 le 12 au POM et 2 le 26,
septembre : 12 le 2 en RBdS, 1 le 23,
octobre : 1 le 14 en RBdS,

BECASSEAU SA BERLING Calidris alba

Uniquement noté sur le littoral, les stationnements observés lors du passage pré-nuptial sont spectaculaires en BdA.

RBdS :

février : 20 le 25, 13 le 7,
mars : 19 le 29,
avril : 24 le 9, 80 le 26 (5 le 14),
mai : 11 le 6, min 300 le 13, 370 le 27,
juin : 1 le 11,
juillet : 160 le 19,
août : 430 le 6, 80 le 22,
septembre : 160 le 2, min 25 le 19, 45 le 23,
octobre : 8 le 18, 5 le 31,
novembre : 5 le 1,
décembre : 1 le 5, 11 le 31,

RBdA (À Quend) :


février : 140 le 26,
avril : 230 le 10, 300 le 12, 800 le 23, 920 le 26, environ 650 le 27,
 Absent ou en nombre infime en juillet-août,
octobre : 103 le 29,
décembre : 42 de Quend à la BdA le 19, 31 le 27 à Fort-Mahon,

CONSTATANT Philomachus pugnax

Observé du 21 février au 19 octobre, principalement dans les bas champs et les arrières littoraux.

Stationnements

février : 13 le 21 à Noyelles-sur-mer, 5 le 22 à St-Quentin-en-Tourmont,
mars : 9 le 18 au HA, 41 le 28 à Noyelles-sur-mer, 40 le 24 en BdA,
avril : 18 le 6, 120 le 17 et 180 le 2, 5 à Noyelles-sur-mer/Boismont, 6 les 9 et 13, 10 le 28 au HA; 12 le 25 à St-Quentin-en-Tourmont; 28 le 28 à Rue/



mai : Favières; 9 le 17 et 6 le 24 au POM; 1 femelle le 22 à Famechon,
11 (dont 7 mâles en plumage nuptial) le 9 et 40 femelles le 15 à Rue/
Favières, 1 mâle en plumage nuptial le 4 et 20 le 12 en BdA, 15 le 13 à
St-Quentin-en-Tourmont; 1 le 20 au POM; 2 le 6 à Long-le-Catelet,
juin : 2 le 6 au POM, 3 (dont 1 mâle) le 10 à Rue/Favières; 1 le 23 à Hoyelles-
sur-mer,
juillet : 50 le 4, 60 les 17 et 20, 110 le 21 à Rue; 53 le 9 et 2, 39 le 17 à
Hoyelles-sur-mer/Boismont, 22 le 7 en BdA; 20 le 18 et 14 le 26 au POM,
août : 1 le 6 au HA, 23 le 3, 13 le 19 et 6 le 23 au POM; 21 le 10 et 1 le 30 à
Estrées-Mons,
septembre : 1 le 7 au HA; 13 le 1, 7 le 12 et 3 le 23 au POM
octobre : 1 le 19 à Estrées-Mons,

Migrations

J. MOUTON note :

HA : 4 mâles vers le Nord-Est le 25 octobre,

Froise/Rue : 23 vers le Nord-Est le 26, 50 vers le Nord-Est le 27,

ECHASSE BLANCHE Himantopus himantopus

1 mâle le 4 juillet à Boismont (F. SUEUR)
2 le 16 juillet à Hoyelles-sur-mer (P. TRIPLETT)
2 du 6 juillet au 6 août au POM (P. BIET)

AVOCETTE Recurvirostra avosetta

L'effectif de la colonie installée au POM a encore augmenté : 88 couples en 1982
(P. BIET) contre 68 en 1981. Une petite colonie s'installe et alarme au marais de
Rue mais la nidification n'est constatée (J. MOUTON). 2 ad/1 nid le 1 juin à
Boismont, abandonné ensuite (F. SUEUR et M. SUEUR-BELLARD).

RBdS/POM (toutes les données concernent le POM sauf indications contraires) :

février : 1 le 13 en RBdS, 25 le 19,
mars : 38 le 5, 66 le 16 et 150 le 28,
avril : 146 le 10, 91 le 13, 217 le 29,
mai : 125 le 9, 143 le 14, 152 le 21, (125 ind/45 nids/4 couvées le 9. première
éclosion le 5, 70 ad/29 pulli/min 21 nids le 27)
juin : 115 le 7, 165 le 18, 100 ad/40 pulli vivants/4 pulli morts en RBdS le 23,
106 le 26,
juillet : 178 le 3, 120 le 18,
août : chute brutale des effectifs : 23 le 8, 33 le 12, 34 le 23,
septembre : 50 le 4, 2 en RBdS; 24 le 17, 36 le 28 en RBdS,
octobre : 59 le 10, 75 le 17, 68 le 26 en RBdS,
novembre : 9 le 2 en RBdS, 12 le 14 en RBdS,
décembre : 52 le 3 en RBdS, 23 le 13 et 40 le 31 (donnée hivernale exceptionnelle)
Rue : 2 le 30 avril; 10 le 15 et 22 le 20 mai; 19 le 10 juin; 40 le 4, 70 le 12 et
75 le 21 juillet,

Hoyelles-sur-mer/Boismont : 36 le 28 avril, 10 le 18 et 4 le 25 mai; 4 le 1, 1 le 19
et 5 le 27 juin,

HA : 6 le 28 mars, 4 le 11 avril, 2 le 17 mai,

Migrations

passage pré-nuptial :

34 vers le Nord le 29 mars à Quend-Plage, 5 vers le Nord le 17 avril à Quend-Plage,

passage post-nuptial :

6 vers le Sud le 1 août à Rue, 70 vers le Sud le 25 octobre en BdA,

A l'intérieur des terres (en dehors de la plaine maritime picarde), la rencontre de
cet oiseau est un événement rare : 22 vers le Nord le 2 mai à La Chaussée-Tirancourt
(X. COMMECY et A. M. COMMECY), 1 les 30 et 31 août à Estrées-Mons (X. COMMECY et H.
DUPUTCH).

PHALAROPE A BEC LARGE Phalaropus fulicarius

août : 1 le 28 au POM (P. BIET)

septembre : 1 le 12 au Cap Hornu (St-Valery-sur-Somme) (P. TRIPLETT)


PHALAROPE A BEC ETROIT Phalaropus lobatus

1 du 30 août au 3 septembre au POM (P. BIET); 1 le 21 décembre (P. BIET),

OEDICHENE CRIARD Burhinus oedichemus

Toutes les observations communiquées ont été faites par J.P. FERRE. Elles concernent la petite région située autour d'Airaines.

avril : 1 le 22 à Airaines,
mai : noté à Airaines, Le Quesnoy, Métigny,
juin : 3 à Airaines et 1 à Warly le 3,
juillet : noté à Airaines et au Henge,
septembre : 1 le 20 à Le Quesnoy-sous-Airaines.



GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU.

LABBE PARASITE Stercorarius parasiticus

Noté d'août à octobre.

août : 1 le 23 en RBdS,
septembre : 1 le 11 à Quend-Plage, 1 le 13 et 2 le 19 à Cayeux-sur-mer,
octobre : 1 les 17 et 28 en RBdS, 1 le 24 à Cayeux-sur-mer,

GOELAND MARIN Larus marinus

Stationnements

RBdS/POM :

janvier : 500 le 30,
février : 250 le 13,
mars : 60 le 29,
avril : 40 le 26 (Le 9, un individu tente de capturer un Guillemot de Troïl Uria aalge mazouté; J. MOUTON),
mai : 100 le 30 (surtout im et sub),
juin : 3 le 26,
juillet : 450 le 7, 500 le 22 (dont min 300 ad ou sub),
août : 300 le 6,
septembre : 350 le 2,
octobre : 1150 le 17, 440 le 30,
novembre : 440 les 14 et 30,
décembre : 250 le 20 (Plusieurs individus provoquent des vols massifs d'anatidés rassemblés à marée haute en RBdS le 31. L'un d'eux poursuit même un Tadorne de Belon Tadorna tadorna; T. RIGAUX.),

RBdA :

février : 100 le 27,
avril : 100 le 10 (80 % im),
juillet : 250 le 18,
août : 200 le 31,
octobre : 650 le 25 (90 % ad ou sub),

Migrations

Elle est notée principalement en mars mais aussi en mai.

mars : Froise/Rue : 12 ad vers le Nord le 18, 15 ad vers le Nord le 26, 3 ad vers le Nord, 1 ad vers le Nord le 30,
mai : RBdS : 5 en vol vers le Nord le 12,
 Quend-Plage : 4 ad vers le Nord le 16,

GOELAND BRUN Larus fuscus

Maxima par décade signalés sur le littoral.



février : 1 le 7 au POM, 2 le 22 à Quend-Plage et au POM,
mars : 4 le 12 en RBdS, 4 vers le Nord-Est le 25 au MA,
avril : 5 le 12 et 45 le 23 en BdA,
 La migration est alors très nette :
 2 ad vers le Nord le 13 et 15 à Rue et 4 ad vers le Nord le 18,
 20 vers le Nord le 24 en BdA, 18 vers le Nord le 24 à Fort-Mahon et 5 vers le Nord le 25,
mai : Encore 7 vers le Nord le 2 en RBdS, 250 sub et im le 27 en RBdS,
juin : 1 le 2 à St-Valery-sur-Somme, 1 ad L. f. fuscus et min 80 im le 11 en RBdS, 25 le 23 en RBdS,
juillet : 54 ad et im de plus d'un an ainsi qu'un juvénile le 16 en RBdS,
août : 7 ad vers le Sud le 30 à Fort-Mahon,
septembre : 1 ad le 17 en RBdS, 2 ad 1 im le 26,
octobre : 10 le 17 en RBdS, 30 le 25 en RBdA,
novembre : min 3 le 14 en RBdS,
 Une observation légèrement à l'intérieur des terres : 2 sub le 20 mai au Marais de Rue.

GOELAND ARGENTE Larus argentatus

Stationnements sur le littoral

RBdS/POM :

janvier : 3500 le 17, 4000 le 30,
février : min 500 le 25,
mars : 4000 le 12,



avril : 3000 le 9, 1500 le 26,
mai : 2700 le 30,
juin : 1600 le 11, 2400 le 23,
août : 1500 le 6,
septembre : ?
octobre : 3000 le 17,
novembre-décembre : Les effectifs diurnes n'ont pas été recensés mais sont accrus le soir par l'arrivée au dortoir des individus se nourrissant à l'intérieur des terres.

RBdA :

avril : min 2000 le 10, min 1500 le 12,
juillet : 1000 le 7,
octobre : 800 le 25,

Brighton/Cayeux-sur-mer : 5400 le 14 mars

A l'intérieur des terres, les Goélands argentés L. argentatus se rencontrent en nombre sur les décharges, en particulier sur celle située entre Boves et Sains-en-Amiénois.

Décharge de Sains-en-Amiénois :

janvier : 2800 le 3 (plus de 70 % d'im), 3000 du 9 au 30,
février : 1500 le 6,
mars : 1600 le 20,
mai : 150 le 18 (grande majorité d'adulte),
juin : ?

novembre : min 1000 le 15,

Nidification

Bois de Cise (Ault) :

220 couples sont recensés (sur l'ensemble des falaises picardes) (F. SUEUR).

200 ad le 12 avril, 400 ad le 29 mai (J. MOUTON).

POM :

1 individu couve le 26 mai, première éclosion le 20 juin, 1 couple nicheur/1 juv non volant les 16 et 23 juillet.

Migrations

Important passage vers le Nord le 25 mars en RBdS, passage se poursuivant en avril (100 vers le Nord le 26 à Froise/Rue) et même début mai (une quinzaine passent les 7 et 8) avec, selon J. MOUTON, 3 retardataires le 26 juin.

GOELAND CENDRE Larus canus

Stationnement sur le littoral

RBdS/POM (inclus Le Crotoy) :

janvier : 1500 le 17, 2000 le 30,
février : 1400 le 22 (Le Crotoy),
mars : 6000 le 12,
avril : 2000 le 9,
mai : 1200 le 6, 200 le 26,
juin : 200 le 16, 300 le 24,
juillet : 2200 le 9, + 1500 le 21,
août : 3500 le 5,
septembre : 1000 le 2,
octobre : min 260 le 17 (Le Crotoy), 580 le 31,
novembre : ?
décembre : min 300 le 30 (220 dans une pâture ce même jour au Hourdel (Cayeux-sur-mer)),

RBdA :



avril : 200 le 27,
juillet : min 100 le 18,
octobre : min 200 le 29,
 Fort-Mahon : 400 le 28 février, 500 le 31 mars,
 Quend-Plage : 50 les 16 mai et 24 juin
 Brighton (Cayeux-sur-mer) : 800 le 14 mars

A l'intérieur des terres

Rencontré surtout dans les pâtures mais aussi dans les cultures, principalement en hiver. Les bandes réunissent rarement plus de quelques dizaines d'individus.

Airaines : 4 im le 9 février

Abbeville : 15 le 15 février



Hangest-sur-Somme : 6 ad le 18 mars

Crécy-en-Ponthieu : 100 le 17 mars, 60 ad le 11 novembre dans une pâture,

Cléry-sur-Somme : 1 le 19 octobre

Famechon : 1 im le 8 décembre

Des individus sont notés de la route pendant les mois de janvier, février, mars, dans pratiquement toutes les communes situées entre Rue et Domart-en-Ponthieu. Les observations reprennent à partir du mois d'août et jusqu'à la fin de l'année.

Migrations

février : 50 vers le Nord-Est le 5 et 30 vers le Nord-Est le 6 à Froise/Rue

Important passage fin mars en RBdS (le 25 en particulier)

Nidification

J. MONTON note 1 couple cantonné le 27 mars au POM et 1 ad alarmant le 23 juin, toujours au POM. Le 24 juillet, T. RIGAUX remarque le comportement nicheur de 2 individus au POM. Il semblerait cependant qu'il n'y ait pas eu de reproduction effective.

MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus*

2 ad en plumage nuptial le 27 avril à Fort-Mahon (O. HERNANDEZ et T. RIGAUX)

MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus*

L'intérieur des terres est particulièrement fréquenté en hiver : 350 le 11 janvier au Bassin de La Hotoie à Amiens, 400 le 3 et 10 février à la décharge de Sains-en-Amienois, 800 entre Ailly-le-Haut-Clocher et Abbeville (date non précisée).

Dès le mois de mars et en avril, sont notés des passages vers le Nord sur le littoral : 150 vers le Nord-Est le 5 mars à Froise/Rue, passage important le 25, 240 vers le Nord-Est le 3 avril.

A partir de cette époque, les observations "continentales" peuvent se rapporter à des reproducteurs locaux, exploitant les abords des colonies.

Nidification

Marais de Rue : 800 ind/300 nids le 4 avril, 1000 ind (dont 950 ad) le 15 mai, 700 le 10 juin. A cette date, sont notés les premiers juvéniles volants tandis qu'il reste des poussins de quelques jours.

POM : 1 couple nicheur (1 nid le 26 mai)

Il existe d'autres colonies, non recensées, dans le département.

Pendant la saison de reproduction, les oiseaux restent nombreux sur le littoral :

2000 le 16 juin en RBdS, mais les effectifs s'accroissent encore en juillet : 4000 le 5 au Crotoy. Cette augmentation s'accompagne d'une certaine migration : 460 migrateurs le 19 juillet à Fort-Mahon (en 1 heure).

A Fort-Mahon, 1200 individus fuient vers le Sud le 25 octobre.

Les effectifs des Mouettes rieuses *L. ridibundus* se nourrissant dans la décharge de Sains-en-Amienois redeviennent importants : 500 le 15 novembre par exemple.

MOUETTE PYGMEE *Larus minutus*

Rencontrée toute l'année, avec un net maximum en avril, mai.

février : 10 le 2 à Quend-Plage,

mars : 1 le 28 au HA, 3 ad vers le Nord le 30 à Quend-Plage, 5 ad vers le Nord le 31 à Fort-Mahon,

avril : 8 le 12 en BdA, 12 (dont 2 juv) le 17 en BdS, 8 le 19 à Boismont et le 20 au HA, 15 (dont 10 vers le Nord) le 23 en RBdA, 2 vers le Nord le 25 à Cayeux-sur-mer et le 29 à Fort-Mahon; le 29, 10 à La Chaussée-Tirancourt et 15 entre L'Etoile et Long-le-Catelet (A.M. et X. COMMECY),

mai : 1 ad 4 im le 1 et 1 sub 2 im le 16 à Boismont, 6 ad 2 im le 20 à Rue et 2 ad vers le Nord-Est le 29 au Bois de Cice (Ault),

juin : 2 ad 7 im le 10 au Marais de Rue,

juillet : 1 im le 7 à Noyelles-sur-mer, 3 ad 1 im le 17 en BdA, 1 ad le 31 à Rue,

août : 1 le 29 au HA,

octobre : 12 le 25 en RBdA,

décembre : 1 ad le 20 au Hourdel (Cayeux-sur-mer),

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla*

février : 1 morte le 23 en RBdS,

mars : respectivement 2 et 1 im les 28 et 29 en RBdS,

avril : 1 im le 23 et 1 ad, 1 im le 27 en RBdA, 1 vers le Nord le 25 à Cayeux-sur-mer,

août : 1 juv le 23 en RBdS, 1 ad le 31 en BdA,
décembre : 2 le 13 au HA, 1 ad le 21 en RBdS,

MOUETTE DE SABINE Larus sabini

1 ad en plumage d'hiver le 12 mars en RBdS . (F. MONTEL)

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger

Les deux passages sont bien suivis.

avril : 30 du 22 au 27 à Noyelles-sur-mer/Boismont, 45 le 23 et 15 le 28 au Marais de Rue, 4 vers le Nord le 25 à Cayeux-sur-mer tandis que 9 ind sont observés au HA et 1 à Noyelles-sur-mer, 17 le 29 à La Chaussée-Tirancourt et 1 à L'Etoile.
mai : 1 le 1 à Boismont, 1 le 2 à Nampont-St-Martin, 6 le 6 à Longpré-les-Corps-Sts, 6 le 18 à Long-le-Catelet, 14 le 15 et 1 le 20 au Marais de Rue, 2 le 23 à Estrées-Mons et 1 à Péronne, 6 le 30 en RBdS,
juin : 6 le 25 au POM,
juillet : 1 le 24 en RBdS, 2 le 27 à Cléry-sur-Somme,
août : 1 le 6 au HA, 1 le 23 en RBdS, 6 le 30 à Estrées-Mons et 1 à Cléry-sur-Somme, le 31,
septembre : HA : 5 le 1, 7 im le 25, 6 le 29,
1 le 27 en RBdS,
octobre : 2 le 5 et 3 le 13 au HA, 1 le 21 à Grand-Lavier,

GUIFETTE MOUSTAC Chlidonias hybrida

18 le 26 juin au Hourdel (Cayeux-sur-mer) et 2 le 10 août en cette même localité (J.C. ROBERT).

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo

avril : 14 le 9 en RBdS, 15 vers le Nord-Est le 11 à Quend, 25 le 12 en RBdA, 7 le 29 à La Chaussée-Tirancourt et 7 entre l'Etoile et Long-le-Catelet, 12 le 29 à Noyelles-sur-mer,
mai : 2 le 16 et 1 le 30 en RBdS,
juin : 4 le 16 et 23 le 23 en RBdS,
juillet : min 7 le 8 et 580 le 21 en RBdS,
août : 150 le 23 entre Quend et l'Ance Bidard (St-Quentin-en-Tourmont), 80 le 31 en BdA,
octobre : 1 le 19 à Péronne,

STERNE ARCTIQUE Sterna paradisaea

Nettement plus rare que la Sterne pierregarin S. hirundo sur notre littoral, semble t'il.

avril : 2 le 9 et 4 le 26 en RBdS, 8 le 21 à Fort-Mahon,
juillet : 3 le 21 en RBdS,
août : 10 le 5 en RBdS,

STERNE COMIC Sterna hirundo/paradisaea

Compte tenu de la remarque précédente, la plupart des observations concernant probablement la Sterne pierregarin S. hirundo.

avril : 215 vers le Nord le 29 à Fort-Mahon,
mai : 35 le 30 en RBdS,
juillet : 150 le 7 en RBdS, 300 le 19 et 650 le 28, 40 le 7 en BdA et 100 les 17 et 18,
août : 630 le 5 en RBdS,
septembre : + 300 le 2 en RBdS,

STERNE NAINE Sterna albifrons

Le passage est très intense au mois d'avril, plus diffus en juillet-août.

avril : 8 le 9 et 50 le 26 en RBdS, 17 le 10 en RBdA, 45 le 12, 110 le 23 et 180 le 26,
Le 27 : 240 vers le Nord en 35 minutes à Fort-Mahon (soit 410 ind/h),
mai : 4 le 6 en RBdS,
juillet : 4 le 7 et 15 le 24 en RBdS, 4 le 18 en RBdA,
août : 6 le 5 en RBdS, 2 le 15 au HA, 50 vers le Sud le 29 à Hautebut,
septembre : 3 le 2 en RBdS,

STERNE CAUGERK Sterna sandvicensis

mars : 28 le 28 en RBdS,
avril : RBdA : 160 le 10, 220 le 12, 100 le 26,
RBdS : 150 le 9, 180 le 26,
mai : 80 le 6, 19 le 16 et 20 le 30 en RBdS,
juin : 8 le 6 à Quend, 5 le 16 et 30 le 23 en RBdS,
juillet : RBdA : 110 le 7, 600 le 17,
RBdS : 440 le 7, 800 le 19, 1300 le 21,
août : 500 le 3 (dont un minimum de 50 juv) en RBdS, 50 le 23 entre Quend et
l'Ance Bidart (St-Quentin-en-Tourmont), 40 le 31 en RBdA,
septembre : 80 le 2 en RBdS,
octobre : 4 le 25 en RBdA, 4 le 28 en RBdS (harcelées par un Labbe parasite
S. parasiticus), 1 le 29 en RBdS.

Additif:

STERNE DE DOUGGAL Sterna dougallii

I juv. le 17 Juillet en RBdS (P. Raevel)

PINGOUIN TORDA Alca torda

2 observations d'oiseaux non mazoutés: 1 en migration vers le Sud le 20 décembre, en RBdS et à Quend-Plage le 2.
7 morts mazoutés cette année.

MERGULE NAIN Plautus alle

Le 26 novembre: 1 trouvé mourant dans un marais au Crottoy, mort le lendemain, non mazouté ni blessé. (H. DANSETTE)
2 trouvés morts suite à des tempêtes en BdS: 1 le 18 et 1 le 20 décembre.

GUILLEMOT DE TROÏL Uria aalge

58 trouvés morts mazoutés (5 en janvier, 24 en février, 3 en mars, 9 en avril, 1 en octobre, 1 en novembre et 15 en décembre)
1 les 22 et 25 décembre au POM.

MACAREUX MOINE Fratercula arctica

1 ad mort mazouté le 20 décembre.

PIGEON COLOMBIN Columba oenas

Absence de feuilles

PIGEON RAMIER Columba palumbus

Absence de feuilles

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur

Absence de feuilles

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto

Absence de feuilles

COUCOU GRIS Cuculus canorus

Absence de feuilles

HIBOU MOYEN-DUC Asio otus

Une mauvaise année, pour ce nocturne cette année où il est signalé en régression comme nicheur dans le secteur d'Airaines et dans le Marquenterre.
Nicheur certain ou probable à Amiens, Gentelles et c'est tout.
3 données hivernales seulement.

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus

Hivernage net dans le secteur de Quend-Plage (2 à 3 individus) installation dès la fin octobre et près de Rue: 2 individus
Toujours un net passage fin mars avec 5 observations entre le 21 et le 28: Friville-Escarbotin, HA, Noyelles-sur-mer, Rue et Saigneville.
Nicheur possible au Marais de Rue (observations jusqu'à fin mai) et à Noyelles-sur-mer (observations jusqu'à la mi-mai)
1 le 5 juillet à St-Quentin-en-Tourmont.
2 en BdA le 29 octobre et 1 dans le secteur d'Airaines fin décembre.

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua

Notée presque uniquement dans le Marquenterre.
Rue: nicheuse certaine, présente toute l'année (4 à 5 individus/150 ha) à Froise.
Quend: notée de février à juin (maximum de 5 le 29 mars)
St-Quentin-en-Tourmont, présente toute l'année (maximum de 4 dont 3 chanteurs, début février)
Villers-sur-Authie: 1 le 3 avril, Noyelles-sur-mer: 1 le 25 mars.

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco

Sédentaire; notée cette année à:
Airaines, Amiens (3 endroits), Blangy-sous-Poix, Forêt de Crécy (3 chanteurs), Epauennesnil, Etrejust, Frémontier, Froise (2 chanteurs), Domart-en-Ponthieu, Dunes du Marquenterre (3 chanteurs), Monchaux, Rue, Saveuse, St-Quentin-en-Tourmont (3 chanteurs) St-Valery-sur-Somme, Tilloy-les-Conty, Thoirx et Vironchaux.

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba

J. MOUTON note une "diminution catastrophique dans la plaine du Marquenterre où elle était commune au début des années 70".

Notée cette année à Amiens(2 endroits), Airaines, Corbie, Le Crotoy, Domart-en-Ponthieu, Flixecourt, Fort-Mahon, Froise, Glisy, Ligescourt, Mouflers, Nampont-St-Martin, Nolette(Noyelles-sur-mer)(1 couple le 12 juin, 1 poussin mort et 1 oeuf clair) Ribeaupville, Rue, St-Valery-sur-Somme, Sorel-en-Vimeu, Tilloy-les-Conty, Toutencourt.

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus

2 le 16 mai dans les Dunes du Marquenterre.(J. MOUTON)

MARTINET NOIR Apus apus

Premier: 1 le 27 avril à Fort-Mahon. L'arrivée se généralise dans les premiers jours de mai(2, 3 et 4). Des passages sont notés tout le mois de mai(40 en vol vers le Nord-Est en 4 h 00 le 29 au Bois de Cise(Ault))

Nicheur fréquent, effectifs supérieurs cette année à 1981 dans la région de Poix(P. CARRUETTE).

Dès le 5 août, des migrateurs sont notés à Yseux: 30 en 1 h 00

3 observations de septembre

Dernier: 1 le 3 octobre à Amiens.

MARTIN PECHEUR Alcedo atthis

Nicheur certain à Camon, Fleury, Long et Tilloy-les-Conty.

Observé aussi en période de nidification à: Airaines, Belloy-sur-Somme, Blangy, Boismont, Condé-Folie, La chaussée-Tirancourt, Famechon, Fontaine-sur-Somme, Nampont-St-Martin et Rue.

En dehors de cette période: Abbeville, Bergicourt, Boves, Lamotte-Brebière, Péronne, POM et Wailly.

HUPPE FASCIEE Upupa epops

1 au POM le 24 septembre.

PIC VERT Picus viridis

Signalé en période de nidification:

Abbeville, Forêt de Crécy, Dunes du Marquenterre(nicheur certain), Epaumesnil, Fouencamps, Nampont-St-Martin, POM(éclosion le 27 juin), Régnière-Ecluse, Rue.

Observé aussi à Bergicourt, Froise(Rue), Heucourt et Selincourt.

PIC NOIR Dryocopus martius

1 entendu en Forêt de Crécy.(G. FLOHART)

PIC EPEICHE Dendrocopos major

Observé dans 23 localités, essentiellement en marais: (Arry, Boves, Cléry-sur-Somme...) et en forêt(Creuse, Crécy,...)

Nicheur certain: Forêt de Crécy(1 nid et 1 juv le 6 juin), Froise(1 couple nourrit le 13 juin), Monchaux(Quend)(1 nid le 12 février), POM(éclosions le 14 juin).

En Forêt de Crécy, 6 sont noté pour 8 km le 14 avril.

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor

Signalé en 19 localités: Abbeville(janvier), Airaines(mai), Boismont(avril), La Chaussée-Tirancourt(septembre), Corbie(juillet), Crécy-en-Ponthieu(avril et août), Dominois(septembre), Epaumesnil(avril), Fouencamps(décembre), Heucourt(mars), Long(mai), Machiel(avril), Métigny(décembre), Nampont(mars), Poix(juin), Rue(toute l'année), St-Valery-sur-Somme(mars, août), Tilloy-les-Conty(janvier, avril), Wailly(août).

TORCOL FOURMILIER Jynx torquilla

1 chanteur le 27 juin au POM.(P. ETIENNE)

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata

1 le 13 janvier à Rue et 2 le 17 à Thennes.

Localités où l'espèce est signalée en période de reproduction :

Amiens (Quai de la Somme, Port d'Aval, Continent, Cité scolaire avec 1 chanteur en altitude le 10 juillet.)

Cayeux-sur-mer (1 chanteur le 1 juin au Hourdel)

Corbie (1 chanteur le 11 mai)

Domart-en-Ponthieu (1 chanteur les 18 mars et 25 juin, à cette date 1 chant vers 2 h 40 TU)

Fort-Mahon (2 chanteurs le 10 avril et 2 le 28; à l'automne, les effectifs sont plus importants: min 10 le 29 octobre).

Quend (2 le 30 mars à Quend-Plage)

1 le 19 décembre au HA

ALOUETTE LULU Lullula arborea

Migration postnuptiale

33 migratrices en 5 h 00 le 31 octobre en BdS (O. HERNANDEZ, T. RIGAUX et F. SUEUR)

et 19 migratrices en 3 h 00 le 1 novembre (F. SUEUR)

Hivernage

min 4 le 29 décembre à La Houssoye. (D. FOSSE)

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis

min 45 le 9 janvier à Rue et 12 le 27

0,8 chanteurs/km le 3 avril dans la basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km) mais 5,5 chanteurs/km sur le plateau entre Pont-Rémy et Eaucourt-sur-Somme (0,9 km).

Migration pré-nuptiale encore notée le 4 avril à Ault (Bois de Cise).

Donnée de nidification tardive : 1 ad nourrit encore des pulli le 3 août à Rue (F. SUEUR)

Migration postnuptiale constatée du 26 septembre au 30 décembre

4 migratrices en 2 h 00 le 26 septembre en BdS et 5 en 1 h 00 le 29 à Rue

2 migratrices en 2 h 00 le 3 octobre à Rue

24 migratrices (+1 chanteur) en 2 h 15 le 17 à Rue et 4 en 4 h 30 en BdS.

1 migratrice en 1 h 15 le 20 à La Chaussée-Tirancourt

140 en vol vers le Sud en 3 h 50 le 25 à Fort-Mahon, 35 en vol vers le Sud en 3 h 00

le 26 en BdS, 100 migratrices en 2 h 00 le 28 à Rue et 40 en vol vers le Sud en

4 h 00 en BdS

90 migratrices en 5 h 30 le 29 en BdA

150 migratrices en 5 h 00 le 31 en BdS et 150 en vol vers le Sud en 3 h 45 le 1

novembre

13 migratrices en 1 h 30 le 10 à Rue

72 dont 27 migratrices en 2 h 00 le 11 et 74 migratrices en 2 h 15 le 21

40 le 29 décembre à La Houssoye

ALOUETTE HAUSSECOL Eremophila alpestris

15 le 14 février à Cayeux-sur-mer

9 le 16 février en BdA et 5 le 10 avril

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia

Premières données

20 le 3 avril à Boismont

1 les 11 et 13 à Rue

150 le 11 en BdA

La migration pré-nuptiale est encore notée le 25 avril à Rue.

Colonies

Ault (Bois de Cise) : 69 terriers (Taux d'occupation ?)

BdS : 4 terriers en construction sur une digue le 25 avril abandonnés 15 jours plus tard.

Blangy-Tronville

Rassemblements pré-migratoires

300 le 17 août au HA.

Migration postnuptiale notée du 20 août au 19 septembre

11 migratrices en 2 h 00 le 8 septembre à Rue.
21 migratrices en 1 h 30 le 19 septembre à Ault et Woignarue.

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*

premières données : 1 le 3 avril à Epagne-Epagnette, 150 en migration vers le Nord le 4 à Ault (Bois de Cise), 1 du 4 au 11 à Rue, 1 le 6 à Amiens, 1 le 9 à Nampont-St-Martin.

15 migratrices en 2 h 00 le 27 avril à Fort-Mahon

Migration prénuptiale signalée jusqu'au 4 mai à Noyelles-sur-mer et Boismont.

Données sur la nidification :

Accouplements le 7 mai à Rue ainsi que 3 accouplements et construction d'un nid le 10.

1 accouplement le 1 juillet à Rue et tentatives le 4.

1 couple nourrit encore des pulli au nid le 19 août à Corbie.

Effectifs en diminution dans la région de Poix mais bonne reproduction selon P. CARRUETTE.

Migration postnuptiale constatée du 20 août au 19 octobre

27 migratrices en 2 h 00 le 5 septembre en BdS

7 migratrices en 2 h 00 le 8 à Rue, 8 en 1 h 00 le 12 et 7 en 1 h 00 le 15

75 migratrices en 1 h 30 le 19 à Ault et Woignarue

10 migratrices en 2 h 00 le 26 en BdS et 9 en 1 h 30 à Rue

5 migratrices en 0 h 45 le 28 et 3 en 1 h 00 le 29 dans cette dernière localité

Peu de rassemblements postnuptiaux signalés

170 le 19 septembre à Favières et 300 à Ponthoile

HIRONDELLE DE FENETRE *Delichon urbica*

premières données : 1 le 4 avril à Domart-en-Ponthieu et 2 le 9 à Nampont-St-Martin

Données sur la nidification :

10 nids occupés à la Cité Scolaire d'Amiens où l'espèce est de moins en moins abondante.

min de 9 nids (nidification rupestre) le 1 juin à Ault (Bois de Cise), plusieurs dizaines de nids le 9 juillet.

effectifs très nettement en baisse dans la région de Poix où l'espèce a disparu de certains secteurs selon P. CARRUETTE

1 couple nourrit encore des pulli au nid le 19 août à Abbeville

nidification signalée sans plus de précisions à Blangy-Tronville

Rassemblement pré-migratoire

120 le 8 août à Blangy-Tronville

Migration postnuptiale constatée du 20 août au 3 octobre

1 migratrice en 2 h 00 le 8 septembre à Rue

8 migratrices en 1 h 30 le 19 à Ault et Woignarue

1 migratrice en 2 h 00 le 26 en BdS

1 migratrice en 2 h 00 le 3 octobre à Rue

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*

première donnée : 1 chanteur les 8 et 18 avril en Forêt de Crécy

1 le 20 août à Famechon

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*

Migration prénuptiale

2 en vol vers le Nord-Est le 15 février à Rue.

Données sur la nidification

0,2 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km) mais 2,2 couples/km entre cette dernière localité et Eaucourt-sur-Somme (0,9 km.)

1 ad nourrit des pulli au nid le 9 mai au POM

1 ad nourrit des pulli au nid le 4 juin au HA

1 ad nourrit des pulli au nid le 3 août à Rue

Migration postnuptiale constatée du 8 septembre au 10 novembre

1 migrateur en 2 h 00 le 8 septembre à Rue

1 migrateur en 1 h 00 le 29

11 migrateurs en 2 h 15 le 17 octobre à Rue

5 en vol vers le Sud en 3 h 50 le 25 à Fort-Mahon
9 migrateurs en 5 h 30 le 29 en BdA
30 migrateurs en 5 h 00 le 31 en BdS et 7 migrateurs en 3 h 00 le 1 novembre
1 migrateur en 1 h 30 le 10 à Rue

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava

- type M. f. flava
premières données : 20 le 11 avril en BdA
1 mâle le 12 à Rue
3 nourrissent le 17 juillet à Rue
Migration postnuptiale notée du 5 septembre au 3 octobre
9 migrateurs en 2 h 00 le 5 septembre en BdS
2 migrateurs en 2 h 00 le 8 à Rue
1 migrateur en 1 h 30 le 19 à Ault
1 migrateur en 1 h 30 le 26 à Rue et 1 migrateur en 2 h 00 le 3 octobre.
- type M. f. flavissima
1 mâle du 20 avril au 6 mai à Rue et 10 le 1 août
- atypique (caractères intermédiaires entre les 2 sous-espèces précédentes : dessus de la tête mi-bleu, mi-jaune)
1 mâle du 20 avril au 6 mai à Rue (F. SUEUR)

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea

1 le 14 mars à Moreuil
1 seul couple noté le 3 avril sur un parcours de 23,6 km (soit 0,04 couple/km) dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy; cette espèce n'est jamais très répandue dans la Vallée de la Somme tout comme dans le reste du département d'ailleurs.
Observations concernant la période de nidification :
1 mâle le 19 juin à Famechon
1 le 10 juillet à Blangy-sous-Poix
Quelques observations doivent correspondre à la migration postnuptiale :
2 le 20 août à Famechon, 1 le 22 à Blangy-sous-Poix
2 le 4 septembre à Famechon, 1 le 10 à Blangy-sous-Poix
1 le 22 septembre à La Chaussée-Tirancourt
1 du 3 au 31 octobre et le 14 novembre à Rue
1 le 1 décembre à Amlens
Hivernage :
1 les 22 et 23 décembre à Poix
1 le 23 à Bergicourt

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba

Données sur la nidification :
0,1 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km), ce qui est faible mais il faut tenir compte du fait que cette espèce se cantonne principalement dans le courant du mois d'avril.
Premières éclosions le 18 mai au POM
Migration postnuptiale
1 migratrice en 2 h 00 le 5 septembre en BdS
1 migratrice en 4 h 30 le 17 octobre en BdS
3 migratrices en 5 h 30 le 29 en BdA
1 migratrice en 5 h 00 le 31 en BdS
Rassemblement
50 le 30 octobre à Fouemcamps (Le Paraclet)

PIE-GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio

1 le 16 mai à Gentelles (A. DUPUIS et E. MERICIER)

PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor

1 le 4 janvier à Aubigny
1 les 1 février et 18 mars à Fouemcamps
1 le 14 mars à Moreuil
1 les 25 mai (albinos partiel), 26 juin, 20 août et 22 septembre à La Chaussée-Tirancourt
1 le 25 juillet à Boves.

TROGLODYTE Troglodytes troglodytes

Nicheur commun (Domart-en-Ponthieu, Rue, ...)

Données sur la nidification :

3 chanteurs/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).

Premier juv volant le 12 juin à Rue

ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis

Premier chant le 15 février à Rue

Données sur la nidification :

1 couple parade le 29 mars à Quend

1 nid/oeufs le 1 mai à Bonnay

premières éclosions le 15 mai au POM

premier juv volant le 4 juin à Rue

Abondance en période de reproduction :

0,6 à 0,7 chanteurs le 3 avril dans la Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).

3 nids dans un jardin de 850 m² à Oust-Marest

TRAQUET TARIER Saxicola rubetra

1 mâle le 9 mai au POM

1 le 12 septembre à St-Quentin-en-Tourmont et 2 le 17 octobre

7 le 12 septembre à Bergicourt

TRAQUET PATRE Saxicola torquata

1 seul mâle noté le 3 avril sur un parcours de 23,6 km (soit 0,04 mâle/km) dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy; cette espèce se cantonne dans le courant du mois d'avril.

Données sur la reproduction :

1 femelle/3 juv le 26 juin à Bergicourt

1 mâle/2 juv le 27 juin à Poix

Quelques observations concernant probablement la migration postnuptiale

1 femelle/immature le 20 août à La Chaussée-Tirancourt

1 le 5 septembre au POM

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe

premières données : 2 mâles et 1 femelle le 21 mars au HA, 1 le 29 à Quend et 1 mâle en Bds.

La migration pré-nuptiale se poursuit jusqu'au 16 mai.

Migration postnuptiale constatée du 17 août au 29 octobre.

ROUGEQUEUE NOIR Phoenicurus ochruros

Premières données : 1 femelle le 14 mars à Fouemcamps

2 chanteurs le 26 à Amiens, 1 mâle adulte le 29 à Quend, 1 chanteur du 2 au 13 avril et 1 chanteur le 3 à Abbeville.

1 seul mâle noté le 3 avril sur un parcours de 23,6 km (soit 0,04 mâle/km) dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy; certains migrateurs ne sont probablement pas encore de retour.

Encore 1 chanteur le 7 septembre à Rue et 1 individu le 3 octobre, 2 mâle (et 1 mâle trouvé mort) le 29 à Fort-Mahon.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus

Cette espèce est notée à plusieurs reprises en mai à Amiens : 1 du 9 au 15 Quai de la Somme, 1 du 10 au 12 rue Jules Barni et 1 le 16 rue Abbadène.

1 mâle les 30 août et 12 septembre à Rue.

1 mâle le 9 octobre au POM et 1 femelle/immature le 24.

ROUGEGORGE Erithacus rubecula

Données sur la nidification :

0,3 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).

premières éclosions le 5 juin au POM

premier juv volant le 12 juin à Rue

1 adulte transporte de la nourriture le 14 juin à Poix
1 migrateur diurne en 5 h 30 le 29 octobre en BdA

ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos
première donnée : 1 chanteur le 15 avril au POM
La migration s'intensifie à la fin du mois d'avril.
1 chanteur le 25 à Rue et 1 chanteur à St-Quentin-en-Tourmont
1 chanteur le 27 à Fort-Mahon.

GRIVE LITORNE Turdus pilaris
Dernier individu le 2 mars à Rue
Premiers migrateurs postnuptiaux le 17 octobre : 1 à St-Quentin-en-Tourmont et 56 au POM.
Données sur la migration postnuptiale
12 migratrices en 2 h 00 le 28 octobre à Rue
3 migratrices en 5 h 30 le 29 en BdA
26 migratrices en 1 h 30 le 10 novembre à Rue.

MERLE NOIR Turdus merula
premier chant le 9 février à Rue
Abondance en période de reproduction :
1,2 couples/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
1 nid dans un jardin de 850 m² à Oust-Marest.
Données sur la reproduction :
1 juv sorti du nid le 1 mai à Amiens.
1 juv non volant trouvé mort le 2 mai à Corbie.
Premières éclosions au POM le 23 mai.
Net passage pendant les nuits du 16 au 17 octobre et du 29 au 30 à Rue.
7 migrateurs en 5 h 30 le 29 octobre en BdA.

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus
Migration de descente encore constatée le 5 janvier : 20 à Rue où au moins 70 stationnent le 11 mars.
Dernières données printanières : 30 le 14 mars à Moreuil et 7 à Fouemcamps, 50 le 31 à Amiens (La Madeleine).
Migration postnuptiale du 15 octobre (Domart-en-Ponthieu) au 21 novembre.
4 migratrices en 2 h 15 le 17 octobre à Rue, 69 migratrices en 5 h 30 le 29 en BdA.
20 en vol vers le Sud en 3 h 45 le 1 novembre en BdS, 35 migratrices en 1 h 30 le 10 à Rue, 6 migratrices en 2 h 00 le 11 et 9 migratrices en 2 h 15 le 21.
Seul stationnement hivernal important signalé :
60 à 70 le 22 décembre à Poix.

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos
premier chant le 9 février à Rue
1,1 chanteurs/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
Migration postnuptiale du 16 octobre au 10 novembre
5 migratrices en 2 h 15 le 17 octobre à Rue et 6 migratrices en 2 h 00 le 28,
4 migratrices en 5 h 30 le 29 en BdA.
2 migratrices en 1 h 30 le 10 novembre à Rue.

GRIVE DRAINE Turdus viscorus
premier chant le 31 janvier à Thennes
0,1 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
5 en migration en 3 h 45 le 1 novembre en BdS.

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti
2 chanteurs le 3 avril à Cambron et 1 chanteur à Abbeville soit 0,1 chanteur/km dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).
1 chanteur le 9 à Nampont-St-Martin.

La Chaussée-Tirancourt : 1 chanteur le 12 mai, 2 chanteurs le 25, 3 chanteurs le 26 juin, 2 chanteurs le 23 juillet, 2 juv le 20 août, 4 chanteurs le 22 septembre, 1 chanteur le 20 octobre.

1 chanteur le 3 juillet à Fouemcamps
1 chanteur le 20 octobre à St-Sauveur

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia

1 chanteur le 9 avril à Nampont-St-Martin, 1 chanteur les 21 et 25 à Rue.
2 chanteurs le 23 juillet à La Chaussée-Tirancourt
1 chanteur le 9 août au POM

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobaenus

Premières données :

1 chanteur le 9 avril à Nampont-St-Martin et 1 chanteur à Villers-sur-Authie, 5 le 10 à Noyelles-sur-mer.

Chanteurs notés le 10 avril au POM où les premières éclosions se produisent le 1 juin.
Nidification à Rue où le dernier individu est observé le 8 septembre.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris

première donnée : 1 le 10 mai à La Chaussée-Tirancourt

Rue : 1 chanteur les 16 et 28 mai

2 chanteurs le 6 juin

3 adultes dont 1 chanteur et 1 adulte nourrissant des pulli le 1 juillet.

1 juv le 1 août, dernier chant noté le 3.

Espèce nicheuse à Corbie où notamment 1 adulte et 2 juv tout juste volants sont observés le 17 juillet.

1 chanteur le 26 juin à La Chaussée-Tirancourt et 1 individu le 23 juillet.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus

Nicheuse à La Chaussée-Tirancourt, Noyelles-sur-mer (nourrissages le 31 juillet) et Rue où le dernier chant est noté le 8 août et le dernier individu le 8 septembre.

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta

1 individu le 5 juin et 1 chanteur le 7 à Rue

1 couple/2 jeunes le 20 juillet en Forêt de Crécy, 12 le 1 août mais en fait l'espèce est présente dans toutes les coupes (T. RIGAUX).

FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin

Nicheuse commune (La Chaussée-Tirancourt, Rue ...)

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla

3 chanteurs le 3 avril à Abbeville, 2 chanteurs le 4 à Domart-en-Ponthieu

Rue: 1 chanteur le 10 avril

Espèce nicheuse où le 1 juv volant est noté le 2 juillet.

0,1 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km); la date précoce du dénombrement explique la faiblesse des effectifs de cette espèce.

1 femelle le 2 septembre à Poix.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca

1 chanteur le 4 mai à Rue

1 chanteur le 11 juin à St-Quentin-en-Tourmont

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis

1 chanteur le 28 avril au POM où les premières éclosions sont notées le 15 juin.

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis

1 chanteur le 2 juin à Cayeux-sur-mer (Le Hourdel)

1 chanteur le 31 juillet à Noyelles-sur-mer et 1 chanteur à Rue

1 chanteur le 26 septembre au POM

POUILLOT FIATIS Phylloscopus trochilus

0,4 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-

Rémy (23,6 km) ; la migration prénuptiale du Pouillot ^{f.t.s} ~~véloce~~ P. trochilus est encore en cours ce qui explique la relative faible abondance des individus cantonnés qui sont toutefois plus nombreux dans la secteur le plus proche du littoral : 1 chanteur/km à Boismont et 0,7 chanteur/km à Saigneville.
Des chanteurs sont notés le 10 avril au POM où 1 adulte nourrit des pulli le 4 mai.
Espèce nicheuse à St-Quentin-en-Tourmont où notamment 1 juv peu volant est observé le 11 juin.

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita

Rue : 1 chanteur (hivernant ou migrateur très précoce) le 16 février, espèce nicheuse premier juv volant noté le 1 juillet encore 1 chanteur le 23 octobre, 1 individu le 28.

Nette migration le 14 mars : 8 à Fouencamps et 5 à Moreuil.

6,4 chanteurs/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).

4 chanteurs et nette migration le 22 septembre à La Chaussée-Tirancourt

1 migrateur en 5 h 30 le 29 octobre en BdA

Hivernage : 5 le 26 décembre à Amiens (Cimetière de La Madeleine)
1 le 29 à Querrieu

ROITELET HUPPE Regulus regulus

Peu de données significatives.

1 migrateur en 5 h 30 le 29 octobre en BdA.

GOBEMOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca

1 du 1 au 29 septembre à Rue.

GOBEMOUCHE GRIS Muscicapa striata

1 les 2 et 4 juin à St-Valery-sur-Somme

1 le 6 juin à Rue et 1 juv le 30 juillet

1 le 19 juin à Famechon

1 couple élevant des jeunes le 3 juillet à Grivesnes (Septoutre).

Migration postnuptiale :

3 le 22 août à Conty (Wailly)

1 le 24 à Boves

MESANGES A NOUSTACHES Panurus biarmicus

1 mâle 8 femelles/immatures le 13 juin à Noyelles-sur-mer et 10 le 31 juillet.

1 le 26 septembre à Rue

1 le 21 mars et 4 le 27 octobre au HA.

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus

Seulement 2 couples notés le 3 avril sur un parcours de 23,6 km (soit 0,08 couple/km) dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy.

MESANGE NONNETTE Parus palustris

2 chanteurs le 8 avril en Forêt de Crécy

1 le 10 juillet à Bergicourt

MESANGE BORÉALE Parus atricapillus

0,1 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).

MESANGE BLEUE Parus caeruleus

Données sur la reproduction :

0,5 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).

1 couple/6 à 8 pulli (nichoir) le 19 juin à Poix.

MESANGE CHARBONNIÈRE Parus major

Abondance en période de reproduction :

1,5 chanteurs/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).

1 nid dans un jardin de 850 m² à Oust-Marest

Donnée sur la nidification :

premier juv volant noté le 6 juin à Rue

1 couple/6 pulli (nichoir) le 14 juin à Poix

1 couple/6 juv le 19 juin à Blangy-sous-Poix et 1 couple/8 juv le 26

1 chanteur le 20 novembre à Amiens

SITELLE TORCHEPOT Sitta europea

1 chanteur le 1 avril à Boismont, 1 chanteur le 3 à Epagne-Epagnette

Chanteurs le 8 en Forêt de Crécy

1 chanteur le 19 septembre à St-Valery-sur-Somme

GRINPEREAU DES JARDINS Corthia brachydactyla

Peu de Données significatives.

1 femelle avec plaque incubatrice les 15 et 26 avril à Rue

BRUANT PROYER Emberiza calandra

min 8 le 13 janvier à Rue et 5 migrants en 2 h 15 le 21 novembre.

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella

0,8 chanteur/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).

Espèce nicheuse à Rue où 13 migrants en 2 h 15 sont notés le 21 novembre.

Espèce abondante dans les coupes de la Forêt de Crécy début août.

2 migrants en 5 h 00 le 31 octobre en BdS et 2 migrants en 3 h 45 le 1 novembre.

BRUANT ZIZI Emberia cirrus

1 mâle le 10 juillet à Blangy-sous-Poix

1 mâle chanteur les 10 juillet et 29 décembre à Amiens (Cité scolaire).

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus

0,3 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).

10 migrants en 5 h 30 le 29 octobre en BdA, 19 migrants en 5 h 00 le 31 en BdS et 13 migrants en 3 h 45 le 1 novembre.

BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis

5 le 14 février à Cayeux-sur-mer

1 mâle le 16 novembre et 4 le 4 décembre en BdS.

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs

Premier chant le 22 février à Rue

1,6 chanteurs/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).

Migration postnuptiale notée du 3 octobre au 21 novembre :

1 migrant en 2 h 00 le 3 octobre à Rue, 86 migrants en 2 h 15 le 17 à Rue et 53 en 4 h 30 en BdS, 7 migrants en 1 h 15 le 20 à La Chaussée-Tirancourt, 5 migrants en 2 h 00 le 28 à Rue, 11 migrants en 5 h 30 le 29 en BdA et 698 migrants en 5 h 00 le 31 en BdS.

Plus de 200 migrants en 3 h 45 le 1 novembre en BdS, 42 migrants en 1 h 30 le 10 à Rue et 2 migrants en 2 h 15 le 21.

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla

Peu de données hivernales, citons :

4 le 21 février au POM

Migration postnuptiale notée du 17 octobre au 11 novembre :

50 migrants le 17 octobre en BdS, 20 migrants en 4 h 00 le 28, 7 migrants en 5 h 00 et 2 migrants en 3 h 00 le 1 novembre, 3 migrants en 1 h 30 le 10 à Rue et min 3 dont 1 migrant en 2 h 00 le 11.

VERDIER D'EUROPE Carduelis chloris

Rue : 2 femelles avec plaques incubatrices le 15 avril

40 individus le 26 août

55 le 8 septembre, min 30 le 26

20 le 28 octobre

25 le 21 novembre

Abondance en période de reproduction :

1 seul chanteur le 3 avril sur un parcours de 23,6 km (soit 0,04 chanteur/km) dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy.

1 nid dans un jardin de 850 m² à Oust-Marest

Population nicheuse en nette baisse dans la région de Poix selon P. CARRUETTE.

Migration postnuptiale notée du 3 octobre au 1 novembre :

15 migrateurs en 2 h 00 le 3 octobre à Rue et 6 migrateurs en 2 h 15 le 17

21 migrateurs en 5 h 00 le 31 en BdS et 8 migrateurs en 3 h 45 le 1 novembre

Stationnement hivernal :

100 le 28 décembre au POM

CHARDONNET Carduelis carduelis

Données sur la nidification :

2 nids dans un jardin de 850 m² à Oust-Marest

Espèce nicheuse à Rue où 1 femelle construit encore 1 nid le 3 août alors que le mâle l'accompagne (X. COMMECY et F. SUEUR).

Effectifs nicheurs très inférieurs à ceux de 1981 dans la région de Poix selon P. CARRUETTE.

Migration postnuptiale notée du 3 octobre au 31 décembre :

5 migrateurs en 2 h 00 le 3 octobre à Rue et 1 migrateur en 2 h 15 le 17

10 migrateurs en 1 h 15 le 20 à La Chaussée-Tirancourt

3 migrateurs en 5 h 00 le 31 en BdS et 5 migrateurs en 3 h 45 le 1 novembre

10 migrateurs en 1 h 30 le 10 à Rue et 2 migrateurs en 2 h 15 le 21

15 migrateurs le 31 décembre en BdS.

TARIN DES AULNES Carduelis spinus

5 le 4 janvier à Rue

Migration postnuptiale :

2 dont 1 migrateur en 1 h 15 le 20 octobre à La Chaussée-Tirancourt

min 2 le 30 à Rue

1 migrateur en 5 h 00 le 31 en BdS

LINOTTE A BEC JAUNE Carduelis flavirostris

Peu de Données sur cette espèce nous sont parvenues cette année :

7 le 19 février au Crotoy et 3 le 22

ainsi que 5 le 28 décembre en BdA .

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina

premières éclosions notées le 26 juin au POM

Effectifs stables dans la région de Poix où l'espèce est abondante selon P. CARRUETTE

Abondance en période de reproduction :

0,2 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy (23,6 km).

4 nids dans un jardin de 850 m² à Oust-Marest

Stationnements postnuptiaux :

100 le 7 juillet, 40 le 22 juillet à Rue, 80 le 16 août

80 le 11 septembre à Blangy-sous-Poix

Migration postnuptiale notée du 8 septembre au 11 novembre :

3 migrateurs en 2 h 00 le 8 septembre à Rue, 2 migrateurs en 1 h 00 le 15, 17 migrants en 1 h 00 le 29, 7 migrateurs en 2 h 15 le 17 octobre

1 migrateur en 5 h 30 le 29 en BdA

10 migrateurs en 5 h 00 le 31 en BdS et 5 migrateurs en 3 h 00 le 1 novembre

1 migrateur en 1 h 30 le 10 à Rue et 1 migrateur en 2 h 00 le 11.

Stationnements automnaux et hivernaux :

160 le 12 septembre en BdS, 70 le 28 octobre, 50 le 27 novembre, plus de 100 le 31 décembre.

SIZERIN FLAMME Carduelis flammea

5 le 9 janvier à Rue

2 le 22 juillet dans les dunes du POM

2 le 6 août à St-Quentin-en-Tourmont

La nidification certaine reste à prouver dans les dunes du Marquenterre.

SERIN CINI Carduelis serinus

Retour des premiers migrants fin mars et début avril :

1 chanteur le 29 mars à Quend-Plage

1 chanteur le 3 avril à Abbeville et 2 dont 1 chanteur à Forest-Montier

1 chanteur le 4 à Domart-en-Ponthieu

1 chanteur le 10 au POM

1 seul chanteur le 3 avril sur un parcours de 23,6 km (soit 0,04 chanteur/km) dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy.

Espèce très localisée dans la région de Poix selon P. CARRUETTE.

Dernière donnée en septembre :

1 le 29 à Rue

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula

0,1 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy.

Chute catastrophique des effectifs dans la région de Poix où P. CARRUETTE n'a noté aucun individu du 4 janvier au 22 décembre et suspecte l'influence des rigueurs hivernales.

Deux données de migration pour cette espèce réputée sédentaire :

5 migrants en 2 h 15 le 17 octobre à Rue et migration constatée le 20 à La Chaussée-Tirancourt.

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus

Nicheur très commun dans tout le département.

Données sur la nidification :

premières éclosions le 18 mai au POM

premier juv volant le 28 à Rue

2 accouplements le 13 juillet à Quend

MOINEAU FRIQUET Passer montanus

0,5 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy.

Migration postnuptiale notée du 17 octobre au 21 novembre :

5 migrants en 2 h 15 le 17 octobre à Rue et min 20 dont 10 migrants en 2 h 00 le 28, 30 migrants en 4 h 00 le 28 octobre et 9 migrants en 3 h 00 le 1 novembre en Bds, 25 dont 16 migrants en 2 h 00 le 11 à Rue et 7 migrants en 2 h 15 le 21.

ETOURNEAU SANCONNET Sturnus vulgaris

0,6 couple/km le 3 avril dans la Basse Vallée de la Somme entre Boismont et Pont-Rémy

Données sur la nidification :

premières éclosions le 1 mai à Corbie et le 22 au POM encore 1 nid en cours de construction le 12 juillet à Daours (F. SUEUR)

min 6000 le 11 septembre à Noyelles-sur-mer

Migration postnuptiale notée du 17 octobre au 21 novembre :

144 migrants en 2 h 15 le 17 octobre à Rue et 32 migrants en 4 h 30 en Bds
42 migrants en 1 h 30 le 20 à La Chaussée-Tirancourt, 300 migrants en 3 h 50 le 25 à Fort-Mahon, 34 migrants en 2 h 00 le 28 à Rue, 128 migrants en 5 h 30 le 29 en BdA, 790 migrants en 5 h 00 le 31 en Bds et 75 migrants en 3 h 00 le 1 novembre, 58 migrants en 1 h 30 le 10 à Rue et 189 migrants en 2 h 00 le 11 ainsi que 37 migrants en 2 h 15 le 21.

Un individu au bec anormalement long et recourbé à la manière de certains Colibris le 25 mars à Boismont (F. MONTEL)

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus

12 le 3 juillet à Fouencamps

Encore 1 chanteur le 5 août à Rue

PIE BAVARDE Pica pica

Rassemblements automnaux : 15 le 23 octobre au POM

13 le 31 à St-Quentin-en-Tourmont

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula

Rue : min 250 le 15 janvier
60 le 1 février, min 20 le 24
9 le 2 mars

Migration postnuptiale notée du 24 octobre au 1 novembre :
167 individus/heure de 8 h 00 à 11 h 15 TU le 24 octobre au POM (P. ETIENNE).
25 migrateurs en 3 h 50 le 25 à Fort-Mahon, 50 migrateurs le 26 en 3 h 00 en Bds,
10 migrateurs en 10 mn le 27 à Boismont, 9 migrateurs en 2 h 00 le 28 à Rue et 380
en 4 h 00 en Bds, 22 migrateurs en 5 h 00 le 31 en Bds et 3 migrateurs en 3 h 00 le
1 novembre .

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus

Rassemblements de la fin de l'hiver et du début de printemps :

Rue : 250 le 11 janvier
65 le 1 février, min 175 le 24
20 le 2 mars

min 250 le 24 janvier à St-Valery-sur-Somme
150 le 8 février à Ailly-le-Haut-Clocher, 285 le 21 à Franvillers
210 le 1 mars à Lamotte-Buleux, 300 le 10 à Vaux-en-amiénois

Colonies :

Boismont : min 10 nids (précisions souhaitables)

Epagne-Epagnette : 21 nids

Migration postnuptiale notée en Bds le 26 octobre (4 en 3 h 00), le 28 (30 en 4 h 00),
le 31 (118 en 5 h 00) et le 1 novembre (13 en 3 h 00) ainsi qu'à Fort-Mahon le 25
octobre (15 en 3 h 50).

Rassemblements de l'automne et du début de l'hiver:

Rue : 22 le 8 septembre, min 60 le 12, min 30 le 28 octobre
32 le 11 novembre
100 le 27 décembre

CORNEILLE NOIRE Corvus corone

- type C. c. corone

Nicheuse commune

Données sur la nidification :

réfection d'un ancien nid le 20 avril à Rue et couvaison constatée le 25

1 adulte nourrit 2 juv au sol le 26 juin à Famechon

1 adulte nourrit 2 juv au sol le 10 juillet à Blangy-sous-Poix

Migration : 10 migratrices en 3 h 50 le 25 octobre à Fort-Mahon

- type C. c. cornix

Bds-POM : 6 le 20 janvier

27 les 22 janvier et 25 février, 48 le 26 février

7 le 24 octobre, 31 le 28

30 le 11 novembre

2 le 4 décembre, min 10 le 31

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 1981 DANS L'AISENE

INTRODUCTION

Avec un peu de retard, paraît enfin cette synthèse. Comme tous les ans, nous déplorons la couverture très inégale du département qui reste dans l'ensemble peu couvert.

Cette situation est due d'une part au peu d'ornithologues présents dans l'Aisne et d'autre part à des ornithologues de groupes limitrophes qui oublient ou ne veulent pas envoyer leurs données (problèmes de limites géographiques...).

Cette année était la dernière année de l'enquête F.I.R. sur les rapaces (ceux-ci seront traités à part).

Dans l'ensemble, l'année météorologique a été plus favorable qu'en 80. Quelques données retiennent l'attention :

- La première nidification du Tadorne de Belon
- Toujours la nidification du Courlis cendré en Laonnois ainsi que celle du Guépier d'Europe
- Premières preuves de nidification du Cincle plongeur
- L'explosion géographique de la Grive litorne
- L'observation du Cassenoix moucheté et de la Gorge-bleue

H. DUPUICH

ABREVIATIONS

♀ : femelle ♂ : mâle juv. : juvénile ind. : individu

C ou ♂ : couple

A.S.L. : Aulnois sous Laon F.C.B. : forêt de Coucy-basse

F.N.T. : forêt du Nouvion en Thiérache

M.I.S.Q. : réserve du marais d'Isle de Saint-Quentin

Boué : lieu de nidification

OBSERVATEURS :

S. Boutinot, A.M. et X. Combecy, G. Cuppa (COCA), H. Dupuich, A. Dupuis, L. Kérautret (GON), F. Letourneau, E. Mercier, E. Nowack, P. Pigeon, C. et J.C. Tombal (GON). C. Scovotto

GREBE HUPPE Podiceps cristatus

De trop nombreux secteurs favorables non visités (gravières de l'Oise, zone humide de Laon-Sissonne, étangs de la Somme autour de Saint-Simon) ainsi qu'un recensement incomplet des gravières de la vallée de l'Aisne donnent une mauvaise idée de la population totale de l'Aisne.

Boué : I Ad. du 7 au 17 Avril (avec un deuxième le 8), 3 le 1 Mai

Chassemy : I couple. le 14 Avril : nicheur possible.

Fontenoy : I C/I nid le 14 Avril

Hirson : 3 grands juv. à l'étang du Pas bayard le 23 Juillet : I C nicheur

M.I.S.Q. : 5 C nicheurs

Prémontré : I Ad., 2 grands juv. le 13 Juillet

Saint Nicolas aux bois : 2 C/2 nids, I C/2 juv. le 9 Juin; 2 Ad./4 pulli et I Ad./3 juv. le 13 Juillet; I Ad./4 pulli mais I Ad./2 juv. le 20 Juillet; I Ad. le 29 Octobre. Bilan : 3 couples.

Soissons : 2 couples le 14 Avril

Vermand : 5 à 6 couples nicheurs. I juv. de 2 semaines le 22 Avril

Vieil Arcy : 4 o dont 2 paradent le 14 Avril

Villers en Prayères : I Ad., I Ad./I nid, 2 Ad. le 14 Avril. Bilan : 3 couples.

Nous obtenons un total de 28 couples; c'est vraiment un minimum.

GREBE ESCLAVON Podiceps auritus

I Ad. en plumage quasi-nuptial est observé à l'étang de Boué le 7 Juillet. Date vraiment précoce pour la migration post-nuptiale, surtout que l'espèce est rare dans le département (H. Dupuich)

GREBE CASTAGNEUX Podiceps rufficollis

La nidification n'est toujours bien suivie qu'à Boué; ailleurs, seulement des données de migration.

A.S.L. : I les 13 Avril et 13 Juillet, 3 le 29 Octobre

Boué : noté de Mars à Juin avec 2 ou 3 couples nicheurs. 4 Ad./I juv. le

8 Juin, 2 Ad./ I pullus et 2 Ad. le 13 Juin, 2 Ad./2 juv. et I Ad. alarmant le 20 Juillet...I Ad. le 21 Août. Puis la migration est suivie :

II le 28 Août, 2I le 30 Septembre, 15 le 23 Octobre, II le 21 Novembre et 6 le 12 Décembre.

Montcornet : II le 12 Septembre

Saint Nicolas aux bois : 8 le 20 Juillet et 3 le 31 Août

A noter, I ind. sur l'Oise à Autreppes le 23 Octobre et 7 à Chigny le 23 Oct.

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo

I ind. le 27 Avril aux étangs de Vermand (S. Boutinot)

I ind. en migration le 1 Mai à Boué (H. Dupuich)

HERON CENDRE Ardea cinerea

On note uniquement des hivernants, des migrateurs et des erratiques mais toujours pas d'indices de nidification.

Beaumé : I le 16 Juillet

Bihécourt : régulier en Décembre

Boué : I le 1 Janvier et le 15 Février, 4 le 7 Avril, 2 le 17 Juillet, I le 30 Septembre et max. de 5 en Octobre.

F.C.B. : I le 23 Janvier et le 5 Février

Saint Nicolas aux bois : 2 le 22 Novembre

Saint Michel (forêt) : I le 28 Février

Vallée de l'Oise (de Chigny à Molzy) : I le 25 Janvier, II le 21 Mars et 8 le 23 Octobre.

GRAND BUTOR Botaurus stellaris

Pas de nouveaux sites. Bihécourt : I couple nicheur (S. Boutinot)

Chivres : I chanteur le 19 Avril (L. Kérautret)

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus

Bihécourt : peut-être encore I couple nicheur.

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor

Boué : I le 21 Novembre, I immature du 19 au 23 Décembre

CYGNE SAUVAGE Cygnus cygnus

I donnée pour cet oiseau peu observé dans le département : I stationne en Décembre à Bihécourt (S. Boutinot)

OIE CENDRE Anser anser

Watigny : 5 ind. en vol N.E. le 1 Mars. (C'est pourtant une migratrice commune)

OIE DES MOISSONS Anser fabalis

Bihécourt : passage noté dans la dernière décade d'Août (S. Boutinot)

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna

Boué : 3 le 19 Décembre, 2 les 21 et 23.

Vermand : 2 le 12 Novembre et 25 le 18 Décembre

La nidification a été constatée dans les bassins de décantations à Aulnois sous Laon. Il s'agit de la nidification la plus éloignée du littoral pour la Picardie, ce qui prouve l'expansion de l'espèce.

Le couple est observé à partir du 13 Avril, 2 Ad./9 juv. le 13 Juillet puis le 20, envol entre le 20 et le 27 Juillet (H. Dupuich et P. Pigeon)

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos

A.S.L. : 3 le 13 Avril et 10 le 20 Juillet

Bihécourt : nicheur certain

Boué : Hivernants notés de Janvier à Mars puis 4 couples en Avril-Mai.

I 2/2 grands juv. le 8 Juin, 8 pulli de 15 jours et 30 ind. le 24 Juillet

puis observé d'Août à Décembre avec un max. de 20 le 23 Déc.

Bucy le Long : 5 C mini le 14 Avril. nicheur possible

Chassemy : 2 le 14 Avril et 1 le même jour à Maisy

M.I.S.Q. : Nicheur certain. Premiers pulli le 16 Avril

Prémontré : 10 le 13 Juillet et le 23 Novembre

Soissons : 5 ♂ et 3 ♀ le 14 Avril. Nicheur possible

Villers en Prayères : 4 ♂ et 3 ♀ le 14 Avril

SARCELLE D'HIVER Anas crecca

Bihécourt : 1 C nicheur; juv. non volants observés (S. Boutinot)

Boué : 2 ♂ 1 ♀ le 21 Mars, 1 ♂ 1 ♀ le 23 Octobre

M.I.S.Q. : 1 C nicheur probable

CANARD CHIPEAU Anas strepera

Uniquement noté en migration. A.S.L. : 1 ♀ le 29 Octobre

Boué : 6 ♂ 3 ♀ le 21 mars, 3 ♂ 1 ♀ le 22

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

Bihécourt : 1 couple nicheur (S. Boutinot)

Boué : 2 ♂ 1 ♀ le 21 Mars, 1 ♂ 2 ♀ le 7 Avril et 1 ♂ 1 ♀ le 8

CANARD SOUCHET Anas clypeata

A.S.L. : 1 C le 13 Avril

Boué : 6 ♂ 5 ♀ le 21 Mars, 2 ♂ le 22, 4 ♂ 4 ♀ le 7 Avril, 1 C le 8,

1 ♂ les 17 et 18 Avril; il semble se cantonner mais il ne sera plus revu ensuite.

Saint Nicolas aux bois : 2 ♂ 1 ♀ le 29 Octobre

FULIGULE MILOVIN Aythya ferina

Beaucoup de données, tant en migration qu'en nidification.

A.S.L. : 225 le 22 Octobre

Bihécourt/Vermand : mini de 30 couples nicheurs d'après S. Boutinot avec

encore 1 famille avec 7 juv. non volants le 22 Août ce qui montre encore

1 fois l'absurdité de l'ouverture de la chasse au gibier d'eau en Juillet.

Boué : 1 ♂ le 23 Février, 50 le 21 mars et 17 le 22, 1 ♂ 5 ♀ le 20 Mai,

1 ♂ le 1 Juillet, présent jusqu'au 11, jour où il est en mue. 10 le 14

Nov., 19 le 17 et 27 le 21

Saint Nicolas aux bois : 2 ♂ le 6 Juin, 2 ♂ 1 ♀ le 13 Juillet, 1 ♀/5 pulli

2 ♂ 1 ♀ le 20 Juil., 10 le 31 Août, 160 le 29 Oct., 2 le 19 Déc. Il se reproduit donc 2 couples sur cet étang.

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula

Boué : 1 ♂ 2 ♀ le 7 Avril, 1 ♂ le 19 Nov., 3 le 19 Déc. et 1 le 23.

Saint Nicolas aux bois : 1 ♀ le 13 Juillet

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila

A.S.L. : 2 ♀ le 29 Octobre

Vermand : 1 le 20 Novembre

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula

2 ♀/im. du 23 au 29 Octobre à Boué (H. Dupuich et C. Scuotto)

HARLE BIEVRE Mergus mergus

Boué : 1 ♂ le 19 Décembre (C. Scuotto)

HARLE PIETTE Mergus albellus

13 à Vermand le 18 Décembre (S. Boutinot)

PERDRIX GRISE Perdix perdix

Notée en Avril à A.S.L., Sissonne, Villers en Prayères...

FAISAN DE CHASSE Phasianus colchicus

Nicheur : F.N.T., F.S.G. ...

RALE D'EAU Rallus aquaticus

Boué : 1 chanteur le 8 Avril, les 16 et 17 Juillet. 2 ind. le 23 Oct. et le 21 Nov. 1 couple nicheur probable donc.

Montcornet : 2 en migration le 12 Septembre.

MARQUETTE PONCTUEE Porzana porzana

Passage post-nuptial bien noté à Boué : 2 Ad. le 28 Août et 1 ind. du 4 Sept. au 7 Oct. (H. Dupuich et C. Scuotto)

POULE D'EAU Gallinula chloropus

Notée en période de nidification à A.S.L., Boué, Englancourt, Marle, Montcornet...

FOULQUE MACROULE Fulica atra

La reproduction est certaine à Prémontré (Ad. et juv. le 13 Juil.), Saint Nicolas aux bois (2 C/nid, 1 C/I pullus, 1 C/3 juv., 3 Ad. le 9 Juin).

Observée aussi à A.S.L. (Avril à Août), Fontenoy, Maizy, Vieil Arcy...

Seul le site de Boué est bien suivi : 120 le 23 Février, 80 le 22 Mars, 40 le 10 Avril. 60 le 1 Juillet, 80 le 6, 100 le 21, 140 le 21 Août, 86 le 30 Novembre.

En nidification : 1 Ad./1 nid le 17 Avril, 1 Ad./2 pulli 2 ad./4 et 1 Ad./5 le 20 Mai, 1 Ad./1 p. 1 Ad./1 juv. 1 Ad./2 juv. 3x1 Ad./3 juv. 2x2 Ad./4 juv. 1 Ad./5 juv. le 6 Juin.

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus

Après les derniers passages d'Avril (encore 1 le 14), les premiers migrateurs sont notés le 7 Juin avec 12 ind. à Autreppe puis en Juillet à Autreppe, Boué, Clairfontaine, Malzy... Réguliers ensuite jusqu'en Décembre.

Nidification : A.S.L. : juv. en Juillet. Plusieurs couples.

Bucy le Long : 4 C le 14 Avril. Chivres : quelques couples.

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola

2 le 20 Juillet à A.S.L. (migrateurs précoces!)

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula

A.S.L. : 1 le 20 et 27 Juillet

Montcornet : 5 le 9 Septembre

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius

Observé en migration et en nidification dans les bassins de décantations.

Un recensement de tous ces bassins et des gravières en Mai-Juin permettrait d'évaluer précisément la population nicheuse.

A.S.L. : 2 Ad. le 13 Juillet, 10 le 20 dont 1 juv., 18 le 31 Août (Ad. et juv.)

Bucy le Long : Nicheur probable. 4 à 5 couples.

Marle : 2 Ad. le 27 Juillet

Villers en Prayères : 1 C alarme le 14 Avril

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago

Uniquement des observations au cours de la migration post-nuptiale.

A.S.L. : 1 le 27 Août

Boué : 12 le 25 Août, 40 le 28, 3 le 31. 2 le 28 Octobre et 1 le 23 Déc.

Montcornet : 2 le 9 Septembre.

COURLIS CENDRE Numenius arquata

La nidification est toujours notée dans le Laonnois. Chivres : 1 en vol le 28 Mai (L. Kérautret); 1 couple nicheur (S. Boutinot)

Malzy : 7 le 25 Janvier, 3 le 23 Octobre

Saint Nicolas aux Bois : 1 ind. en vol le 9 Juin (A.M. et X. Combecy)

Observation bien insolite quant à la date...!

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa

2 en migration le 13 Juillet à A.S.L.

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus

Observé en 2 endroits traditionnels.

A.S.L. : entendu le 13 Juil., 3 le 20 Juil., 11 le 31 Août

Boué : 1 les 7 et 9 Avril, 6 le 14 Août et 1 le 21 et le 31.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia

A.S.L. : noté le 13 Juil., 12 le 20 et 7 le 27

Montcornet : 1 le 9 Sept.

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus

Observé en migration post-nuptiale.

A.S.L. : Observé le 13 Juillet, 1 le 20.

Boué : 1 le 28 Août et 4 le 9 Septembre

Marle : 2 le 13 Septembre.

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

1 seule donnée : 1 le 27 Août à A.S.L.

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos

Le premier cas certain de nidification a été constaté à Boué. Observé ailleurs en migration.

A.S.L. : 40 le 20 Juil., 50 le 27, 3 le 21 Août et 1 le 29 Octobre

Boué : 1 couple a niché; se reporter à la note parue dans l'Avocette No 7(I-2) p.86 à 88. Il y a eu 1 juv. Observé non volant le 15 Juillet.

Autres obs. : 1 le 16 Avril, 6 le 20 Mai, 6 le 15 Juillet, 1 le 21 Août, 3 le 25, 5 le 28. 2 le 9 Sept. et 1 le 30, 8 le 7 Octobre.

Marle : 28 le 27 Août

Montcornet : 1 le 9 Septembre

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta

Assez bien observé au cours de la migration post-nuptiale, surtout début Sept

A.S.L. : 1 le 27 Juil. Boué : 1 du 4 au 9 Sept. et 1 le 9 Sept. à Montcornet

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina

A.S.L. : 7 le 13, Juil. et 1 le 9 Sept. à Montcornet

CHEVALIER COMBATTANT Philomachus pugnax

A.S.L. : 3 le 27 Juillet

AVOCETTE Recurvirostra avosetta

Observé uniquement à A.S.L. où 1 couple a simulé ou tenté une nidification du 13 au 27 Juillet (alarmes, mises en position de couvaison...) mais aucun oeuf ni ébauche de nid ne sera trouvé. (S. Boutinot et H. Dupuich)

GOELAND ARGENTE Larus argentatus

Noté en erratisme à Englancourt : 2 im. en vol W. le 2 Juillet et 7 Ad. à Malzy le 20 Juillet

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus

Des Ad. sont notés ça et là hors période de nidification : Boué, Marle, Hirson. De plus l'espèce hiverne dans la vallée de l'Aisne, surtout vers Soissons et en grand nombre.

La nidification est constatée dans plusieurs localités.

A.S.L. : 9 Ad. dont 1 alarmant le 13 Avril, 50 dont plusieurs juv.(locaux?) le 13 Juil., 30 dont 1 juv. non volant le 20, 1 im. le 27. 1 C nicheur donc

Bucy le Long : colonie estimée à 80 nids (+ 10)

Vermand : 118 nids le 30 Avril (12 nids vides, 21/1 Oeuf, 17/2, 68/3)

Vierzy : non visité cette année

MOUETTE PYGMEE Larus minutus

Boué : 8 Ad. et 2 im. le 1 Mai. Vermand : au passage en Mai

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger

Notée aux passages pré et post nuptiaux

Boué : 2 le 1 Mai, 6 le 20. Montcornet : 1 le 12 Sept.

Au passage en Mai à Vermand

STERNE PIERRE-GARIN Sterna hirundo

Quelques observations cette année pour cette espèce peu fréquente dans

l'Aisne. Boué : 8 le 1 Mai et 3 le 20 (H. Dupuich et C. Scuotto)

Vermand : notée en Mai

PIGEON COLOMBIN Columba oenas

Aucune donnée précise sur cette espèce pourtant bien nicheuse dans les grandes forêts!

PIGEON RAMIER Columba palumbus

Quelques données éparses et peu précises.

Boué : noté toute l'année; nicheur certain.

Observé en de nombreux endroits en période de nidification. De grosses bandes hivernantes de Janvier à Mars et en Décembre dans les zones de cultures.

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur

Premières : 1 le 12 Avril à Origny Ste Benoite puis 1 le 19 à Chivres.

Bien répandue en période de nidification : Juin, Juil.: 10 localités d'obs.

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto

Notée en divers lieux sans grande précision. Des données numériques sur la nidification et les rassemblements seraient bien utiles...

En F.N.T., l'espèce est notée de plus en plus souvent en période de reproduction, même en pleine forêt.

COUCOU GRIS Cuculus canorus

Le premier est entendu le 8 Avril au M.I.S.Q. (P. Pigeon). Des chanteurs sont entendus ensuite à Chivres, Montaigu, Vermand le 11 Avril, à A.S.L. le 13, à Maizy le 14 et à Boué le 16.

Nombreux chanteurs ensuite jusqu'en Juin dans les lieux favorables.

Vermand : 1 oeuf le 25 Juin, envol le 5 Juillet. 3 à Boué le 6 Juin...

HIBOU MOYEN -DUC Asio otus

Aucune donnée, ni sur les dortoirs ni sur la nidification...

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua

Observée en Avril à Etreauport, en Juin à Cessières et en Juillet à Clairfontaine et Erloy. C'est peu!

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco

Quelques chanteurs en F.N.T., 2 localisés le 7 Avril en forêt de Régneval et 5 autres le même jour en F.C.B. Tous nicheurs possibles.

Chouette effraie Tyto alba

1 seule donnée d'oiseau vivant : 1 le 3 Juillet à Leschelles!

1 trouvé mort sur la route de Quincy-bosse le 26 Janvier.

Martinet noir Apus apus

Quelques lieux de reproduction probable : Boué (premier le 20 Mai),

Englancourt, Marchais... Migrateurs observés le 27 Juillet à A.S.L.

MARTIN PECHEUR Alcedo atthis

Cette espèce a surtout été observée en Thiérache, notamment en forêt

d'Hirson et de Saint Michel au cours des recherches sur le Cinole et à Boué, site fort visité.

Boué : observé régulièrement de début Juin à Novembre avec un maximum de 3 du 14 au 28 Août. Le recoupement des observations laisse supposer un couple nicheur, comme cela était déjà le cas les années précédentes.

F.C.B. : 1 le 7 Février.

Forêt de St Michel : La remontée de ses ruisseaux en Mars Avril a permis de localiser 2 cantons avec alarmes des individus. 1 canton sur le Gland et 1 canton sur l'Artoise.

Pas Bayard/Hirson : une observation insolite le 21 Juillet : "après avoir observé un premier oiseau, j'ai pu prendre contact quelques instants après avec un autre qui brusquement s'écarte de la rivière, parcourt plus de 50 mètres se dirigeant, en alarmant, vers un bouquet d'arbres où il pénètre alors dans la cavité du tronc d'un arbre mort". Le couple nichait il dans ce site insolite? Il n'a pas été possible de le vérifier. (H. Dupuich)

GUEPIER D'EUROPE Merlops apiaster

L'espèce a été observée en Juillet à Marchais, dans le secteur où elle niche depuis 1977. Il s'agit d'une propriété privée et nous n'avons aucune information sur la réussite de la nidification. Les habitants du village semblent bien connaître l'oiseau.

HUPPE FASCIEE Upupa epops

Une seule observation pour cet oiseau devenu bien rare : 1 en vol le 28 Mai à St Erme (L. Kérautret)

PIC VERT Picus viridis

Toutes les données concernent des chanteurs entendus en période de reproduction. Ces individus étaient tous bien cantonnés : nicheurs probable
Boué : Avril à Juillet ; Cessières : Juin ; Englancourt : Juillet ;
Le Nouvion en Thiérache : Avril à Juin ; Malzy : Avril à Juillet ;
Montaigu : Avril . F.C.B. : 1 en Janvier, 4 en Février.

PIC NOIR Dryoscopus martius

Pas d'observation directe cette année mais des traces (surtout de vieux trous) en forêt de St Michel attestent de la présence de l'espèce.

PIC EPEICHE Dendrocopos major

Boué : régulier toute l'année, cantonnements en Avril.

F.C.B. : en Janvier; forêt de St Michel : 2 cantons en Avril.

PIC MAR Dendrocopos medius

A Boué, 1 chanteur a été entendu dans un biotope favorable du 8 au 16 Avril (H. Dupuich)

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor

Peu de données. Boué(Avril), Cessières(Juin), F.C.B.(Fév.), M.I.S.Q.(Mars)

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis

Nombreux chanteurs dans les zones de cultures. Cette Alouette est absente du bocage de Thiérache, même en hivernage.

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia

Premières : le 14 Avril à Villers en Prayères.

Quelques colonies : Fourdrain, 60 nids le 31 Août ; Villers en Prayères, 8 nids le 14 Avril.

Des observations le 20 Mai à Boué et le 9 Juin à St Nicolas aux bois laissent espérer d'autres sites de reproduction.

HIRONDELLE DE CHEMINEE Hirundo rustica

Premières : 20 le 28 Mars à Boué; bien répartie ensuite.

Quelques données : 300 le 1 Mai à Boué, dortoir d'1 centaine le 9 Juillet
Chavignon : 2 le 27 Oct.

Dernières : 2 le 28 Oct. à Boué.

HIRONDELLE DE CHEMINEE Delichon urbica

Dates extrêmes : 1 le 17 Avril et 2 le 30 Septembre à Boué.

Nicheuse dans de nombreuses localités comme l'espèce précédente.

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis

Peu de données : les premiers sont notés le 14 Avril en forêt de St Michel avec 3 ind. cantonnés. L'espèce niche en F.N.T. et à Beaumé (Juillet)

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis

Toutes les données proviennent du bocage de Thiérache, surtout en période de nidification. Hivernage noté à Malzy (Janv. Nov.) et Englancourt (Sept.)
Des ind. cantonnés, intéressant des nicheurs probables sont observés à Clairfontaine, Englancourt, Hirson, Malzy d'Avril à Juin.

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava

1 seule donnée : A.S.L. , migration le 31 Août

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea

Surtout rencontrée en période de nidification sur les ruisseaux et les étangs.

Forêt de St Michel : 2 cantons sur le Gland et 2 autres sur l'Artoise les 7, 8 et 18 Avril.

A.S.L. : notée le 13 Avril, 1 Ad./1 juv. peu volant le 20 Juillet

Nicheurs possibles à : Chivres, Prémontré, Pas Bayard/hirson, St Nicolas aux bois (obs. de Juin et Juillet)

Migrations : Bucy le Long le 14 Avril, Vermand le 26 Août et Montcornet : 100 le 9 Septembre.

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba

La plupart des données d'Avril à Juillet concernent des nicheurs possibles ou probables.

A.S.L. : Avril à Juillet; Autreppes : I juv. le 6 Juin; Boué : Mars à Juil.

Clairfontaine : Juin; Englancourt : Juil.; forêt de St Michel : I canton sur le Gland et I sur l'Artoise en Avril; Montcornet : I5 le 9 Sept.; St Nicolas aux bois : I C le 9 Juin, noté aussi en Juil. et Août.

PIE GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*

Peu observée jusqu'à présent en Thiérache, l'espèce semble amorcer une légère remontée sur la bordure NW de la région; le bocage de Thiérache avec ses haies d'aubépines étant favorable à cet oiseau.

Bois du Hauty/Clairfontaine : I o cantonné les 7 et 14 Juin

Dohis : I o le 22 Juillet; I couple nicheur possible

Englancourt : I o le 21 Mai, I C alarmant le 2 Juillet, I C/I juv. non volant le 3 avec des cris d'autres juv. dans la haie (2 ou 3 autres).

IC et I o le 7 Juillet, revu en chasse les 17 et 22. Les obs. du 7 au 22 Juillet semblent se rapporter à un deuxième couple nicheur.

PIE GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*

Boué : I ad. en chasse et I autre alarmant le 6 Juillet, 2 Ad. avec transports orientés de nourritures le 15 Juil., I Ad. le 17 Juillet.

Le nid devait être dans la colonie de Grives litornes d'après les allées et venues de ces 2 espèces.

Moulin lointain/Boué : I ad. perché le 15 Juillet à plus de 2 Kms. du couple précédent.

Autreppes : I Ad. attaque I Buse le 17 Juillet : I couple nicheur possible.

CINCLE PLONGEUR *Cinclus cinclus*

La remontée des ruisseaux affluents de l'Oise en Mars et en Avril et quelques données ponctuelles ont permis d'éclaircir le statut de cette espèce. La très haute vallée de l'Oise a été peu couverte.

Une étude étant en cours de rédaction (H. Dupuich), nous nous bornerons à donner le bilan global.

Artoise et Gland : 4 cantons recensés avec parades et alarmes.

Oise : signalé au Pas Bayard/Hirson : I couple possible.

Le bilan pour cette espèce n'ayant jamais été signalée nicheuse en Picardie est donc de 5 couples. La moitié seulement des sites favorables ayant été recensés, une estimation à 10 couples pour tout le réseau est plausible

TROGLODYTE *Troglodytes troglodytes*

Quelques stations : Boué, Erloy, F.C.B., F.N.T., Le Nouvion en Thiérache...

Le Troglodyte est abondant le long des ruisseaux de la forêt de St Michel et l'on trouve environ 30 cantons de Troglodyte pour I de Cincle.

ACCENTEUR MOUCHET *Prunella modularis*

Des chanteurs notés à Le Nouvion en T., St Quentin...

TRAQUET TARIER Saxicola rubetra

Une seule localité d'observation : I o' cantonné le I Mai et I couple le le I Juillet à Englancourt.

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe

Juvigny : plusieurs en migration le I Septembre.

TRAQUET PATRE Saxicola torquata

Quelques données : Soissons : I o' le 2I Mars, Hurtebise : I o' cantonné le 2I Mai, St Nicolas aux bois : I o' le 9 Juin

ROUGE QUEUE NOIR Phoenicurus ochruros

St Nicolas aux bois : I C nicheur le 9 Juin. Pas d'autres données!

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus

Englancourt : I C cantonné le I Mai

ROUGE GORGE Erithacus rubecula

Noté à : Boué, Epyloy, Clairfontaine, F.C.B., F.N.T., forêt de St Michel,
Le Nouvion en Thiérache...

ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos

Quelques localités : Autrepres, Boué : plus de 10 chanteurs le 6 Juin,
Clairfontaine...

GORGE BLEUE A MIROIR Luscinia svecica

Cette espèce qui passe généralement inaperçue lors de ses migrations a fait l'objet d'I donnée : I o' le 9 Sept. à Boué (C Scuotto)

GRIVE LITORNE Turdus pilaris

Un gros effort a été fait cette année sur la nidification de la Grive litorne. Un article descriptif sera fait ultérieurement aussi nous ne dresserons qu'un rapide bilan.

Hivernage : jusqu'au 2I Mars à Malzy et en Thiérache et à partir du 23 Octobre à Malzy; bien répandue ensuite.

Nidification :

Any Martin Rieux : 6 Ad. le 7 Juil., alarmes et transports de nourritures orienté vers une haie. 3 à 4 couples probablement.

Martin Rieux/ Any Martin Rieux : Rassemblement de 50 Ad. et grands juv. volants le 15 Juillet. Des adultes alarment; est ce une colonie proche ou une concentration post-nuptiale locale? Nous penchons plutôt pour la première hypothèse.

Beaumé : I Ad. et 2 Ad./5 grands juv.; I Ad. alarme le 7 Juillet

I Ad. et I autre alarment le 16 Juil.

Bilan : 2 couples dont I certain.

Boué : Noté du 2I Mars au 2I Août avec I max. de 2 Ad. vus ensembles.

I Ad. attaque un Milan noir le 20 Mai, 2 Ad. avec transports

orientés de nourritures le 8 juin. Bilan : 1 C certain peut-être 2.

Englancourt : 1 Ad. le 1 Juillet, non revu ensuite...?

Eparcy : 1 Ad. en vol le 22 Juillet. 1 couple?

Faigny : 2 Ad. recherchent de la nourriture le 22 Juil. 1 à 2 C possibles

Leuze : 3 Ad. alarment le 16 Juillet. 2 couples possibles

Bobigny/Leuze : 3 Ad. alarment le 15 Juillet. 2 couples possibles

SaintMichel : 1 Ad. le 16 Juillet

Les Watignes/Watigny : 8 ind. avec transports orientés de nourritures le 16 Juillet. Minimum de 4 couples

Les Rigoles/Watigny : 10 ind. mini alarment dans une peupleraie inondée le 15 Juillet. Mini 10 couples.

Une extension nette est donc à remarquer cette année. Tous les biotopes sont bien typés : il s'agit de haies ou d'arbres isolés en bordure de ruisseaux ou d'étangs.

MERLE NOIR Turdus merula

Très commun. Quelques chanteurs précoces : 1 le 18 fev. en F.C.B., 1 le 28 à Malzy. Des juv. non volants le 17 Avril à Boué.

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus

Peu d'observations! F.C.B. : 50 le 11 Janvier, Chigny : grosses bandes le 25 Janvier.

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos

Boué : régulière, chante dès Février

F.C.B. : cantonnée début Février....

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus

Notée à Englancourt(Juil. et Oct.) et Erloy(Oct.) C'est tout...

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti

Contactée dans seulement 2 localités.

Boué : premier chant le 21 Mars, régulière ensuite, 2 cantons en Juin puis un seul contact jusqu'en Octobre.

Chivres : 2 chanteurs les 19 Avril et 28 Mai

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE Locustella luscinioides

1 chanter à Boué le 15 Juillet

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia

Hormis 2 chanteurs en forêt du Régneval/Erloy le 3 Juillet, aucune autre mention. C'est peu pour une espèce qui doit être assez commune.

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobanus

premier chant le 8 Avril à Boué, régulièrement notée ensuite.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus

Boué : 1 chanteur le 8 Avril, nombreux le 20 Mai, 1 Ad./4 juv. le 15 Juillet. Dernières le 21 Août.

St Nicolas aux bois : I chanteur le 20 Juillet

Vermand : I nid/ 3 pulli le 25 Mai

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris

Erloy : I chanteur le 3 Juillet dans un fourré humide

HYPOLAIS ICTERINE Hippolais icterina

Une seule donnée d'un individu tardif observé le 30 Septembre à Englan court (H. Dupuich)

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta

Aucune donnée!! Il serait pourtant intéressant de suivre l'expansion de cette espèce.

FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin

Première : I chanteur le II Avril en F.N.T.

Nicheuse à Boué, Erloy...

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla

Premiers chants le 2I Mars à Boué et le 22 à Vermand

Boué : I o^e le 22 Mars, I C le I6 Avril, régulière jusqu'en Juillet.

F.N.T. : 3 o^e chanteurs séparés de 2 et 5 m. le II Avril.

Notée régulièrement en période de nidification à : Clairfontaine, Erloy, Englancourt, forêt de St Michel...

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca

Seulement 2 localités : Autreppes, I le II Juillet et I au M.I.S.Q. dès le I4 Avril. Il peut s'agir d'oiseaux nicheurs.

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis

Quelques localités de nidification.

Boué : I chanteur le I6 Avril, noté jusqu'au I5 Juillet

Clairfontaine : I canton le 7 Juin

Englancourt : I C cantonné les 2I Mai et 2 Juillet

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus

Premiers : le 26 Mars au M.I.S.Q. Ensuite, I le 7 Avril à Erloy et le 8 à Boué. Noté aussi à A.S.L. et en F.N.T. en Avril

Boué : Ad. + juv. le 2I Août

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita

Premier chanteur à Vermand le I8 Mars puis à Boué et Soissons le 2I Mars

Noté en période de nidification (Avril à Juin) en de nombreuses localités.

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix

Cité de 2 localités où la nidification est probable :

Boué : chanteur le I Juillet

F.N.T. : 3 chanteurs le 3 Juillet.

ROITELET HUPPE Regulus regulus

Boué : observé en Juillet régulièrement (nicheur possible); 2 le 29 Oct.

ROITELET TRIPLE BANDEAU Regulus ignicapillus

Une seule donnée : I le 7 octobre (C. Scuotto)

GOBE MOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca

I q en migration le 28 Août à Boué.

GOBE MOUCHE GRIS Muscicapa striata

I Ad. cantonné le 1 Juillet à Malzy. C'est tout!

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus

Quelques données concernant des nicheurs.

Boué : parades le 28 Mars, I C cantonné le 16 Avril, Ad. et juv. le 7 Juil
F.C.B., forêt de Régneval...

MESANGE NONNETTE Parus palustris

I le 1 Février en F.C.B.

MESANGE BOREALE Parus montanus

Boué : nicheuse certaine; forêt du Régneval : parades le 7 Avril;
Sorbais : le 3 Juillet

MESANGE HUPPE Parus cristatus

Boué : I le 29 Octobre

Forêt de St Michel : I chanteur le 1 Mars

MESANGE NOIRE Parus ater

I le 25 Janv. en F.C.B.

Pour ces 2 espèces la non prospection des zones à conifères explique
cette apparente rareté.

MESANGE CHARBONNIERE Parus major et MESANGE BLEUE Parus caeruleus
Communes.

SITELLE TORCHEPOT Sitta europaea

Quelques localités : Boué : I canton le 21 Mars, F.C.B. : 5 le 15 Fév.

Forêt de St Michel : 8 cantons en Mars Avril le long de l'Artoise et
une nidification dans une boîte nichoir à Vermand : éclosion le 24 Avril

GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla

I le 1 Mars en forêt de St Michel...

BRUANT PROYER Emberiza calandra

Pas de données particulières. L'espèce est rencontrée dans les zones de
cultures et sur les bassins de décantations comme à A.S.L., Bucy le Long.

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella

Observé dans de nombreuses localités, surtout en été.

BRUANT ZIZI Emberiza cirrus

I q le 23 Octobre à Englancourt; migratrice.

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus

A.S.L. : canton le 13 Avril, 1 le 13 Juillet; Boué : 4 couples le 28 Mars
Marle : cantons le 13 Avril, Villers en Prayères ...

Autreppes : 1 le 11 Juillet cantonné dans un milieu sec; 1 ♂ cantonné
dans un champ de blé le 7 Juil. à Leuzé, 1 le 15 dans une prairie
humide à Clairfontaine.

Migration : plusieurs dizaines dans un champ à Laffont le 1 Septembre.

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs ; VERDIER D'EUROPE Carduelis chloris

CHARDONNERET ELEGANT Carduelis carduelis : Communs et réguliers

TARIN DES AUNES Carduelis spinus

Premiers le 2 Oct. à Bihécourt; 70 le 23 Oct. à Boué.

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina

Régulière et abondante. Migration observée à Boué le 23 Octobre

SERIN CINI Serinus serinus

1 o'chanteur le 2 Avril à Englancourt. Peu observé dans l'ensemble
BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula

Plusieurs localités d'observations en été...

GROS BEC Coccothraustes coccothraustes

1 chanteur le 1 Mars en forêt de St Michel

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus

MOINEAU FRIQUET Passer montanus

Saint Nicolas aux bois : 1 C/ juv. de 10 jours dans un trou d'arbre, 2
autres couples nicheurs le 6 Juin

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris

Nicheur commun; transport de nourritures le 13 Avril à Boué.

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus

Boué : 1 chanteur le 8 Juin, 1 autre le 6 Juin à St Nicolas aux bois.

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius

Nicheur dans les forêts. Migration observée le 23 Dec. à Boué et le 22
Octobre à Englancourt.

PIE BAVARDE Pica pica

Nombreux nids en Avril dans les haies du bocage en Thiérache.

CASSENOIX MOUCHETE Nucifraga carvocatactes

1 le 21 Décembre à Boué (C. Scotto)

CHOUCAS DES TOURS Corvus corone

1 colonie à Le Nouvion en Thiérache...

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus

Quelques colonies : Chivres(15 nids), La Capelle(8 nids en bocage),
Rouvroy(35 nids), St Clément(40 nids).

Bien plus dispersé en hivernage.

CORNEILLE NOIRE Corvus corone

Toutes les localités d'observation concernent des nicheurs probables ou
certains.

A.S.L., Boué, St Michel, Sissone, Chigny, Clairfontaine, Coingt, Dohis,
Englancourt, Erloy, F.N.T., F.C.B., forêt du Régneval, Hirson, Leschelles,
Marly, Malzy. Espèce bien commune donc.

ENQUETE F.I.R. SUR LES POPULATIONS DE
RAPACES DIURNES NON RUPESTRES : LA SITUATION DANS
L'AISE EN 1981 ET CONCLUSION SUR LES 3 ANNEES D'ENQUETE.

1981 était la dernière année d'enquête. La prospection a continué de manière individuelle en essayant de couvrir plus de terrain. Malgré cela, à la fin de l'enquête, plus du tiers du département n'a pas été visité. Nous remercions tous les ornithologues qui ont participé aux trois années de recherches.

Noms des observateurs : même liste que pour la synthèse 1981

Abréviations : voir synthèse 1981

H. Dupuich

I. COMPTE RENDU GENERAL DE L'ENQUETE

Toutes les conclusions concernent les 3 années d'enquête; nous donnons les résultats des observations pour 1981

Couverture régionale

Sur les 23 cartes I.G.N. au 50.000e que nous avons classées en 3 types

-type a : secteur Aisne faisant plus de 80% de la carte (10)

-type b : secteur Aisne faisant de 30% à 80% de la carte (4)

-type c : secteur Aisne faisant moins de 30% de la carte (9)

Pour l'enquête, 15 cartes ont été couvertes mais parfois très incomplètement. La carte I résume cette prospection.

10 cartes de type a : 2 non couvertes

1 couverte totalement

7 couvertes en partie

4 cartes de type b : 2 bien couvertes

2 couvertes en partie

9 cartes de type c : 6 non couvertes

3 couvertes en partie

Soit : le Sud et le Sud-Est ne sont pas couverts

le Nord et le Nord-Est sont bien couverts

le reste du département est couvert très inégalement.

Cette enquête, bien qu'avec une couverture qui n'est que médiocre nous permet néanmoins de nous faire une idée des populations de rapaces du département et servira de référence car hormis pour le

	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII
8	Péronne 2	Bohain 2	Guisa 5	Hirson 4
9	Ham 2	St Quentin 3	Vervins 3	Rozoy 4
10	Chauny 2	La Fère 3	Laon 3	Ch Porcien 0
11	Attichy 1	Soissons 2	Craonne 1	Asfeld 0
12	Villers C 1	Fère en T 0	Fismes 0	
13	Meaux 0	Ch Thierry 0	Epernay 0	
14		Montmirail 0		

Carte I - Couverture du département de l'Aisne.

Vermandois nous n'avions pas documents de référence.

Nous devons poursuivre nos efforts ces prochaines années de façon à pouvoir estimer ces populations à l'échelle du département tout entier.

II Liste des espèces

Buse variable Buteo buteo

Migration et hivernage

Peu notée en dehors des lieux de nidification.

Nidification

Carte de Bohain : forêt d'Andigny : non couverte

Carte de Guise : forêt du Nouvion en Thiérache; régulière toute l'année

Premières parades dès fin Février mais surtout en Mars où on observe souvent des ascendances de 5 à 6 Buses. Observé aux alentours de la forêt à : Boué Ic, Le Nouvion (I à 2c), Le grand Wez (Ic) et Buirofosse (Ic)

forêt du Regneval et bois attenants : observé sur les communes de Autrepes, Chigny, Englancourt, Erloy, Lerzy, Leschelles, Malzy, Marly-Gomont soit environ 16 couples. Ic/I juv. le 21 Mai à Chigny.

Fourchette de 27 à 30 couples pour l'ensemble de la carte.

Carte d'Hirson : bois du Hauty : peu couvert cette année. Mini. Ic (rappel; 7 couples en 1980)

forêt de Saint-Michel : Observé à Any Martin Rieux St Michel, clairières en forêt: 3 c, Watigny.

1 couple occupe un petit bosquet à Bellevue.

Fourchette par extrapolation pour la carte: 35 couples.

Carte de Vervins : forêt de Marfontaine: signalée à Lemée, St Richaumont, La Neuville Housset (2 à 3 c)

Autres secteurs non couverts; la fourchette de 7 à 8 couples est maintenue.

Carte de Rozoy : forêt de la Haye d'Aubenton : signalée en 13 localités autour de cette forêt.

Forêt du Val Saint-Pierre : I couple

Soit I4 couples repérés. Fourchette par extrapolation: 30 à 35 c.

Carte de La Fère : FSG : St Nicolas aux Bois 2 c vers le village,
I c coté étang. Sessières : I c nicheur certain.

FCB : 3 c en parade dès Février. Mini 7 c.

Fourchette par extrapolation : 20 couples/carte.

Carte de Laon : Chivres : Ic; Montchalon : Ic; Camp de Sissone,
plusieurs couples.

La fourchette de I5-20 couples donnée en I980 peut-
être maintenue.

Buse pattue Buteo lagopus

Cette espèce a été soumise à homologation nationale en I982. Pour
cette année nous n'avons pas transmis les observations.

Leschelles : I Ad. typique le 22 Février (H. Dupuich)

Mont Saint Jean : I ad. observé durant 20 minutes, posé puis en vol
partant vers le N.E. en direction de Rumigny (08) (H. Dupuich)

Epervier d'Europe Acciter nisus

Carte de Guise : aucun contact durant la nidification cette année;
noté de fin Oct. à Déc. à Boué.

Carte d'Hirson : Forêt de St Michel: contacts en Mars (femelle)

Bois du Hauty : plumées en Juillet

Bilan : 2 couples possibles

Autour des palombes Accipiter gentilis

Aucun contact durant la saison de nidification. Devons nous admettre
que l'espèce ne niche plus dans le département?

Milan royal Milvus milvus

La recherche de l'espèce s'est poursuivie dans le N.E. du département
et a confirmé la présence d'un petit noyau de reproducteurs.

Carte d'Hirson : contacts réguliers de Février (I le 23 Fév. à Neuve
Maison) à Juillet sur les bordures Est et Sud de
la forêt d'Hirson.

St Michel : 2 couples probables.

Nourrissage à la décharge d'Hirson: 4 le 28 Fév.

Carte de Rozoy : Contacts réguliers autour de la forêt de la Haye d'Aubenton notamment à Beaumé, Coingt, Dohis, Hurtebise, St Clément. 2 c probables.

Carte de Laon : I le 31 Juillet à A.S.L. et I le 13 Juillet à Semilly sous Laon. Migration ou erratisme d'un couple local?

Bilan départemental, toujours un minimum de 5 couples.

Milan noir Milvus milvus

Migrateurs : Beaumé : I le 16 Juillet, Boué : I le 20 Mai,
Chivres : I le 19 Avril (L. Ketautret); Malzy : I le 28 Malzy.

Le cas d'Englancourt est plus singulier : l'espèce y a été observée en Juin dans un secteur favorable (forêt et rivière proche) mais elle n'a pas été retrouvée en Juillet. Conclusion ?

Bondrée apivore Pernis apivorus

Carte de Guise : premier dès le 17 Avril (H. Dupuich)
secteur du Nouvion, 2 c probables
secteur de Boué , 2 c minimum
secteur d'Autreppes , 1 c possible
secteur d'Englancourt , 2 c probables
Fourchette d'environ 10-12 couples.

Carte d'Hirson : secteur de St Michel, observée en Juil. : 1c possible
secteur de Faigny, observée en Juil. : 1c possible
bois du Hauty : 1c minimum
Any Martin Rieux : 1c en Juillet
Le minimum de 10 couples donné en 1980 peut être maintenue mais la carte est incomplètement couverte.

Carte de Rozoy : Beaumé, Cuiry, Leuze, Plomion : observations de Juillet; 4 c possibles. On peut estimer à 8-10 c la population de la Haye d'Aubenton.

Carte de Laon : secteur de Marchais : 1c en Juillet
secteur de Chivres : 2 le 25 Mai; 1 c?
Estimation difficile : 10 couples?

Carte de Soissons : Bagneux, I le 13 Juillet 1c possible

Une grande partie du Sud de l'Aisne, assez favorable n'a toujours pas été couverte et rend une extrapolation à l'échelle du département très aléatoire.

Busard des roseaux Circus aeruginosus

Migration : I o le 12 Sept. à Montcornet, I q/Im. le 24 Sept. à Epagny, 3 en vol S.W. (I o'Ad., I o'IM, I o/Im.) à St Aubin le 24 Sept. (C. et J.C. Tombal)

Nidification :

Carte de Péronne : secteur de Bihécourt , I o donne 2 juv. à l'envol
(S. Boutinot)

Carte de Laon : secteur de Chivres , I o cantonné dès le 19 Avril;
passages de proies le 28 Mai.

Les autres secteurs favorables du département n'ont pas été couverts cette année.

Busard Saint-Martin Circus cyaneus

Migration : I o/Im le 9 Avril à Malzy et I autre le 29 Oct. à Pargny les Bois.

Nidification :

Carte de Laon : secteur de Bucy les Pierrepont : I o cantonné le 4 Avril, I q le 16 Mai. I couple
secteur de Chambry : I q se pose dans I phragmitaie
située entre 2 champs. Y niche-t-elle?

Busard cendré Circus pygargus

Migration : I en vol Sud au Nouvion en Thiérache en Septembre.
A retenir l'observation de L. Kérautret à Chivres le 28 Mai : I
Busard Sp. construisant (en 1965 les 3 espèces de Busard nichaient dans ce secteur.

Balbusard pêcheur Pandion haliaetus

Bien observé aux deux passages.

Bihécourt : noté au printemps et 3 le 27 Août (S. Boutinot)

Boué : I le 7 Avril (H. Dupuich et C. Scuotto), I le 20 Mai et I
le 23 Octobre (C. Scuotto)

Saint Nicolas aux Bois : I le 31 Août (H. Dupuich)

Faucon hobereau Falco subbuteo

2 sites de nidification ont été suivis régulièrement. On peut noter les dates tardives du début de nidification.

Carte de Guise ; Boué, 2 Ad. paradent le 6 Juillet, I Ad. le 17,
I Ad. attrape I Hirondelle le 21 , 2 Ad. le 21
Août . I couple.

Carte d'Hirson : Bois du Hauty, 2 Ad. le 6 Juillet(I attaque I Bondrée), I Ad. le 19, 2 Ad./I nid le 23 Juillet

2 relèves de couveurs sont observés en 1 heure. L'aire est à environ 20 mètres de la lisière. Ce couple nicheur est à cheval sur les départements de l'Aisne et du Nord. (Il était déjà présent en 1980)
Eparcy : 1 Ad. le 22 Juillet. Nicheur local?

Faucon crécerelle Falco tinnunculus

Carte de Guise : secteur d'Autreppes : 1 o le 17 Avril puis régulier
secteur de Boué : noté en Mars et Avril
secteur d'Englancourt : 1 c régulier toute l'année
secteur du Grand Wez : 1 le 3 Juil.; 1 c possible
secteur de Malzy : 1 c en Avril
secteur du Nouvion : 2 c en Avril
Fourchette : 25-30 couples.
Noté en hivernage à Erloy (Oct.), Chigny (Sept.),
Malzy (Oct.)

Carte d'Hirson : Bois du Hauty : 1 Ad. le 7 Juil., 1c/1 juv. le 18
Juillet . 1 couple certain.

Any Martin Rieux : 1 en Juillet

Eparcy : 1 le 15 Juillet

Clairfontaine : 1 en Juillet

Rocquigny : 1 le 19 Juillet

Évaluation : 15 couples? pour la partie Aisne (A
remarquer 3 couples pour un carré de 3x4 Kms.)

Carte de St Quentin : Marcy, 1 couple probable.

Carte de Vervins : La Hérie : 1 le 13 Avril

Marle : 1 le 13 Avril

Bilan pour cette année, 2 couples (non repérés en
1980)

Carte de Rozoy : couples nicheurs possibles ou probables (observa-
tions en Mai, Juin, Juillet) à Cuiry, Dohis, Hur-
tebise, Mont-Saint-Jean, Margny, Plomion.
Estimation par extrapolation de 25-30 couples pour
cette carte.

Carte de Laon : A.S.L., observé en Avril; 1 couple possible
Chivres, observé en Avril; 1 couple possible
Marchais, observé en Mai; 1 couple possible
Semilly, observé en Juillet, 1 couple possible.
Bilan, 4 couples; mini de 20 pour la carte par
extrapolation.

Carte de Soissons : secteur de Bagneux I couple probable
secteur de Juvigny, I couple probable
Carte d'Attichy : secteur de Fontenoy, I couple possible

III CONCLUSION

Bilan global

Au bout de 3 années d'enquête, nous pouvons avoir une idée des rapaces nicheurs de l'Aisne mais celle ci reste très incomplète, une bonne partie du département, essentiellement le Sud, n'ayant pas été recencée et une autre partie ne l'a été que fort peu. De ce fait nos estimations totales pour certaines espèces sont minorées; néanmoins il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Le Nord-Est du département, avaut garde des grosses populations de l'Est, est un réservoir pour les espèces forestières : Buses, Bondrées Milans et Eperviers (par contre, absence apparente de l'Autour). Le Laonnois céréalier et marécageux apparait comme une réserve pour les Busards des roseaux et à moindre titre pour les Busards Saint-Martin. La Crécernelle est assez répandue sur tout le département, un peu moins en Thiérache. L'enquête a également confirmé l'effondrement des populations de Faucons hobereaux et la quasi absence de l'Autour et du Busard cendré.

Nous allons essayer d'estimer les effectifs. Ces estimations ont été faites à partir d'extrapolations sur les seules cartes couvertes et non pour tout le département; une meilleure prospection devrait permettre de relever largement ces chiffres.

Bilan par espèce.

a) Buse et Bondrée

Buse variable : relativement prospère. Population estimée à 170 couples. Meilleure densité : 10/2à3 Kms² (Caretes de Rozoy et Hirson) Le chiffre avancé est vraiment un minimum.

Bondrée : Plus rare. Population estimée à 50 couples. Là encore ce chiffre est un minimum. En Thiérache, 32 couples pour 100 couples de Buses variables soit 1 pour 3.

b) Autour et Epervier

Autour des Palombes : Aucun couple nicheur certain n'a été trouvé. Un indice possible en F.C.B. Population : 1-2 couples ?

Epervier d'Europe : Résultats catastrophiques. Population ,10 couples.
Espèce à suivre pour juger de son déclin véritable .

c) Milans

Milan noir : Aucun cas certain n'a été trouvé. Présence estivale de quelques individus à la limite du département des Ardennes (Thiérache, région de Laon-Sissone)

Milan royal : Existence d'un noyau de 4-5 couples en Thiérache. Autour de ce noyau, présence épisodique de quelques couples.
Total : 5 à 9 couples

d) Busards

Busard des roseaux : Présence de 2 noyaux : 1 dans la zone humide du Laonnois avec 4-6 couples et un autre dans les vallées marécageuses du Vermandois (Oise, Aisne, Omignon) avec 4-5 couples.
Rare ailleurs. Population estimée : 9-13 couples

Busard-Saint-Martin : Rien de bien certain. Quelques couples épars, en culture, sans preuves formelles de réussites.
Population très fragile de 2 (réguliers) à 5 couples.

e) Faucons

Faucon hobereau : Pour les 3 années d'enquête, 1 site a été occupé 2 années (80 et 81) et un autre une année avec nidification certaine pour le reste, pas de preuves formelles.

Population trouvée : 2-3 couples, extrapolation départementale impossible. De toutes façons un net déclin.

Faucon crécerelle : La couverture trop moyenne ne donne qu'une idée partielle de la population.

Population contactée sur les cartes couvertes : 187 couples

Population estimée sur les cartes couvertes : mini. 300 couples

Population estimée pour le département : mini. 500 couples

Les densités sont variables : moins fréquent que la Buse en Thiérache, il est assez abondant en Vermandois et Laonnois.

Pour terminer, si certaines espèces ont opéré un redressement depuis 1972 (année de protection) en récupérant d'anciens secteurs et des effectifs corrects (mais non abondants), d'autres ont continué à continuer à décliner et les causes semblent d'abord être l'agriculture moderne et ses méfaits et un grand dérangement dans les forêts. Enfin des espèces enexpansion (expansion parfois terminée) sont apparues ou devraient le faire rapidement.

Espèces en redressement : Buse variable, Bondrée apivore, Busard
des roseaux, Faucon crécerelle.

Espèces en déclin : Autour des Palombes, Epervier d'Europe, Busard
Saint-Martin, Busard cendré, Faucon hobereau.

Espèces en expansion : Milan royal et Milan noir.

IV BILAN

Nombre de couples de rapaces nicheurs dans l'Aisne

Premier chiffre : reflet des observations

Second chiffre : estimation sur les cartes couvertes ou (nicheurs
irréguliers)

? : Pas de nidifications certaines ou estimation impossible

Buse variable : I43- I70 couples

Bondrée apivore : 27 - 50 couples

Autour des Palombes : I -? couple

Epervier d'Europe : 6 - IO couples

Milan royal : 5 - (9) couples

Milan noir : 0 -? couple

Busard des roseaux : 9 - I3 couples

Busard Saint-Martin : 2 - (5) couples

Busard cendré : ?

Faucon hobereau : 2 - 3 couples

Faucon crécerelle : I87 - 300 couples (mini. 500 couples pour le
département)