SYNTHESE DES OBSERVATIONS I98I DANS L'AISNE

INTRODUCTION

Avec un peu de retard, parait enfin cette synthèse. Comme tous les ans, nous déplorons la couverture très inégale du département qui reste dans l'ensemble peu couvert.

Cette situation est due d'une part au peu d'ornithologues présents dans l'Aisne et d'autre part à des ornithologues de groupes limitrophes qui oublient ou ne veulent pas envoyer leurs données (problèmes de limites géographiques...).

Cette année était la dernière année de l'enquête F.I.R. sur les rapaces (ceux-ci seront traités à part).

Dans l'ensemble, l'année météorologique a été plus favorable qu'en 80

Quelques données retiennent l'attention :

-La première nidification du Tadorne de Belon

- Toujours la nidification du Courlis cendré en Laonnois ainsi que celle du Guépier d'Europe
- Premières preuves de nidification du Cincle plongeur
- L'explosion géographique de la Grive litorne
- L'observation du Cassenoix moucheté et de la Gorge-bleue

H. DUPUICH

ABREVIATIONS

♀ : femelle ♂ : mâle juv. : juvénile ind. : individu

C ou ♀♂ : couple

A.S.L. : Aulnois sous Laon F.C.B. : forêt de Coucy-basse

F.N.T. : forêt du Nouvion en Thiérache

M.I.S.Q. : réserve du marais d'Isle de Saint-Quentin

Boué : lieu de nidification

OBSERVATEURS :

S. Boutinot, A.M. et X. Commecy, G. Cuppa (COCA), H. Dupuich, A. Dupuis, L. Kérautret (GON), F. Letourneau, E. Mercier, E. Nowack, P. Pigeon, C. et J.C. Tombal (GON). C. Savotto

GREBE HUPPE Podiceps cristatus

De trop nombreux secteurs favorables non visités(gravières de l'Oise, zone humide de Laon-Sissonne, étangs de la Somme autour de Saint-Simon) ainsi qu'un recensement incomplet des gravières de la vallée de l'Aisne donnent une mauvaise idée de la population totale de l'Aisne.

Boué : I Ad. du 7 au I7 Avril (avec un deuxième le 8), 3 le I Mai

Chassemy :I couple. le I4 Avril : nicheur possible.

Fontenoy : I C/I nid le I4 Avril

Hirson : 3 grands juv. à l'étang du Pas bayard le 23 Juillet : I C nicheur

M.I.S.Q. : 5 C nicheurs

Prémontré : I Ad.,2 grands juv. le I3 Juillet

Saint Nicolas aux bois : 2 C/2 nids, I C/2 juv. le 9 Juin; 2 Ad./4 pulli et I Ad./3 juv. le I3 Juillet; I Ad./4 pulli mais I Ad./2 juv. le 20 Juillet; I Ad. le 29 Octobre. Bilan : 3 couples.

Soissons : 2 couples le I4 Avril

Vermand : 5 à 6 couples nicheurs. I juv. de 2 semaines le 22 Avril

Vieil Arcy : 4 o dont 2 paradent le I4 Avril

Villers en Prayères : I Ad.,I Ad./I nid, 2 Ad. le I4 Avril. Bilan :3 couples.

Nous obtenons un total de 28 couples; c'est vraiment un minimum.

GREBE ESCLAVON Podiceps auritus

I Ad. en plumage quasi-nuptial est observé à l'étang de Boué le 7 Juillet. Date vraiment précoce pour la migration post-nuptiale, surtout que l'espèce est rare dans le département (H. Dupuich)

GREBE CASTAGNEUX Podiceps rufficollis

La nidification n'est toujours bien suivie qu'à Boué; ailleurs, seulement des données de migration.

A.S.L. : I les I3 Avril et I3 Juillet, 3 le 29 Octobre

Boué : noté de Mars à Juin avec 2 ou 3 couples nicheurs. 4 Ad./I juv. le 8 Juin, 2 Ad./ I pullus et 2 Ad. le I3 Juin,2 Ad./2 juv. et I Ad. alarmant le 20 Juillet...I Ad. le 2I Août. Puis la migration est suivie : II le 28 Août, 2I le 30 Septembre, I5 le 23 Octobre, II le 2I Novembre et 6 le I2 Décembre.

Montcornet : II le I2 Septembre

Saint Nicolas aux bois : 8 le 20 Juillet et 3 le 3I Août

A noter, I ind. sur l'Oise à Autreppes le 23 Octobre et 7 à Chigny le 23 Oct.

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo

I ind. le 27 Avril aux étangs de Vermand (S. Boutinot)

I ind. en migration le I Mai à Boué (H. Dupuich)

HERON CENDRE Ardea cinerea

On note uniquement des hivernants, des migrateurs et des erratiques mais toujours pas d'indices de nidification.

Beaumé : I le I6 Juillet

Bihécourt : régulier en Décembre

Boué : I le I Janvier et le I5 Février, 4 le 7 Avril, 2 le I7 Juillet, I le 30 Septembre et max. de 5 en Octobre.

F.C.B. : I le 23 Janvier et le 5 Février

Saint Nicolas aux bois : 2 le 22 Novembre

Saint Michel (forêt) : I le 28 Février

Vallée de l'Oise (de Chigny à Molzy) : I8 le 25 Janvier, II le 2I Mars et 8 le 23 Octobre.

GRAND BUTOR Botaurus stellaris

Pas de nouveaux sites. Bihécourt : I couple nicheur (S. Boutinot)

Chivres : I chanteur le I9 Avril (L. Kérautret)

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus

Bihécourt : peut-être encore I couple nicheur.

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor

Boué : I le 2I Novembre, I immature du I9 au 23 Décembre

CYGNE SAUVAGE Cygnus cygnus

I donnée pour cet oiseau peu observé dans le département : I stationne en Décembre à Bihécourt (S. Boutinot)

OIE CENDRE Anser anser

Watigny : 5 ind. en vol N.E. le I Mars. (C'est pourtant une migratrice commune)

OIE DES MOISSONS Anser fabalis

Bihécourt : passage noté dans la dernière décade d'Août (S. Boutinot)

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna

Boué : 3 le I9 Décembre, 2 les 2I et 23.

Vermand : 2 le I2 Novembre et 25 le I8 Décembre

La nidification a été constatée dans les bassins de décantations à Aulnois sous Laon. Il s'agit de la nidification la plus éloignée du littoral pour la Picardie, ce qui prouve l'expansion de l'espèce.

Le couple est observé à partir du I3 Avril, 2 Ad./9 juv. le I3 Juillet puis le 20, envol entre le 20 et le 27 Juillet (H.Dupuich et P.Pigeon)

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos

A.S.L. : 3 le I3 Avril et I0 le 20 Juillet

Bihécourt : nicheur certain

Boué : Hivernants notés de Janvier à Mars puis 4 couples en Avril-Mai.

I ♀/2 grands juv. le 8 Juin, 8 pulli de I5 jours et 30 ind. le 24 Juillet

puis observé d'Août à Décembre avec un max. de 20 le 23 Déc.

Bucy le Long : 5 C mini le I4 Avril. nicheur possible

Chassemy : 2 le I4 Avril et I le même jour à Maizy

M.I.S.Q. : Nicheur certain. Premiers pulli le I6 Avril

Prémontré : I0 le I3 Juillet et le 23 Novembre

Soissons : 5 ♂ et 3 ♀ le I4 Avril. Nicheur possible

Villers en Prayères : 4 ♂ et 3 ♀ le I4 Avril

SARCELLE D'HIVER Anas crecca

Bihécourt : I C nicheur; juv. non volants observés (S. Boutinot)

Boué : 2 ♂ I ♀ le 2I Mars, I ♂ I ♀ le 23 Octobre

M.I.S.Q. : I C nicheur probable

CANARD CHIPEAU Anas strepera

Uniquement noté en migration. A.S.L. : I ♀ le 29 Octobre

Boué : 6 ♂ 3 ♀ le 2I mars, 3 ♂ I ♀ le 22

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

Bihécourt : I couple nicheur (S. Boutinot)

Boué : 2 ♂ I ♀ le 2I Mars, I ♂ 2 ♀ le 7 Avril et I ♂ I ♀ le 8

CANARD SOUCHET Anas clypeatea

A.S.L. : I C le I3 Avril

Boué : 6 ♂ 5 ♀ le 2I Mars, 2 ♂ le 22, 4 ♂ 4 ♀ le 7 Avril, I C le 8,
I ♂ les I7 et I8 A vril; il semble se cantonner mais il ne sera plus revu ensuite.

Saint Nicolas aux bois : 2 ♂ I ♀ le 29 Octobre

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina

Beaucoup de données, tant en migration qu'en nidification.

A.S.L. : 225 le 22 Octobre

Bihécourt/Vermand : mini de 30 couples nicheurs d'aprés S. Boutinot avec encore I famille avec 7 juv. non volants le 22 Août ce qui montre encore I fois l'absurdité de l'ouverture de la chasse au gibier d'eau en Juillet.

Boué : I ♂ le 23 Février, 50 le 2I mars et I7 le 22, I ♂ 5 ♀ le 20 Mai, I ♂ le I Juillet, présent jusqu'au II, jour où il est en mue. I0 le I4 Nov., I9 le I7 et 27 le 2I

Saint Nicolas aux bois : 2 ♂ le 6 Juin, 2 ♂ I ♀ le I3 Juillet, I ♀/5 pulli 2 o I o le 20 Juil., I0 le 3I Août, I60 le 29 Oct., 2 le I9 Déc. Il se reproduit donc 2 couples sur cet étang.

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula

Boué : I ♂ 2 ♀ le 7 Avril, I ♂ le I9 Nov., 3 le I9 Déc. et I le 23.

Saint Nicolas aux bois : I ♀ le I3 Juillet

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila

A.S.L. : 2 ♀ le 29 Octobre

Vermand : I le 20 Novembre

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula

2 ♀/im. du 23 au 29 Octobre à Boué (H. Dupuich et C. Scuotto)

HARLE BIEVRE Mergus mergus

Boué : I ♂ le I9 Décembre (C. Scuotto)

HARLE PIETTE Mergus albellus

I3 à Vermand le I8 Décembre (S. Boutinot)

PERDRIX GRISE Perdix perdix

Notée en Avril à A.S.L., Sissonne, Villers en Prayères...

FAISAN DE CHASSE Phasianus colchicus

Nicheur : F.N.T. ,F.S.G. ...

RALE D'EAU Rallus aquaticus

Boué : I chanteur le 8 Avril, les I6 et I7 Juillet. 2 ind. le 23 Oct. et le 2I Nov. I couple nicheur probable donc.

Montcornet : 2 en migration le I2 Septembre.

MAROUETTE PONCTUEE Porzana porzana

Passage post-nuptial bien noté à Boué : 2 Ad. le 28 Août et I ind. du 4 Sept. au 7 Oct. (H. Dupuich et C. Scuotto)

POULE D'EAU Gallinula chloropus

Notée en période de nidification à A.S.L., Boué, Englancourt, Marle, Montcornet...

FOULQUE MACROULE Fulica atra

La reproduction est certaine à Prémontré (Ad. et juv. le I3 Juil.), Saint Nicolas aux bois (2 C/nid, I C/I pullus, I C/3 juv., 3 Ad. le 9 Juin). Observée aussi à A.S.L. (Avril à Août), Fontenoy, Maizy, Vieil Arcy...

Seul le site de Boué est bien suivi : I20 le 23 Février, 80 le 22 Mars, 40 le I0 Avril. 60 le I Juillet, 80 le 6, I00 le 2I, I40 le 2I Août, 86 le le 30 Novembre.

En nidification : I Ad./I nid le I7 Avril, I Ad./2 pulli 2 ad./4 et I Ad./5 le 20 Mai, I Ad./I p. I Ad./I juv. I Ad./2 juv. 3xI Ad./3 juv. 2x2 Ad./4juv. I Ad./5 juv. le 6 Juin.

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus

Aprés les derniers passages d'Avril (encore I le I4), les premiers migrateurs sont notés le 7Juin avec I2 ind. à Autreppes puis en Juillet à Autreppes, Boué, Clairfontaine, Malzy... Réguliers ensuite jusqu'en Décembre.

Nidification : A.S.L. : juv. en Juillet. Plusieurs couples.

Bucy le Long : 4 C le I4 Avril. Chivres : quelques couples.

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola

2 le 20 Juillet à A.S.L. (migrateurs précoces!)

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula

A.S.L. : I les 20 et 27 Juillet

Montcornet : 5 le 9 Septembre

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius

Observé en migration et en nidification dans les bassins de décantations. Un recencement de tous ces bassins et des gravières en Mai-Juin permettrait d'évaluer précisement la population nicheuse.

A.S.L. : 2 Ad. le I3 Juillet, I0 le 20 dont I juv., I8 le 3I Août(Ad.et juv.

Bucy le Long : Nicheur probable. 4 à 5 couples.

Marle : 2 Ad. le 27 Juillet

Villers en Prayères : I C alarme le I4 Avril

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago

Uniquement des observations au cours de la migration post-nuptiale.

A.S.L. : I le 27 Août

Boué : I2 le 25 Août, 40 le 28, 3 le 3I. 2 le 28 Octobre et I le 23 Déc.

Montcornet : 2 le 9 Septembre.

COURLIS CENDRE Numenius arquata

La nidification est toujours notée dans le Laonnois . Chivres : I en vol le 28 Mai(L. Kérautret); I couple nicheur (S. Boutinot)

Malzy : 7 le 25 Janvier, 3 le 23 Octobre

Saint Nicolas aux Bois : I ind. en vol le 9 Juin (A.M. et X. Commecy)

Observation bien insolite quant à la date...!

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa

2 en migration le I3 Juillet à A.S.L.

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus

Observé en 2 endroits traditionnels.

A.S.L. : entendu le I3 Juil., 3 le 20 Juil., II le 3I Août

Boué : I les 7 et 9 Avril, 6 le I4 Août et I le 2I et le 3I.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia

A.S.L. : noté le I3 Juil., I2 le 20 et 7 le 27

Montcornet : I le 9 Sept.

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus

Observé en migration post-nuptiale.

A.S.L. : Observé le I3 Juillet, I le 20.

Boué : I le 28 Août et 4 le 9 Septembre

Mrale : 2 le I3 Septembre.

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

I seule donnée : I le 27 Août à A.S.L.

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos

Le premier cas certain de nidification a été constaté à Boué. Observé ailleurs en migration.

A.S.L. : 40 le 20 Juil., 50 le 27, 3 le 2I Août et I le 29 Octobre

Boué : I couple a niché; se reporter à la note parue dans l'Avocette No 7(I-2) p.86 à 88. Il y a eu I juv. Observé non volant le I5 Juillet.

Autres obs. : I le I6 Avril, 6 le 20 Mai, 6 le I5 Juillet, I le 2I Août, 3 le 25, 5 le 28. 2 le 9 Sept. et I le 30, 8 le 7 Octobre.

Marle : 28 le 27 Août Montcornet : I le 9 Septembre

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta

Assez bien observé au cours de la migration post-nuptiale, surtout début Sept

A.S.L. : I le 27 Juil. Boué : I du 4 au 9 Sept. et I le 9 Sept. à Montcornet

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina

A.S.L. : 7 le I3, Juil. et I le 9 Sept. à Montcornet

CHEVALIER COMBATTANT Philomachus pugnax

A.S.L. : 3 le 27 Juillet

AVOCETTE Recurvirostra avosetta

Observé uniquement à A.S.L. où I couple a simulé ou tenté une nidification du I3 au 27 Juillet (alarmes, mises en position de couvaison...) mais aucun oeuf ni ébauche de nid ne sera trouvé. (S. Boutinot et H. Dupuich)

GOELAND ARGENTE Larus argentatus

Noté en erratisme à Englancourt : 2 im. en vol W. le 2 Juillet et 7 Ad. à Malzy le 20 Juillet

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus

Des Ad. sont notés ça et là hors période de nidification : Boué, Marle, Hirson. De plus l'espèce hiverne dans la vallée de l'Aisne, surtout vers Soissons et en grand nombre.

La nidification est constatée dans plusieurs localités.

A.S.L. : 9 Ad. dont I alarmant le I3 Avril, 50 dont plusieurs juv.(locaux?) le I3 Juil., 30 dont I juv. non volant le 20 , I im. le 27. I C nicheur donc

Bucy le Long : colonie estimée à 80 nids (± I0)

Vermand : II8 nids le 30 Avril (I2 nids vides, 2I/I Oeuf, I7/2, 68/3)

Vierzy : non visité cette année

MOUETTE PYGMEE Larus minutus

Boué : 8 Ad. et 2 im. le I Mai. Vermand : au passage en Mai

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger

Notée aux passages pré et post nuptiaux

Boué : 2 le I Mai, 6 le 20. Montcornet : I le I2 Sept.

Au passage en Mai à Vermand

STERNE PIERRE-GARIN Sterna hirundo

Quelques observations cette année pour cette espèce peu fréquente dans

l'Aisne.Boué : 8 le I Mai et 3 le 20 (H. Dupuich et C. Scuotto)

Vermand : notée en Mai

PIGEON COLOMBIN Columba oenas

Aucune donnée précise sur cette espèce pourtant bien nicheuse dans les grandes forêts!

PIGEON RAMIER Columba palumbus

Quelques données éparses et peu précices.

Boué : noté toute l'année; nicheur certain.

Observé en de nombreux endroits en période de nidification. De grosses bandes hivernantes de Janvier à Mars et en Décembre dans les zones de cultures.

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur

Premières : I le I2 Avril à Origny Ste Benoite puis I le I9 à Chivres.

Bien répandue en période de nidification : Juin, Juil.: IO localités d'obs.

TOURTERELLE TURQUE Stretopelia decaocto

Notée en divers lieux sans grande précision. Des données numériques sur la nidification et les rassemblements seraient bien utiles...

En F.N.T., l'espèce est notée de plus en plus souvent en période de reproduction, même en pleine forêt.

COUCOU GRIS Cuculus canorus

Le premier est entendu le 8 Avril au M.I.S.Q. (P. Pigeon). Des chanteurs sont entendus ensuite à Chivres, Montaigu, Vermand le II Avril, à A.S.L. le I3, à Maizy le I4 et à Boué le I6.

Nombreux chanteurs ensuite jusqu'en Juin dans les lieux favorables.

Vermand : I oeuf le 25 Juin, envol le 5 Juillet. 3 à Boué le 6 Juin...

HIBOU MOYEN -DUC Asio otus

Aucune donnée, ni sur les dortoirs ni sur la nidification...

CHOUETTE CHEVECHE Athène noctua

Observée en Avril à Etreauport, en Juin à Cessières et en Juillet à Clairfontaine et Erloy. C'est peu!

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco

Quelques chanteurs en F.N.T., 2 localisés le 7 Avril en forêt de Régneval et 5 autres le même jour en F.C.B. Tous nicheurs possibles.

Chouette effraie Tyto alba

I seule donnée d'oiseau vivant : I le 3 Juillet à Leschelles!

I trouvé mort sur la route de Quincy-bosse le 26 Janvier.

Martinet noir Apus apus

Quelques lieux de reproduction probable : Boué (premier le 20 Mai), Englancourt, Marchais... Migrateurs observés le 27 Juillet à A.S.L.

MARTIN PECHEUR Alcodo atthis

Cette espèce a surtout été observée en Thiérache, notamment en forêt

d'Hirson et de Saint Michel au cours des recherches sur le Cincle et à Boué, site fort visité.

Boué : observé régulièrement de début Juin à Novembre avec un maximum de 3 du I4 au 28 Août. Le recoupement des observations laisse supposer un couple nicheur, comme celà était déjà le cas les année précédentes.

F.C.B. : I le 7 Février.

Forêt de St Michel : La remontée de ses ruisseaux en Mars Avril a permis de localiser 2 cantons avec alarmes des individus. I canton sur le Gland et I canton sur l'Artoise.

Pas Bayard/Hirson : une observation insolite le 2I Juillet : "aprés avoir observé un premier oiseau, j'ai pu prendre contact quelques instants aprés avec un autre qui brusquement s'écarte de la rivière, parcourt plus de 50 mètres se dirigeant, en alarmant, vers un bouquet d'arbres où il pénètre alors dans la cavité du tronc d'un arbre mort". Le couple nichait il dans ce site insôlite? Il n'a pas été possible de le vérifier.(H.Dupuich)

GUEPIER D'EUROPE Meriops apiaster

L'espèce a été observée en Juillet à Marchais, dans le secteur où elle niche depuis I977. Il s'agit d'une propriété privée et nous n'avons aucune information sur la réussite de la nidification. Les habitants du village semblent bien connaitre l'oiseau.

HUPPE FASCIEE Upupa epops

Une seule observation pour cet oiseau devenu bien rare : I en vol le 28 Mai à St Erme (L. Kérautret)

PIC VERT Picus viridis

Toutes les données concernent des chanteurs entendus en période de reproduction. Ces individus étaient tous bien cantonnés : nicheurs probables Boué : Avril à Juillet ; Cessières : Juin ; Englancourt : Juillet ; Le Nouvion en Thiérache : Avril à Juin ; Malzy : Avril à Juillet ; Montaigu : Avril . F.C.B. : I en Janvier, 4 en Février.

PIC NOIR Dryoscopus martius

Pas d'observation directe cette année mais des traces (surtout de vieux trous) en forêt de St Michel attestent de la présence de l'espèce.

PIC EPEICHE Dendrocopos major

Boué : régulier toute l'année, cantonnements en Avril.

F.C.B. : en Janvier; forêt de St Michel : 2 cantons en Avril.

PIC MAR Dendrocopos médius

A Boué, I chanteur a été entendu dans un biotope favorable du 8 au I6 Avril (H. Dupuich)

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor

Peu de données. Boué(Avril), Cessières(Juin), F.C.B.(Fév.), M.I.S.Q.(Mars)

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis

Nombreux chanteurs dans les zones de cultures. Cette Alouette est absente du bocage de Thiérache, même en hivernage.

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia

Premières : le I4 Avril à Villers en Prayères.

Quelques colonies : Fourdrain, 60 nids le 3I Août ; Villers en Prayères, 8 nids le I4 Avril.

Des observations le 20 Mai à Boué et le 9 Juin à St Nicolas aux bois laissent espérer d'autres sites de reproduction.

HIRONDELLE DE CHEMINEE Hirundo rustica

Premières : 20 le 28 Mars à Boué; bien répartie ensuite.

Quelques données : 300 le I Mai à Boué, dortoir d'I centaine le 9 Juillet Chavignon : 2 le 27 Oct.

Dernières : 2 le 28 Oct. à Boué.

HIRONDELLE DE CHEMINEE Delichon urbica

Dates extrêmes : I le I7 Avril et 2 le 30 Septembre à Boué.

Nicheuse dans de nombreuses localités comme l'espèce précédente.

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis

Peu de données : les premiers sont notés le I4 Avril en forêt de St Michel avec 3 ind. cantonnés. L'espèce niche en F.N.T. et à Beaumé (Juillet)

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis

Toutes les données proviennent du bocage de Thiérache, surtout en période de nidification. Hivernage noté à Malzy (Janv. Nov.) et Englancourt(Sept.)

Des ind. cantonnés, intéressant des nicheurs probables sont observés à Clairfontaine, Englancourt, Hirson, Malzy d'Avril à Juin.

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava

I seule donnée : A.S.L. , migration le 3I Août

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea

Surtout rencontrée en période de nidification sur les ruisseaux et les étangs.

Forêt de St Michel : 2 cantons sur le Gland et 2 autres sur l'Artoise les 7,8 et I8 Avril.

A.S.L. : notée le I3 Avril, I Ad./I juv. peu volant le 20 Juillet

Nicheurs possibles à : Chivres, Prémontré, Pas Bayard/hirson, St Nicolas aux bois (obs. de Juin et Juillet)

Migrations : Bucy le Long le I4 Avril, Vermand le 26 Août et Montcornet : I00 le 9 Septembre.

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba

La pluspart des données d'Avril à Juillet concernent des nicheurs possibles ou probables.

A.S.L. : Avril à Juillet; Autreppes : I juv. le 6 Juin; Boué : Mars à Juil. Clairfontaine : Juin; Englancourt : Juil.;forêt de St Michel : I canton sur le Gland et I sur l'Artoise en Avril; Montcornet : I5 le 9 Sept.; St Nicolas aux bois : I C le 9 Juin, noté aussi en Juil. et Août.

PIE GRIECHE ECORCHEUR Lanius collario

Peu observée jusqu'à présent en Thiérache, l'espèce semble amorcer une légère remontée sur la bordure NW de la région; le bocage de Thiérache avec ses haies d'aubépines étant favorable à cet oiseau.

Bois du Hauty/Clairfontaine : I ♂ cantonné les 7 et I4 Juin

Dohis : I ♀ le 22 Juillet; I couple nicheur possible

Englencourt : I ♂ le 2I Mai, I C alarmant le 2 Juillet, I C/I juv. non volant le 3 avec des cris d'autres juv. dans la haie(2 ou 3 autres). IC et I ♂ le 7 Juillet, revu en chasse les I7 et 22 . Les obs. du 7 au 22 Juillet semblent se rapporter à un deuxième couple nicheur.

PIE GRIECHE GRISE Lanius excubitor

Boué : I ad. en chasse et I autre alarmant le 6 Juillet, 2 Ad. avec transports orientés de nourritures le I5 Juil., I Ad. le I7 Juillet. Le nid devait être dans la colonie de Grives litornes d'aprés les allées et venues de ces 2 espèces.

Moulin lointain/Boué : I ad. perché le I5 Juillet à plus de 2 Kms. du couple précédent.

Autreppes : I Ad. attaque I Buse le I7 Juillet : I couple nicheur possible.

CINCLE PLONGEUR Cinclus cinclus

La remontée des ruisseaux affluents de l'Oise en Mars et en Avril et quelques données ponctuelles ont permis d'éclaircir le statut de cette espèce. La trés haute vallée de l'Oise a été peu couverte.

Une étude étant en cours de rédaction (H. Dupuich), nous nous bornerons à donner le bilan global.

Artoise et Gland : 4 cantons recencés avec parades et alarmes.

Oise : signalé au Pas Bayard/Hirson : I couple possible.

Le bilan pour cette espèce n'ayant jamais été signalée nicheuse en Picardie est donc de 5 couples. La moitié seulement des sites favorables ayant été recencés, une estimation à I0 couples pour tout le réseau est plausible

TROGLODYTE Troglodytes troglodytes

Quelques stations : Boué, Erloy, F.C.B., F.N.T., Le Nouvion en Thiérache... Le Troglodyte est abondant le long des ruisseaux de la forêt de St Michel et l'on trouve environ 30 cantons de Troglodyte pour I de Cincle.

ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis

Des chanteurs notés à Le Nouvion en T.,St Quentin...

TRAQUET TARIER Saxicola rubetra

Une seule localité d'observation : I ♂ cantonné le I Mai et I couple le le I Juillet à Englancourt.

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe

Juvigny : plusieurs en migration le I Septembre.

TRAQUET PATRE Saxicola torquata

Quelques données : Soissons : I ♂ le 2I Mars, Hurtebise : I ♂ cantonné le 2I Mai, St Nicolas aux bois : I ♂ le 9 Juin

ROUGE QUEUE NOIR Phoenicurus ochruros

St Nicolas aux bois : I C nicheur le 9 Juin. Pas d'autres données!

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus

Englancourt : I C cantonné le I Mai

ROUGE GORGE Erithacus rubecula

Noté à : Boué, Erloy, Clairfontaine, F.C.B., F.N.T., forêt de St Michel, Le Nouvion en Thiérache...

ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos

Quelques localités : Autrepnes, Boué : plus de IO chanteurs le 6 Juin, Clairfontaine...

GORGE BLEUE A MIROIR Luscinia svecica

Cette espèce qui passe généralement inaperçue lors de ses migrations a fait l'objet d'I donnée : I ♂ le 9 Sept. à Boué (C Scuotto)

GRIVE LITORNE Turdus pilaris

Un gros effort a été fait cette année sur la nidification de la Grive litorne. Un article descriptif sera fait ultérieurement aussi nous ne dresserons qu'un rapide bilan.

Hivernage : jusqu'au 2I Mars à Malzy et en Thiérache et à partir du 23 Octobre à Malzy; bien répandue ensuite.

Nidification :

Any Martin Rieux : 6 Ad. le 7 Juil.,alarmes et transports de nourritures orienté vers une haie. 3 à 4 couples probablement.

Martin Rieux/ Any Martin Rieux : Rassemblement de 50 Ad. et grands juv. volants le I5 Juillet. Des adultes alarment; est ce une colonie proche ou une concentration post-nuptiale locale? Nous penchons plutot pour la première hypothèse.

Beaumé : I Ad. et 2 Ad./5 grands juv.; I Ad. alarme le 7 Juillet
I Ad. et I autre alarmant le I6 Juil.
Bilan : 2 couples dont I certain.

Boué : Noté du 2I Mars au 2I Août avec I max. de 2 Ad. vus ensembles.
I Ad. attaque un Milan noir le 20 Mai, 2 Ad. avec transports

orientés de nourritures le 8 juin. Bilan : I C certain peüt-être 2.
Englancourt : I Ad. le I Juillet, non revu ensuite...?
Eparcy : I Ad. en vol le 22 Juillet. I couple?
Faigny : 2 Ad. recherchent de la nourriture le 22 Juil. I à 2 C possibles
Leuze : 3 Ad. alarment le I6 Juillet. 2 couples possibles
Bobigny/Leuze : 3 Ad. alarment le I5 Juillet. 2 couples possibles
SaintMichel : I Ad. le I6 Juillet
Les Watignes/Watigny : 8 ind. avec transports orientés de nourritures le I6 Juillet. Minimum de 4 couples
Les Rigoles/Watigny : I0 ind. mini alarmant dans une peupleraie inondée le I5 Juillet. Mini I0 couples.
Une extension nette est donc à remarquer cette année. Tous les biotopes sont bien typés : il s'agit de haies ou d'arbres isolés en bordure de ruisseaux ou d'étangs.

MERLE NOIR Turdus merula

Trés commun. Quelques chanteurs précoces : I le I8 fev. en F.C.B., I le 28 à Malzy. Des juv. non volants le I7 Avril à Boué.

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus

Peu d'observations! F.C.B. : 50 le II Janvier, Chigny : grosses bandes le 25 Janvier.

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos

Boué : régulière, chante dès Février
F.C.B. : cantonnée début Février....

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus

Notée à Englancourt(Juil. et Oct.) et Erloy(Oct.) C'est tout...

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti

Contactée dans seulement 2 localités.
Boué : premier chant le 2I Mars, régulière ensuite, 2 cantons en Juin puis un seul contact jusqu'en Octobre.
Chivres : 2 chanteurs les I9 Avril et 28 Mai

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE Locustella luscinioides

I chantuer à Boué le I5 Juillet

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia

Hormis 2 chanteurs en forêt du Régneval/Erloy le 3 Juillet, aucune autre mention. C'est peu pour une espèce qui doit être assez commune.

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobanus

premier chant le 8 Avril à Boué, régulièrement notée ensuite.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus

Boué : I chanteur le 8 Avril, nombreux le 20 Mai, I Ad./4 juv. le I5 Juillet. Dernières le 2I Août.

St Nicolas aux bois : I chanteur le 20 Juillet

Vermand : I nid/ 3 pulli le 25 Mai

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris

Erloy : I chanteur le 3 Juillet dans un fourré humide

HYPOLAIS ICTERINE Hippolais icterina

Une seule donnée d'un individu tardif observé le 30 Septembre à Englan court (H. Dupuich)

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta

Aucune donnée!! Il serait pourtant intéressant de suivre l'expansion de cette espèce.

FAUVETTE DES JARDINS Sylvia borin

Première : I chanteur le II Avril en F.N.T.

Nicheuse à Boué, Erloy...

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla

Premiers chants le 2I Mars à Boué et le 22 à Vermand

Boué : I $o^{\wedge}$ le 22 Mars, I C le I6 Avril, régulière jusqu'en Juillet.

F.N.T. : 3 $o^{\nearrow}$ chanteurs séparés de 2 et 5 m. le II Avril.

Notée regulièrement en période de nidification à : Clairfontaine, Erloy, Englancourt, forêt de St Michel...

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca

Seulement 2 localités : Autreppes, I le II Juillet et I au M.I.S.Q. dès le I4 Avril. Il peut s'agir d'oiseaux nicheurs.

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis

Quelques localités de nidification.

Boué : I chanteur le I6 Avril, noté jusquau I5 Juillet

Clairfontaine : I canton le 7 Juin

Englancourt : I C cantonné les 2I Mai et 2 Juillet

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus

Premiers : le 26 Mars au M.I.S.Q. Ensuite, I le 7 Avril à Erloy et le 8 à Boué. Noté aussi à A.S.L. et en F.N.T. en Avril

Boué : Ad. + juv. le 2I Août

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita

Premier chanteur à Vermand le I8 Mars puis à Boué et Soissons le 2I Mars

Noté en période de nidification (Avril à Juin) en de nombreuses localités.

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix

Cité de 2 localités où la nidification est probable :

Boué : chanteur le I Juillet

F.N.T. : 3 chanteurs le 3 Juillet.

ROITELET HUPPE Regulus regulus

Boué : observé en Juillet régulièrement (nicheur possible); 2 le 29 Oct.

ROITELET TRIPLE BANDEAU Regulus ignicapillus

Une seule donnée : I le 7 octobre (C. Scuotto)

GOBE MOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca

I ♀ en migration le 28 Août à Boué.

GOBE MOUCHE GRIS Muscicapa striata

I Ad. cantonné le I Juillet à Malzy. C'est tout!

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus

Quelques données concernant des nicheurs.

Boué : parades le 28 Mars, I C cantonné le I6 Avril, Ad. et juv. le 7 Juil

F.C.B., forêt de Régneval...

MESANGE NONNETTE Parus palustris

I le I Février en F.C.B.

MESANGE BOREALE Parus montanus

Boué : nicheuse certaine; forêt du Régneval : parades le 7 Avril;

Sorbais : le 3 Juillet

MESANGE HUPPE Parus cristatus

Boué : I le 29 Octobre

Forêt de St Michel : I chanteur le I Mars

MESANGE NOIRE Parus ater

I le 25 Janv. en F.C.B.

Pour ces 2 espèces la non prospection des zones à conifères explique cette apparente rareté.

MESANGE CHARBONNIERE Parus major et MESANGE BLEUE Parus caeruleus

Communes.

SITELLE TORCHEPOT Sitta europaea

Quelques localités : Boué : I canton le 2I Mars, F.C.B. : 5 le I5 Fév.

Forêt de St Michel : 8 cantons en Mars Avril le long de l'Artoise et une nidification dans une boite nichoir à Vermand : éclosion le 24 Avril

GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla

I le I Mars en forêt de St Michel...

BRUANT PROYER Emberiza calandra

Pas de données particulières. L'espèce est rencontrée dans les zones de cultures et sur les bassins de décantations comme à A.S.L., Bucy le Long.

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella

Observé dans de nombreuses localités, surtout en été.

BRUANT ZIZI Emberiza cirlus

I ♀ le 23 Octobre à Englancourt; migratrice.

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus

A.S.L. : canton le I3 Avril, I le I3 Juillet; Boué : 4 couples le 28 Mars Marle : cantons le I3 Avril, Villers en Prayères ...

Autreppes : I le II Juillet cantonné dans un milieu sec; I ♀ cantonné dans un champ de blé le 7 Juil. à Leuzé, I le I5 dans une prairie humide à Clairfontaine.

Migration : plusieurs dizaines dans un champ à Laffont le I Septembre.

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs ; VERDIER D'EUROPE Carduelis chloris

CHARDONNERET ELEGANT Carduelis carduelis : Communs et réguliers

TARIN DES AULNES Carduelis spinus

Premiers le 2 Oct. à Bihécourt; 70 le 23 Oct. à Boué.

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina

Régulière et abondante. Migration observée à Boué le 23 Octobre

SERIN CINI Serinus serinus

I ♂ chanteur le 2 Avril à Englancourt. Peu observé dans l'ensemble

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula

Plusieurs localités d'observations en été...

GROS BEC Coccothraustes coccothraustes

I chanteur le I Mars en forêt de St Michel

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus

MOINEAU FRIQUET Passer montanus

Saint Nicolas aux bois : I C/ juv. de I0 jours dans un trou d'arbre, 2 autres couples nicheurs le 6 Juin

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris

Nicheur commun; transport de nourritures le I3 Avril à Boué.

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus

Boué : I chanteur le 8 Juin, I autre le 6 Juin à St Nicolas aux bois.

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius

Nicheur dans les forêts. Migration observée le 23 Dec. à Boué et le 22 Octobre à Englancourt.

PIE BAVARDE Pica pica

Nombreux nids en Avril dans les haies du bocage en Thiérache.

CASSENOIX MOUCHETE Nucifraga caryocatactes

I le 2I Décembre à Boué (C. Scuotto)

CHOUCAS DES TOURS Corvus modedula

I colonie à Le Nouvion en Thiérache...

CORBEAU FREUX Corvus frugelegus

Quelques colonies : Chivres(I5 nids), La Capelle(8 nids en bocage), Rouvroy(35 nids), St Clément(40 nids).

Bien plus dispercé en hivernage.

CORNEILLE NOIRE Corvus corone

Toutes les localités d'observation concernent des nicheurs probables ou certains.

A.S.L., Boué, St Michel, Sissone, Chigny, Clairfontaine, Coingt, Dohis, Englancourt, Erloy, F.N.T., F.C.B., forêtdu Régneval,Hirson, Leschelles, Marly, Malzy. Espèce bien commune donc.