

NOTE SUR LE REGIME ALIMENTAIRE
DU FAUCON CRECERELLE Falco tinnunculus
DANS L'AMIENOIS

par D. Masson

Dix neuf pelotes de réjection ont été récoltées le 7 juillet 1980 au pied d'un nid de Faucon crécerelle, quelques jours après l'envol des jeunes.

Les environs immédiats du site de nidification (commune de Boves) sont constitués de champs ouverts (céréales) proches de la vallée de l'Avre, marécageuse et boisée.

L'analyse de ces pelotes a fourni les restes suivants :

- 1) Insectes : Des pièces chitineuses d'insectes indéterminés ont été trouvées dans trois pelotes. Une quatrième contenait les restes d'un Coléoptère indéterminé.
- 2) Oiseaux : Des fragments de calamus de Passereaux indéterminés figuraient dans cinq pelotes. L'une de ces pelotes contenait en outre un humérus de Passereau. Deux autres pelotes renfermaient quelques plumes de Bruant jaune (Emberiza citrinella) ou de Verdier (Carduelis chloris).
- 3) Micromammifères : Les 19 pelotes contenaient les restes de :
 - 5 Campagnols indéterminés (Microtus/Pitymys)
 - 1 Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus)
 - 1 Campagnol souterrain (Pitymys subterraneus)
 - 9 Campagnols des champs (Microtus arvalis)
 - 2 Campagnols agrestes (Microtus agrestis)
 - 2 Musaraignes carrelots (Sorex coronatus)

Notons enfin la présence d'une dépouille de Campagnol des champs (Microtus arvalis) décapité, près du nid.